

C A E L I I

# A V R E L I A N I S I C C E N S I S, M E -

D I C I V E T V S T I, E T I N  
tractanda morborum curatio-  
ne diligentissimi, secta  
Methodici,

\*

De Acutis morbis.

Lib. III.


De Diuturnis.

Lib. V.


Ad fidem exemplaris manu scripti castigati,  
& Annotationibus illustrati.

*Cum Indice copiosissimo, ac locupletissimo.*

I N V I R T V T E,



E T F O R T V N A.



L V G D V N I,  
A P V D G V L I E L. R O V I L L I V M,  
S V B S C V T O V E N E T O.

M. D. LXVI.

C V M P R I V I L E G I O.

---

*Extrait du priuilege du Roy.*



A R grace & priuilege du Roy est permis à Guillaume Rouille libraire de Lyon, d'imprimer, ou faire imprimer, vne fois ou plusieurs, ce present liure intitulé *Celij Aureliani Siccensis Medici vetusti, de Acuth & Diuturnis morbis libri, ad fidem exemplaris manuscripti castigati, & Annotationibus illustrati*. Lequel liure il a recouuté avec grans fraiz, mises & despenles: & pource est faict defense de par ledict Seigneur, à tous autres libraires, imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, vendre, ni distribuer en ses pays, terres & seigneuries, ledict liure imprimé par ledict Rouille, si ce n'est par son consentement, & ce iusques au temps & terme de neuf ans, à compter du iour & datte que sera paracheuée la premiere impression, sur peine d'amende arbitraire & de cōfiscation des liures qu'ils auroyent imprimez. Et à fin qu'aucun ne pūisse pretendre ignorance du present priuilege, ledict Seigneur veut & entend, que l'extrait d'iceluy estant mis au commencement, ou à la fin dudit liure, serue pour toute notification, comme si la signification estoit faicte sur l'original. Car tel est son plaisir, comme plus à plein est contenu & déclaré par les lettres de priuilege, sur ce données à Moullins le vingtiesme de Feburier, l'an de grace, mil cinq cens soixante six, & de son regne le sixiesme.

*Par le Roy en son Conseil,  
Signé De Vabres.*

*Et scellé du grand seau en cire iaune à simple queue.*





# LECTORI S.



**V**I in veterum scripto-  
rum Græcorum & La-  
tinorum, veluti Galeni,  
Athenæi, Actij, Plinij,  
huius ipsius Cælij Au-  
reliani, aliorumque li-  
bris tantum Medicorum  
numerum citari obser-

uarit, secum ipse reputabit, opinor, plures olim  
eosque præcellentes viros in arte Medica tum  
exercenda, tum literarum monumentis con-  
signanda, quàm ullos vnquam aliqua alia in ar-  
te vel scientia colenda floruisse. Ex quo Medi-  
cinam maiore quondam, quàm nunc sit, in ho-  
nore, & multò celebriorem fuisse perspicuum  
est. Sed in ea explicanda atque tractanda non  
eandem omnes viam secuti sunt, qua ad id quod  
vellent peruenirent. Omnium enim vetustissi-  
mi pharmaca plurima, vel ab herbis & stirpi-  
bus, vel ab oraculis & insomniis petita, vel ex  
animalibus obseruata ad varios sanandos mor-  
bos accommodata, id est *ὑπερίπιν*, literis man-  
darunt. Alij non solùm medicamentis omnis ge-  
neris, sed & eorum certo vsu atque effectu, &  
morborum differentiis atque causis, ac alijs per-  
multis quæ ad artis perfectionem desiderabantur,

# E P I S T O L A.

λογικῶς describendis medicinam summa cum  
 laude amplificarunt. Alij multò angustioribus  
 terminis artem circumscripsere. Eam enim neq;  
 longam, neque difficilem esse rati, methodum  
 quandam seu rationem artis compendiarium  
 tradiderunt. Hinc tres potissimum nobiles sectę  
 extitere, ex ea re cui singularum authores & de-  
 fensores omnia in hac arte tribuebant, nomi-  
 nata, quas prolixius explicare non est huius in-  
 stitutę scriptiois, neque temporis. Illud nunc  
 volo dicere, Quemadmodum constat inter om-  
 nes qui bene à natura informati, bonisq; artibus  
 & philosophorum præceptis instituti sunt, Hip-  
 pocratis, Galeni, eorumq; qui hos duces sequun-  
 tur, sectam quę λογικὴ, quòd ratione nitatur, di-  
 citur, cæteris longè anteponendam esse, sic reli-  
 quas & veterum summorumq; virorum autho-  
 ritate commendari, & ex dogmatum sese conse-  
 quentium coaceruatione constare, & doctrina  
 aliqua contineri existimandū est: quin & multa  
 ab ipsorum authoribus & rectè scripta esse, &  
 curandis morbis accommodata. Nam Galenus  
 in libris de Compos. Medicam. κατὰ τόπους, καὶ  
 κατὰ γέννη, Aetius, Paulus, aliiq; Græci & Latini  
 ab Empiricis & Methodicis remedia varia mu-  
 tuati sunt. Quod si multa ab arte aliena, multa  
 perperam dicta, multa prætermissa sint ab ipsis,  
 ut reuera sunt, ne ea quidem nos ab eorum le-  
 ctione detertere debent, imò potius incitare, ut  
 ex illorum cum rectis contentione ac disquisi-  
 tione veritas magis eluceat. Qua in re Galenum  
 imitabimur, qui infinitus prope locis Empirico-  
rum

rum Methodicorumque placitis refellēdis saepe  
lectorem diutius remoratur. Quos locos sine le-  
ctione eorum authorum quorum sententiæ im-  
probantur intelligi posse nō video, multò minùs  
libros quos idem Galenus dogmatis ipsorum  
conuellendis dicauit, quorum alterum de opti-  
ma secta ad Thrasymbulum, alterum de sectis ad  
eos qui introducuntur, inscripsit. His ego ratio-  
nibus sum adductus vt credam Empiricorum,  
Methodicorumque scripta non omnino indi-  
gna esse quæ Medicorum manibus terantur,  
hæcque inprimis quibus Cælius Aurelianus  
Methodicus de morbis acutis & diuturnis ac-  
curatè pertractauit. Quorum cum ferè oblite-  
rata esset memoria, tum quòd iampridem excu-  
sorum magna admodum penuria esset, tum quòd  
ea exemplaris vitio turpissimis maculis defor-  
mata, fracta, multisque vulneribus confecta cō-  
temnerentur, ope vetusti codicis manuscripti,  
aliorumque cum eo collatorum excellentissi-  
mus & literatissimus Medicus totius operis ma-  
culas deleuit, fracta restituit, vulnera curauit,  
doctissimis annotatiunculus in margine ascri-  
tis illustrauit. Quæ cum ego nactus essem, eaq;  
Medicis & lectu iucunda, & scitu vtilia esse iu-  
dicarem, author omnino fui Gulielmo Rouillio  
Typographo, vt ea typis elegantioribus excu-  
deret: id quod faciliè ab eo impetraui, qui & pu-  
blicæ vtilitatis sit studiosissimus, & nullis par-  
car sumptibus, vt boni authores emendati, &  
characteribus elegantissimè conformati veniant  
in manus hominum. Quare & illi qui hunc au-

EPISTOLA.

thorem pene extinctum in lucem reuocauit, & huic qui vt in publicum prodiret, effecit, Lector habe gratiam, ac vtriusque opera grato animo fruire. Cæterum de vita Cælij Aureliani, quoq; tempore vixerit nihil dum legi. Ex inscriptione quidem horum librorum Numidam fuisse constat. Nam Plinio ac Ptolemæo Sicca Numidiæ est oppidum: ex lectione verò Galeno superiorem: neq; enim cùm tot authores nominet, cùm in vetustiorum sententiis refutandis, suis confirmandis tam sit diligens, Galenum vnquam prætermisisset. Præterea cùm tot Græcos Medicinæ scriptores peruolutarit, quorum catalogū habes cùm tot ipse de medicina libros ediderit, quorū nomina in amplissimo indice reperies,

Græcæ linguæ & medicinæ peritissimum, & in tractandis morbis maximè versatum fuisse docti omnes iudicabunt,

## CAPITA PRIMÆ

## LIBRI OXEON PAS-

## SIONVM.



I.	Vtrumne sint signa phrenitica futura passionis.	pag. 8
II.	Quæ sequuntur eos qui in phreniticam passionem proni intelligantur, quos labiles diximus.	11
III.	Quomodo intelligitur phrenitis.	12
IIII.	Quæ sint huic similes passionēs, & quomodo discernuntur.	15
V.	Quomodo discernimus à phreniticis eos qui furore febricitant.	16
VI.	Quomodo discernimus dormientes phreniticos ab his qui in lethargicam deueniunt passionem.	17
VII.	Quæ sint differentiæ phreniticæ passionis.	19
VIII.	Quis locus in phreniticis patitur.	19
IX.	Quomodo curandi sunt phrenitici.	21
X.	De phlebotomia.	25
XI.	De cucurbita.	27
XII.	Ad Dioclem.	34
XIII.	Ad Erasistratum.	36
XIIII.	Ad Asclepiadem.	ibidem
XV.	Item ad Asclepiadem phreniticos curans.	40
XVI.	Ad Themisonem.	53
XVII.	Ad Heraclidem.	57

## CAPITA SECVNDI LIBRI.

I.	De Lethargo.	64
II.	Quæ sequuntur eos qui in lethargiam uenire posse noscuntur.	67
III.	Quomodo discernimus lethargos ab ijs qui similibus afficiuntur.	68
IIII.	Quomodo curandi sunt lethargi.	71
V.	Ad Dioctem.	ibid.
VI.	Quis locus in lethargicis patitur, & quo- modo curandi sint lethargici.	72
VII.	Ad Dioctem.	75
VIII.	Ad Praxagoram.	ibid.
IX.	Ad Asclepiadem & Themisonem, & Hera- clidem Tarentinum.	77
X.	De apprehensione uel oppressis, quos Græci cataleptos appellant.	84
XI.	Quomodo curandi sint hac passione labo- rantes.	93
XII.	Quomodo aliarum sectarum principes istam curauerunt passionem.	94
XIII.	De pleuritica passione.	96
XIIII.	Quæ consequuntur pleuriticos.	98
XV.	Quomodo intelligimus pleuriticam passionē in peripneumoniam transcuntem, aut in uomicam uenientem.	100
XVI.	Quis locus in pleuriticis patitur.	101
XVII.	Quæ sunt similia pleuritice passioni. Et quo- modo internoscuntur.	103
XVIII.	Quomodo curandi sunt pleuritici.	104
XIX.	Ad Hippocratem.	108
XX.	Ad Dioctem.	114
XXI.	Ad Praxagoram.	ibid.

XXII.	Ad Aſclepiadem.	116
XXIII.	Ad Themifonem.	118
XXIII.	Ad Heraclidem.	ibid.
XXV.	De peripneumonia.	120
XXVI.	Quæ eſt peripneumoniæ intelligentia.	ibid.
XXVII.	Quomodo intelligitur peripneumonia.	121
XXVIII.	Quis locus in peripneumonicis patitur.	123
XXIX.	Quomodo curandi ſunt peripneumonici.	ibid.
XXX.	De Cardiacis.	128
XXXI.	Quid eſt cardiaca paſſio, uel quomodo eius agnitio tradenda.	129
XXXII.	Quomodo intelligimus eos qui in cardiacam uenire poſſunt, aut etiam in ipſa conſtitutos.	130
XXXIII.	Vtrumne febricitent cardiaci.	133
XXXIII.	Quis in cardiacis locus principaliter patitur.	136
XXXV.	Quomodo diſcernimus cardiacos ab his qui ſtomacho patiente ſudauerint.	138
XXXVI.	Quomodo diſcernimus cardiacos ab his qui proſpero ſudore liberantur, quem Græci Criticum uocant.	140
XXXVII.	Quomodo curandi ſunt cardiaci.	141
XXXVIII.	Quomodo aliarum ſectarum principes cardiacos curauerint.	152
XXXIX.	Vtrum rectè Aſclepiades cardiacos curauerit.	154
XL.	Vtrum rectè Themifon cardiacos curauerit.	157
CAPITA TERTII LIBRI.		
I.	De Synanche.	159
II.	Quæ conſequentur ſynanchicos.	161

III.	Quomodo curandi sunt synanchici.	163
IIII.	Quomodo synanchicos aliarum sectarū principes curauerint.	168
V.	De Apoplexia.	177
VI.	De conductione quam Græci spasmō uocant, & distictione quam tetanō uocant, & earum speciebus.	182
VII.	Quomodo discernimus raptum quem Græci spasmō uocāt, à tremore atq; saltu.	185
VIII.	Deuratione.	187
IX.	De Hydrophobia.	195
X.	Quæ est definitio seu agnitio hydrophobiæ.	196
XI.	Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicam passionem proni ac declines esse uidentur.	ibidem
XII.	Quæ sunt similia hydrophobiæ: & quomodo internoscentur.	198
XIII.	Vtrumne animæ an corporis passio sit hydrophobia.	199
XIIII.	Quis locus in hydrophobicis patitur.	200
XV.	Vtrum noua passio sit hydrophobia.	202
XVI.	Quomodo curandi sunt hydrophobæ.	205
XVII.	De acuto tormento, quod Græci ileon appellant.	210
XVIII.	De Satyriasi.	223
XIX.	De Cholericis.	227
XX.	Quæ sequuntur eos qui cholerica passione afficiuntur.	229
XXI.	Quomodo curandi sunt cholerici.	231
XXII.	De defluxione quam Græci diarrhœam uocant.	238



CAPITA PRIMI LIBRI  
CHRONION.

I.	<u>De capitis passione quam Græci cephalæan</u> <u>nominant.</u>	243
II.	<u>De Scotomaticis,</u>	261
III.	<u>De Incubone.</u>	262
IIII.	<u>De Epilepsia.</u>	264
V.	<u>De furore siue insania, quam Græci maniam</u> <u>uocant.</u>	296
VI.	<u>De Melancholia.</u>	310

CAPITA SECUNDI LIBRI.

I.	<u>De Paralyfi.</u>	312
II.	<u>De canino raptu, quem Græci cynicon spas-</u> <u>mon uocant.</u>	336
III.	<u>De auriculæ dolore, atq; humoris fluore per</u> <u>auditorias cauernas.</u>	ibid.
IIII.	<u>De dolore dentium.</u>	339
V.	<u>De apprehensione siue oppressione, quam</u> <u>Græci catalepsin appellant.</u>	345
VI.	<u>De uocis amputatione, quam Græci phones</u> <u>apocopen uocant.</u>	346
VII.	<u>De influxione quam Græci catarrhon uo-</u> <u>cant.</u>	347
VIII.	<u>De Tussicula.</u>	355
IX.	<u>De sanguinis fluore.</u>	356
X.	<u>Quot, uel quæ sint differentie floris san-</u> <u>guinis.</u>	357
XI.	<u>Quomodo intelligamus differentiam floris</u> <u>sanguinis.</u>	359
XII.	<u>De effectu siue exitu supradictarum passionum</u> <u>quem Græci Apotelesma uocant.</u>	362
	XIII. De	

XIII.	De curatione.	367
XIIII.	De phthifica passione.	385

#### CAPITA TERTII LIBRI.

I.	De suspirio siue anhelitu quē Græci Asthma uocant.	394
II.	De Stomachicis.	398
III.	De Phagedæna.	410
IIII.	De Iecorosis quos Græci hepaticos uocant, & lienosis, quos splenicos dicunt.	411
V.	De Aurigine siue arquato morbo, quē uulgō morbum regium uocant, Græci icteron.	419
VI.	De Cachexia.	423
VII.	De nutrimenti cessatione, quam atrophiam Græci uocant.	427
VIII.	De Hydrope.	429

#### CAPITA QVARTI LIBRI.

I.	De Elephantiasi.	444
II.	De Phthiriasi.	449
III.	De Ventriculosis, quos Græci cœliacos uocant, & de cæteris defluxionibus.	450
IIII.	De Ventris debilitate.	473
V.	De Ventris tumore ac duritia & uentositate, inflatione, ac saltu.	473
VI.	De Dysenteria.	474
VII.	De Colicis passionibus.	477
VIII.	De Lumbricis.	483
IX.	De Mollibus siue subactis, quos Græci malthacos uocant.	492

#### CAPITA QVINTI LIBRI.

I.	De Ischiadicis & Psœadicis.	495
II.	De	

- II. De articuloꝝ passione, quam Græci ar-  
thritin uocant, & de pedum dolore, quem  
podagram appellant. 513
- III. De Renali passione quam Græci Nephritin  
appellant. 522
- IIII. De tardis uesicæ passionibus. 525
- V. De somno Venereo quem Græci onirogo-  
non appellant. 532
- VI. De sanguinis emissionē ex debilitate semi-  
nalium uiarum. 535
- VII. De priapismo. *ibid.*
- VIII. De uomicis siue internis collectionibus, quæ  
Græci Empyemata uocant. 536
- IX. De superflua carne quam Græci polysar-  
cian uocant. 550

CATALOGVS AVTHORVM  
*qui toto opere citantur.*

Agathinus.	Gaius.
Alexander Laodicensis.	Heraclitus.
Andreas.	Heraclides Tarentinus.
Antipater.	Herodicus.
Antiphanes.	Herophilus.
Antigenes Cleophrantinus.	Hippocrates.
Apollonius Herophilus.	Leonides Epistyntheticus.
Apollonius Citienfis.	Lufius fivc Lucius.
Apollonius Memphites.	Magnus.
Apollonius Glaucus.	Magnus Ephesus.
Apollonius Mys.	Menemachus.
Apollophanes.	Menecrates.
Archigenes.	Milefius.
Aristoteles.	Mhaseas.
Aristoxenus.	Niger.
Artemidorus Sidenfis.	Niceratus.
Artorius.	Nicander.
Asclepiades.	Parmenides.
Asclepius.	Philippus.
Athenæus Tharfensis.	Philotimus.
Bachius.	Philiftion.
Caridemus Erafiftratus.	Polybius.
Caffius.	Praxagoras.
Clodius Chryfippus.	Proculus.
Demetrius Attaleus.	Ptolemæus.
Demetrius Herophilus.	Serapion Empiricus.
Demetrius Aponicus.	Silimachus.
Diocles.	Sorantus.
Dionyfius.	Theffalus.
Demarchus.	Titus Asclepiadis difcipulus
Democritus.	Themifon.
Erafiftratus.	Tryphon.
Empedocles.	Tullius Baffus.
Eudemus.	Valens Phylifcus.
Euenor.	Zenon.
Euryphon Gnidius.	







## CAELII AVRELIA-

NI METHODICI SICCEN-

SIS CELERVM VEL

acutarum passionum

Liber primus.

\* \*



IVNT Ippallum pythagori-  
cum Philosophum interroga-  
tum quid ageret, respondisse,  
nondum\* nihil: Nondum quidē  
mihī inuidetur. Si igitur profi-  
cientium testis est inuidia, quæ  
nobis olim comes est, magna ge-

rimus, in his\* quæ gerimus. Placet itaq; Bellice disci-  
pulorum summe, celerum passionum libros scribere,  
quos tibi utiles magis quam necessarios fore confido.

Vtiles inquam ut si qua forte à Græcis obscurè dicta  
sunt, reuelentur. Nonnūquam necessarios: \* hæc enim

necessario, \* in quo sunt\* posita, me tradente legisti.

Nam interrogationum ac repositionū libros, quibus

omnem medicinam breuiter dixi, iamdudum ad Lu-

cretium nostrum perscriptos aptissime destinaui. Is

enim, ut nosti, ex omni parte Græcarum scientia præ-

ditus est literarum. Principio te scire uolo omnium

celerum passionum aliquas esse cum febribus, aliquas

sine febribus. Quarum necessario cum febribus, sunt

plurimæ; ut phrenitis, lethargia, pleuritis, peripneu-

a

\* i. hæcenus

nihil

Sicly 8-  
deu.\* quæ cum in-  
uidia gerimus.

\* hoc

\* ob quod

\* compositi

monia. Sine febribus autē synāche, cholera, & id ge-  
 \* in nus, sicut \* ex consequentibus docebimus. Sed exor-  
 dium sumemus ab his quæ cū febribus esse noscuntur:  
 siquidem febres sunt acutis magis comites passiōi-  
 bus, in quibus est phrenitis præponenda. Nomen igitur  
 sumpsit à difficultate mentis, sicuti & dysenteria,  
 & dysuria, quòd urinam uel uentrem impediunt.  
 \* quatum Phrenas enim græce mentes uocauerunt \* quare ut  
 supra diximus impedimentum phrenetica ingerit pas-  
 \* Herophilū sio. Nam Demetrius \* Erophilum sequens libro sexto  
 quem de passiōibus scripsit, hanc definiens, deliratio-  
 nem dixit uehementem, cum alienatione, atque febre  
 desinentem in interfectionem celerem, aliquando &  
 in sanitatem. Sed neque à deliratione uehementi alie-  
 nationem differre quisquam existimet. Hanc sanè pas-  
 sionem non frequētius cum febribus, sed iugiter ac ne-  
 cessario nunquam sine febribus esse accepimus, dehinc  
 ultra disciplinam elatus longa hoc definitione expli-  
 casse perspicitur adiiciendo cito interficientem esse  
 passiōem uel desinentem in sanitatem celerem. Erat  
 \* hinc observa facile \* acutam uel celerem passiōem dicere, quòd in  
 quos morbos utranque partem ocys feratur, & esset hoc defini-  
 acutos veteres tioni sufficiens. Asclepiades primo libro de celeribus  
 appellarint. scribens passiōibus, phrenetis, inquit, est corpusculo-  
 \* sequentia in- rum statio, siue obtrusio in cerebri mēbranis frequen-  
 dicant legen- ter sine \* sensu, cum alienatione, & febribus.  
 dum, consensu Hanc ipse \* explorans diffinitionem, cum febribus, di-  
 \* explicans. xisse inquit: siquidem sine his etiam mente alienan-  
 exponens. tur qui papauer aut mandragoram, aut altercum bi-  
 \* morbus enim tur qui papauer aut mandragoram, aut altercum bi-  
 is per protopa berint, aut inmensa ira, aut nimio timore commoti,  
 etiam fit, & uel mæstitia etiam compressi, aut epileptica sunt agi-  
 non sympha- tati passiōe \* sine consensu ( inquit ) definiens, ne  
 etiam



etiam pleuriticum uel peripneumonicum phreneticum putaremus, qui in statu uigore passionis septima uel octaua die saepe mentis erroribus agitantur. Eius sectatores quidam, residuam partem definitionis \* differentes. stationem corpusculorum uel obtrusionem, aiunt cum dixisse secundum membranas cerebri, si quidem sunt etiam \* medullarum spinæ membranæ in quibus cum fuerit obtrusio, non ingerit phrenithim. Pluraliter autem usum dicunt, ut membranas diceret. Siquidem siue per multas, siue per omnes id eueniat, si singulariter poneret, negaret esse in multis, sed quisquis hunc sequeretur, unius esse membranæ causam putaret. Frequenter autem quod adiecit definiens, quidam sequentibus adscripserunt, ut sic intelligamus, frequenter sine consensu: si consensu quia uehemens fit aliquando phrenitis. Alij uero antecedentibus esse inquit iungendum, ut sic intelligatur: frequenter statio, uel obtrusio, quomodo enim febrem, illam uehementem dixit, cum de causis tractaret, quæ per stationem uel obtrusionem fuerit, illam uero solubilem, atque leuem, quæ ex turbatione fuerit liquidarum materialium, atque spiritus, sic etiam phreniticam passionem illam dixit esse uehementem, quæ statione uel obtrusione fuerit effecta corpusculorum. Alij uero non, inquit, quod sine \* obtrusione fiat aliquando phrenitis, id Asclepiadē dixisse \* accipiamus, sed quia \* sola ex uehementi. Sunt etiam quædam in hominibus sanis \* obtrusiones. Erat igitur melius, ut manifestis & consequentibus uerbis intelligendam traderet passionem, & non per occultā atq; dissonantem obtrusionē, & quæ fortasse neq; esse probetur, sicut libris quos

\* explanantes  
 τὰς αἰν. vel μ.  
 φῆσιν  
 \* medulla

\* obtrusione  
 \* putamus  
 \* solum  
 \* μὴ ἄλλο

\* contra

\* Soram, quē  
potissimus se-  
quebatur.

\* intra sectas unius \* scriptoris edidimus, docebimus.

Sed neq; oportuit eandem obtrusionem simul phreni-  
tim atq; phreneticæ passionis causam uocare. Siquidē  
uis \* loquutionis nihil aliud designet, quā phrenitim  
esse phreneticæ passionis causam. Etenim dicere ab-  
surdum est, quōd secūdum Asclepiadem causa ea \* scri-  
ptionum siue partitionum sit quas Græci categorias  
appellant, non appellationum quas idem prosegorias  
uocat: Non enim alienationis aut febrium, sed alie-

\* definitionis

ab Asclepia  
de tradita

\* appellationes

Asclepiadici  
seu παρρησιαςvocabant no-  
mina ipsa re-tum ut φρενι-  
τις, παρρη-  
σις. Scriptio-nes vero seu  
partitiones ver-

ba

\* nominibus

ipsis \* scripta, ut  
φρενιτις, παρ-ρησις. Adscrip-  
tionē

ut infra

\* dissertationē

interpestiuam

\* quam hic a

gimus

\* Asclepiades putabat aliud esse φρενιτις, aliud παρρησις, & propterea causam  
esse putabat aliam τὸ παρρησις quā dicto παρρησις est non τὸ φρενιτις, quā  
vox est παρρησις itaque is putabat ὑπερσφίς causam esse τὸ φρενιτις, febrium  
verò τὸ παρρησις.

nandi, uel febricitandi causas nominare: & sic etiam  
phrenetizandi non phreneticæ passionis causas dice-  
re. Nam primum ad \* aliud ex \* alia re transire uide-  
bimur: Vtrum ne partitionum, siue adscriptionum, an  
appellationum sint causæ: de qua re cum de passionum  
causis scribere cœperimus, dicemus. Dehinc paulu-  
lum progrediens, ait at quæ statio corpusculorum,  
siue obtrusio in qualibus, uel ex qualibus corpusculis  
fiat, atque etiam quomodo ea quæ partibus eueniunt  
totum commoueat corpus ac febres generent, in his  
quæ decimo libro scripsimus enodauimus. \* Nec enim

febres, inquit causæ generant, sed febricitare: oportebat autem proprie, non improprie loqui. Alij hæc  
defendentes aiunt cum uerbis significasse phrenitim  
esse passionē ex obtrusione effectā, habereq; cōsuetu-  
dinem pro effectu causas ponere. Nam luem definiens  
lues, inquit, est qualitas insueta, in his, ubi est, locis  
consistentium animalium, quæ è communi causa faci-  
libus morbis & interfectiuis adficiuntur. Etiam

Causa

nunc luis causam pro effectu sumpsisse perspicitur. Causa etenim luis, est qualitas : Lues autem decliuitas in ægritudinem prona, atque \* celeberrima, communibus antecedentibus causis. Et in aliis uero his utitur sepe \* sumptionibus quas \* Græci metalepses appellant, ut exempli causa, dicat densatum liquorem pro partibus liquoris densatis: partes enim ad totum redigit. Sed neque expiant his maledicta, \* sed ostendunt etiam aliis similibus peccatis adfectum. Querimus enim non si consuetudinem habuit \* sumptionis faciendæ, sed utrum hæc consuetudo recta esse uideatur. \* Externa etenim si fuerit hæc à diffinitionibus consuetudo, ueniam fortasse merebitur : in \* diffinitionibus uero non poterit ad ueniam pertinere. Oportebat enim definitiuè loquentem propriis uti sermonibus, & non abusiuis, neque \* sumptionibus, quæ in contrarium sepe uocentur. Neque nunc obtrusio causa est phreneticæ passionis, sicut in aliis ostendimus : Neque causam debuit pro effectu accipere, neque in mēbranis cōsequens est, id est, uerum ac probabile obtrusionem fieri, sed in sensibus, hoc est in sensualibus uis, quas Græci αἰσθητικὰ uocant. Omnis enim phrenitis causam uel substantiam alienationem generaliter, communiter autem alienationis substantiam in sensibus constitutam existimauit Asclepiades. Denique in definitionum libris alienationem definiens, hoc genere explicauit : alienatio est passio in sensibus, ex qua aliquando \* maiores intellectus efficiuntur capacitate, non consensu aliarum uiarum, aliquando uero uia capactores motibus, sed hoc \* tardans inquit, ac sine febribus, \* furor uocatur, quem uulgo insaniam dicunt : recens autem atque cum fe-

\* plurimis  
infesta  
\* transsumptionibus  
\* μεταλυσίς  
\* uerum  
\* transsumptionis  
\* in aliis rebus  
id usurpentur,  
\* quam definitionibus

\* maiores impetus ( nempe corpusculorum quæ obtruduntur) capacitate uiarum, sine aliarum partium consensu : aliquando uia capactiores motibus (nimirum cum hic morbus sit exturbatione liquidarum materiarum & spiritus) ut solum de sabre dixit.

\* diuturnum  
\* uariæ

\* consensu bribus, neq; \* cum sensu phrenitis intelligitur. si igitur phrenitis passio est in sensu, non recte eam principaliter definiens obtrusionem dicit esse in cerebri membranis. Addo etiam fieri phrenitim ex \* consensu perseueranti ac uehementi, sicuti ex aliis antecedentibus causis. Oportuit ergo etiam in eo quod definiens adiecit, uerbum frequentiae seruare ordinem, ne dicendi ambiguitatem daret. Ex qua eius sectatores inter se

a visus & cognitus mihi qui esu ciente in inscullo sumptae loco apij hortensis, stolidus & mente captus reliquum vite tempus transigeris. plurimum pugnaverunt. <sup>a</sup> Mentitur etiam aptissime cum suam explanans definitionē dicit quod papauer alienationem facit. Soporiferam etenim ingerit \* pressuram. Hoc adeo defendentes quidam eius sectatores aiunt etiā somno fieri alienationem. Ipse deniq; Asclepiades in primo libro celerum passionū, \* furiosos inquit facere somnum, sic etiam alienationem \* faciunt.

His nos respondebimus, differre pressuram a somno contra naturam. Etenim pressura intelligitur contra naturam somni. Papauera autē pressuram, non somnum faciunt. At si accipiunt etiam pressuram somnum

\* quosdam maniacos fieri ob uocari, quæ necessario contra naturam est, oportebat etiā lethargos dicant alienari, & erit definitio phrenitice passionis lethargicæ communis. Et in lethargis obtrusio est secundum Asclepiadem in membranis cerebri cum febribus ac sine consensu. De hinc etiā in febre febricitantium cōmunis erit definitio. in his enim,

\* somni sub. ipse ait, obtrusionem in membranis cerebri frequenter sine febribus atque cum alienatione effici. Huic occurrentes quidam aiunt quod inquit, cum febribus duo significare. Vnum quod tardantem cum membranarum obtrusione longi scilicet temporis febre significet <sup>b</sup> & non ex ipsa \* soluerit exordium; aliud

\* sumpseris cum febribus quidem, sed causa obtrusionis membrana

branarum naris febres oriuntur parvæ atq; mitiuscu-  
 le cum in minutissimis fiunt plagæ siue\* percussa, atq; \* percussus  
 adfricationes, quæ corpori minimum accendere fe-  
 uorem possint. Sed etiam nunc consentitur confusum  
 dictum, si ex\* hoc duo significat\* alterum ex his \* hac interpre-  
 uerum, alterum falsum. Dehinc febrem fieri in phre- tatione  
 niticis ex obtrusione membranarum\* solitum accipia- c Ambo enim  
 mus, eorum tamen dictis id repugnat. Additur enim vera esse non  
 alienatio febribus, denique etiam obtrusio ex qua possunt,  
 alienatio fiet. Quod igitur\* secundo sequitur, cau- \* solitam  
 sa prioris\* esse non potest. Addo etiam\* febres quæ \* obtrusio  
 per totum corpus exardescunt causam ex obtrusione \* sabris  
 membranarum factam, \* februm  
 quo totum corpus accenda-  
 tur, ratione carere. Etenim in epilepticis quibus etiã  
 \*raptus omnium membrorum\* ex cerebri\* membra-  
 nis, atque maiore causa secundum Aesclepiadem\* de-  
 scendit, quapropter etiam phlebotomiam probat ad-  
 hibendam, oportebat magis ac uehementius febrem  
 accendi. Siquidem maiora corpuscula maioribus mi-  
 sta cum toto maiores \* faciant plagas siue percussio-  
 nes & adfricationes. In libris denique de definitionum  
 phrenitim inquit esse alienationem repentinam cum  
 febribus. Sed etiam\* nouus\* furor, quem insaniam uo-  
 cant, sæpe mouetur cum febribus. Nos igitur manife-  
 ste atque breuiter quantum res patiuntur, intelligen-  
 tiam, siue definitionem passionis trademus, dicen-  
 tes, phrenitim esse alienationem mentis celerem,  
 cum febre acuta, atque manuum uano errore, ut ali-  
 quid suis digitis attrectare uideantur, quod græci  
 \*Crocysimon, siue carphologian uocant, & par-  
 uo pulsu ac denso.

\* qua  
 \* impetus mi-  
 nutissimorum  
 corporum  
 \* membra  
 \* in  
 \* conscendit

\* faciunt

\* subitua  
 \* mania

\* Crocysimon

Vtrumne sint signa phreniticæ futura  
passionis. Caput 1.

**D**E hinc querendum utrum ne sint signa phreni-  
tica futura passionis. Nam multi sectarū prin-  
cipes inter quos fuit & Asclepiades signa futura  
passionis posuerunt. At Thessalus & eius sectatores,  
id posse fieri negant, dicentes quia non futura phre-  
niticæ passionis signa uera atq; necessaria\* fuissent.

\* esse, oportere oportebat omnes in iisdem constitutos necessario es-  
se phreniticos. Nunc uero quidam cum his afficeren-  
tur signis, in phreniticam passionem non uenerunt.

Secundo oportebat etiam aliarum passionum futura-  
rum esse signa. Nullius autem futura passionis signa  
esse perspicimus. Neq; igitur phreniticæ passionis es-

\* aliquid quæ se posse signa credamus. Sed neq; præstantius\* quic-  
quid antecedens causæ quam antecedentium causarum, ut adustio, cruditas,  
fa uinolentia, atq; exercitium post cibum, uel mansio si-

\* affertur sub.  
pro signo.

\* & parietibus  
in muris\* parietis cubiculorum. Hæc alias quoq; pas-

siones ingerunt generaliter, ut lethargiam, apople-  
xiam, epilepsiam. Neq; multos, tempore certo, spe-  
cialiter phreniticam incurrere passionem, ut\* Autum-  
no uel alio quolibet, firmum esse credamus. Incertum  
est enim siquidem non\* omnes phrenitici efficiantur,

\* cuius consti-  
tutione ad caus-  
sas anteceden-  
tes referebant

\* certo tem-  
pore

\* urina

sed alij diuersis afficiantur passionibus. Neq; etiam  
uigilare, ac iugiter cum dolore\* urinam reddere pa-  
rum, uel plurimum, atq; grauedine uel dolore capi-  
tis, uel occipitis, uel clunium affici, aut oculorum  
rubore certa signa sunt. Hæc enim signa communia  
sunt passionum, quæ uexata membrana cerebri fiunt;  
atq; inde male laborantium ægrorum, nec necessa-  
rio omnium, ac semper phreniticorum. Dehinc au-

dacia

dacia sine ratione, uel e contrario \* securitas & hi- \* sine ratione  
 laritas non futuram, sed præsentem alienationem  
 designant. Hæc expugnantes Asclepiadis sectatores  
 contra primum responderunt, quanquam inquirunt  
 signis futuræ passionis ægri afficiantur, ratione ta-  
 men certa non in ipsam plerunque ueniunt: Si qui-  
 dem imminuentem passionem \* cohibeat. Medicina \* inhibeat  
 lis uera curatio, quod inquirunt debemus definitio-  
 ne explicatum accipere. Etenim furorem febrici-  
 tantium, ex obtrusione membranarum quæ non \* si-  
 nat, initium sumere. Non igitur negant signa fuisse \* desinat. i. au-  
 futuræ passionis. Dehinc signorum quædam inquirunt \* xilio medicine  
 secundum Asclepiadem esse necessaria, ut cordis uul- \* colatur.  
 neratio mortis signum: quædam non necessaria, sed \* frequentiam  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca- \* designare  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat. \* signum esse  
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con- \* a Cum vero  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* probauimus  
 quædam non necessaria, sed \* antecedentes  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* sigillatim scri-  
 quædam non necessaria, sed \* plimus, & do-  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* cuimus, debere  
 quædam non necessaria, sed \* soli phreniticæ  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* passioni priua-  
 quædam non necessaria, sed \* tas inueniri.  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* probabimus  
 quædam non necessaria, sed \* differre cau-  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* sum eius a  
 quædam non necessaria, sed \* tēpus ipsum,  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* symptomata  
 quædam non necessaria, sed \* quæ morbum  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* sequuntur.  
 quædam non necessaria, sed \* b Hoc signo  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* ostendunt iam  
 quædam non necessaria, sed \* gliscentē: quæ  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* futura & non  
 quædam non necessaria, sed \* præsens dicitur,  
 frequenter futura significantia, sicut membranæ ca-  
 pitis uulneratio moriturum uulneratum significat.   
 frequenter enim hoc, non iugiter, ac necessario con-  
 tingit. Futura igitur phreniticæ passionis signa \* quia adhuc par-  
 quædam non necessaria, sed \* ua est.



certa significatione indicant signa futuræ phreniticæ  
 \* affectibus passionis: Nam sicuti & in externis, \* præsentia par-  
 & morbis, ut uitate \* iā latetia pro \* futuris accipimus. Igitur The-  
 phlegma salus Primo libro diætetico præcepit phlebotomari  
 \* adhuc in stricturam magnam uētu-ros, atq; hos ita designat,  
 \* futuris iugiter febricitantes, & usque ad dimissionis tempus  
 submerso pulsu affectos, frequenter uel cum dolore  
 urinam reddentes, cum hæc præsentis iam sint uehe-  
 e significatio mentis signa, non futuræ. Ex ea enim \* significatione  
 \* necessaria futuram dicunt intelligi phrenitim quæ non \* natura-  
 lis est, sed multorum placitis firmata. Dehinc præ-  
 sentis passionis signa necessaria esse confitentur. Aūt  
 enim quædam esse quæ futura denuntient, quædam  
 quæ sæpe futura, quorum secunda futuræ phreniticæ  
 passionis esse dicunt, siquidem non necessario sequi-  
 tur. Quid enim est repugnans? omne etenim signum  
 \* significat ad eam rem quam \* significauerit intelligitur, est enim  
 ex his quæ ad aliquid intelliguntur. Quomodo igitur  
 \* ostendit signum uocari potest cuius non solum præsens non est  
 quod \* ostenderit, uerum etiam in quibusdam neque  
 erit. Secundum nos itaque, decliuitatis atque prone  
 ægritudinis in phrenitim signum recte nuncupatur;  
 ut labiles in passionem, ægros pronuntiemus, quos  
 græci *πρόσκυ*; totius appellatione uocant. Ipsius enim  
 uerbi qualitas, siue ueritas excussa designat aliquid  
 esse, quo res ferantur, nec tamen necessario uentu-  
 ræ. Signa igitur res ipsa semper præsens, quæ signi-  
 ficatur, ostendit, qua sæpe etiam futura noscuntur.  
 Alia uero esse signa decliuitatis in phrenitim, alia in  
 lethargiam: atque cæteras passiones, ex his reddere  
 incipimus, cum sua suis manifestabimus.

Que



Quæ sequuntur eos qui in phreneticam  
passionem proni intelligantur,  
quos labiles diximus.

Cap. II.

**I**N phreneticam igitur passionem pronos uel decli-  
ues sequitur febris acuta, atque difficile ad superfi-  
ciem corporis ascendens, pulsus \* humilior, densior, \* obscurus  
uultus subinflatus, siue plenus, sanguinis per nares de-  
stillatio, uigiliæ iuges, aut turbatus somnus, & insania  
turbulenta, mentis sollicitudo, ac prauitas sine ratione,  
frequens tergorum \* est uersio iacendi cum capitis as- \* inuersio iac-  
sidua commutatione. Aliquando etiam sine causa hila- cendo, uel ia-  
ritas, oculorum rubor cum leui lachrymatione, & centis.  
circumiecilio manuum sine ullo capitis dolore, articu-  
lolorum frigus sine \* tremore, urinae abundantia fla- \* febrili  
ue, aquata, tenuis, & paulatim exclusæ. Aliquibus e-  
tiam sonitus capitis, atque aurium tinnitus: dolor quo-  
que capitis repente non \* quiescit, nulla ex manifesta \* quiescens  
ratione præcordiorum etiam tensio, uisus attentus, uel  
frequenter palpebrans. Quidam Medici ex quibus sunt  
Asclepiadis sectatores, etiam attendunt acris qualita-  
tem, quam Græci \* catastema uocant, & tempus, & \* κατάστημα  
antecedentes causas, & naturam, & ætatem. Aeris  
inquiunt \* habitu, ne ea cale scat, quod eius causa pluri- \* habitum  
mos afficiat, ut sæpe oculorum inducat lippitudines, uel  
ulcera. Tempus autem, ut æstatis finem uel autumnum.  
In his enim aiunt hanc frequentare passionem. Ante-  
cedentes inquiunt causas, ut uimolentiâ uel uigilias, ac  
iuges \* adustiones: naturâ \* inquit, egrotantis, ut si sue \* in sole morâ  
rit mente mobilis, atq; iracundus, uel in disciplinis lite- & balneis  
rarum exercitatus, aut capite debilitato, & facile \* in- \* in-  
flationem sentienti, uel si quoties ægritudine afficitur, \* legi potest &  
inflammatione  
facile

facile alienatione uexetur: etatem inquirunt si iuuenis. Omnia quidem sunt prouidenda, non enim ex uno uel duobus, sed ex multis concurrentibus, significatio firmatur: unum etenim quiddam etiam ad aliud quiddam commune est. At uero in\* unum conueniens multorum concursus, \* discretionum facit intelligentiam \* promineret.

\* morborum  
differentia  
\* emuere

Quomodo intelligitur phrenitis.

Caput 111.

**I**Ntelligimus phrenitim ex toto signorum concursu. Vnum etenim singulare quicquam, ut est alienatio, uel febricula non designat phreniticum, sed si multa concurrerint, quæ nihil aliud quam passionem designent, ut sit \* significatio, quæ ut supra diximus ex multis confecta, unum faciat signum, & significans eius rei quæ demonstrat. Quare ut dixi intelligimus phrenitim ex concurrenti febre acuta, & alienatione & pulsu paruo atq; crebro, attestante carphologia & erodidismo. Ex his enim intelligitur passionis genus: magnitudinis uero atq; proprietatis differentiam, plurima atq; alia sunt quæ designant, à græcis symptoma-

\* febres conti-  
nuæ

\* hemitritea

\* diatrizeum

\* diatrizeum

\* ipsius

ta appellata, ut \* febris continuæ, uel \* hemitriteas, uel inæquales, atq; superficiem corporis difficile ascendentes: alienatio intra \* diatria, uel post \* diatria tempus, iugis aut intercapedinata, cum risu tacito, aut cū cachinno, & cantilena, uel certe mœstitudine, silentio, uel murmure, aut uagitu, aut leui secum sua \* ipse musitatione, uel mentis indignatione, ut in furorem exiliens difficile teneatur, atq; omnibus iracundus sit, & exclamet, uel sese percutiat, aut suam uestem atq; propinquantium scindat, aut metu se abscondendum existimet, aut lachrymetur, atq; secum loquentibus non

respon

respondeat, cum loquatur\* tanquam uisis, & non so- \* nunquam  
 lum non uisis, sed etiam mortuis: & neque potum po-  
 stulet, neque cibum, aut \* acceptum uehementer\* inua- \* gratum  
 dat, & immasticatum transuoret\* atque masticet. Ne- \* edat  
 que transuoret, sed in ore contineat, & post paululum  
 proiciat: lucem quoque aut tenebras fugiat, adsint e- \* atq; dnglu-  
 tiam uigiliæ iuges, aut paruus & turbulentus somnus, tiat: uel neque  
 oculi sanguinolenti, cum tensione uenarum suarum, &  
 fixo uisu, atque sine ulla palpebratione, aut multum  
 \* mobili, & cum iugi palpebratione: aliquando etiam \* mobiles  
 manuum ante oculos præmissio, quasi aliquid appre-  
 hendere, uel detrahare uolentium, quod aut inhæsisse  
 oculis, aut ante uolare ægrotati uideatur. Vultus etiā  
 quibusdam \* collectus atque conductus: genarum ru- \* collapsa fa-  
 bor persecrans, aut per interualla in pallorem muta- cies  
 tus: capitis siccitas quæ statim eibat fomentu liquorē:  
 dentium stridor: guttæ sanguinis leuissimæ per nares,  
 capitis frequens \* alienatio cum aurium intentione, ut \* acclinatio  
 aliquid audire uideatur: indecens iacendi positio: pe-  
 dum quoque iugis ex alto submissio: corporis \* uacua \* uana: cum  
 fortitudo: articulorum iugis torpor: raptus etiam, uel aliquid sum-  
 attractio cooperimentorum à pedibus ad superiora: mo conatu, sed  
 uentris fluor: urinae aquatæ, uel felleæ cum nubeculis frustra efficere  
 portentosis: ultimo quibusdam etiam uultus\* mortuo- \* cadauerosa  
 sus, aliis cum collo subinflatus: manuum tremor: pulsus facies  
 creberrimus, atque submersus, & tremulus, & imbe-  
 cillis, aliquando etiam deficiens, & in similitudinem  
 oleo defecti luminis marcescens: præcordiorum ue- \* quæ intelli-  
 bemens tensio atque ad superiora adductio: singultus, gi non potest  
 linguæ impedimentum atque loquutionis \* inappre- \* Eripathy-  
 hensibilis articulatio. Dehinc quibusdam \* diaphore- mia: virium  
 sis, quibusdam spasmus, aut pressura, quæ lethargicam dissolutio.  
 passionem \* somnus altus  
 & profundus

passionem attestantibus cæteris denuntiet : hoc pulsus  
 \* ac inducit celeres, multos, \* aut paruos saltus. In magni-  
 tudinem erectio quæ sita, & ægrotanti incongrua atq;  
 \* sanitatem subinanis. Releuatis autem atque ad \* sedem pergen-  
 titus omnia supradicta minuuntur. Grauius autem ac  
 perniciosè affici dicimus eos quos ut supradictos plu-  
 \* secuta iugi- rima atque uaria fuerint \* secuta, & iugi & sine ulla  
 ter, & \* indulgentia \* indulgentia laxamēti. Peius autē laborare dicimus eos  
 \* indigum, id quicquid adhibetur, graue atq; \* indignum adiutoriū,  
 est exiguum uel \* phlebotomice quæ principaliter \* temporis causa  
 \* phlebotomia adhiberi prohibetur. Exitialiter etiam affici dicimus  
 \* tēporis caus- eos qui asperrimi atque audaces fuerint ægrotantes:  
 fa. s. occasio- \* Infontine etenim etiā \* sanis iracūdi esse perspiciun-  
 nu : nēpe quia \* tur. Nec non etiam qui subridere uidentur, & strido-  
 vires imbecil- re dentium, aut singultu affici. His \* etiā spasmus im-  
 la sunt. minere significatur. Grauius etiā si mutabiles fuerint  
 \* Sontine, i. colore, & tremuli, & stertentes, aut \* fastidiosi per  
 cum pernicie sua omnia. Aliarum uerò principes sectarum iuxta ætatis  
 \* sani differentiam grauius affici dicunt, iuuenes à cæteris æ-  
 \* enim tatibus: iuxta sexum & naturam uiros \* ac fœminas;  
 \* acutius quā quomodo etiā sapere \* plus est in iuuenibus, atq; maio-  
 \* quam plus est in ribus. Maius enim sit malum, firmitate reliqua adiutū.  
 maiorib. quā Dehinc etiā \* illos qui natura fuerint tristes, & in pas-  
 iuuenibus. sione cū \* ridiculo delirauerint, aut rursus hilares na-  
 \* sensibus: na- tura, atq; cachinnosi, cū iracūdia & mœstitudine ægro-  
 tu grandiori- tates grauius affici dicūt. Siquidē nulla uestigia ex his  
 bus. quæ sanitati fuerint cōsueta, remansisse uidentur. Nos  
 \* illi uerò dicimus cōmuniter grauius laborare quos pas-  
 \* risio sionis adficit magnitudo. Illud enim semper in ægritu-  
 dine magis afficit, quod à natura plurimum recesserit.

Quæ

Quæ sunt huic similes passionēs, &  
quomodo discernuntur.

Cap. III.

Similes sunt atque uicinæ phreneticæ passioni \* ex \* cum  
S ipsa alienatione, \* furor quam uulgo insaniam \* mania  
uocant, melancholia, pleuritis, atque peripneumo-  
nia: quæ sæpiſſimè acceſſionis tempore alienationem  
faciunt. Item \* mentis alienatio fit, in his qui mandra- \* ἀνώγει  
goram, aut altercum biberint. Internoscuntur au-  
tem furentes atque melancholici à phreneticis: siqui-  
dem \* Alienatio sine febricula, atque crocidismo, \* melancholia  
uel carphologia eſſe uidetur. Dehinc tardè sæpiſſi-  
mè finit, atque sine paſſione. \* Item melancholia, fel- \* dolore capi-  
lis nigri uomitum facit, stomacho patiente, aut plus tis, nisi legas  
à cæteris corporis partibus ægotante. \* præstan- compaſſione.  
tius autem odiſſe homines facit, \* atque uultus colo- \* obſtinacius  
rem plumbeum. Item pleuritis & peripneumonia, & \* melancholia  
omnes paſſiones, quæ ex dolore acceſſionis tempo-  
re alienationem faciunt, internoscuntur hoc modo.  
Primò, quòd cum dolores aſperantur, extenditur at-  
que conſurgit alienatio, & eorum \* indulgentia mi- \* laxamento,  
nuitur, quippe leuis atq; ſolubilis deliratio. Nam phre mitigatione.  
niticorum \* ſi ex conſenſu fuerit facta, \* tamen, & nō \* & ſi ex  
ſemper acceſſionibus aucta, aut demiſſionibus minuta, \* non tamen  
ſed magis intardans atque perſeuerans perſpicitur. ſemper  
ſi uerò potò malo medicamine, \* uel Alterco alienen- \* &  
tur, discernuntur ſecundum interrogationem præce-  
dentes cauſæ. Sed quia etiam de medicamine potò po-  
teſt phrenitis euenire: (Non enim præordinatæ atque  
fixæ ſunt neceſſariò eius antecedētes cauſæ) ad inter-  
rogationem præcedētium cauſarū æger credibilis eſſe  
nō poteſt, item externi, hoc eſt, ab ægro alieni antece-  
dentia

\* potius dentia nescire possunt, \* totius differentiā accipimus,  
 \* decreuerunt si non febricitat, ut hoc sit signum internoscendarum  
 \* Alij sic ex- causerum, si autem febricitat ut crocidismus atq; car-  
 ponit morbos, phlogia & densitas pulsus absint. His enim qui man-  
 qui sine à pri- dragoram uel altercum biberint rarus est pulsus.

uationis dictio  
 ne ut nūmā:  
 nāq; pronun-  
 tiatur, per in-

Quomodo discernimus à phreneticis  
 eos qui furore febricitant.

Cap. v.

disiū cōstitui:  
 eos uero per  
 à τὸ τῆς φύσεως,  
 qui cum à pro-  
 feruntur, ut  
 ἀγγύπρια  
 ἀπὸ ψύχας.

\* humoris vi-  
 tio si plenitu-  
 dine & abun-  
 dantia

\* possemus  
 \* obserua, me-  
 lancholiā ve-  
 rā esse putat,

quæ gignitur  
 affectu prima-  
 rio ventriculi  
 \* ἀξίωμα

\* in discrepan-  
 tia & diuersa  
 diuiditur, &  
 partitur, ut a-

liquando verū  
 sit, aliquando  
 falsum.

\* afficiuntur  
 \* qui ob aliā  
 causam febrē  
 contraxerunt

**Q** Vando furentes siue insanos à phreneticis sola  
 febrium sinceritate omnes sectarum principes  
 \* decreuerunt, & sepe etiam febris ex aliis causis his  
 passionibus incidit, oportebat hos etiam cum febribus  
 furore delirantes à phreneticis discernere: Non qui-  
 dem mutandæ curationis causa: Omnes etenim passio-  
 nes celeres supradiçtæ, atq; tardæ, sed insuper \* posi-  
 tione constitutæ, quam Græci \* epitheſim uocant, la-  
 xatiua atque mitigatiua indigent curatione. Sed ad  
 demonstrationem, quo \* probemus etiam specialium  
 uti discretione, hæc posuimus. Est autem utilissimum  
 etiam localibus adiutoriis, ut patientibus locis, uel plus  
 patientibus curationem adhibeamus. Nam phreneti-  
 cis atque furiosis caput magis, \* melancholicis stoma-  
 chus patitur. Igitur nō febricitare furiosos \* percun-  
 ctatum non est siue uniuerſale, quod Græci catholicon  
 uocant, \* sed est discrepatione partile. siquidem, ut  
 diximus, quidam febribus \* afficiuntur, sed phrenetici  
 acutis, uel celeribus, furiosi uerò tardis, quanquam sit  
 etiam hoc insufficiens discretioni, propter eos qui re-  
 pentino furore agitati febricitant: remanet, ut ordine  
 accidentium discretionem faciamus. Præcedit enim fe-  
 brem in\* furiosis alienatio, in phreneticis uerò febrī-  
 cula alienationem: sed quia aliquādo potest furentium  
 alienatio

alienatio concurrens febriculæ latere, aut ordinis, aut  
 \* interrogationis, ut supra diximus causa, si quidem \* interuentio-  
 ab ægro narrari non possit, aduertamus in phreniti-  
 nis  
 cis paruum atque crebrum esse pulsum necessario, in  
 furiosis uero maiorem. Sed quia initij, uel augmenti  
 accessione febrium par in his atque creber pulsus esse  
 potest, declinationis autem atque \* indigentia maior, \* indulgentia  
 remissionis  
 illud aduerte debemus: quia in phreniticis etiam tunc  
 paruum atq; densus perseverat, ut discretionem magis  
 ex pulsu faciamus, quanquam etiam ipsa infirmetur  
 sæpe febrium \* nequitia, quæ ut in aliis passionibus sic \* malignitate  
 etiam in furiosis pulsum paruum atq; densum seruat, κακωνδρίας  
 ita discerni uel internosci potest cum neque crocidis-  
 mum in ægrotantibus uiderimus, quod est ex operi-  
 mentis funbriarum ueluti decerptio: neque carpholo-  
 giam, quæ est festucarum leuium à parietibus ueluti  
 detractio, quam necesse est phreneticos facere. Quæ  
 denique si furiosis aduenerint, in febribus constitutis, affectuum eõ-  
 in phreniticam passionem, ex insania uenisse pronun-  
 tiamus, tanquam rursum, & phrenitica passio rece-  
 dentibus propriis signis, hoc est, supradictis in furorem  
 transeat. Non aliter quam si etiam aliis id testantibus  
 signis, in lethargiam ueniant, uel certe releuati ex le-  
 thargia, in phreniticam redeant. παρὰλλογῶ

Quomodo discernimus dormientes phreniti-  
 cos ab his qui in lethargicam deueniunt  
 passionem.

Cap. vi.

Q Vomodo \* phrenitici aliqui argumento passio- \* Cum  
 nis in lethargiam, aliqui declinatione in som-  
 nos deuenierint, & cum aspectu commune sit, quod  
 utrique non sentiunt, \* atque multos in exercitos \* cumq;



\* lethargicos

\* nitidum

\* floride

\* lethargica

\* alieno

\* obstructio-  
nem

\* labantur

\* iacent

\* cernuntur

\* calor febris

\* lenior

\* lethargicorum

\* asperior.

medicos errore sefellerint, ut dormientes tāquam depressos excitarent, aut \* oppressos tanquam dormientes sine adiutorio passioni traditos, reliquissent, Vt illem ducimus eorum discretionē faciendam, discernuntur igitur calore, caractere, respiratione, pulsu, tactu, schemate iacendi, febrium magnitudine. Calore inquam, dormientium enim \* mundum corpus, atq; \* flosculē uiuidū, & naturali habitudine plenum. Oppressorū uero in \* lethargia passione pallēs, uel plumbeū, uel quolibet \* alio colore affectum, inuenitur. Character autem dormientium hilari. Lethargicorum tristis inuenitur. Item spiratio dormientium ordinata, lethargicorū tarda esse probatur. Pulsu etiam discretionem facimus, & quanquam utrique subinflatas atq; maior, tamen cum inanitate in lethargis, cum plenitudine dormientibus inuenitur. Tactu autem lethargis etiam praeordia distenduntur plurimum, & totum corpus durius sit, ob nimiam \* stricturam: dormientibus uero ecōtrario, quia strictura minuitur, etiā praeordia relaxantur, & totius corporis tactus mollior efficitur. Schemate iacendi, discretio fiet. Siquidem lethargi à capite lecti ad pedum loca \* labantur, & incomposito, uel indisposito \* iaceant corpore, dormientes uero congrua naturae positione \* cernuntur. Magnitudine inquam febrium: dormientium enim \* minor ac \* lenior, \* lethargorū maior atq; \* aspera febricula inuenitur. Quapropter obseruanda sunt etiam tempora, si enim in declinatione passionis, & in dimissionē uel declinatione accessionis sensus aegrotantiū quiescerint, intelligimus somnum. Si uero in augmento passionis, uel accessionis, & magis in eius initio, uel augmento id acciderit, lethargum pronuntiamus.

Que



Quæ sint differentia phreniticæ passionis. Cap. VII.

**D**ifferentias phreniticæ passionis quidam ex accidentium proprietate faciendas existimant. Atunt denique aliam esse alienationem cum risu, atq; puerili saltatione, aliam cum mœrore, atq; exclamatione, uel silentio, aut timore. Nos uero aliam dicimus esse ex strictura\* aliam ex complexione strictura atq; solutionis. Est enim\* uerum ita discernere, ut non accidentium diuersitas passionis differentias ostendat, sed generalis quædã ac necessaria designatio, quæ fit ut supra diximus ex principalibus\* passionibus, unde etiam curationum ratio sumatur.

\* aliam ex solutione. Sic legendum esse ostendit cap. post nonum.

\* æquum  
\* & earum causas: strictura: solutione: utriusque complexu.

Quis locus in phreniticis patitur

CAPUT VIII.

**Q**uestum etiam quis locus in phreniticis patitur, & magis à principibus aliarum sectarum, ut secundum differentiam patientis loci curationes adhiberent, & localia locis adiutoria compararent. Nos autem siue locorum siue uicinitatis eorum causa generalem curationem non mutamus. Non est enim sub eodem\* genere\* iacens locorum necessaria differentia, aliqui igitur cerebrum pati dixerunt: alij eius fundum, siue basin quam nos sessionem dicere poterimus: alij. membranas: alij & cerebrum & eius membranas: alij cor: alij cordis summitatem: alij\* membranam, quæ cor circumtegit: alij\* arteriarum eam quam Græci αόρτην appellant: alij uenam crassam, quam iidem φλέβα παχύνου vocauerunt: alij diaphragma: & quid ultra\* tendimus\* quod facile explicare possumus, si id quod senserunt dixerimus? Nam singuli eum locum in phreniticis

\* morbi  
\* iacentium:  
alij, patientiæ.

\* περιτρίβειν  
\* arteriam

\* orationem  
proferimus

pati dixerunt, in quo animæ regimen esse suspicati sunt. Denique singulorum iudicium atque assertionem pertractantes, expugnabimus libris quos de passionū causis scribemus. Nos igitur communiter totum cor-

\* impletur aliq  
implicatur.

pus pati accipimus, etenim totum febre iactatur. \* Implet denique phreniticorum significatione febrium signum, quapropter totum corpus curamus, sed

\* signa phre-  
nitidis

plus pati dicimus caput, etenim antecedentia demon- strant signa, \* ut eius grauedo, tensio, dolor, so- nitus, aurium tinnitus, siccitas atque sensuum im-

\* carentes

pedimentum, & cetera quæ iam passionis præsentis esse signa noscuntur: singuli sensus suo \* careant ap- prehensionis officio, palpebra dura, oculi sangui-

\* regalem lo-  
cum internum  
incognitum re-  
mansisse dica-  
mus

nolenti, ac prominentes, genarum rubor, uenarum extensio, uultus inflatio ac plenitudo, linguae aspe- ritas. Eos uero qui nos ex naturali tractatu, quam

\* capiti  
\* quasi quide

Græci physiologiam uocant patientem locum ap- prehendere dixerunt, (Siquidem prænoscentes ani- mæ regalia in capite constituta, exinde mentis alie- nationem capitis offensa fieri acceperimus) ita expu-

\* prorsum pue-  
riliter.

gnamus, ut primo \* regale locum maternum reman- serit. Sed nos uarietas atque multitudo accidentium in capite signorum, plus à cetero corpore decuit id pati. Sed aiunt faciem magis, plurimisque signis affi-

\* aut  
\* scarificant

ci, & propterea \* huic esse adhibenda adiutoria. Nunc uero cucurbitam cur occipitio apponitis, \* Si quidem per apertionem, quam Græci anatomiam di- cunt didiceritis sensuales uias inde sumere exordium. Hic \* rursum similiter eos peccare perspicimus. Etenim faciem non curant cataplasmate, \* atque ua-

poratione, atque occipitium tanquam dolens, & ex-

tentum apposita cucurbita \* scarificamus, sicut etiam  
alias

alias partes, atque præcordia, si in tumore fuerint constituta: Explicata uariæ passionis apprehensione ad eius curationem transeamus.

Quomodo curandi sunt phrenitici. Cap. ix.

**Q**uomodo curationibus principio locus aptandus est, iacere oportet phreniticos in loco omnino ex parte deuio, ne aliqua transeuntium uoce pulsantur: fenestris etiâ altioribus \* luminato. Sæpe enim im hac passione constituti alienationis causa sese præcipitantes latuerunt. Dehinc ob obscurationis proprietatem strictura laborantes, in lucido atq; tepido & amplo mediocriter locamus. Etenim ultra modum feruens aer naturaliter fibricula caput incendit, & rursum frigidus, constringit, atq; corporis auget densitatem. Item nimium lucidus membranam percutit cerebri immodici splendoris causa. Par uis etiam locus si fuerit atq; humili tecto, suffocabilis erit aeris paupertate. Sit etiam sine ullo picturæ figmento, ne uisa agri ex picturis mente accipientes, quæ Græci phantasmata uocauerunt, plus aspereretur, aut in risum soluantur, maxime cum ratione careat, multorum ingressum aut frequentiam prohibere, & pictura occasione lacerandæ mentis acquirere, cum iugi uisu falsa coguntur pro ueris accipere. Hinc etiam splendidi colores parietum siue \* straminum, uel operimentorum prohibendi. Resultantes enim, ut ita dixerim percutiunt uisum, solutione \* autem \* optinenti laborantes e contrario iacere oportet loco medie obscuro, atq; refrigeranti, neq; enim nimium frigidus, neq; obscurus passionis mitigare celeritatem potest. Stramenta etiam omnibus mollia atq; operimenta conueniunt: sed tenuia, solutione laborantibus, corpulenta uero atq; calida, strictura

Quandoquidē

\* illuminato

\* stragularum

\* nam supra c.

7. dixit aliquā

do fieri ex com

plexu strictu-

ra & solutio-

nis

\* cum solutio

maior est quā

strictura

affectis. Sic etiam lectus omni ex parte firme locatus,  
 ut cum fuerint impatienter iactati uel necessitate co-  
 gente \* deuincti immobilis perseueret, foribus etiā atq;  
 fenestra auersi, ne ingressu hominum asperentur. At si  
 etiam alienatio fuerit principali passioni cōtraria, ut  
 strictura laborantes lucem odisse faciat, solutione la-  
 borantes tenebras, oportet aliis oculos contegi, aliis  
 tenue atq; blandū lumen immittere, lucernæ, aut lucis  
 ætheriæ, sed arguto usu machinatum, quo uelut per  
 quandam cauernam, ægrotantis uultū perfundat, &  
 nullas tangat alias corporis partes. Sic etiam mitiga-  
 bitur alienationis augmentum, & adiutoriū id passio-  
 ni aptum \* cōgrue seruabit qualitatis effectum. Laxat  
 enim, ut supra diximus, lux, colore, \* quo uidetur,  
 \* sed cōsequenter necessario suæ tenuitatis causa ma-  
 net cætero circūfusa corpori tamen si nō uideatur. Si-  
 militer etiam obscuritas uel tenebræ si fuerint ægro-  
 tantibus odiosæ & curationi necessariæ, erūt artis a-  
 stutia cōponendæ. Sed si ita fuerint alienatione cōmo-  
 ti, \* qua obscurari totū uel \* luminari uelint, erit con-  
 iiciendū, ut quibus obscurū acrem fecerimus, calidum  
 tamen faciamus, quibus autem lucidū ecōtrario frigi-  
 dū faciamus, ut & congruā passioni seruemus qualita-  
 tem, & eorū furorē mitigādo non asperemus. Si uero  
 nihil ægotātes \* praua cupiditate turbauerit, serua-  
 bit lucē strictura, obscuritas solutione laborātibus ad-  
 hibenda. Vel si quomodo turbatio atq; motus & iac-  
 tatio corporis celeritatē asperat passionis, erit ali-  
 quando mitigādi furoris causa ægorū uoluntati ser-  
 uiciū, stringitur enim magis solutio, uel strictura laxa-  
 tur, si grauioribus auersis parua cōtrarietate uexen-  
 tur siue stricturalaborātibus obscurū, siue solutione la-  
 boran

\* deuincti

\* congruum

\* cum

\* &amp;

\* ut

\* illuminari

\* praua cupi-  
ditas

borantibus lucidum adhibendum iudicamus locum.  
 Dehinc si strictura\* obtinuerit, conuenit ægrum usq; \* solutionem  
 ad acceſſionis declinationem uigilare, tunc ſomno di- \* ricerit  
 mitti. At ſi longa fuerit acceſſio, etiam ante dimiſſio-  
 nem ſomnus poterit adhiberi. Maior enim ab\* intem- \* intempeſti-  
 porali ſomno uigiliarum eſt uexatio. Siquidem etiam \* uo  
 uires ægrotantis\* inſinuat. Dehinc iudicio noſtro ab- \* ſuppeditat  
 ſtineri\* uel tolli non poteſt. ſomni autem intempera- \* ſomnus, licet  
 litas ſi fuerit interrumpenda, excitare dormientem in tempeſtuum  
 poterimus, atq; ſoporis oppreſſionem prohibere. \* uigiliis  
 Delirationes uero ægrotantium uſu dextero atq; artiſi-  
 cio ſeruientes accipere & tolerare debebunt, ut aliis  
 aſſentiant, alias uero\* conſentientes redarguant, ne \* diſſentientes  
 frequēti correptione aſperos faciant ægrotantes. De-  
 niq; ſi quos ſanitatis tempore inuiſos habuerunt, in-  
 trare prohibemus, ne his uiſis aſpererentur. Eos uero  
 quos metu aut uerecundia coluerunt, per interualla  
 intrare permittimus: parit enim frequentia contem-  
 ptū. At ſi exilire de lecto uiderimus nimietate furoris,  
 melius erit plurimus uti ad remedium miniſtris, ſed qui  
 poſſint\* lenitate retinere, ut etiā laxamentū ſtricturæ \* i. leniter  
 præbeamus. Vel ſi \* fuerint qui ut ſupra diximus \* defuerint qui  
 teneāt, aut ipſorū uiſu cōmoti fuerint ægrotantes, li-  
 gationibus utimur, ſed prætectis lana aut ueste locis,  
 quos uinculis neſtimus, ne maior utilitate quieſcendi  
 imprimatur uexatio. Ligationib. etenim immodice cō-  
 ſtricta, neceſſario tumescūt, propterea omnis in peius  
 extēditur paſſio. Si linguæ atq; totius\* oris ſiccitas fue- \* remediū ad  
 rit, oportet ſpōgia tenera, aqua calida inſuſa, atq; me- \* oris ſiccationes  
 diocriter expreſſa, ſenſim uniuerſa quæ\* ſiccauerunt, \* ſiccata ſunt  
 humectare, nō ſine cautione: adiūctos enim ſæpe digi-  
 tos ſpōgiæ, alienatione coacti ægri momorderunt.

Quapropter, si fieri poterit, cogendi sunt, ut exerant  
 linguā, atq; ita supradicta faciamus. declināte accessio  
 ne, hoc est, cū ē uiscerib. reclusus firuor ad superficiē  
 corporis atq; articulos uenerit egrotātis, pulsus quo-  
 que densitas, & humilitas in amplitudinē atq; raritē  
 uenerit, oportet pubetenus, hoc est, inter umbilicū &  
 pectinem, <sup>2</sup> quod Græci ἡττω<sup>2</sup> appellant\* lanas oleo ca-  
 lido expressas apponere, quæ omnia etiam uicina con-  
 tegant, ut inguina, atq; uesicæ partes, \* uel si qua uen-  
 trem contegant: fouendum caput\* oleo dulci atq; \* ca-  
 lido. De hinc alienatione perseverante etiam calida  
 cum oleo mixta, quod Græci uocant hydræleon. Pau-  
 lo etenim uehementius hoc genus fomenti operatur, si  
 ut supra diximus oleo aqua calida misceatur, uel fœ-  
 nugræci, aut lini seminis succus. Sed hæc singula sine  
 ullo, esse odore debent, atq; nullo fumi afflatu \* uexa-  
 ta, ne caput impleant, & alienationem exasperent.  
 At si adiuncta fuerit stricturæ solutio, ut aut uenter  
 fluens, aut sudores esse uideantur, caput supradicto  
 modo, atque fomentis supradictis curabimus: etenim  
 alienatio, \* tumore membranarum cerebri fiet. Me-  
 dias uero partes frigido ac \* uiridi curabimus oleo.  
 Si autem\* plurima atque superans fuerit & occulte  
 in diaphoresim uenire posse egrotantes uiderimus,  
 tunc etiam caput dulci quidem, sed frigido oleo\* fo-  
 mentamus: etenim frigus diaphoresim, dulcedo strictu-  
 ram temperat. detergendus etiam erit sæpissime su-  
 dor, qui per uultum atq; thoracem emicuerit, spongia  
 molli. At si plus fuerit extentus, ut\* integros solui ui-  
 deamus, etiam flabris utimur, non quidem sine respec-  
 tu alienationis. etenim si constricturam ea curatio-  
 ne mitigari uideamus, audacius id facere persevera-  
 bimus.

Et sic cauetur  
 ne uehementia  
 febris, & cere-  
 bri consensu in-  
 vesica fiat in-  
 flammatio, quod  
 accidit sæpius:  
 item quia. ne  
 uirna obstende-  
 re supra modū  
 vesicā, inter-  
 dum enim de-  
 lirio agri obli-  
 uiosi meiendū  
 esse non recor-  
 dantur, ischu-  
 ria succedat.  
 \* mitigando  
 febris ardori.  
 \* ac quasi totū  
 ventrem  
 \* id remediū nō  
 est ex arte. ui-  
 de qua adnota-  
 uimus folio. 35.  
 pag. i.  
 \* ut nimia sic-  
 citas corriga-  
 tur  
 \* vexare  
 \* phlegmone  
 \* omphacino  
 oleo  
 \* euacuatione  
 sudoris, alui  
 \* fouebimus  
 \* integrè.

bimus. Si autem asperari senserimus, erunt minuenda quæ gerimus, conuiccentes, non tantum solutionem constringi adiutoriis, quantum alienatio augetur. Namque necessario requies congrua solutioni, atque noxius motus accipitur. Declinâte acceßione os colluere iubemus ægotantem ex aqua calida, uel si impatienter siti iactatur, dabimus ei\* potum, sed strictu- \* potus aqua  
rasola laboranti, plurimum, ut\* densitas irrigetur: \* ariditas  
solutione laboranti,\* paruum: uel si plurima cogit so- \* paucum  
lutio, etiam frigidum.

## De phlebotomia

## Cap. x.

**A**T si sola atq; uehemens strictura ægros in phreniticam ex templo passionem perduxerit, designat adhibendam esse phlebotomiam, permittenti-  
bus uiribus: atq; si passio cogit, intra diatriton: si minus, in  
ipsa prima diatrito, ultra nunquam: uexantur enim in  
eiusmodi ægritudinibus corporis uires. Phlebotomâ-  
di autem disciplinam, uel\* magnitudini passionis mo-  
derationem faciendi congruam, libris quos de specia-  
libus adiutoris scripturi sumus, docebimus, princi-  
paliter monentes ne usque ad animi defectum, quem  
Græci lipothymiam uocant, adiutorium tendere ni-  
tamur. Timendum enim hoc sæpe est accidens, quod  
Græci symptoma uocant: quamuis enim in omnibus  
passionibus si sit mortuosum, plus tamen in phreniti-  
cis afficitur male \* præacta neruositas. Dehinc post  
phlebotomiam caput similiter fouemus, atque occi-  
pitio lanæ oleo calido ac dulci madidas apponimus.  
Similiter<sup>b</sup> etiam uertebis, quas Græci ἰσχία uocant,  
præcordiis etiam atque pectini. Hæc enim necessa-  
rio in phreniticis passioni consentiunt. At si intra  
diatritum, ut suprâ diximus, phlebotomia fuerit ad-

\* vel magnitu-  
dini passionis.  
congruam, vel  
pro robore vi-  
rium moderatè  
faciendam, li-  
bris &c. sic le-  
gendū esse con-  
tektor.

\* pertracta  
¶ b Similiter  
etiā uertebis  
quæ Græci ἰ-  
σχία uocant.  
Sic legendū es-  
se mōstrat cap.  
ii. uertebrium  
enim autem hic  
uocat quod  
ischion Græci,  
nempe semaris  
articulum.



hibita, post paululum os colluere aqua calida agrotantes facimus: \*potum quoque damus: dehinc dormire permittimus. Sin uerò in ipsa diatrìto phlebotomia adhibita cum adiutorio \* motus quicuerit, <sup>c</sup> oleo agrotantium corpus perungendum erit, atque à ministris facies lauanda, ut \* alienatio nullo \* nouorum \* uultu asperctur (noti enim usu prudentes delirantes faciunt, non resistendo) præsentiibus etiam his ut supra docuimus agrotantes uerecundiam \* debent. Cibus dāimus simplicem, digestibile, \* paruum, laxatiuum, ut est alica, calida aqua, aut mulsā decocta, uel panis ex aqua calida, aut alica supra dicta sorbilis facta, uel ex melle atque oleo & anetho, & sale paucissimo \* præcocta. Solutione autem laborantibus pultem dābimus, atque panem, & oua ἀπαλά. Dehinc omnes somno dimittimus, uel si minime dormire potuerint, quiescere tamen iubemus. Non enim minus somnus cibo reficit opportunus. <sup>d</sup> Dehinc alia die à cibo abstinemus, fomento atq; potu utentes. Secūda uero diatrìto si uenter suum non agnouerit officium, clysterem adhibebimus ex aqua & oleo calido, uel decoctione fœnugræci aut lini seminis, cum oleo. Etenim intestinorum siccitas rigatur, & aliena quæ retinebantur \* excluduntur, & \* acrimonia quæ ex ipsis nascens ex \* vapor acer \* alienatione quadam capitis tumentia asperabat, detrahetur, atque ipsum caput localibus adiutoriis melius præparatur. Tum post \* intellectionem medias partes cataplasmate curamus ex fœnugræci & lini seminibus \* admixto polline, quod Græci μακρόν uocant, & est omnibus usitatum. Dehinc simili supra dicto cibo utemur. Alia uero diatrìto caput detondemus, etenim detractis capillis partes \* resantur, pluri-



ma grauatione liberatæ. Tunc post tonsuram lanis oleo calido expressis caput tegemus.

De cucurbita.

Cap. xi.

**A**Lia dehinc diatritho rasis partibus cucurbitam apponimus occipitio mitiganter\* atq; sub ipsa \* blandè, leni-  
fröte sanguisugas facimus inherere quatuor uel quin- ter.  
que, ut non ex una parte detractio fieri sanguinis ui-  
deatur, sed ueluti circularis ut totum spiret atq; rele-  
uetur caput. At si plurimum laxamentum facere uo-  
luerimus, totum caput rademus, & per circulum plu-  
rimas cucurbitas affigimus alteram occipitio, alteram  
medio capitis, quod Græci bregma uocant, alias duas  
superius à temporibus, sed neque cum multa flamma,  
neque multo sinimus tempore immorari. \* Arentes  
enim atq; \* siccatae facile commouent, caput implēt, ac  
mentis faciunt alienationem augeri. Ita detractis cu-  
curbitis si partes erubuisse uiderimus, leniter scarifi-  
camus: si minus\* mitigamus uaporantes spongiis, non  
nimis calidis ac relaxantes: \* uapore etenim nimio  
tanquam frixantes densamus. Quapropter, ut su-  
pra diximus, post iugem atque temperatam uapora-  
tionem, ubi partes rubuisse uiderimus, scarificamus.  
\* Post nanque etiam uaporatio ante cucurbitæ appo-  
sitionem adhiberi debet, ne plurimum infixa immo-  
retur, & inde partes radi uideantur. \* Suppositis er-  
go cucurbitis cum sufficientem locorum \* uerticem  
factum uiderimus, scarificamus. \* Si enim non solum  
cucurbitæ quassatio mitigatur, sed etiam floris san-  
guinis facilitas sit. \* Explicata scarificatione, rursum  
cucurbitas imponimus, ut sanguinis detractio fiat. Sed  
eo tempore capiti atq; collo & uicinis partibus \* le-  
ues erunt cucurbitæ apponendæ, quo in laxamen-  
tum

e Arentes &  
siccas cucurbi-  
tulas dicit, que  
admonetur cū  
flamma. Inter-  
dum enim cum  
aqua calida  
apponebantur,  
quemadmodū  
scripsit Albu-  
crasis cap. De  
usu cucurbitu-  
larum.

\* sicca  
\* ruborem ex-  
citamus  
\* calore  
\* Præterea  
\* Depositis  
\* extumuisse  
\* sic  
Peracta  
\* sine scarifi-  
catu

tum consentiant. At si in præcordiis tumor fuerit, erūt ipsa prius scarificanda, sic etiam & uesicæ partes, uel uicinæ eius. Tunc in alia diatrito caput, dehinc clunes etiam, simul scarificare noxium atq; uexabile est. Erit enim eiusdem temporis multas per partes effecta sanguinis detractio \* phlebotomiæ, quæ necessario uires \* absumat. Quapropter partiatim erit adhibenda cucurbita, ut exempli causa, nunc præcordiis atque pubetenus, prærasa capillatura, nunc capiti, nunc clunibus, ac uertebrotenus, quod Græci ἰσχυρὸν uocant. Cæteris quoq; partibus fomento curatis, ac \* decoctionibus supradictis, & cataplasmatibus relaxatis, \* atque ita lenibus cucurbitarum raptibus utemur, quos Græci abusiue \* cufar uocāt. præfricatis partibus \* tractationem manuū. At si uires illasæ aut minus lesæ fuerint, post detractiōem sanguinis factā, spongiās expressas ex aqua calida partibus applicamus, uel oleo calido mediocriter fouemus. Tunc totum corpus per unctiōnem curamus, his operantibus magis qui agro seruiendo iam noti sunt, ne mētis alienatio asperetur. Etenim eorum facili accipiunt, atque redarguunt delirationem præsentibus, ut sæpe diximus, his quibus uerecundiam egrotantes debent. Post perunctiōem factam ut suprā diximus, cibum dabimus. At si accipere congrua noluerint, uel contraria uoluerint, erunt fallendi: facili enim id fieri potest, si quidem etiam mentis ægritudine afficiantur. Dabimus ergo congrua, fingentes ea quæ ipsi petebāt. At si minime consenserint, erit consuetudinis argumentatio adhibenda. Vt si exempli causa uinum accipere cupiunt, mulsum demus: uel si prisana succum petierint, alicam demus, uel ex \* milio in similitudinē in prisana confectum cum possint, si

\* tū id vexat,  
quā si phle-  
botomia fieret  
\* absumit.

\* sēni græci  
& lini cum o-  
leo.  
\* postea  
\* καὶ οὕτως  
\* tractatione

\* milio ius in

ex aliqua parte sapuerint, hortationibus, aut metu  
 compesci. Si neque hoc fieri, dabimus ea quæ non sa-  
 tis aliena sint ab his quæ rationi conueniunt, ut olus,  
 aut ptisanam: dabit enim quiddam laxamenti atq; in-  
 dulgentiæ asperitatibus animorum, \* cōcupita oblatio, \* cōcupitorum  
 & non omnino sine cibo atq; nutrimento perseuera-  
 bunt. Vinum uerò omnino negamus, tanquam repu-  
 gnans, & nihil à ueneno differens: etenim datum sta-  
 tim furorem exasperat, atque in nimiam magnitudi-  
 nem tollit. Post refectionem itaq; erunt somno dimit-  
 tendi, uel quod est uicinum somno, requies adhibenda,  
 atque usque ad totius passionis statum alterna, uel per  
 interualla, cibi resectio: hoc est interposita dici unius  
 ieiunitate, permittentibus quidem uiribus: sed ea die  
 qua cibum non dederimus, erit cataplasmatibus uten-  
 dum congruis, atque iugibus, usque ad medium tempus  
 dimissionis. At si porrecta in dies \* numerosior erit \* numerosio-  
 aegritudo, & \* statum infirmitas acceperit, conuenit <sup>res</sup>  
 ut declinatione, augmento, uel impetu passionis trans- <sup>\* stabilis diu-  
 acto motum gestationis adhibeamus, si uires patiun- <sup>turnaq; sit a-  
 tur, in domo suspenso lecto, si aer loci bonus atq; muni- <sup>gritudo</sup>  
 dus fuerit. Etenim si motus uel gestatio somnum rupe-  
 rit, rursus addormiunt, atq; difficile expergiscuntur,  
 perseuerante iugi motu. At si hoc fieri non poterit, in  
 uicina porticu gestatio adhibenda, ita ut sella baiula-  
 toria, uel quolibet sefforio leniter atque mediocriter  
 moueantur. Similiter etiam si fuerint experrecti, non  
 statim erit gestatio incidenda: nam repentina statio,  
 atque interrupti motus in præteritas uigillas reuo-  
 cant ægotantes. Non enim dimissio accessionis, sed  
 totius passionis declinatio, nunc curationem poscit.  
 Quapropter oportet ægros perseueranter mouere:  
 sed</sup></sup>

sed leniter, atq; sensim, & sine ulla nimietate. At si so-  
 \* incris lutio magis \* inerat passioni, nō erit gestatio adhiben-  
 da. Tenuat enim atq; dirarat motus. Dehinc cū solu-  
 tio prouocatur, etiam uigiliæ necessariō augentur. In  
 dimissione uerō accessionis, quam Græci anesin uocāt,  
 perseuerandum est localibus adiutoriis, & cucurbitæ  
 appositione sed nō adhuc adiungēda scarificatio. Bo-  
 num est enim corporibus sua seruare, ne latenter effu-  
 sione frequenti ægotantes in diaphoresin ueniant. At  
 si aliquo in loco uehemens dolor emerferit, sola erit  
 scarificatione curandus. Tunc consequentibus atq; cō-  
 gruis uaporationibus, & somētis, & cataplasmatibus,  
 \* vnctione & \* punctione utendum, & cibo, cū temporis op-  
 portunitatem uiderimus, quæ probatur signis quæ de  
 febribus scribentes docebimus. Generaliter autem  
 omnium passionum strictura laborantes minus ciba-  
 mus: conuenit enim cibi paruitas densitati, si quidem  
 corpora minus exhalent, ut econtrario solutioni plu-  
 \* insumitur rimus conuenit cibus: Si quidem celerius \* insumatur,  
 plurimæ exhalationis causa. At si uires ægotantis  
 fuerint dissolutæ, & febres non ita acres, tunc spem  
 \* declinationis ueluti \* declinationes ostentent, aspicienda erit imbe-  
 cillitas uirium, dandus cibus, & si necessitas cœperit,  
 etiam uinum, sed omnino paruum ad releuandas cor-  
 poris uires. In his enim sanè magis erit consideranda  
 \* effluxio liquidarum enussio materiarum, atque corporis \* de-  
 \* rugosa fluxio, & cutis ueluti \* ruginosa, uel sulcata panno-  
 sitas, quam Græci rhacofin uocant. Etenim humilitas  
 atq; densitas pulsus plurimos fecit errare, ut putarent  
 uirium solutionem, atque ita importunè uinum dantes,  
 insuperabiles mentis alienationes fecerunt excitari.  
 Quapropter oportet etiam cum aliis, pulsū conside-  
 rare,

rare, non solum si densus atque humilis est: hoc enim  
 etiam nō solutis uiribus saepe occurrit, sed si etiam im-  
 becillis, & in \* comparatione multarū effusione sem- \* continuatio-  
 per ac magis densatur, atque humilis & tremulus effi- \* ne multarum  
 citur. \* Cordis etiam motus tarditate quadam defecti \* effusionum  
 spiritu, \* motu torpescit, ut post factum saltum ad se- \* Cordis enim  
 met ex residuo corpore prerogatum spiritum trahat, \* motus spiritu  
 & difficulter alium faciat saltum, siquidem non possit \* defecti, tardi-  
 spiritus usq; ad \* articularum finem, uel omnium mem- \* tate quadam  
 brorum peruenire summatē. His deniq; accedit tre- \* multū torpescit  
 mor tempore, quo corpora requiescunt, non tantum \* multum  
 cum aliquis sua membra attrectare tentauerit. Ete- \* in carpum,  
 nim cessante officio atque \* uisu, egrotantis tremor si \* cuius arterias  
 fuerit solutus, \* atque è natura, uel sanitas tempore \* nos explora-  
 intelligitur fuisse. Prouidendum itaque, quia in ista \* mus & tenta-  
 egritudinis qualitate incanta uini dandi consuetudo, \* mus  
 & \* propter uitas, ut suprā memorauimus, accusa- \* usu  
 bilis apud inertes, quos idiotas appellant, inuenitur, \* iamq; à na-  
 quanquam passionis causa \* egrotantes interfecti ui- \* tura vel sani-  
 deantur. Quapropter erit primo periculum prædi- \* tatis  
 cendum, ac deinde uinum dandum. At si uirium solu- \* proteruitas  
 tio non fuerit, sed sponte profectus in meliorem par- \* non ob usum  
 tem passionis fuerit demonstratus, non illico præcipue \* uini  
 festinandum circa mutandum curationis cursum, nisi  
 triduo fuerit confirmata passionis declinatio. Etenim  
 facilis in recursum peiorem, atque in augmentum hoc  
 passionis est genus, etiamsi parua occasio impulerit  
 cause. Quapropter etiam tunc propter difficultatem  
 passionis cautius erunt omnia agenda, atque primum  
 capiti, uel magis patientibus locis cerotum apponen-  
 dum ex oleo dulci confectum. At si reliquæ fuerint in  
 tumoribus uiscerum, cataplasmatibus erunt perseue-  
 rantius

- \* relaxanda rantius \* relaxandæ, uel pinguibus palmulis, siquidem  
 \* habent non præsentis temporis, sed etiam sequentis \* habèant  
 relaxandi uirtutem. Tunc etiam conuenit caput fo-  
 \* subiecta ca- mentis curare frequentius, sed cauta diligentia, \* ne-  
 piti, ut thorax qua alia pars frigore tangatur. Nam lata spōgia erit  
 supponenda gutturi, atq; mento. Dehinc paulo pro-  
 minentiùs à lecto \* producendus eger, atque paululum  
 inclinandus. \* Tunc supponenda scaphula alta, aqua  
 \* ut exaëto calida plena: deinde duo adhibendi, qui foueant alter-  
 prolatoq; capi- no officio, ne ullo tempore fomentum frigesce-  
 te forum exci- piat. re faciat  
 \* Hoc κα- caput. Per interualla denique erit etiam oleo perfun-  
 τάρραίνον, & dendum, & manibus leniter defricandum, sed non im-  
 κατὰ κλύσαν preßis. Tunc expressa spongia detergendum, & ultra,  
 veteres dixe- que humectata sunt fortè, pannis calidis detergenda,  
 runt: unde κα- atq; lana calida est \* tergenda. Tunc residuum corpus  
 τὰ κλύσμις oleo perungendum, molli quidem tactu manuum. Pro-  
 \* contagenda cedente declinatione, solitum nobis est uti etiam fo-  
 mento à genibus ad inferiora. Tunc comparatione  
 profectus, cibi augenda humanitas. Primo enim opor-  
 tet ac sufficit uarietatem de simplicibus facere, dando  
 pultem, aut sorbilem cibum, oua atque panem, uel elu-  
 tam alicam, & non alternis, sed quotidianis diebus,  
 & plurimum, comparatione præteriti temporis illo-  
 \* parum rum dierum, quibus \* paruum dare solebamus. Simpli-  
 ciores uerò tenuem atque paruum illis diebus quibus  
 nihil dare solebamus. Confirmata atq; plurimum pro-  
 ficiente declinatione, erunt addendæ etiam mediæ ma-  
 \* obsonia teriæ \* pulmenta, quod Græci μέσων ἄνθων appellant,  
 ut pisces saxatiles, cerebrum, olera, sed non acria, ut  
 \* salsamen: u: beta, malua. Tunc etiam ex deposito, ut \* salsum, oli-  
 al, salgamum uas. Hæc enim quæ de cellario proferuntur, Græci  
 apothecion uocauerunt. Oportet etiam aduertere, ut  
 quando

quando damus multum, minoris sit nutrimenti, aut quando paruum, maioris sit nutrimenti. Sicut responsionū.

\* libris resumptiuum quid tunc scribes docuimus: \* libris quid  
semper autem utantur. Dandus autem sic est cibus, ut sumptiuum sit  
intra dimissionis medietatem digeratur, & nihil su- scribentes do-  
perfluum sequens inueniat accessio. Augendi sunt igi- cuimus, &  
tur cibi pro uirium quantitate. Denique si se corporis quomodo iu-  
fortitudo attollere cœperit, dabimus etiam uolantum medici semper  
carnes, ut turdos, uel pullos gallinarum, & columbi- riantur.  
norum. Tunc etiam porcina carnem, atq; crura por-  
cina, quæ Græci acrocolia uocauerunt, uel quæ motu  
frequente \* exercentur in iisdem animalibus, dabimus \* ut antiū cru-  
etiam hœdinam carnem resumptis \* uiribus, ut omnes ra & alia.  
supradictos cibos facile accipere ac digerere possit \* uiribus: ac  
egrotans, ordinem cibi componimus, ut primo demus  
ea quæ sunt mediæ materiæ, quem Græci mesen hy-  
len uocant, ut pulles, pisces, cerebrum, alicam, sed quæ  
caput nō percutiāt, ut ficus sola uel ex melle, aut mul-  
sum coctū malum, uel \* celsa. Tūc deinde uolantia, sed \* mulsā  
non pingua, neq; cibus nutritilibus \* adescata ob ac- \* saginata  
quirendam pinguedinem, sed mediocriter carnosā: ul-  
timo porcina atq; hœdinam: Proficiente curatione  
addenda erit gestatio, quæ in domo uel in porticibus  
fiat: sed hæc quoq; erit sensim augēda, similiter etiam  
corporis unctio, atq; defricatio, & cibus supradictus,  
nunc quantitate, nunc qualitate, erit augendus. Tunc  
lauacrum adhibendum, & in abstinentia uini perma-  
nendum, Cum autem sine ulla inquietudine corpus  
\* habitare senserimus, dabimus uinum splendens, \* le- \* habere  
ue, atque \* mediæ acre, non nimij odoris, temporis \* lene  
mediocris, ut neque uetustum, \* neque satis nouum \* mediocre  
sit. Erit præterea aquatum dandum: metuenda est \* neq; plus sa-  
tis



enim in ista passione uini datio, siquidem eius in tu-  
more fuisse substantia uidetur. Tempore igitur quo  
uinum damus erit primo ager perungendus, tunc  
idem modus cibi dandus. Cum omnis deinde sollicitudo  
recesserit, atque omnia suspecta \* circumspecta ui-  
derimus, & alienatio mentis omni ex parte recesserit,  
febris \* desertis, atque uiribus resumptis, impa-  
uide omnibus supradictis utendum erit, coniunctis, ut  
gestatione, unctione, lauacro, & uario cibo atque ui-  
no. Omni autem tempore resumptionis erit curan-  
dum, ut ab alienatione mentis reducti sapere cogan-  
tur. Plerique enim usque ad sanitatis tempus, mæsti-  
tudinem, uel iracundiam, aut alienationem mentis  
seruauerunt. Quare oportet eos qui hilaritate affi-  
ciebantur, seuera uerborum atque tristi oratione  
corrigere. Sic enim mentis laxata habitudo atquo  
pueris effrenata bacchatio coercetur. Eos uero qui  
mæstitudine atque ira afficiebantur, \* leui cōsolatio-  
ne, \* atque nunc dictis hilarioribus incunditate rele-  
uare. Etenim tædium, uel mæstitudo non solum in his,  
sed etiam in aliis passionibus ualuit sepe passionem  
refricare. Nam si sani homines plerique anxietate  
\* in passionem corporis deuenerunt, nimirum etiam  
qui nondum sunt passione purgati, in eadem redeant,  
cum animæ qualitas sua, ut ita dixerim, cubilia qua-  
dā noua uulneratione affecerit, hæc est secundū \* Me-  
thodon curatio phreniticæ passionis. Dehinc aliarum  
fectarum principes quid ordinauerint, prosequamur.

Ad Dioclem. Cap. XII.

**H**ippocrates igitur solum nomen uidetur teti-  
gisse passionis, libro quem de ptisana scripsit.  
Item libro prædictiuo quem prorrheticū appellauit,

nam

\* ablata, re-  
mota

\* curatis : sa-  
uatis.

puerilis  
\* leni

\* & quæ nu-  
per dicta hila-  
riore

\* in hanc pas-  
sionem

\* Methodum



nam curationem nullam tradidit. Sed neq; Praxagoras, neq; Herophilus. Diocles uero libro quem de febribus scripsit, ait oportere phreniticos fortes, atque audaces lauacro curari. Similiter etiam phlebotomare iuuenes fortes atq; plurimum sanguine abundantes, uel consuetudine uiolentos, quosdam intra sextum diem, aliquos uero etiam post septimum, & octauum. Item libro quem de passionibus & earum causis, & curationibus scripsit, non solum, inquit, ex brachio sanguis est phreniticis detrahendus, sed etiam de uenis quæ sub lingua sunt. Quantum \* ad hæc mi-

seris erat melius debilitate potius quam uana corporis fortitudine laborare, ne tantis cladibus errantis medici uexarentur. Etenim audacia & irrationabilis fortitudo peiorantis est passionis, & magis in augmento fit. Perniciosius autem cum passio uehementescit, uexato tantis turbationibus egro, lauacrū adhibere. Quod est \* econtrarium utilissimum in declinatione, etiam non audacibus, neq; fortibus phreniticis. Dehinc noxius est etiam clyster acrior, quem sæpissime probat, atq; nihil ab officio differens. Phlebotomia quoq; à iugulatione nō differt, cū uexatis uiribus adhibetur, ut aiūt post septimū uel octauū diem. Atq; etiā ex uiolentia in phreniticā passionem uenientes cōuenit plerunq; non phlebotomari, cū forte etiam solutio adfuerit, alios etiā, hoc est ex aliis causis phreniticos effectos, ut est adustio, sæpe phlebotomari oportet, Sed neq; parū sanguinis habētes, quos Græci *αἰμαῖ* appellāt, ita curādi erūt ut \* phlebotomia beneficio priuētur. Et quid ultra? cū enim non ætates, neq; cetera, quæ \* superfluo posuerūt, prouidēda probemus sed passionē magis, atq; eius \* comitatia cōsidere-

\* remedia

\* econtrario

ā maleficio  
nescio

\* phlebotomia

\* superflua

\* symptomatica

magnitudinē

paruitati &amp;c.

mus, falsa deniq; ac superstitiosa est etiam ex uenis sub lingua constitutis sanguinis detractio, etenim caput implet, & eius fluor abstinere difficile potest.

Ad Erasistratum. Cap. XIII.

\* dari: verum  
non ad

**E**rasistratus tertio libro de febribus scribens, hoc solum dixit, quomodo in febrium alienatione uinum conuenit cum melle\* dari. Non ad examen dandi tempora sumpsit. Dicit deniq; multis profuisse, & miratur quomodo, nescius, temporum conuenisse fortuna. Dehinc multam inflationem facere nemo dubitat, atq; plenissimam uentris commotionem, quippe cum neq; dandi quantitatem adiecerit, neque alias adiutorij partes manifestandas aduerterit.

Ad Asclepiadem. Cap. XIII.

\* veluti  
\* peccata

\* cognita  
\* inuicem oc-  
currentia

morborum caus-  
se ex Asclep.

\* faciam  
\* sequitur

\* vasa: mea  
tui corporis

**A**sclepiadi responsuri, eius primum dogma proponamus, qua\* uoluti apprehensionis falsitate, \* peccatis etiam inuoluuntur curationum: Primordia namq; corporis primo constituerat atomos, corpuscula intellectu\* sensa, sine ulla qualitate solita, atq; ex initio comitata, eternum mouentia, quæ suo incurso \* offensa, mutuis iustibus in infinita partium fragmenta soluantur, magnitudine atq; schemate differentia: Quæ rursum eundo sibi adiecta, uel coniuncta, omnia faciunt sensibilia, uim in semet mutationis habentia, aut per magnitudinem sui, aut per multitudinem, aut per schema, aut per ordinem. Nec, inquit, ratione carere uidetur, quod nullius\* faciant qualitatis corpora. Aliud enim partes, aliud uniuersitatē\* sequetur, argentum deniq; album est, sed eius affricatio nigra: caprinum cornu nigrum, sed eius alba ferrago. fieri etiā\* uias ex cōplexione corpusculorum, intellectu sensas, magnitudine, atq;

atq; schemate differentes, per quas succorum ductus solito meatu percurrrens, si nullo fuerit impedimento retentus, sanitas maneat, impeditus uero statione corpusculorum morbos efficiat. Fit autem eorum statio, aut magnitudinis, aut schematis, aut multitudinis, aut celerrimi\* motus causa, aut uiarum flexu, conclusionem atq; \*squamularum, exputo. Varias inquit fieri passiones, locorum, aut uiarum differentia, & nō omnes statione corpusculorum, sed certas, hoc est phrenitim, lethargiam, pleuritim & febres uehementes: \* solubiles uero liquidorum atq; spiritus turbatione: Item bulimum magnitudine uiarum stomachi, atq; uentris fieri sensit: Defectionem uero atq; corporis fluxā & \*irrigibilem\* laxitatem, uiarū inquit raritate fieri. Item hydropisium perforatione carnis in paruam foramulam uiarum quæ possit solita corporis nutrimenta \*inaquare. \* Item\* typum quotidianum maiorum corpusculorū statione fieri assuerat: Cito etenim inquit ea exantlari atq; impleri: Tertianum uero minorum statione corpusculorum: Item quartanum minutissimorum. Difficile enim impleri atq; exantlari possunt. \*Febrium ponunt signum seruorem plurimum, atque immutationē pulsus in uehementia, nisi ex aliqua hæc manifesta fuerint causa. Et neq; inquit esse in passionibus statos dies, quos crisimos appellant. Etenim non certo, aut legitimo tempore ægritudines soluuntur. Vinum iubet febricitantibus dari, sed adiecta discretionem. Impari denique die adhibendum probauit: clysterem, & \*iugiter adhibendum. Non etiam sitim uehementem donec pulsus concidat, probat: etenim oportunitatem \* temporis fieri magis ab \*artifice posse quam sua sponte, aut deorum nutu uenire,

\* qui ordinem perturbat

\* squamularū obtrusione, ut in retēto spūto

\* cum solutione iunctas.

\* incorrigibile  
\* extenuationem: maciem.

\* in aquā retere

\* Idem  
\* febris

\* Febriū idem ponit

\* sæpius: frequenter

\* tēporis opportunitatem

\* artificis prudentia & obseruatione

μεγαλειαν  
 \* Samothra-  
 cia a femina  
 quam tracta-  
 bat.  
 \* pestilenti  
 morbo

Appellauit deniq; illam \*magnificam. Item in \* Samo-  
 tracia clysterem, atq; uomitum probat, circa uesperā  
 pridie. Sed in his qui periodicis typis afficiuntur, uo-  
 mitum preponit clysteri. Item \* lue egrotantibus uo-  
 mitum & Lauacrum probat. Typicis uero, clysterem  
 & uomitum, & uiuum Samothracium, atq; salsum  
 bibendum inquit, primo usque ad tres quartas sexta-  
 rij, & superbibendam partem sextarij. Item tempus  
 dandi cibo non dimissione per facta, sed accessionis de-  
 clinatione dicit. Et quosdā prima die, quosdam secun-  
 da, quosdam tertia, quosdam quarta, uel quinta, aut  
 septima cibari iubet. Phlebotomat eos qui cum dolo-  
 re fuerint egrotantes, alios omnes prohibet phlebo-  
 tomari, & magis specialiter phreniticos, adiiciens  
 etiam non esse tondendos, loci quoq; obscuritatem re-  
 cusans. Item cardiacos uehementioribus clysteribus cu-  
 rat, & cum leui fuerint indulgentia releuati, reficit  
 uino, & cibo. in synanchicis uero, \* ut supradictis etiā  
 utitur & \*pharyngotomia, hoc est canne siue guttu-  
 ris ob respirationem diuisura: item in hydropibus pa-  
 racentesin probat, quia inquit, si forte plus modo fue-  
 rit facta humoris detractio, erunt egri aqua calida  
 replēdi tantū, quantū plus uidebamur abstulisse. Huic  
 sanc \* adiutorio detractioem sanguinis ex tato factā  
 ex eius uena interiore similiter mederi dicit: & non  
 esse actiuas atq; operantes causas agritudinum in li-  
 quidis constitutas, quas \* synectitas uocant, sed esse an-  
 tecedentes, quas Græci procatarcticas appellāt: item  
 plenitudinem plerasq; passionēs adiuuare dicit. Lau-  
 dat etiam in salutaribus præceptis uitæ uarietate, atq;  
 uehementē utile dicit aquam bibere, & frigida lauari  
 quam psychrolusiam appellant, & frigidam bibere.

Item

Item habitudinem athleticam negat esse tutā: & neque ullam \* digestionem in nobis esse, sed solutionem \* cibi coctionē ciborum in uentre fieri crudam, & per singulas particulas corporis ire, ut per omnes tenuis \* uisa penetrare uideatur, quod appellauit Leptomeres, \* sed nos \* ipsa intelligimus spiritum. Et neque inquit feruentis qualitatis, neque frigide\* esse nimie sue tenuitatis causa, neque alium quemlibet \* sensum tactus habere, sed struibitur in per uias receptaculorum nutrimenti nunc arteriam, <sup>corpus</sup> nunc neruum, uel uenam, uel carnem fieri. Item transuorationis primam partem dicit extentione fieri fau- <sup>\* qualitatem</sup> cium, secundam uiarum tenuitate, quæ ad uentrem du- <sup>que sensu ta-</sup> cunt. Item orexim, quam nos appetentiam dicere po- <sup>ctus percipia-</sup> terimus, eam quæ cibum appetit, uiarum maiore \* per- <sup>tur</sup> fectiōe fieri dicit in stomacho atque uentre. Eam au- <sup>\* patefactione</sup> tem quæ potum appetit, paruorum uiarum causa fieri <sup>& magnitu-</sup> dicit. Præterea excrementa uentris (græci scybala di- <sup>dine: ut supra</sup> cunt) negat aliena esse natura. Siquidem etiā ex ipsis <sup>dictum est de</sup> corpora augentur. Quædam deniq; inquit, animalia <sup>bulimo.</sup> ex ipsis solūmodo & \* nutriūt. Somnū enim etiā fie- <sup>\* nutriuntur</sup> ri spiritus sensibilis crassificatione asseuerat: deinde regnum animæ aliqua in parte corporis constitutum negat. Etenim nihil aliud esse dicit \* animā, quam sen- <sup>\* Asclepiadis</sup> suum omnium cæterū: intellectu autem occultarū, uel la- <sup>de anima iudo</sup> tentiū rerū, per solubile fieri motū sensuū, qui ab acci- <sup>cium.</sup> dentibus sensilib. atq; antecedēti perſpectione perficitur. Memoriam uero alterno corū exercitio fieri dicit. Omnia præterea fieri necessitate, & nihil sine causa, & neq; naturam aliud esse, quam corpus, uel eius motum. Deinde, inquit, non solum prodest natura sed etiam nocet. Hoc est Asclepiadis dogma, nunc quemadmodum phreniticos curauerit, prosequemur.

Item ad Asclepiadem phreniticos curans.

## Caput xv.

**P**hreniticos curans, libro celerum, uel acutarum passionum primo expugnat eos qui cōtraria posuerunt adhibenda. Secundo, quomodo declinanda, uel auertenda sit phrenitis docet. Tertio quomodo curanda, cum facta fuerit. Contradicens igitur primo<sup>a</sup> in causa<sup>a</sup> clysteres, atq; irim bibendam, & acetum cum melle, & ex sinapi apophlegmatismum & tonsuram. Siquidem uelut hortamento quodam humor liquidior facit ad caput ascensum, & in<sup>a</sup> constructionem atque tensionem cerebri membranam cogit. Accurrit enim incisuræ capillorum materies, & pori deniq; & capilli post tonsuram crassescunt, atque fortiores fiunt. Quapropter etiā homines, si post cibum totonderint, tussicula atq; catarrho, uel lippitudine uexantur. Dehinc si lanis caput post, tonsurā tegere curamus, quāto melius si naturali tegmine capillorum lateat obtectū? Improbatur etiam in obscuro loco iacere ægrotantes. In luce enim, inquit, mentis siue intelligentiæ uisa debilia, atque parua efficiuntur, cum sensualibus uisis arguuntur, sicut nocturni luminis ac funaliū flamma sub ætheria luce constituta uisi potioris oppressione languescit: in obscuro autem econtrario uehementiora atque maiora fieri mentis atq; intelligentiæ uisa asseuerat, cum nullis sensualibus uisis arguuntur, quiescentibus sensibus. Denique tanquam præsentia, uel uera fiunt, sicuti somniantum etiam: tunc enim silentibus sensibus solius mentis uisa operantur.<sup>b</sup> Ac deinde cum nullis adhuc sensualibus incisa uocantur, tanquam præsentium non præsentium uisa sequuntur, phlebotomiam etiam nihil inquit iugulatione differre: in phre

<sup>a</sup> a legendum  
recusat, ostendit  
uersus decimus  
quartus pa  
gina sequentis  
<sup>a</sup> in curatione  
clysteres recusat  
<sup>a</sup> obtrusionem

<sup>b</sup> Ac deinde  
de cum nullis  
hæc sensuali-  
bus uisa auo-  
cantur

phreniticis quidem sit cum dolore ægrotantibus, congrua. Nam dolor maiorum corpusculorum statione sit, quæ sola phlebotomia exantlari posse noscuntur: phrenitici\* igitur nullo dolore uexantur. <sup>c</sup> Siquidem <sup>\* autem</sup> angustis in his paruorum facta uidetur statio, & propterea phlebotomati animi defectu, atq; corporis frigido torpore\* afficiantur, aut uocis amputationem, aut mentis alienationem sustinent. Detracta enim materia, passionum causa remanentem crassificari contingit, atq; corporis facere algorem, & tunc ad cerebri membranam spiritum, uel feruorem ferri, & statione corpusculorum\* geminata quoque alienatione. <sup>\* geminari quoque alienationem</sup> Et recte quidem clysteres atque irim & mulsum ex aceto, & ex sinapi apophlegmatismum recusat, sed se ipse quoq; impugnans, sicuti in consequentibus docuimus: item tonsuram, atque obscurum locum, & phlebotomiam non recte prohibere uoluit. Nocentur enim quidam non tonsuræ causa, sed intemporalitatis eiusdem. Denique etiam sanos post cibum tondentes <sup>\* noceri</sup> nocere manifestum est, ante cibum uero oportunitatis causa releuari. Dehinc etiam si ui sua prodesse tonsuram negat, oportuit tamen eam adhiberi propter usum localium adiutoriorum, sine qua necessario adhiberi non possunt, sicut superius docuimus. <sup>\* lucidi, obscuri.</sup> Aëris uero qualitas non occulta causa, sed manifesto actionis indicio erit iudicanda, secundum passionem. Igitur quomodo uidemus alios strictura, alios solutione magis affici, conuenit ut pro differentia his lucidus, illis obscurus sit adhibendus. Nam crassitudine, ac frigore constringens aer\* redarguit corporis defluxiones, quas <sup>\* cohibet: coarctat.</sup> greci aporrhæas uocant. At si, ut nuper docuimus, proprietatem accidentium seruauerimus, quomodo qui-



dam lucem fugiunt, uel oderunt, alij tenebras, conuenit ut alios obscuro, alios lucido esse faciamus loco. Quid dicam quomodo pleraque aegris aliter sunt quam uidentur: ex uisis namque ueris ducentes quidam mentis errorem, falsitate magis afficiuntur. Sic denique Hercules filiorum & conjugis uisibus inimicos uultus accepit: Orestes etiam Electrae furiales uultus expauit. Non omnes igitur lucido in loco iacere concordat: sicut latius adiutorium libro explicamus. Est etiam uehementer noxium phlebotomiae utilissimum adiutorium prohibere. Quippe cum uideamus in ipso usu saepe passionem fecisse compedium. Etenim defectio uocis, atque algor sequuntur eos qui incongrue fuerint phlebotomati,\* coniuncta scilicet solutione aut intemporaliter, aut immodice. Vanum est etiam quia non dolent phlebotomiam prohibere, tanquam maiorum corpusculorum congruam detractioni,\* quorum obtrusione dolores efficiuntur. Primum enim\* paralyticos & peripneumonicos, & apoplecticos congrue phlebotomamus, cum nullis doloribus afficiantur. Secundo etiam phrenitici dolent, sed eorum detrahi sanguinem, quia iudicio caret, nescit queri, quod doleat. Videmus namque eos sese mordere, aut urere, aut pun gere: & naturale non est nullo dolore cogente haec fieri existimare. Dehinc maiorum corpusculorum detractionem, etiam minorum necessario sequitur. At phrenitici non solum alienantur, sed febricitant. Ita febres secundum Asclepiadem maiorum corpusculorum statione fiunt. Si igitur propter alienationem non conuenit, propter febres tamen conuenit adhibere phlebotomiam, sic etiam sanguis maiorum corpusculorum materia,\* quam non\* sed non solum detrahit phlebotomia, uerum etiam spiritum & feruorem, quae ut dicit, paruorum sunt corpus

\* iniuncta

\* cum paruorum

\* efficiantur

\* obserua pa-

ralyticis recte

detrahi sangui-

nem.

\* quam non



corpusculorum materie. Conuenit igitur secundum ipsum phreneticos phlebotomari, ut detractiōe minorum corpusculorum alienatio mentis, maiorum febres auferantur. Apparet itaq; neq; secundum se consequēter Asclepiadem phlebotomiā prohibere. Proinde præcauens uel auertens mentis alienationem, iubet addisci, quæ sit accessiōis ac dimissiōis dies. Tūc grauiori die cibum dari paucissimum, atque expectato febrium statu, dari ptisanam, uel hordeum, aut alicā, aut cum beta lenticulam, uel his quicquā simile, coniiciens solam ex his dandi \* nouitatem prodesse, nec habendum \* uarietatem iudicium, quid istorum debeamus offerre, sed potestati ac mutationē egrotantium dimittendum, quid uelint eligere. \* Alia \* uiclus ratio die si febricula perseuerauerit exantlare obtrusiones, & requiem corporis adhibere, aquam dantes potandam, non plusquam bis in die usq; ad heminā, uel duas, & hunc modum etiam nocte seruare: sic rursum secunda die, transacto accessiōis augmento dandum quiddam de præscriptis sorbilitus, atque alia die declinante febricula, uti sorbili cibo. Perseuerante uerò rursum abstinere, & præterito similem tertium imitari diem. Tunc septima audere iam pane atque piscibus, & uino uti: soluitur inquit enim passio tertia sepe periodo. Ad hæc respondemus, quia etiam si sua sponte passio intra septimum diem solui potuerat, non soluetur, \* iniquæ curationis causa. Etenim neque \* prauæ, incō- de somno, neq; de uigiis, neq; de capitis fomento, uel mode, absur- ceteris quæ ad diligentiam pertinent curationis, quic- da quā uidemus ordinatum, solis ex tribus medelam credidit adhibendā, potu, cibo, clystere, & hoc tanquam de experimento. Nam cibus, ut uoluit, ante dimissiōnem dādus, trāsacto mox accessiōis statu, turbatis ad- huc

huc liquidis atque spiritu, quo febres duplicentur, & alienatio mentis ardeat, & non solum intemporaliter, uerum etiā incongrue. \* Stringit enim ordeum, &

\* hoc falsum. lenticula: relaxat ptisana, & alica, & non possunt contrariæ qualitatis species iisdem passionibus adhiberi, nulla discretione seruata. Dicimus etiam curiosum genus pulmenti, atque congestum, & primæ oblationi \* contrarium esse, betam cum lenticula, quod appellauit Teutlophacen, item ptisanā: contrarius etiam clyster atq; noxius perspicitur, omnibus quidem propter intestinorum mordicationem, & \* cetera: magis

\* hordei, ptisana, &c.

\* ulcera

\* quæ noxia est, præsertim si alui fluorem constitit, ut paulo post ait. \* uidentes

tamen \* solutionem. Ipse deniq; accusans \* urentes, ait continuationem clysterum incendium atq; sitim facere. Inusta enim intestina melle, atque cæterarum specierum mordicatione, mouent feruorem plurimum, qui per alta, quadam continuitate uiarum, membranæ cerebri influat. Cuncta etenim, inquit, quæ sunt in alto corporis constituta, sese occulta uicinitate contingūt. Quorum in numero membranam cerebri ponimus.

\* Aduocat, sub. clyster.

\* iubet

\* Reuocat etiam & graue passioni atque perniciosum malū: nihil enim in ipsa grauius quàm uentris est fluor. Quòd igitur crescit peiorante passione, hoc \* perhibet fieri clysterum prouocatione. Deniq; quæ culpans alios dixit, in ipsum conuertenda, utentem clystere. Non enim dici potest solam frequentiam iniectionis accusasse, genus autem innoxium iudicasse, cum manifestè propter acrimoniam clystere noxi iudicentur, & magis etiam si usu frequenti, atque copia peccauerint adhibentes. Quid dicam, quòd neque semel Asclepiades clysterem iusserit adhiberi, cum secundo die dixerit innouandum, dicens, perseverante rursum, ci-

\* præterea bo abstinendum, & innouandum tertio \* præterita die à quo

à quo clyster fuerit adhibitus. Est etiam uanum sine disciplina temporis potum ordinare. Ait enim bis dandum in singulos dies : mitto non omnibus ægris eundem modum competere strictura atque solutione laborantibus : at iste duas heminas omnibus iussit dari, sed etiā uinum atque uarium cibum septima die offerendum dixit, non declinationem passionis, sed numerum dierum aduertens, tanquam tunc necessario solui passionem existimans, quod est iuri uel legibus simile. Dehinc explicita passionis auertende præcautione & cognitione præsentis : \* hoc etiam effecta curatione \* clysteris <sup>τὸ</sup> ordinauit, cuius duplicem dicit differentiā, unam non <sup>sum</sup> frequētem meticulosam, ac multis phreneticis aptandam, aliam uehementem atque periculosam, quam \* philoparabo- \* curatio <sup>φί-</sup> lon appellauit. Quarum primam ordinans, si inquit, <sup>λοπαράβολος</sup> eum qui non sit ab alio curatus, acceperunt : & propterea nullo sit tentatus adiutorio, odoramentis utemur, hoc castoreo peucedano, ruta & aceto, uel ex his infuso liquore, & clystere detrahendæ obtrusionis causa. Sin uerò ab aliquo medico fuerat antè curatus, erit, inquit, omnis unctio, atque cataplasma, uel odoramentum prohibendum, statim primo ingressu, & ad lucem ex umbra transinutandus egrotans, sternutamentum etiam adhibendum, mulsum dandum æstate quater, hyeme bis in die, dimidia hemina in singulis potionibus, sed præcocto melle, ne uenter humidus, aut fluidus fiat. Tunc ueniente nocte primo ad domicilium mediocre secedendum, atque plurimus uel apertus aer fugiendus : dehinc si aliqua fuerit accessio, uel \* arti \* <sup>typus, cum</sup> culorum stupor, his transactis dandum quicquam de <sup>horrore aut præ-</sup> præscriptis sorbilibus necessario : si autem equalia <sup>gore</sup> permanserint febrium signa, statim uespertino tempore

porē, oleo totum corpus perungentes, caput etiā atq;  
collum rosaceo, dabimus sorbilem cibum: tunc ad lar-  
giendum requiem, uel somnū sufficiens erit motus, baiu-  
latoria sessione adhibitus, quia mox egros mites ac

\* demulcet, \* delicatos facit. Aliqui deniq; phreneticorū dirarato-  
re delenis.

corpore motus causa, deficiūt. Quapropter nocte ma-  
gis atq; post cibū gestationem conuenit adhibere. Hæc  
est secundum Asclepiadem metu perniciosa, atq; cauta  
differētia curationis. Huic extēplo respondemus, quia  
nulla est metu periculosa differentia curationis, arte  
formata sed est potius tuta: neq; etiam uehemens, quā  
secundam posuit periculosam ac metuendam. Vocan-  
da est enim artis iudicio probata necessario magis,  
quā supradictō est uocabulo nuncupanda. At si uerē  
fuerit illa quā putat, tuta, quomodo non omnibus,  
sed multis erit phreneticis congrua? aut cur non ma-  
nifestauit, quibus sit incongrua? Quid dicam? quia

\* curationem  
\* obserua. Me-  
dicorum inui-  
dentiam.

ipsa quoque quā putat, tutam \* passionem, peior  
esse perspicitur. Primò etenim \* inuidiose iubet si quā  
ante ipsum Medicus adhibuit, repudianda. At si non  
adhibuerit, tunc probanda, tanquam legitima putans;

\* sub adhiben-  
te.

ut hæc aliis adhibentibus noceant, \* ipso medeantur.  
Dehinc, neque quibus utendum sit his prohibitis dixit,  
ut oporteat phreneticum sine ullo adiutorio derelin-

\* consopiant,  
ut uaporosa o-  
mnia.

qui. Est etiam uehementer noxium aceto uti atq; pen-  
cedano, & ruta, & castoreo: \* premunt hæc enim, &  
uertigines ingerunt, & ob acrimoniam sui, tumentes

\* rodunt, lan-  
cinant.

\* diffecāt membranas. Hinc etiam alienationem gemi-  
nant, aut \* pressurā ingerunt uehementem: horū testis  
ipse est Asclepiades. Accusans enim eos qui rutā pro-  
baucrunt adhibendam, uitandas inquit primò \* grau-  
abiles uirtutes. Siquidem ascensu quodam inspirationis

\* soporem  
\* quæ caput  
grauant.

caput

caput \*inuadant, & magnas menti occasiones aliena- \* inuadunt  
tionis \*subiiciant. Præterea paulò superius in eodẽ li- \* subiiciunt  
bro ait, ipsum caput \* obsidere non sinunt hi qui curant \* obsidere, id  
cataplasmatibus, & aceto, & polline: & confectis fo- est à dolore va  
mentis ex multiformi materia abluendum existimant. care  
Similiter ungentes non solum caput, sed etiam faciem  
atq; collum, quæ omnia non difficulter \*naris implẽdæ \* nares implẽt  
odoris acerrimi atque grauabilis. Nobis denique sæpe odore acerr-  
contigit ingredientibus ad egros quibus hæc fuerant mo & grauabi-  
adhibita, uertiginem pati. Quid nunc Asclepiades bili.  
grauius olens habuisti castoreo: quid grauabilius \* ab ex iis  
his quæ adhibenda cõfirmas. Cataplasma uerò ex pol-  
linibus, & aceto, fuit cataplasma remoto aceto per se  
efficax. Laxatiuum est enim, si acetum tibi repugnat.  
\* Ipso enim caput foueri \* iussisti. Clysteris uerò cul- \* At enim  
pam superius probauimus. Est etiam iners, omnes e- ipso  
gros, ut uoluit, ex tenebris ad lucem transferre, cum \* Supra enim  
quidam tenebris curari magis uidentur, sicut superius odoramentum  
demonstrauimus. Vexat etiam \* ptarmicum quod cre- ta, pencedano,  
didit adhibendum. Acre est enim atq; ignitũ, ut piper, & aceto com-  
struthium, & album helleborum, quibus tumentes mē- mendauit.  
brane ex eorum acrimonia in asperitatem surgūt, & \* vulgo echin-  
agitatione ob sternutamēta extente prouocātur. De- non  
niq; si statio corpusculorũ causa est phrenetica passio-  
nis, ut putat, uehementius eam his rebus excitari suspi-  
candum est, cum ad sternutamenti motum materia cõ-  
currit. Omnino deniq; sic curationes suas cõsuundit, ut  
quæ etiam ipse ordinauit excludat, cum sibi quadã cõ-  
paratione \* fuerint opposita: ait deniq; maiora adiuto- \* sint  
ria uitanda. Siquidẽ nocere magis quam prodesse \* uidentur  
deatur. Sed quid tandẽ leuioribus \* laceramus, si fomē- \* vel macera-  
tis, atq; unguentis, & cataplasmatibus, & odoramētis, mus, vel laces-  
simus

& sternu

Et sternutamentis egros afficiendos credidit? quibus  
 apparet eum contra semet tulisse sententias. Caret e-  
 \* *tempore* tiam artis auxilio, quod pro \* temporum, aere, atque  
 loco ordinanda adiutoria putat, Et non pro passionis  
 tempore. Dehinc non oportet solum considerare, quo-  
 ties potum demus, uerum etiam quando. Etenim ac-  
 cessionis tempore limpida quoque aqua febrium facit  
 incendium. Mulsum uero dandum dicit subleuandi pul-  
 \* *quodēmodo* sus causa, nescius \* quomodo propriū phreneticæ pas-  
 sionis, inesse paruum, atque humilem pulsum, ut lethar-  
 go maiorem ac tardum. Oportuit igitur passionem  
 destrui, non pulsum optari maiorem, qui sæpe peiorā-  
 do consurgit, quando Et phrenetico in lethargum ue-  
 nerit: ita quoties potum demus autumno, uel uerno  
 tempore, nō docuit. Dehinc clysterc utens, mellis me-  
 tuit admixtionem: Et ne uentrem, inquit, fluidum fa-  
 ciat, decoquendum iussit, Et clysterem non timuit, ne  
 uentrem commoueret. Falsum est etiam cum continua  
 atque iugis fuerit passio, circa uesperum cibum dare.  
 \* *releuantur,* Siquidem etiam secundum ipsum Asclepiadem \* rele-  
 \* *augentur* uentur omnes lucis initio, uespere accessiones \* au-  
 \* *vesperi* geantur. Natura, inquit, \* uesperum ob aeris crassitu-  
 dinem densata inflat corpora, atque initium generat  
 accessionis. Omnibus denique pulsus leuatur statim ex  
 medio die initium sumens. Omnino igitur ratione ca-  
 ret uesperum cibo tempus eligere, quo etiam secun-  
 dum Asclepiadem accessiones augentur. Graue est e-  
 tiam oleo rosaceo tumentia refrigerare, atque con-  
 \* *soporem* stringere, Et ex odore uertiginem facere, atq; \* pres-  
 suram, Et inchoante accessione egros ad alium trans-  
 mutare locum, quando magis eos oportebat quiesce-  
 re. Sed neq; quotidie cibo nutrire est, ut putat, necessa-  
 rium

rium, & magis si nulla fuerit solutio coniuncta, solo  
 tumore constrictis corporibus, \* quo ferre non possint <sup>\* que ferre pos-</sup>  
 quotidianam cibi sumptionem. Noxium est etiam om- <sup>sunt non quo-</sup>  
 nes gestatione agitare: in his enim qui \* solutione & <sup>tidianam</sup>  
 non constrictione uexantur, magis extenditur passio, <sup>\* simul con-</sup>  
 & horum testis Asclepiades est primus. Etenim ait <sup>iunctis</sup>  
 uias apertiores fieri gestatione. Deniq; defectio atq;  
 diaphoresis sequitur eos qui incongrue gestatione  
 fuerint moti. Quod quidem nescius qua causa fiat,  
 tanquam remedium querens uexationi gestationis,  
 nocte gestari atque post cibum egros prodesse aestima-  
 uit, scilicet ut non solum incongruo adiutorio, uerum-  
 etiam inordinato homines noceantur. Neque enim sa-  
 nis utilis gestatio post cibum. Inertem etiam perspici-  
 mus dietam primam, quod ait quibusdam esse contra-  
 riam, nec tamen docuit quibus. Si enim quos nocet ne-  
 scierimus, necessario etiam quos releuet, nescire con-  
 sequitur. Tradens etiam periculosam siue temerariā,  
 quam philoparabolon appellauit, ita composuit cura-  
 tionem, \* in alia inquit, habere similia prae dicta \* pas-  
 sioni solum, quod uinum \* pro melle circa uesperā, non  
 nisi omnino coegerit passio, damus: si minus, primo in-  
 gressu statim, atque plurimum, & extentum, hoc est,  
 meracum & salsum dabimus uinum, quod appellauit  
 tethalassomenon. Etenim inquit quae primo imbecilla  
 atque tarda de sorbilibus & mulsa dederunt agro  
 commoda, omnia ex uino celerius atque coacerua-  
 tim implentur. Etenim feruor plurimus accedit, &  
 pulsus erectio \* & roscida sudatio mitigatur, tan-  
 quam ex cauterio per totum corpus uino concurren-  
 te, atq; incurrente sensum scientia. Haec est uehemen-  
 tior, quam dicit curatio, pro mulsa habens uinum, ut

φίλωπαρβο-  
 λος cura-  
 tio  
 \* in alia  
 \* passioni ex-  
 cepto solum  
 quod  
 \* cum  
 Rusticorum  
 in febribus cu-  
 ratio.  
 \* & roscida  
 sudatio absti-  
 netur, quod a-  
 lienationē mi-  
 tigat, tāquam  
 cauterio per to-  
 tū corpus uino  
 excurrete, atq;  
 inurente sen-  
 sum sua poten-  
 tia. Sic esse le-  
 gendum appa-  
 ret ex pag. 7.  
 & seq.



ceteris peccatis manentibus in odoribus, & fomentis, & sternutamentis, & iacendi loco, & gestatione omnibus ordinata, grauiorem ex uino uexationem adiecerit. In quibus neque mulsum recte secundum ipsum ordinatum esse perspicimus. Dat enim uinū & incongrue, & intēporaliter, & immodice. Incongrue inquam, quoniam falsum, & propterea acre, quādo denique mel coqui iubet ne uenter ueniat in fluorem, atque ab aliis ordinatum clysterem remouet, tanquam

\* commotionē  
inducentem

\* in commemorationem ducentem ac grauem phreniticis uexationem, hoc est fluorem uentris, cum magis falsum uinum id facile possit efficere, & per acrimoniam febres, atq; tumens corpus incendere. Intēporaliter autem, \* quomodo circa uesperā, quando secundum ipsum sit accessio: uel certe \* statim, ut ait, primo ingressu, tanquam secum opportunitatem dandi attulerit uini. Item immodice dare probatur, \* quomodo mulsum, atque meracum, \* & propterea ignis in modum uexare perspicitur, ut uere ipsū uideatur cauteris esse uirtute, quæ neruos incurrens atque penetrans infestat. Adudum febriculæ coniuncta, etiam illud quo sapimus offendit & alienationē geminat mentis, aut spasmus facit egrotanti: \* asserēs etiam quod hi qui non mulsum neq; meracum accipere uoluerint, noceantur, si quidem manu: \* inebriare cōtingat. Erat enim conueniens omni phrenitico qui ab eo curatur, hanc \* adhibere propriam alienationem mentis \* aut omnino uinum accipere nolisset, \* quippe cum Asclepiades ex uino frequenter phreniticos fieri fatetur, atq; similes ebriis inueniri, quodammodo igitur credi potest eosdem multo uino accepto, atq; meraco re-

\* quodammodo  
\* sub. dari iubet.

\* quoniam  
\* quod

\* asserit

\* inebriare

\* augescere &  
irritari

\* cum

\* At enim

\* fieri

uari, quibus alienatio ex uino \* facta perspicitur, quæ

necessa



necessario in capite \* simili semper \* uexatione opera-  
 tur. In his nos credulitate occupari existimat, ut tan-  
 quā ebrios plurimū uinum in altū somnū demergit, nō  
 aliter etiam phreneticos uinolētia in somnum uenire  
 posse putemus, mulso atq; meraco potu affectos. Hæc  
 enim uere ipsorū aliquis dicere potest, sed cōtra erit  
 aduertendum, nullā esse similitudinē \* uinolētiæ phre-  
 niticæ passionis. In ebriis enim alienatio ex multitu-  
 dine poti uini facta perspicitur, quæ \* reflata tēpora-  
 lem citius alienationem soluit. In phreneticis uero ex  
 \* tumore alienatio fit. Quo considerandū est quia uinū  
 in his reflari minime potest propter difficultatē uia-  
 rum, quæ sunt ex morbo adeo densatæ, ut neq; \* natu-  
 ralia quæ per sensuales uias excludi consueuerunt,  
 reddantur, neque accepta per cibos impartiri corpori  
 facile uideantur, uel per tennes uias digestionē soluta  
 \* propriari atque ad sua destinata peruenire, sed ma-  
 nentia statione insueta, nouo turbore corpus afficiāt,  
 atq; tumētia exagitent, mentem quoque turbent uel  
 receptacula quæque percutiant, tēpore quo etiam ille  
 spiritus qui naturalis ac tenuis est, angustatos suos am-  
 bitus pungit, ac dolores corporis efficit. Mitto etiam,  
 quomodo, si ut uolunt, ebrius similes phreneticos acci-  
 pimus, non oportuit ebriū inebriando curare. \* Nut-  
 lus enim uinolentus bibendo in sobriū uenit. Nam ma-  
 gis econtrario qui perseuerando potauerunt, multo  
 \* potu multum mentis alienationem auxerunt, aut in  
 spasmus, aut in uigilias incurabiles deueniunt. Ad-  
 iuuant etiam uexationem uinolentiæ grauabilia odo-  
 ramenta, atque fomenta, quibus denique fortes ac re-  
 cte ualentes in conuiuuiis incautius usi, multa se gra-  
 uatione uexarunt. Ait etiam uinum in cauteris simi-

\* similem  
 \* vexationem

\* cum uinolen-  
 tia

\* concocta &  
 discussa

\* phlegmone  
 cerebri & mē-  
 branarum.

\* alius & lo-  
 tium

\* loci quorum  
 propria sunt,  
 subministrari.

Quidā legunt,  
 suppeditari.

\* seclīnē dīclū

\* potu

vini diuersa  
vni & facultas

• affecta

infectum

• egrotantibus

litudinem abstinere sudorem, cum idem dicat mitigari alienationem accepto uino, cum se plurimi ac per totum corpus sudores effuderint, ut secundum ipsum id sit intelligendum quod nunc abstineat uinum sudores, nunc faciat. Libro denique quem de communibus adiutoriis scripsit, utriusque uirtutis uinum, dixit. Sicut enim, ait, coagula densant atque extenuant lactis naturam, cum caseus ex lacte crassescat, & materia exinde tenuior ac magis liquida fiat, quam Græci ὀππὸν appellant, atque hæc contraria eadem uirtute \* suffecta separantur, non aliter & uinum ui quadam sue percussione, plurimam nutrimenti partem densare accepimus, atque in se cogere, plurimam uero resolueri ac dirarare, & tenuem facere. Quibus probatur repugnantia ex iisdem promittere, & frigido exemplo denique errare. Sed neque discretionibus generalibus uini cōiectura conuenit, falsis exemplis immissa. In his denique adhuc constitutus, demonstrationibus uanis inuoluitur, dicēdo uini \* tritam potationem in passionibus tardis, magis quam in celeribus, uel acutis, & in his qui dimissionibus releuantur, magis quam in his qui continuatione uexantur: & senibus magis quam in iuuenibus: & præpurgatis clystere, uel sitientibus, magis quam plenis cibo: & inchoantibus ac deficientibus febribus magis quam summa tenentibus: & post acceptionem potius quam ante ipsam. Nunc autem curans phreniticos, ordine quodam usque ad finem seruato, in nutriendis \* uirginibus uinum dari constituit, in celeri passione, atque continua, & omnibus nihil sane considerans, sed statim primo ingressu, ac frequentius in statu passionis. Tunc enim, inquit, uehementius alienantur  
agro

egrotantes. Præterea & in uehementia accessio-  
nis intelligitur dare, cum uespere tempore dandum  
iubet. Hæc sunt quibus neque sibi conueniens phreni-  
ticorum curationem ordinasse probatur, quanquam  
infinita quæ dici potuerant, plurima consideratione  
taceantur.

Ad Themisonem.

Cap. xvi.

**Q**uomodo Themison scribens calerum passio- *Quoniam vero*  
num curationes, antiquorum peccatis assen-  
tiens quedam incondita dereliquit, (Nam necdū pur-  
gauerat suam sectam, & ob hoc phreniticorum ordi-  
nans curationem quibusdam erroribus implicatur,) *ant*  
ipsius quoque inspicienda sunt singula. Primo igitur  
\* ex prima diatritho nutriendos dicit, nullis etiam co-  
gentibus causis, quod est impropriū tempori. Dehinc  
dat sorbilia, \* ita cucurbitā, aut solum mulsū, aut po-  
morum quedam. Quod nunc dissimilitudo uirtutis ci-  
borum docet, errorem facile eius perspicimus. Etenim  
sorbilia quæ posuit succi sunt melioris, \* cucurbita ue-  
ro cito corrumpitur. Poma quoque succi maligni, ac fa-  
cile acescentis esse noscuntur, etiamsi sanæ fuerint acci-  
pientes, \* quibus denique medio cibo uti debere saluta-  
ribus præceptis docuimus. Vbi autem uiscera tument:  
& \* altiora febribus inuruntur, multo facilius acescere  
poma probamus. Prohibet sane in fomentis peucedana  
num, castoreum, rutam, sed aceto rosaceo admixta hi-  
berno tempore, Aestate uero \* aqua admixta \* rosa-  
ceo initio passionis caput foueri iubet, non \* conti-  
nens quomodo ob magnitudinē transceso initio, ex-  
templo \* passionis sumit augmentum. Dehinc etiam si  
initium habere potuerit, quod est difficile, erat melius  
\* quos  
\* profundiores  
\* penitiores  
corporis partes  
\* aqua admi-  
xta & rosaceo  
\* oleo sub.  
\* discernens  
\* passio

constrictiuis uti lenioribus, ut oleo hispano, atque  
 \* nouo. Etenim acetum, & rosaceum percutit, &  
 implet caput. Quod autem refrigerantis ac densan-  
 tis uirtutis est, crescente strictura, incongruum esse  
 perspicitur. Ita iuxta differentiam temporum hyemis  
 uel aestatis fomenti mutare qualitatem, nullius est ra-  
 tionis. Item duobus diebus, uel tribus transactis  
 etiam hederæ foliis, uel succo, serpilli, aut mentæ,  
 uel cuiusquam similis uirtutis simplicium, ac non ue-  
 hementium specierum cum oleo, atque aceto per in-  
 terualla fouendos dicit, etiam nunc non iuxta sectæ  
 rigorem. Neque enim ad numerum dierum oportet  
 fomenta ordinare, cum debeamus magis passionem,  
 uel tempus attendere, & neque constrictiua tumo-  
 ribus, atque grauabilia egrotantibus adhibere. Nam  
 \* hederæ cum bibitur, mentis errorem inducit. Ca-  
 dit etiam, cum in acceſſione thoracem putat ungen-  
 dum, & in his qui \* forte ardorem sentiunt rosaceo  
 fouendum. Hoc etenim quum uirtutis sit densatiuæ,  
 constringit tumentia, & ardorem geminat. \* Omne  
 etiam unguentum acceſſionis tempore, & magis in  
 augmento febrium incendiū facit ex superficie corpo-  
 ris ad altiora perducere. Peccat \* enim & in reprobādis  
 odoramentis, non docendo quæ illa sint, ac quot diebus  
 abstinemus egrotos, unguentū adhibendo quod est la-  
 boriosum, nisi etiam cibus fuerit datus. Oportet enim  
 neq; cibari non antecedere perunctione, neq; perungi  
 nisi cibus fuerit \* cōsequutus. Sed etiā post unctionē a-  
 qua frigida faciē \* somētat, constringēs rursus tumē-  
 tia, phreniticis strictura caput afficit. Omni etenim  
 phrenitico strictura caput affici nemo negat. Itē ina-  
 niter

\* Nam uetus  
 diaphoreticum  
 ac tenue est.

\* Virtute, ca-  
 storei, & reli-  
 quorum id ge-  
 nus: quod uole-  
 bat Aſclepia  
 des

\* hederæ mira-  
 vis

\* fortem

\* hoc falsum

\* etiam

\* consecuturus  
 \* fomentans,  
 constringendo

niter putat, \* ex tertia die qua mēte alienari cōperūt  
 nulla acceſſionū diſcretione cogēte, quotidie cibū da-  
 ri. At ſi alternis diebus fuerit occurrēs acceſſio, alter-  
 nandum etiam nutrimentum. Oportuit enim ſiue \* de-  
 clinato ſolutionis metus occurrerit, atque quotidianis  
 diebus \* acceſſionis fuerint effecta, omnibus cibum al-  
 ternis dari. Nam non poteſt corpus diurnis acceſſioni-  
 bus grauatiō ſuis partibus applicare nutrimenta quæ  
 ſumpſerit. Sed hic grauius peccās ait adiunāre etiam  
 lauacrum, quanquā ſit adhuc paſſio in gradu conſtitu-  
 ta, tribus tamen uel quatuor diebus tranſactis ex quo  
 mentis alienatio irruiffe uidetur. Quomodo igitur cō-  
 ueniens lauacrum paſſioni probatur, cum nec dum  
 quotidianis diebus cibum dare uideatur? Quippe cum  
 adhuc paſſio ſuæ magnitudinis teneat ſummitatem, &  
 propterea mitigatiua ſit curatio magis quam turba-  
 tio ex lauacri commotione adhibenda. Mitto quod  
 æger \* ad hæc magis mouetur alienatione mentis, nec \* per  
 ullo aſſenſu noſtro paret imperio. Siquidem ſerali  
 mente omnia quoque accipit, ac recuſat. Item iubet  
 lauantes in ſolium primo deſcendere, tunc aſcenden-  
 tes è ſolio fricari plurimum, & rurſum deſcendere,  
 quod eſt laborioſum: ſufficiebat enim deſcricatoſ, tunc  
 ſolum deſcendere, cum ſe modico ſenſerint ſudore ue-  
 xatoſ. At iſte poſt lauacrum oleo roſaceo caput fo-  
 uet, quo \* grauius odore impletum ægrotantes affi- \* grauiori  
 ciat. Eſt autem incongruum \* atq; conſequenti laxata, \* neque  
 ut putat, lauacro corpora oleo roſaceo ſomentare,  
 cum ſit frigida atq; conſtrictiuæ uirtutis, & propter  
 ea corporis efficiat denſitatem. Non enim eiſ frigus  
 erit aquæ frigide comparandum, cum aqua frigida

ob extinguendum feruorem, ueluti cocti corporis adhibeatur, Rosaccum uero perseueratione quadam simili, atque eadem uexatione iugi frigore, & odore percussibili caput afficiat. Vinum etiam dandum declinationis ordinauit tempore, cū neq; omnibus hoc sit adhibendum, sed solis illis qui simplici ægritudine afficiuntur. Dehinc non in omnibus prohibuit uinum falsum, sed in his qui sunt insueti, nescius quia consueti uexantur. Si quidem sit natura noxium febricitantibus uinum. \* Consuetudo autem nihil aliud prodesse, quā ut non plurimum corpore noceantur, potest. Nos uero oportet consuetudinem rerum utilem facere, noxiarum fugere. Dat etiam uinum plurimum ad heminam, \* etenim uel tres dimidias \* iubet ante cibum, si fuerit sitis nimia consequuta, quod est, ut sentio, sine ulla ratione. In graui enim ac periculosa ægritudine, nudis & sitientibus uisceribus, ingrediens uinum facile concurrit ad neruos, atque mentis iudicium tollit, cum non habuerit præmissum cibum, in quem incurrens quadam tarditate moritur. Proficientibus igitur ægris perseuerandum inquit in utendo uino, si uero profectus cessauerit, tribus uel quatuor diebus aquam dabimus, usum uini differentes. Rursum dierum numerum & non passionis considerantes motum. Quapropter etiam si post tres dies difficultas adhuc declinationis obstiterit, non oportet ad usum uini descendere. Etenim \* sollicita & passionibus his \* in pulsibus facile ad augmenta recurrunt. Hæc nunc Themison phreniticis curandis ordinauit. Sed post ex methodica secta multa bona contulit medicina.

Ad

\* Consuetudinis res, ac effectus, & potestas.

\* interdum præbet

\* sollicitate impulsibus

Ad Heraclidem. Cap. xvii.

**E**mpiricorum sufficit soli Heraclidi Tarētino respondere. Etenim eorum posterior atq; omnium probabilior apud suos inuenitur. Idem nanque primo libro curationum de internis passionibus, varias curationum differentias scribit, pro suspicionibus causarum. Nam primum phreniticum iacere iubet loco obscuro: Siquidem, luce, inquit, eorum mens asperatur. cum plerosq; magis uideamus tenebris asperari, atque luce eos qui adiuncta solutione afficiuntur, adeo ut si paulo uehementior fuerit, diaphoreticam faciat solutionem. Item iubet uentrem clystere deduci, tunc phlebotomiam adhiberi, atque alia die rursum usum innouari clysteris, non aduertens quomodo \* tumentibus \* quasi clyster  
 præcordiis, atq; extentis, uel adductis simul cum uisceribus, periculosum est quicquam acre, uel quod commoueat immittere, quo retento tumor magis augeatur. mollis atque lenis esse non possit  
 Dehinc turbulentum, atq; uexabile, & per omnia contrarium esse perspicitur, eadem die clysterem atque phlebotomum adhibere: quippe cum neq; tempus utendi dixerit, neque qui sunt phlebotomandi discreuerit. Etenim eos qui solutione afficiuntur phlebotomia nocet, ut gladius. Extendit peccatum, dicendo, oportere quotidie adhiberi clysterē, ut neq; quiescendi aliquod tempus occurrat, & cibo nō nutriatur & uiribus priuet frequēs hæc iniectio. Tradens etiā \* loca alia ad- \* localia  
 iutoria, caput sœuet decoctionibus lauri. Tūc nouacula radit, & ex eodem liquore uaporat. Post rosacē oleo caput atq; nares iubet ungi, percutiens tumentia ante declinationem ex fomentis supradictis, implens etiam caput ex odore lauri, atq; grauedines ac uertigines efficiens. Similiter & ex oleo \* roseo constrin- \* rosaceo



gēs simul ac frigidās cerebri mēbranā. Imponit præterea cataplasma ex polline & aqua mulsa, admiscēs iris illyricæ decimam partem, & lentiseini olei, & aromatici calami, quæ omnia ignea atque percutientia odoris causa esse perspiciuntur: & oportebat tumentia congruis relaxare uirtutibus. Item iubet post hæc medicaminibus ungi caput & nares; hoc genere confectis. Peucedani, castorei, opij ut in libro quem

\* Nicolaus  
Heraclicus em  
peirici  
\* amygdalini

\* Nicolaum uocat, olei \* amygdali amari pōdus supra scriptum, sed prætriti cum aceti sextariis duobus, & olei irini unciiis tribus, quorum usus ita, inquit, erit adhibendus, ut præcalefacta apponantur, ex quibus grauatio capitis, atque commutatio nascetur, ut sta-

\* tam perniciofis

tim alienatio in pressuram transeat, cum \* tantis perniciosissimis malis egrotantis caput obsidetur. \* Em-

\* Hæc porro  
sunt quæ lau-  
dat empiricos.

piricos laudat. Mirandum sane unde hæc ei uenisse suspicio potuerit, ut discrepantium commixtio unam facere uirtutem posse putaretur: uel quæ illis natura uel fortuna fuerit magistra, quas sæpe suis inuentionibus duces fuisse testantur. Vel certe quomodo non discrepantis historię in ista medicaminis confictione iudicium tacuerunt. Sed si hoc experimentum dixerint, apertissime delirabunt, ut laborans

\* ratione do-  
ctrinæque em-  
peirica

\* empirica ad occultarum confugiat apprehensionem causarum. Item iubet nocte caput uaporari, si facultas fuerit, papaueris decoctione, atque serpylli, non adiciens usus causam, neque rationem quæ sit hoc circa \* uesperam faciendum, cum tunc maxime phreniticis asperius tempus occurrat. Vaporatio autem caput exagitat, & tunc magis in requie fuerat habendus egrotans. Sed intelligimus eum in ista fuisse rerum diuersitate coactum, cum solas uigilias egrotantis attendit.

\* somni conciliandi causa

somnum



somnum quibuscunq; ambitionibus adhibendum existi-  
mare. Quinetiam potandos dicit egrotantes antidoto  
diacodion, cum mulsi sextario, uel seminali medicami-  
ne, quod \* diaſpermatum uocant, aut tuſſiculari, quod  
\* bechicum appellant: cum magis opium, hoc eſt papa-  
ueris lachryma, denſitatem faciat. Item ſeminalis po-  
tio acrimoniæ cauſa incendium facit uiſcerum, atque  
hæc omnia grauando preſſuram magis, quàm ſomnum  
facere uidentur. Somnus enim laxatis fiet corpori-  
bus indulgentia naturali. Preſſura uerò denſatis \* ad-  
uerſitate morborum. Igitur præſcripto medicami-  
ne, negligens tumentia, contrariis ſtriſturam gemi-  
nat rebus, non ſimilibus, quomodo cum cauſa impe-  
ditionis ſomni, hoc eſt ſtriſturaq; augetur, in lethar-  
gicam paſſionem egrotantes ueniunt, uel certè ma-  
iores uigilias. Item eodem libro accuſans utentes  
medicaminibus ex caſtoreo atque aceto & ſpondy-  
lio conſectis & cataplaſmatibus ex aceto \* ſiquidem  
ſint acria, ipſe quoque nihil minus peccare uidetur,  
adhibens grauabiliora atque acriora. Etenim dice-  
re \* quomodo non ad ſoluendam paſſionem, ſed ſer-  
uandi ægroti cauſa hæc adhibuit, eſt omnino inertie.  
Nam primò quibus paſſio leuigatur, his etiam æger  
ſeruatur. Secundò quibus laborans retinetur in uita,  
iſdem etiam paſſio releuatur. Tertiò, cum non paruo  
periculo ex uigiſiis afficiantur, maius tamen ex preſ-  
ſura Heraclides facere perſpicitur, \* nam ſomnum ſe-  
ciſſet grauabilibus utens medicaminibus, \* cum ſit ſem-  
per, ut in utilibus maius, ſic in aduerſis leuius eligendū.  
Sed inquit, ut uinum mediocriter datum nutritibile ac  
ſalutare probatur, plurimū uerò atq; immodicè datum  
capitis grauedinē, atq; mentis errorē facit, ſic etiā me-  
dicamen

\* διαſπέρμα-  
τον  
\* τὸ βυχικόν

\* ut carī, co-  
matis, lethargi

\* quia ſunt

\* quod

\* etiamſi  
\* γράμν

dicamen supradictum moderatione accedente somnos faciles facit remota grauedine. Est autem exemplum dissimile: horum etenim medicaminum etiā si paruum quidquā fuerit datum, grauedinem facit: si plurimum,

\* quod mortem. Nam \* quia grauatio magis quam somnus efficitur, facile perspicere poterimus. Etenim de somno coloris melioris efficitur corpus, fortitudine quoque acquisita. Ex medicamine uero, pressura, pallor, atq;

\* omnino hinc \* omnis somnus in corpore spirabili, atque indulgentia laxato nascitur. Medicamina uero quæ ob uigiliarum mitigationem dantur, magis accessionis tempore offerenda dicuntur. Tum \* enim uehementer egri

\* vexatione: uigilare noscuntur, cum sit impossibile \* turbore corpus impletum, somni tunc indulgentia temperari: \* cū  
inquietudine  
\* Itaque  
\* somni aduentum

\* narcotica \* augeat accessionem. Neque enim licet etiam cibos  
\* augent  
\* conuenientem  
\* in accessione  
methodici bibendam dabant,  
ut supra pag. 26. & 27.

\* a fursure purgata  
\* ante alios rescientes cibos, analepticos principio.  
\* At hac  
\* tolerante recreato

corrumunt, incendunt etiam altiora, & præsentem  
consumptos, atque qualitatem \* conueniens accessionis tempore offerre, uel quod multo leuius est, \* aquam quæ corrumpi posse negatur, ut cuiquam minime credendum sit supradicta medicamina, isto præsertim tempore, digestionis officio superari. Ait præterea succubente passione dandū uiscellū simplex gallinaceum, uel succū ptisanæ, ordei, uel orixæ, ac deinde per profectū ad usum panis accedere, \* leui ex farina confecti, & gobionū pisciū pulmentū: secūdo carnis gallinacæ ac leporis, quæ nō recte quisquā etiam declinationis tempore ob reficiendum corpus \* prima dari permittat: \* quæ quidem declinatio forsitan nec futura sit, his malignis egrotante atque tantis affecto, & nulla mitigatione, \* tolerato, neque oris collutione, neque potu

neq;

neque cibo. Mitto etiam \* quia si \* dimissio fuerit fa-  
 sta, non necessario tempus accipit præfinitum. Etenim  
 nunc decima, nunc duodecima die uel ultra sæpius oc-  
 currit. Quapropter tot diebus innutritum ægrotan-  
 tem relinquere, non solum noxium, uerum etiam im-  
 possibile esse perspicitur. Dehinc gallinarum uiscel-  
 lum, facile corrumpitur: & est digestionem difficilis hor-  
 dei atq; ptisanæ succus: oriza uerò quòd stringat nulli  
 dubium est, atque ita panis quantitatem augere nos  
 quoque admittimus, pisces autem gobiones dare pro-  
 hibemus: etenim locum in passionibus celerrimis uel  
 acutis \* acrior cibatio, quam \* polyphagiam uocant, \* amplior  
 non habet. Item dari iubet leporem, atque uarios ci-  
 bos, & neque lauādam faciem, neque aliam congruam  
 corporis diligentiam ordinandam uidit, sine qua mini-  
 mè \* digestio fieri potest, non solum uariæ cibrationis, \* Hic locus o-  
 uerum etiam simplicis, nisi corpori perunctionibus, atq; stedit, fons ex  
 oleo hydreleo,  
 alia diligentia \* recreato fuerit illata. Hæc est secun-  
 dum Heraclidem curationis, prima phreneticorū dif-  
 ferentia. Illis uerò qui cruditate phrenetici fuerint  
 effecti, ita curationem ordinauit, ut supradicta simili-  
 ter adhibeantur. Cataplasma uerò non prius quam  
 clyster antecesserit, adhiberi iubet. Etenim pernicio-  
 sum est, inquit, pleno corpori hæc adhibere. Siquidem  
 ad caput rapta materia in salutis periculum præcipi-  
 tet ægrotantem: atque ita prohibendam dicit phlebo-  
 tomiam, adhibendam uerò corporis purgationem, poto  
 medicanum quod appellat \* diascammonias, hoc est,  
 quod ex diagredio cōficitur, quibus apparet hunc sue  
 sectæ peccata custodire, ut ea quæ empirici \* seruabi-  
 lia uocauerunt, etiam nunc adhibenda existimet, adii-  
 ciens etiam peiora, prohibendo phlebotomiam, quæ  
 simplici

\* quod  
 \* id est, morbi  
 remissio, & de  
 clinatio.

\* amplior  
 \* πολυφαγία

\* Hic locus o-  
 stedit, fons ex  
 oleo hydreleo,  
 & aliis id ge-  
 nus, à metho-  
 dicis imperari  
 solitos, ut su-  
 præ pag. 24. le-  
 gimus, adiu-  
 uandæ conco-  
 ctionis causa  
 inuētos & ex-  
 cogitatos fuis-  
 se.

\* recreatio  
 \* Αἰδὶ σκαμμο-  
 νίας catharti-  
 cum.

\* id est, obser-  
 uatione cogni-  
 ta

simplici atque innoxio laxamento, nullis obstantibus adhibita, facile laxato corpore passionem posset auferre, cuius in uicem nocentissimam adhibendam purgationem iudicauit scammoniae, quae est grauior cruditate, quam ipse metuens in contraria uenit argumenta curationis. Etenim ex hac corporis purgatione, siue liquidarum detractione materiaram, corpus

\* confluere manifestum est, atque eius solida, quadam

\* dimissione lentescere, & in liquida migrando deperire. Mitto quod neque suae sectae seruauerit morem, quae nunquam uasculorum corporis materias attende-

\* rit, si quidem \* sint non solum occultae, uerum etiam empiricorum iudicio falsissimae. Etenim existimare, quod \* discendae passionis causa succorum nominauerit cruditatem, potuimus, nisi etiam curationis ordinem ipsum intuens discessisset, adeo ut etiam scammoniam bibendam credidisset. Querendum etiam ubi esse cruditatem suspicetur, quam scammonia putaret detrahendam. In intestinis? sed sic fuerat melius atque facilius eam clystere purgare. An in capite, an uero in toto corpore? Sed cum haec incerta demiserit, uidetur iudicium sui operis medicamini dimisisse, ut tanquam sentiens animal operetur, separando à naturalibus aliena, hoc est cruditate corrupta, atque sola

\* detrahatur \* detrahere. Tertiam inde curationis scribit differentiam, qua iubet, si totum corpus non fuerit multo sanguine grauatum, sed solae capitis partes uideantur impletæ, ex uena frontis detractionem fieri: cum neque passionis esse causam sanguinem uideamus, neque ex patientibus locis detractio aliquid medeatur: etenim magis patientes adimplet partes, primò ex antecedenti \* fasciolarum constrictione, secundò ipsius coactae materiae

\* diffluere  
 \* liquatione,  
 aliq. remissione

\* sunt

\* dignoscende

\* detrahatur

\* quia liquidum  
 caput est, ut  
 tamidiore uena  
 ne priusquam  
 seriantur, appareant.

materiae concursu. Illos uerò quos \* corruptione, in-  
quit, in passionem uenisse uiderimus, clystere pur-  
gandos, aquam dantes largius bibendam. Aliquan-  
do etiam mulsum, aut uinum chium, aut rhodium, sed  
primò aquatum, secundo etiam meracum. Hic etiam  
rursus suæ sectæ rigorem contempsit, suspicionibus  
in errorem deductus, liquidarum materiarum cor-  
rupta temperare festinans, & ita iugiter, ut incu-  
rabilem faciat manere passionem. Dat etiam sine tem-  
pore uinum. Et quid pluribus? ita curandi diligen-  
tiam \* permisit, ut uaria mobilitate uideatur esse con-  
fusus, quorum omnium meminisse decet, \* sed solam  
supradictorum probare rationem. Hæc sunt quæ  
de phrenetica passione credidimus ordi-  
nanda, nunc de cæteris celeribus, uel  
acutis cum febricula passio-  
nis, sequenti docebi-  
mus libro.

\* succorū cor-  
ruptela

\* omisit

\* i. quamuis  
ea sola proban-  
da sint, quæ su-  
pradicta ratio-  
nibus uera nos  
esse monstraui-  
mus utilia, le-  
gitima, & cō-  
sentanea.

PRIMI LIBRI FINIS.



## CAELII AVRELIANI

METHODICI SICCEN-

SIS OXEON, LIBER

Secundus.

De Lethargo.

Cap. I.



Elerum cum febricula passionum pri-  
mā superiore libro tradidimus phre-  
nitim, nunc lethargicam cum ceteris,  
ordinamus. Vocatur lethargus à con-  
sequentis passionis obliuione. Græci

enim lethen obliuionem uocauerunt, argiam uacatio-  
nem, quam corpori atque animæ ingerit uis supradi-  
ctæ passionis. Et est cōparatione grauior phrenetide,  
non aliter quā negatus in toto uisus, ab ex parte im-  
pedito: uel silentium, ab impedita loquutione: aut sur-  
ditas ab auditus falsitate: uel hebetudo sensuum, à diffi-  
cultate. Denique uehementi strictura phrenetici sæ-  
pius in lethargiam uenerunt, ut declinante lithar-  
gia, aliquando e contrario lethargi in phrenetide de-  
ciderunt. Quorum haud rarius ex supradictis \* prima  
contingūt. Siquidem facile periclitantes passionis ma-  
gnitudine in peiorem \* deueniant: difficile autem in  
periculis bona locum \* accipiant. Quapropter Ascle-  
piadi credendū non est, dicenti pulsum, atq; respiratio-  
nem humaniorem lethargis quā phreneticis esse: si-  
quidem habet magnitudinem & percussum fortio-  
rem, tanquam iugi somno dormientium. Sed neque iste som-  
nus est, impeditis omnibus naturalis actionis officiis,

\* reficit sed est oppressio quæ nihil \* resumat ægrotantem, ac  
potius

\* ut ex phre-  
netide fiat le-  
thargus.

\* deueniunt

\* accipiunt

potius demergit. Neque etiam pulsus fortis, sed magis debili percussu inuenitur, atq; piger, ac inanis. Quòd autem inflatione erectus uidetur, non fortitudinis causa, sed passionis nequitia id efficitur. Denique in his quibus ob phreniticā passionem paruus est pulsus, sæpe peiorante morbo, atque in lethargiam transcente, pulsus in magnitudinem erigitur, ob specialem proprietatem passionis, non proficientium uirium causa: quippe cum generaliter strictura peiorante omnia deterius roborentur. Sed hanc plerique definientes passionem, aiunt lethargiam esse delirationem, cum febribus acutis ad perniciem ducentibus, & uerius non delirationem, sed pressuram dicere. Deme- trius erat autem Herophilus passionem inquit acu- tam cum pressura, \* & obtrusione sensuum frequen- ter cum febribus. in qua definitione ambiguum est, quò sit accipiendum frequenter: utrum ne antece- denti seruiat orationi, ut intelligamus frequenter cum difficultate sensuum: an consequenti sit oratio- ni iungendū, ut intelligamus frequenter cum febribus: an uerò utriq; seruiat parti. Quo inuenimus nihil re- ctè esse definitum: semper enim cum difficultate sen- suum atq; febribus hæc intelligitur passio. Asclepiades hanc passionem non definiuit, sed Alexander Laodi- censis ex Asia secundum ipsum ait \* lethargum esse \* sequētia indi- subitam, uel recentem passionem cū febribus, & pres- cant legendū sura, atque sensuum iugi difficultate. Sed quoniam lethargum esse esse uidemus plerunque etiam cum dimissionibus le- alienationem thargiam & pressuram, id ipsum esse perspicimus, subito accres- quod est sensuum \* difficultas, quanquā hanc grauior- centem. rem putauerint pressuram. Nec sanè debuit in defini- \* sensuum dif- tione magnitudinis differentias ponere, sed passionis ficultate

\* quæ sequitur  
legendum mō-  
strant, & ob-  
structione sen-  
suum frequen-  
ter cum feбри-  
bus, &c.

\* sequētia indi-  
cant legendū  
lethargum esse  
alienationem  
subito accres-  
centem.

\* sensuum dif-

genus:quemadmodum intelligatur manifestare. Nonne etiam complexionem magis phreniticæ passionis cum lethargia dedisse uidetur? Denique alienatio subito accrescens, cum febribus acutis, phreniticæ est passionis. Pressura uero cū febribus, lethargiæ. Athenæus Tharsensis furorem, inquit mentis cum mœstitudine. Si quidem Asclepiades in primo libro celerum passionum dixerit phreniticis alienationem cum turbore effici, in lethargis cum somno atque tristitia. Alij alienationem cum mœstitudine, & iugi somno esse lethargiã dixerunt. Etenim non habent mentem in furorem extentam, ut Athenæus ait, sed sola in alienatione constitutam, ut Asclepiades. Sed etiam nunc traditiones has caducas simul aduertendas existimo, ex his quæ supra

\* sed pressura  
siue nãgus  
è somno  
tempus

memorauimus: non enim somnus in lethargis esse\* aduertitur. Nam nullum periculum<sup>a</sup> sequeretur. Neque etiam accessionis\* tẽpore magis ægros afficeret. Item neq; iugis in omnibus est pressura, sed etiam plerunq; dimissionis intercapedine leuigatur. At si cum febribus esse non adiungerent, ut Asclepiades fecit, communis esset cum epilepsia diffinitio. Leonides autem episyntheticus, lethargus inquit, est \* lethargia secundum uias membranarum, cum furore mentis, atque febre, & mœstitudine, ac pressura, & pulsu magno.

\* obtrusio

\* quia est in  
eo quod dixit  
secundum vias  
membranarum

Sed neque causam oportuit dicere \* quæ sit occulta, atq; apud ueteres discrepans, & iniudicata, cum passionem manifestare fuerit magis necessarium. Neq; etiam mœstitudinem, uel tristitiam, atque mentis furorem. Etenim pressura in semet mœstitudinem atq; furorem continet. Item Menemachus pressuram inquit, celerrimam, uel acutam cum acutis febribus, & non semper iugibus. Soranus uero cuius hæc sunt quæ

latini



latinizanda suscepimus, pressuram inquit, celerem esse, uel acutam cum acutis febribus, & pulsu magno, ac tardo, atque inani, frequentare inquit, in senibus. Siquidem aptior sit sensuum difficultati atque demersioni ipsa quoque senectus.

Quæ sequuntur eos, qui in lethargiam venire posse noscuntur. Cap. II.

Sequuntur eos qui in lethargiam faciles, ac pronesse uidentur, aliqua communia ex his quæ etiam phrenitim fore denuntiant: Aliqua propria, quæ etiã in causa communi tanquam propria accipimus, ut sunt ea quæ in phreniticam uenturos passionem designare præscripsimus, ut febres acutæ, ac uehementes, & sæpe continuæ, ac difficile ad superficiem corporis ascendentes, capitis grauedo, uel somnus aut dolor uehemens, repente ac sine ratione recedens, tinnitus aurium, uultus inflatio, pallor tanquam ex uinolentia, & mœstitudo, uel tristitia. Erit præterea tacitus is, qui natura, atque sanitatis tempore fuerat multiloquus, \* tunc piger, ac non sponte initians loquelam, \* *tum* sed alienam prosequens, suarum tacitus querelarum, aut non digna \* ratione referens: multo etiam ueluti \* *ἀλογία* somno affectus, nec quicquam somnians, aut eorū quæ somniauerit memor: schema iacendi frequenter supinum, contra solitā consuetudinem: oscitatio iugis, extensio crurū, tanquā mox è somno expergiscētis, pulsus etiã inæqualis, post aliquot saltus ordinatus, aut inordinatus & pro ætate, aut natura, maior, aut tardior: aliquādo etiam in inanitatem intercapedinetur: quod deniq; si in phrenitica passione contigerit, in lethargiam transituros ægotantes significat. Etenim maiorem pulsum fieri, neq; tardum, neq; inanem, sed

etati ægrotantis conuenientem, speciem declinantis phreniticæ passionis accipimus. Certius etiam, quoties circa numerum æquales minoribus maiores sal-  
 \* ac uelocibus tardo: dēsis rari: uehementibus languidi.  
 \* obnoxij lethargo saluosi  
 tus efficiuntur, \* ac uelocibus & densis & uehementibus: multo potius, si etiam plures maiores atq; celeres fuerint. Quidam attenderunt etiam naturā ægrotantis si \* saluosus semper fuit. Etenim declines atq; faciles istius modi naturæ in pressuram probantur. Attendendam etiam consuetudinem aiunt, utrum ne febricitans, in pressuram uenire ac demergi solebat: etatem quoque, utrum ne sit mediæ: & acris habitum, utrum multis hanc ingesserit passionem: & anni uel temporum partem, utrum autumnī mediæ. Tunc enim frequentare istam passionem putauerunt.

Quomodo discernimus lethargos ab his qui similibus afficiuntur. Cap. III.

**I**Am lethargum suis signis intelligere debemus. Est enim melius atque certius, sicut in phreniticis dicamus si dicas, quæ sunt signa lethargi. Vñ enim quicquam singulare, ut est pressura, uel febricula, non significat lethargum, sed plurima atque sibi conuenientia, & concursus multorum, signum faciunt indicabile lethargi, ut lethargus certis ac propriis signis sit indicatus, quemadmodum supra diximus. Intelligimus lethargum ex obstrusione, atque hebetudine sensuum, pressura etiam, atq; febre acuta siue iugi, siue \* demissionibus intercapedinata, pulsū magno, tardo, inani, & inflato. Sine his enim neque esse intelligi lethargus potest. Nam quædam præterea alia \* sequuntur multa, uel pauca secundum passionis magnitudinem, uel generalis temporis atque specialis differentiam.

Primo

Primo igitur sequitur dubia atque somni similis pres-  
 sura & demersio, sed quam facile eger uocatus excu-  
 tiat, ut interrogatus, sane nō statim, sed \* secundū, re \* paulo post.  
 spondeat, ac tunc iussus, uel oscitatione persuasus, in-  
 spectioni linguam exerere, aut non id faciat, aut tardē  
 fieri consentiat: uel cum protulerit, non reducat, aut  
 tarde colligat: si quid etiam manu tenuerit, nescius  
 atque sine uoluntate dimittat, & loquens, priorum  
 obliuiscatur, & neque enuntiationis ordinem ser-  
 uet, sed potius intercipiat, exprimere etiam quæ lo-  
 quitur non ualeat, nullo corporis attestante defectu,  
 manus impatienter extendat, \* attestante tremore, \* adstante  
 atque membrorum saltu, nulla etiam siti afficiatur, \* salina copia  
 sed frequēti, ac refluā salina \* ore impleto spuerē con-  
 tendat, & tūc supra mentum atq; stramenta sputa re-  
 maneant: ac si urinam mittere fuerit admonitus, ma-  
 tellam non postulet, uel si petiuerit, nesciat datam,  
 atque urinam non dimittat, nisi fuerit admonitus:  
 hanc quoque difficulter excludat, uel paulatim, &  
 turbulentam autem plurimam: \* saliuam aut exu- \* saliuosam:  
 stam, & crassiorem, aliquando etiam indigestam. aut spumofam.  
 Crescente passione, iacendi schema supinum iuge ef-  
 ficitur: color plumbeus, uel liuidus: uultus ipse con-  
 ductus, atque concurrentibus superciliis caperatus,  
 non aliter quam mortitudine siue luctu uidemus op-  
 pressos: lapsus etiam à superioribus lecti partibus,  
 ad inferiora, negligenter abiectis cruribus, atq; con-  
 uersis, residuo quoque corpore non recte disposito,  
 pulsus maior, rarus inflatus, respiratio tardior,  
 ac maior, cum quodam gemitu, conductio præcordio-  
 rum ad superiora: oppressio sensuum, & difficilis re-  
 cordatio, adeo, ut nisi puncti uel \* inclinati fuerint, \* incitati

non excitentur, sed solum motis labiis leuiter, atque

\* Sunt conductis, rursus demergantur. \* Sint etiam obscure uocis, ac deinde si fuerint manu laceßiti, aut punctio-  
ne aliqua adhortati, uel titillati, non exaudiunt: uel si  
quis eorum manus leuauerit, ac dimiserit, statim con-  
cidunt, uentris etiam atq; urinæ officio cessante, adeo  
ut plerique ex passione liberati, discussa pressura,  
urinæ reddendæ impossibilitate moriantur. At si pas-  
sio in peius duxerit egrotantem, respiratio crassescit,  
ita ut extincta uideatur, palpebrarum quoq; non per-  
fecta sit conclusio, oculorum cavitæ: linguæ ariditas,  
atq; asperitas: dentium confixio, atq; stridor, adeo, ut  
si quisquam uelit facere<sup>a</sup> eorum discretionem, non ua-  
leat, uel certe \* semiclauso ore ac dimisso, ita ut men-  
tum propendens uideatur, & neque manu conduci se-  
parata possint, stridore pectoris \* attestante: immissi,  
uel destillati ob nutrimentum liquoris difficilis atque  
interrupta transuoratio: pallor, & saltus inferioris  
labij: articulorum stupor: unguium linor: guttur pro-  
minens, atque extas: pulsus humilis, ac per \* profectū  
\* diminutus: sudores frigidi, & glutinosi, uultum se-  
cus & collum: plerunque etiam inuoluntaria urinæ,  
uel stercorū emissio, & spasmus, hoc est, membrorum  
conductio. At si ad salutaria signa æger coeperit re-  
currere, ut passio minui uideatur, omnia supra dicta  
leuiora efficiuntur. Et quidam profectio in sanitatē ue-  
niunt, reddita scilicet ualetudine meliore. Aliqui uero  
alienatione mentis recedēte, pressura tentantur. Tunc  
etiam pulsus humilior, atq; densior fit, aut admoniti  
rursus demergūtur, ut cōplexæ duæ passionēs uideā-  
tur. Aliqui deniq; è lethargo liberati absolutā phre-  
\* perueniunt. nitim incurrūt, ac deinde ad sanitatem \* perueniunt.

Quomo

¶ a dentium  
\* semiclausum  
os ac demis-  
sum  
\* accedente

\* processum  
\* moueri  
pulsus innuit

Quomodo curandi sunt lethargi.

Caput IIII.

**Q**uoniam & defectio animi in febribus ueluti sensuum facit hebetudinem, & mandragoram, uel altercum bibentes opprimuntur grauatione\* sor- \* aut hac vox bili sopori simili, item alij lumbricorum\* adiectione supernacuas, deprimuntur, discernenda cuncta sunt, ne falsa simili- aut legendum bus inducti uera putemus. Defectionibus igitur animi \* vexatione densus atq; paruus, & coaceruatim interiens pulsus paulo demer- efficitur. Mandragoram uero, uel altercum bibenti- guntur: ut pan bus pulsus rarus, sed plenior fit, \* à lethargis inanis et lo post. inflatus. Item his qui lumbricorum uexatione afficiun- \* vt tur, uel demerguntur, densus & uelox, & paruus, & deficiens pulsus inuenitur. Et magis tempore\* dimis- \* remissionis sionis febris. Nam accessionis augmento, quantum cre- ditur, non ualent uentrem uel stomachum lactare, atque\* fellare. In dimissione uero, \* resumpta inhæ- \* sugere ver- rescunt uisceribus, atque ita consensum præssuræ\* ex mes antecedentibus faciunt. Sed hæc diligentius \* chro- \* resumptis ri- nias passionibus scribentes, cum de lumbricis dicemus, ribus in hæ- docebimus. scunt

\* agrotantibus  
\* chronicas

Ad Dioclem.

Cap. v.

**Q**uidam Asclepiadis sectatores etiam differen- tias lethargorum tradunt. Alium enim per se dixerunt, alium ex antecedenti passione, ut phreniti: atque ex ipsa uenientem esse grauiorem. Item alium esse nouum atque recentem, alium inueteratum atque tardantem, quod ex numero dierum coniici dixerunt: & alium fieri cruditate ac plenitudine affecto corpo re: alium inani atq; passione macerato. Sed nullam le- thargi uelut ad lethargum, differentiam tradiderunt \* existimabile non certum probatum est liquidorum

\* Existimabi-  
le quidem, non  
certum aut pro  
batum est, li-  
quidorum ple-  
nitudinem le-  
thargum indi-  
care. An nascas.

plenitudinem iudicare. Item Mnaseas lethargū alium stricūra effici, aliū solutione dicit. Siquidem somnus nunc densitate, nunc laxamento corporum fit: atq; in aliis abstentis uidemus officiorum naturalium egestion-  
 nes, in aliis uero largius effluentes, adeo ut etiam in-

\* stercora uoluntario exitu \*stercorum, siue urinae fundantur.

Item multi nostrorum, temporibus atque magnitudine constare lethargi differentias tradiderūt: alium enim magnum, alium paruum esse dixerunt, & alium initio, alium in augmento, alium in statu, alium in declinatione, & accessione uel dimissione: sed omnes illius

\* summas \*summæ atque \*generalis passionis\* differentias tradiderunt, & non specialem lethargi. Falsum etiam solutione lethargum fieri, quantum intelligitur, id quod lethargus. Etenim inuoluntariam egestionem dixerunt, in infātib; non solutionis ratione, sed mentis occupatione fieri. Nihil denique plusquam naturæ cō-

\* reddūt pueri \*eorum uenit, \*excludunt, sed solum quod debuit\* etiam uoluntate deponi. Tenuēs etiam sudores pressura fieri, non solutione intelliguntur, sed neque adiutoriis laxatiuis, sicut in adiutoriorum libris demonstrabimus.

\* ab iis tradi- t. 16 Quapropter lethargi proprias differentias\* tradendas esse negamus.

Quis locus in lethargicis patitur, & quo modo curandi sint lethargici. Cap. v i.

**M**Alē quidam etiam patientem in lethargo partem, caput dixerunt. Vt enim de phreniticis dictum est, communiter totum corpus patitur, febricula testante: specialiter uero caput plus, ob multitudinem uexationū, quibus afficitur. Difficile igitur intra primam diatriton lethargus\* fieri potest, sed frequenter post \*ipsam: & oportet iacere in loco lucido, atq; calido

\* curari

\* agrum

lido mediocriter; in acceſſione per interualla leuiter excitari, ſuo nomine exclamatum. Etenim iugiter titillatu, uel impreſſione, ac punſtionibus hoc facere, nihil aliud quam ſtriſturam erit aſperare, ob inquietudinem\* quaffationis. Dehinc\* probabilior atq; magis \* vexationis eligenda erit quaffabili, & noxia uigilantia, quieta \* optabilior preſſura: blando etiam articulorum fricamento utendum eſt. Eſt autē in acceſſione iugi fomento caput curandum, oleo dulci, atq; calido: mollibus lanis collū tegendum, blandioris laxamenti cauſa locorum capiti uicinantium, & ob excipiendum, ex fomento ſiquid ē capite fuerit lapſum. Tunc aliquando etiam\* elato ad \* de lecto lectum translatione facta, & declināte acceſſione, oris collutio adhibenda: terminata uero, potus dandus. At ſi febrīū continuatio fuerit, primo tempore lucis erūt media fouēda, atq; dorſum lanis mollibus circumtegēdū: ſi magnitudo paſſionis exegerit, phlebotomia adhibenda intra primā diatriton, aut in ipſa. Dehinc ſi ante diatriton fuerit adhibita, ſola fomentatione utemur, atq; oris collutione, & potu aqua uel mulſo. At ſi in ipſa diatrito phlebotomia fuerit adhibita, paululum differentes, perunſtionē adhibemus, atq; oris collutionem. Tunc dabimus ſorbilem cibū ob celerē paſſionem. Si\* ſaſtidioſus fuerit egrotans, tanquam ſanis \* ſi cibum ſaſtidiat ſepe contingit poſt altum ſomnum, experrectis, uel ſi tranſuorationis oblitus, aut piger, tanquam ſunt ſani imminente ſomno decliues in ſoporem, erit acceleranda alicuius cibi tranſuoratio, ut corpus relaxetur. Nam grauiore ſtriſtura lethargi phreniticis afficiuntur. Dehinc poſt cibum paululum differentes, atq; articulorum blanda fricatione utentes, dormire permittimus: atq; uſq; ad declinationis tempus, alternis diebus

à cibo abstinemus, permittentibus uiribus, solo mulso utentes. Si autem uires obstiterint, etiam his diebus sorbilia mediocriter damus. At si uenter non fuerit solutus, clystere utemur, oleo calido & aqua in qua decoctum sit fenugræci semen, admixto aliquādo melle. Tunc sicut in phreniticis tondendum caput atq; radendum, & apposita cucurbita scarificandum, & sanguisugis relcuandum. At si \* media tumeant, simili curatione cucurbitæ, atq; cataplasmatum utemur, tanquam in phreniticis ordinauimus. Attendenda etiam cætera passionum accidentia, quæ symptomata græci uocauerunt, ut ea quæ in corpore frigida fuerint mēbra, blando tactu manibus continentes, leui cum fricatione uaporemus: sudantia citius detergamus: lingue asperitatem uel ariditatem spongia infusa aqua calida humectemus. Nam sæpe faucium \* siccitate præfocationis \* imitatur effectum. Tunc oculos leuis obstitos, uel lachrymantes spongia uaporabimus, atq; ita \* demersos, id est sopitos \* demersos excitamus. Calidus etenim tactus habet quoddam resurrectionis illatæ leuamen. At si pressura perseuerauerit etiam dimissionis tempore, & propterea cibi dandi difficultas occurrerit, oportet ægrotantem in pressura excitari, donec sentiat: tunc priusquā rursus demergatur, destillandum ex cochleari sorbibile quiddam faucibus, atq; manu mētum quod laxius, propendet, subleuādum, ut infusa, priusquā in somnū reuocentur, transuorent. At si forte \* mutatio accessionum atq; pressuræ fuerit facta, quod quidem raro contingit, ut in cōtinuationibus, cibi tempus oriente luce est aptius. Utendum etiam spongiarum uaporationibus, & fomentis capitis, atque domestica molli, ac pensili gestatione. In declinatione uero certissima, uariis ci-

bus



bus dandus, & lauacrum, sine \*uino adhibendum sci-  
 licet: in alia uero diatrito danda poma: tunc etiam ui-  
 num, quorum rationem ex his quæ in phreniticorum  
 curatione sunt ordinata, accipienda dicimus. Tunc  
 cerotarium scarificatis partibus apponemus. Hæc est  
 secundum Methodicos lethargorum curatio. Anti-  
 quorum uero Hippocrates, & Erasistratus, & He-  
 rophilus huius passionis curationem non posuerunt:  
 sed Serapion Empiricus in primo libro, quæ ad sectas  
 scribit obscura nimium, atque pauca ordinauit, quo-  
 rum nihil est dignum enarrare.

Ad Dioclem.

Cap. VII.

**D**iocles libro quo de passionibus atque causis ea-  
 rum, & curationibus scripsit, prohibet demer-  
 gi lethargos, acutissimis utens potionibus, atque iu-  
 giter corpus defricat, adhibens etiam sternutamenta,  
 quæ græci ptarmica uocauerunt: & neque manife-  
 stans, quas uocat acutas potiones, utrum in qualitate  
 acutas, ut est acetum, an officio usus, ut est celerrima  
 transuoratio: sed\* utrum elegerit, malè dictum est.  
 \* Alterū enim densat corpus strictura laborās, \* alte-  
 rū inflat. Itē sternutamēta corpus uehementi motu con-  
 cutiunt: & magis membranas capitis in tumore cōsti-  
 tutas iugiter excitare, sine dubio asperatio passionis  
 est. Peccatur etiā grauius sine ullo adiutorio caput re-  
 linquendo, in quo secundum ipsum passionis est causa.

Ad Praxagoram.

Cap. VIII.

**P**raxagoras secundo libro de curationibus, in  
 sorbilibus cibus, hoc est ptisanæ succis, semper,  
 inquit, ægros, oporteret seruari. Cum non semper  
 hoc conueniat, quando declinationis tempore, opor-  
 tet uaria ciborū resumptione uires reparari, nō tunc  
 uti

\* utrumlibet  
 \* quod acu-  
 tum est  
 \* celerrima  
 transuoratio

uti succo ptisanæ, sed ipsa potius. Ille enim & cor-  
 rumpi facilius, & inflare perspicitur. Deinde clyste-  
 rem iubet adhiberi: & non, inquit, metuendum si re-  
 manserit, non redditus. Erat hoc ueræ rationis, nisi  
 esset uirtutis acrioris. Sed quia est acerrimæ, atque  
 mordicantis qualitatis iuxta ueterum consuetudinem,  
 quomodo sperandum est non grauius nocere quanto  
 \* *immeraturus* plus fuerit tumentibus partibus \* *immeratum*: Dat  
 etiam meracum bibere, acetum cum melle, & piperis  
 modica quantitate, uel pro uino, absinthium, dicens  
 latere ignaros uini dationem: & fomentum adhibet  
 pedum. Sed ex his omnibus nihil sperandum est utile,  
 sed magis incendia uiscerum altiorum, & ueluti pu-  
 tredines tumentium membranarū ob nimietatem fer-  
 uoris. Non enim cum acriora collyria tumentes ocu-  
 los in dolores atque lachrymas plurimas cogere ui-  
 deamus, membranas quoque cerebri delicatas atque  
 faciles ad iniuriam ob naturam sui tumentes passionis  
 \* *crede* causa minimè ex supradictis inuri \* *credere* potest,  
 cum singula igneæ uirtutis esse monstrentur. Item me-  
 racum, inquit, hoc est ultra moderationem tempera-  
 \* *dat* menti commixtum acetum cum melle \* *dari*, & \* *ap-*  
 \* *appellat* pellauit oxymeli. Nec tamen manifestauit quid sit ul-  
 \* *miscere* tra modum temperamenti \* *mittendum*, utrum ne mel  
 debeat superare, an acetum: non enim adiecit aquam  
 quoque miscendam. Dehinc quam similitudinem po-  
 test absinthium habere cum uino, ut in eius uicem dan-  
 dum iusserit, cum sit & hoc generaliter acre, atque  
 densibile? Vinum uerò omnibus ante declinationem  
 ægritudinis aduersum est, & magis lethargis. ob ni-  
 \* *in soporem* nuam uehementiam passionis: immoderate uerò, ut  
 \* *compellit.* ipse uoluit meracum, etiam sanos \* *demergit*. Riden-  
 dum

dum præterea quòd caput patiens incuratum relin-  
quendum putat, & fomētum pedibus adhibendum per  
uenas eorum auertendæ materiæ traductus, ut fiat.

Ad Asclepiadem & Themisonem, & Hera-  
clidem Tarentinum. Cap. ix.

**A**sclepiades primo libro de acutis passionibus  
scribens, multa, inquit, adhibenda lethargis, quæ  
phreneticis sunt ordinata. Nititur etiam iugiter de-  
mersos excitare sternutamentis, & odoramentis ca-  
storei, rutæ & aceti, & spondylis, & conyris, & a-  
gno, herbis, baccis etiam lauri, uel communiter, inquit,  
\* omne quod tenuare atq; mouere uehementer mem<sup>\* omnibus</sup>  
branas ualent cerebri. Iubet etiam ea adhiberi quæ<sup>quæ</sup>  
epilepticis, uel matrice præsecatis adhibuit odoranda,  
hoc est lanam, uel capillos, aut cerui cornu, uel galba-  
num carbonibus imposita: & omnia quæ caput grauare  
ualent, uel iniucunda sunt odoranti. Omnium inquit  
præstantius, atque operantius esse sinapi tritum cum  
aceto admixto, atque hinc caput cataplasmandum, &  
dandum manibus, quod excitet ægrotantem. Potum  
dat bis in die, uel ter, & ueniente nocte offert tan-  
quam phreneticis uinum, uel eo audacius. Etenim, in-  
quit, accedere ex uino furor in phreneticis potest, in  
lethargis uerò nunquam. Siquidem \* sint omnes sensus<sup>\* sunt</sup>  
apprehensi, atque mentis uigor oppressus: ex quibus  
apparet peius cum<sup>\* à</sup> phreneticis lethargum cæca cu-<sup>\* quam phre-</sup>  
ratione uexare. Etenim noxium atque perniciosum<sup>neticos</sup>  
est iugiter eos excitare, sicut supra diximus. Multò  
autem grauius non communibus remediis hoc facere,  
sed, ut ille putat, sternutamentis immoderatè mouenti-  
bus, atque diffecantibus corpus, & magis cerebri mem-  
branam in tumore constitutam. Si enim pedes quan-  
quam

quam sint hebetudine fortes, in tumore constituti paruo deambulationis motu facile uexantur, atq; ob hanc iniuriam in augmenta tumoris ueniunt, quomodo non membranae cerebri in tumore constitutae, atq; uiarum

\* uexari densitate constrictae, magis posse \* moueri creduntur?

\* vsus Ptarmici

Dehinc perseuerare magis in sternutamenti usu iubet, ut scilicet ita forte conuenire \* uideatur, tanquam in chronicis passionibus, commoderatione interea cessante, noxius atq; uexabilis esse probetur. Extendit etiam peccatu odoramentis ex castoreo, atq; aceto, & ruta, & spondylis atq; agno herbis, & lauri baccis, & conyza. Etenim acetu acre manifeste probatur & quod ualeat membranam inurendo uexare, cum laxamento, non constrictione indigeat: alia quoq; graue olentia, & quae pressuram faciant non solum demersis, uerum etiam reuoluentibus, improbantur. Haec peccanter ex epilepticorum curatione, atq; praefocationis matricis transferenda iussit, cum constet etiam in ipsis adhiberi non oportere sinapi, etiam si chronicas passiones quadam

\* re corporatio-  
ne:  $\mu\lambda\lambda\alpha\sigma\tau\epsilon\upsilon\sigma\iota$   
et.

\* a sanat

\* irritas acrimonias

\* in aliquod  
temporis spatium

\* b excitabitur

\* quam affert  
madida, & cataplasmate  
omni, haec coma.

\* corporis nouatione <sup>a</sup> excludit. acutae autem uel celeres \* prouocans, in magnitudinem tollit. Omnis enim acrimonia tumoribus incongrua. Nam & \* temporiter quidem ager omnis tanquam adustus igne <sup>b</sup> consurget, sed rursus grauius opprimetur. Oportet etiam secundum eius praeccepta manente capillatura aliquod cataplasma apponere. Et propterea non parui temporis \* uexatione membranam afficere. Nam tonsuram noxiam phreneticis probat. His etiam lethargos similiter curandos existimat, quo fit ut etiam in ipsis tonsuram prohibuisse uideatur. Non enim in illis materiam post tonsuram ascensus uexabiliter caput poterit onerare, in lethargis uero id minime facere: quae si

tanquam

tanquam uexabilis, excludenda est, multò magis sinapi excludendum. Adducit enim ad semet materiam, sicut inflatæ, atque in ruborem deductæ eius appositione partes demonstrant, eamque adductam tenendo cogit, & uiarum perficit densitatem. Dehinc odore penetrando membranas inurit, & tanquam acre collyrium oculos, sic mentes inflamat. Quomodo etiam fricare \* manibus sinapi lethargos potest, cum sensibus ac mente captus esse uideatur. \* Atque ita odoramentorum tempus tacuit, & solam materiam nominauit. Hoc quidem etiam de dando potu fecisse perspicitur, \* dicens: quoties detur temporum tacita disciplina: uinum etiam lethargis est incongruum nulla declinatione passionis firmata. \* Simile est enim ebrios ac uinolentia madentes uino oportere uti, tanquam congruè superdato, in quibus periculum \* spasmi fore nemo sapiens negat. At uerò iste importunius lethargis \* probandum existimat, sperans uini furorem sub oppressione passionis posse latere: \* uehementer enim curandum putat occultare noxia quàm \* prohiberi. Miseriores igitur lethargis phrenetici iudicandì, & experimentorum probationi subiecti. Nanque etiam in lethargis demersionis aucta uexatio ex uini efficitur potu. Siquidem spiratio alia, ac \* còductus corporis, atque raptus aduenit, & celerrimè mortis sequitur effectus. \* Themison libris acutarum uel celerum passionum rectè cetera ordinauit, sed iubet obscuro in loco haberi lethargos. Etenim, inquit, lux apta non est: siquidem mouet atque turbat corpora, & non sufficiunt spiramenta turbationi cominotæ congruam exhalationem præbere: quapropter etiam sani in luce dormientes grauantur, quorum maximè hi

\* membranas  
 \* manibus lethargici dare sinapi.  
 \* Præterea  
 \* quando & quoties  
 \* Quemadmodum quiebris iam altius dormientibus uinum præterea dat, eis somnium profundiores cõciliat: sic qui lethargico vaporis & humoris copia sopito & oppresso, uinum quod capat tentat, & in vapores dissoluitur, præbet, eum magis grauat, & obruit.  
 \* è plenitudine  
 \* dandum  
 \* uehementius  
 \* prohibere  
 \* conuulsio  
 \* Cetera Themisonem

qui

qui sub sole dormierunt uexari noscuntur, non aduertens quòd omnis tenebrosus aër constringit. Lethargica autem passio nullo alio magis quàm strictura cognoscitur, quam necesse est augeri \* ob solis densitate. Sub sole autem dormientes grauari etiam nos asse-

\* obsecuri loci rimus, sed ob contrarietatem \* efficientium causarum.

\* tepor Lux enim solis, atque \* uapor, relaxat: e contrario, somnus astringit. Dehinc lethargia grauis atque per-

\* natura gra- niciofa esse passio perspicitur. Somnus autem \* natu-  
ra & amica-  
quies-  
rale est officium. Item sol grauatur caput: lux autem quam lethargicis adhibemus tectorum sub tegmine,

nullo \* uapore lucifici solis \* augetur, neque splendore radiorum persusum corpus grauiter afficit egrotantis. Iubet etiam parua per interualla eorum faucibus insinuari liquorem, quod præter tempus faciens ardorem illum, cuius causa id adhiberi existimat, augere potius quàm minuere uidetur. At si uenter strictus fuerit, aloes iubet dari appensum triobolon, hoc est, dimidiam drachmam, cum aqua ante cibum, ac id prodesse inquit, prius quàm passio augeatur. Siquidem multa

\* detrahuntur quæ ad caput ex corpore concurrunt, \* detrahentur. Soranus uerò qui normarum regulis methodum restituit, noxiam esse inquit istiusmodi potionem. Forsitan enim ob nimiam stricturam retinetur, & non solum nihil egerit, uerum etiam ipsa remanet. Credibile autem ad eius \* pigmenti in stomacho effectum sensum, accurrere materiam, ac deinde ad membranas & caput recurrere, quod per uias stomacho uicinum est, & ad rapienda quæ sunt summa facultate, aptissimum, ob tumoris feruorem. Dehinc grauius augeri peccatum uidemus, cum ante cibum hoc medicamen dari iubet. Adiectus enim cibus necessario corrumpitur, manente

\* medicamen-  
ti-  
ad-

ad-

adhuc in \* ore aloe. Corruptio autem cibi uexat ea \* corpore  
 quæ se circumplexa sunt. Attrahens deinde materiam  
 à capite, attrahit etiam eius nutrimentum. Non enim  
 ratione quadam tacita, ueluti animal sentiens, poterit  
 medicamen \* animalia relinquere, & ab his quæ con- \* utilia  
 tra naturam sunt ac detrahenda, separare. Nutrimen-  
 ta igitur propria deperdere dubium non est, \* cum ui \* quia  
 medicaminis detrahuntur. Post tertium diem sternu-  
 tamento utitur, cum ipse prohibuerit lucido in loco  
 egrotos iacere, siquidem mouentur atque turbantur  
 liquida & spiritus: sed utique multo uehementius ster-  
 nutamenta commouere posse perspicimus. Dehinc  
 post quatuor inquit, uel quinque dies, declinante ac-  
 cessione, si nihil obstiterit, ultra muros producendus  
 egrotans, & usq; ad uiginti, uel tringinta stadia ge-  
 statione mouendus. Quo tempore excitare etiam cõ-  
 uenit, atq; sternutamento, & aceti cum sinapi odora-  
 mento uti, uel cataplasmatibus, & hoc per totam pas-  
 sionem faciendum probat. Sed omnino lucem inquit,  
 \* recusandum, tanquam commobilem corporis, cum sit \* recusandam  
 grauior in sinapi uel gestationis motu, commotio.  
 Iners etiam atq; uana \* intentio, dierum numerus, atq; \* animadu-  
 modus stadiorum, circa gestationem adhibēdam. Addo. <sup>si</sup>o, <sup>prescriptio</sup>  
 etiam immodicum motum esse stadiorum triginta pe-  
 riclitanti. Quòd etiam \* considerans sinapi probaue- \* odoramentū  
 rit adhibendum, ratione caret. Vtrum ne quia \* tumo-  
 rem senserit \* in membrana? sed hæc acrimonia neces- \* qui relaxan-  
 sario densatur: an uerò sensuum torpentium mouen- <sup>ex</sup>  
 dorum causa? sed iandudum lucem ne commoueat, re- <sup>iam</sup>  
 cusauit. Postea inquit, radendum sequenti die, duabus <sup>ex sequenti-</sup>  
 ante accessionē horis, seruatis cataplasmatibus ex pa- <sup>bus legendum</sup>  
 ne & \* aqua & olco rosaceo, & lini semine, cū posca, <sup>videtur, Ali-</sup> ca.

uel polenta cū fœnugræco, & aqua mulsa, usum dissimilium cataplasmatum permiscens. Etenim mulsum atque fœnugræcum relaxant atque mitigant tumentia; oleum uerò rosaceum, atque acetum, uel alica cōstringunt. Et propterea in augmento tumores super-tendunt. Intemporaliter etiam utitur cataplasmatibus, quum ante duas horas accessionis uenturæ adhiberi iubet, & sit eo tempore requies adhibenda. Dehinc, inquit, si uehementer fuerit oppressus ægrotans, ut neque \* dimissionis tempore eum ualeamus excitare, si præcordia mollia senserimus, atque uocem non ita obtusam, fricationibus corpus calefaciemus. Tunc frigida caput fomentamus coaceruatim, atq; iugiter, & quodam percussu, ut altius \* à capite demissa ueniant fomenta. Tunc ad balnea ægrotantem ducebimus, ut densitatem frigoris relaxemus. \* Hoc igitur uexatio perdende salutis \* magnitudinem uehementer excedit. Quod enim passio crescere facit (hoc est torporem sensuum) hoc etiam frigida fomentatio cogit augeri, quò fiet ut si fortè tēporaliter quisquā ægrotantium, raptu quodā \* erroris frigide excitetur, uehementius tamē accessionis tēpore opprimatur, sicut & ipse eodē in libro nescius cōfitetur. Dehinc affectans stationē sensuū emouere fomento frigide, uidendum est, utrū nē in accessione id fieri eligat, aut \* in dimissione. Sed si in augmēto, contrariū & aduersum est etiā naturale lauacrū. Sin uerò dimissionis tēpore feriūtur ea quæ dimissionis ratione indulgētia<sup>a</sup> quadā tenues uiae referauerāt. \* agnouerant. Præterea post frigidā allutionem, balneum sanos quoque incōmodat, implendo caput. Quid igitur prodest frigide ablutio quæ stationem atque torporem uiarum excludere putatur, si necessario  
magis

\* remissionis

\* quā caput est

\* Hac

\* aptitudine uehementi procedit.

\* torporis frigida

\* remissione

\* a laxamēto referauerāt.



magis densitas acquisita egrotantem opprimere perspicitur? Ita corpuscula quorum statione uiarum obtrusionem factam existimat, facile utique transire uel resilire possunt, si capacitas exitum dederit, in quam uenisse, uel ex qua exisse uidentur. Huic autem rei perficiendæ frigida repugnat: densat enim atq; conducit uias. Fatetur sane neque se hoc uti adiutorio, cum sit aliud melius: quãquam nominare quod sit, metuat. Etenim inimicũ, & neq; ipsius dogmati cõueniens esse probatur. Heraclides Tarentinus primo libro de internis passionibus proponens lethargos fieri multitudine cruditatis, & crassitudine humoris, adhibet clysteres: quibus etiam admiscet aquam, in qua centaurium fuerit decoctum, uel absinthium. Dat etiam bibere castoreum, & aquam salsam, & epithymum: ac os egrotantium distendens sensim, hæc infundit guttatim, quæ in os labuntur, decurrentia. Caput autem posca fouet, in qua fuerit laurus decocta, & ruta: quoque capillis ungit castoreo, uel spondylion & aceto, cum oleo ueteri, & ex pollinibus adhibet cataplasma quod appellamus omen lysin, ex posca, & absintio, & nitro: uel cantabro ex aceto. Dehinc sinapi cum aceto, & fico: & iisdem clysteribus post rasuram capitis utitur. Dat etiam & radices mastican-  
das: ac ex sinapi, uel pipere, apophlegmatismum prouocat. Utitur etiam balanis, si clystere uentrem mouere non ualuerit, & omne corpus aceto & oleo perungi iubet, sternutamentis commouet: & odora-  
mentis castorei, & spondylii, ex aceto acri resolutis. Sed si ex humorum acrimonia fuerit ægrotitudo confecta, aquam dulcem potare ægrum iubet, ac deinde uinum. Post hæc, acetum cū melle, ob uirium tutelam

\* melius illud.  
sub.

\* bibendum

\* rasis

\* Cataplasma  
ὀμὴν λυσίν

\* struthium

\* radicle, qui  
cibus acrior est  
detergenda pi-  
tuita, ac inci-  
denda conue-  
niens.

\* nutrimenti  
& remediōrū

\* ex aliorum  
iudicio  
\* is principaliter.

\* veritas

\* Aphor. lib.  
5. & Apli. 5.

\* vocat & a-

quāvis lib. 4.

de vict. rat. in

morb. acut. his

verbis. Quod

autem repente

obmutescat id

venarum in-

terceptiones fa-

ciunt, &c.

adhibendā probat. Tunc uiscellum tenue dat anseris,  
uel perdicis, aut gallinæ & per prosectū, oryzae suc-  
cum, uel ptisanæ ex ordeo: tunc panem cum \* radicibus  
fluxis ac mollibus: uel cappare, dehinc cum pisciculis:  
sic enim quasi acceptis his lethargicos iuuandos exi-  
stimat, cum omnimodo tumētia acrioribus uirtutibus  
accensa grauentur, hoc est clysteribus supradictis, atq;  
potionibus, & infusionibus, & perunctionibus, &  
odoramentis, & fomentis, & apoph legmatismis, &  
uini dationibus intemporalibus, & cibus acriori-  
bus, & indigestibilibus, & radicibus, & cappare, &  
uiscello innutribili, atq; corruptibili. In quos errores  
ceciderit nobilis uidelicet empiricus, claret, cum liqui-  
darum \* materiarum causas attendit, & neq; tempo-  
ra, neque quantitatis modum dare perspexit, sine quib;  
solas materias nominauit, non adiutoria consti-  
tuit. Alia quoque multa \* uaria opinione cōposuit,  
quæ non \* imprincipaliter dicenda suscepit, sed expu-  
gnanda, quæ ab aliis posita uidebantur adiecit. Quæ  
propter fastidium prolixitatis tacenda melius existi-  
mo: quippe cum ex his quæ narrabimus, prætermisso-  
rum coniici \* uarietas possit.

De apprehensione vel oppressis, quos Græci  
cataleptos appellant. Cap. x.

Vicina atque similis est lethargiæ passio, quam  
Græci catalepsin appellant; nos apprehensio-  
nem uel oppressionem uocare poterimus, de qua nunc  
dicemus. Nomen igitur ab accidenti sumpsit, sed Hip-  
pocrates libro suo \* sententiarum, & Diocles libro  
prognostico hanc passionem aphoniam \* appellauit.  
Praxagoras secundo libro peregrinarum passionum

cumatoden appellauit. Item Antigenes Cleophanti-  
 nus libro quē de febribus & tumoribus scripsit, anau-  
 diam uocauit. Asclepiades libro quem de periodicis  
 febribus scripsit, catalepsin appellauit, atq; in ea plenū  
 corpus\* scripturæ, composuit: quo constat non erras-  
 se Philippum libro quo de ipsa passione scripsit, ap-  
 pellans cathocham, hoc modo: passionem, inquit quam  
 appellamus cathocham. Veteres etiam medici hanc  
 passionem non tacuerunt, sed facile, sicuti etiam nunc  
 plurimū, lethargiam esse senserunt. Alij horum succes-  
 sores pauci quidem Asclepiadis sectatores, hanc pas-  
 sionem à lethargo discreuerunt, & nomine adiecto  
 catalepsim uocauerunt, nihil quidem ei nouitatis  
 ascribentes, quod proprium passionis uideretur, sed  
 omnia communia quæ etiam de lethargo dixerunt.  
 Sed neque alius quisquam hanc passionem cognouit  
 usque ad Methodicorum tempora. Nam ex nostris  
 primus<sup>a</sup> Magnus eius argumenta constituit, atque  
 mox Agathinus, dehinc Archigenes, qui plurimum  
 passionem à cæteris discernendo separauit. Sed neque  
 proprium nomen passioni omnes unum posuerunt.  
 Praxagoras eam\* cathoden appellauit. Neque si quis-  
 quam nomen passionis dedit primus, etiam eius signa  
 rectè agnouisse probatur. Neque Asclepiadis sectato-  
 res soli catalepsin uocauerunt, uerum etiam & ipse  
 Asclepiades aliam dixit esse passionem, quam le-  
 thargiam: sed cum hoc solum præciperet, nouum  
 non dedit nomen. Nunc ne supradiçta omnia simpli-  
 cia atque nuda posuisse uideamur ipsas quoque signi-  
 ficationes singulorum prosequemur. Hippocrates  
 ait repente uoce captos quos aphonos appellauit,  
 fieri uenarum causa, quum\* spiritum sumpserint.

\* strictura esse  
 posuit: Alij  
 plenum corpus  
 & cum stri-  
 ctura

Ca A Chry-  
 ippo eam me-  
 moratam, &  
 de illa conscri-  
 ptum librum à  
 Nicerato fuis-  
 se, hic autor  
 prodit cap. 5. li.  
 2. Chronon.

\* cumatoden

\* spiritus in-  
 terceptus sue-  
 rit.

\* *prosequuntur* Multos denique talia \* *prosequuntur*, rubor uultus,  
 atq; oculorum statio sine ulla palpebratione: manuum  
 neglecta atq; distensa abiectio: dentium stridor: &  
 membrorum saltus, ac musculorum, quibus buccæ col-  
 ligantur, conductio, quos appellant siagonitas, articu-  
 lorum frigus, quum spiritus inuaserit uenas. Diocles  
 \* *intermittentes* ait, \* *defectiuas* febres tutas, atq; innoxias esse frequen-  
 tius, quàm sunt continuæ, quanquam & in his pericli-  
 tentur, qui in accessionibus apprehensi conticescunt,  
 uel raptu quodam alterno per membra tentantur, cum  
 supra dictis signis: quod sæpe (inquit) est accidens  
 pueris. Item Praxagoras ait esse quasdam febres ex  
 anno duodecimo usq; ad sextūdecimum uel septimū-  
 decimum, quæ quadam priuata perniciæ mortis ha-  
 beant effectum: atq; id in seruis magis quam in liberis  
 euenire: sed excessu dierum numero passionēs fiant,  
 catochæ uehementēs, ut etiam uoce capiantur egro-  
 \* *lethargicos* tantes. Horum aliquos etiam \* *lethargos* fieri. De-  
 nique inquit, de catocha passione quidam liberati,  
 ac deinde sanctitati creduli, plurimum quicquam su-  
 mentes, repente in mortem uenerunt. Hos denique  
 plurimus modo sequitur somnus, atque febrium in-  
 \* *haberi* stauratio, & cætera quæ corpus passione \* *habitari*  
 demonstrent. Item Archigenes ait esse difficiles etiam  
 periodicos typos, horum difficioliores esse tertianos,  
 in quibus quotidianæ accessiones fiāt, sed alterna diei  
 interpositione, \* *sibi similitu-* suæ similitudini respondeant, quando  
 \* *dine* in accessione uehemens occurrerit oppressio, \* & ap-  
 \* *quam: uelut* pellauit rhigos. Difficilis inquit etiam si quotidianis  
 paulo post diebus accessiones sibi similes fiant, & in accessio-  
 \* *quod* ne egrotantes supra dicta patiantur. Dehinc progre-  
 diens paululum idem dixit periodicos typos non esse  
 perni

perniciosos, sicut supra dictum est, sed horum esse molestos, quibus accessionis tempore pressuræ uehementes adueniunt, & quodam\* nubilo corpus demergitur, \* *somni* quod item rhigos uocauit. sed hoc, inquit, est accidens magis tertianis, aliquando etiam quotidianis, qui similibus respondeant accessionibus. Item Asclepiades ait quotidianum perscuerantem non sine periculo esse, atque multos ex eo in aliū morbum induci, hoc est, corporis\* defluxionē, aut hydropem uenire, & quicquid \* *colliquationem, tabem.* potest per corporis debilitatem accedere. Apud Rhomam uero inquit frequentare aduertimus has febres cum corporis atq; mentis oppressione, in similitudine lethargiæ quæ secundo uel tertio in statu accessionis constitutæ statim recalescēto corpore, uel cessante uehementia, in resumptionem atq; resurrectionem mediocrē reuocant egrotantes. At si leui\* figmento cessauerint, semel apprehenso agro nullam resurrectionem dabūt, sed in sudores, & respirationem celerem, in pulsum febricitatem desinunt, ac occidūt. Item similia de his scribit, & non semel, sed frequenter, dicens certa ratione mentis apprehensionem typorum in accessionibus fieri, atque hoc apud Rhomam frequentare, dans etiam causas, quibus hæc singula fiant. Item Chrysippus particulariter signa passionis percurrit futuræ, & præsentis, uel in prius euntis. Discernit etiam ab lethargo & alia plurima, & uaria digerit. Quibus ita se habentibus, erit indignum tanta diffensione conscriptæ passionis eorum cuiquam ascribere firmitatem, quippe cum cæterarum etiam passionum omnibus cognitarum aliqui plurima accidentia atque signa, aliqui pauca conscripserint, nec quisquā uera significatione hæc finierit. Hæc sunt quæ

¶ a quoniam propter eos qui specialiter istā passionem<sup>a</sup> perniciosam dixerūt ponēda credidimus: quod etiamsi lateret in certis corporis partibus, periculū<sup>\*</sup> methodicis afferebat, qui generalibus cōgruas passionibus posuerunt curationes, etiam quibus particulariter latentia curerentur. Sciendum igitur quia hęc passio ex iisdem causis antecedentibus fit, quibus alię quoq; passionēs efficiuntur, indigestione, uinolentia, camali cibo, & horū similibus rebus, cuius hęc sunt quę nostra mediocritas latinizanda existimauit, se uidisse plurimos memorat ex intemporalī cibo uel plurimo Persicorum, ista oppressos passione, sed non inquit<sup>\*</sup> necessariam precedentium causarum differentiam in curationibus pręuidere. Siquidem pręsentia<sup>\*</sup> sint à methodicis intuenda: sic etiam<sup>\*</sup> super dicit temporis attendere frequentiam, quod autumnī tempore hęc passio magis irruat corporibus, atq; in puerilib. frequenter etatibus. Item sexus causa mulieribus, & humorosis, & uacuis corporibus, & edacibus hominibus, uel post ægritudinem resumptionis tempore inordinate atq; impatienter agētibus. Pręterea<sup>\*</sup> omni febriculę hęc passio irruere potest, siue continuis, siue dimissionibus intercapdinatis: hęc tertiaicis etiam febribus, uel quotidianis, & tertianis, & quartanis, quanquam rara atque fręquens secundū febrium fiat qualitatem. Hinc etiam grauis uel lenis pro earum magnitudine fieri intelligitur: frequentius tamen quotidianis accessionibus, uel tertianis ægrotantes ista passione afficiuntur<sup>b</sup> & propterea diuturnis accessionibus admoniti tertianis similitudinem seruant ad typum quotidianum: sed omnium earum febrium grauius, quoties cum articulorum frigido torpore fuerit<sup>\*</sup> qualitas: lenius, quoties tremo

¶ a quoniam eius priuata natura & ut solet autor dicere, specialis proprietates non cognoscatur, nec sciant medici quam potissimum corporis partem occupet.

\* tamen nullū Methodicis afferebat.

\* Soranus cuius &c. ut supra pag. 66.

\* necessarium sunt

\* insuper dicit oportere temporis.

\* omnibus febriculis

¶ b & pręterea diuturnis accessionibus. in geminatis tertianis, quę.

\* inæqualitas

tremore egrotantes afficiuntur. Itē magis ac magis, sed leuius, quoties sine his quę supra diximus, solo seruo-  
 re initium febres accipiunt. Sequentur autem eos qui in passionem uenire\* meditantur alia communia cum \* periclitantur  
 lethargo, ut sequities & tardus corporis motus: uel nulla querela ex his quę egrotantes afficiunt, hoc est tacita sui laboris relatio, & ueluti somnus ultra modū  
 prolixus uel grauis, itē alloquētibz nobis\* eius tarda \* agri  
 responsio. Propria autē sunt quę in propriā passionem uenturi patiuntur, ut est genarū rubor plurimus, sine febrū leuigatione: saliuarum fluor: pulsus erectio at-  
 que plenitudo: uentris retentio, aut coaceruata atque fluxa effusio. Eos uero qui\* sint in passione iam con- \* sunt  
 stituti, sequitur schema iacendi iugiter supinum: colli distentio: genarum rubor: febris: uocis amputatio: sen-  
 suum torpor, atque hebetudo: palpebrarum\* distātia: \* instantia  
 & infixa atque immobilis intentio luminū, tanquam quicquam intento obtutu aspicere<sup>c</sup> cupientium: aut  
 boum ceruicis repentino motu cadentium. Sequitur <sup>c</sup> Quidam  
 etiam lachrymatio tanquam sentientium, atque dolen- legunt: cupien-  
 tium:\* saltus latenter commouens musculos, qui buc- tium; ut boum  
 cas colligāt, quos siagonitas appellant.\* Mouens etiā ceruicis repen-  
 labia, & supercilia, & digitos, atque manus: singul- tino ictu caden-  
 tus creber, ac resonans: pulsus celsior, humectus, ple- tium.  
 nus: uehemens retentio uentris, & neq; extenta re- \* palpitatio  
 colligunt membra, neq; conducta distendunt. Ventris \* mouet & ia  
 inflatio aliquibus tanquam ex uento magis ac magis  
 circa stomachi\* sensione: aliquibus tanquam ex humo \* insertionem  
 re, uel cibo, cum sonitu intestinorum. Dentium\* cōcu- \* collisus  
 bitus, hoc est confixio uehemens: Aliquando etiā stri-  
 dor, & cum statū sumpserit accessio, horum\* recessus \* discissus  
 adeo, ut sit quędam interiecta distantia. Oris hiscens

\* remissa atq; \* dimissa hebetudo, \* cum plurimum saliuarū fluo-  
 \* qua re per eius obliqua foras decurrit, nunc \* attestāte so-  
 \* adstante nitu trasuoratur. \* Discurret etiam si quid fuerit li-  
 \* hac illac dis- quoris infusum, aut inuito agrotante \* percipitur. Itē  
 fluit  
 \* accipitur labia sepiissime conducentes, contrahentēsq; , & tan-  
 quam in mactitudine constituti, suspirant. Atq; ita si  
 ante oculos eorum quisquam digitos circum moueat,  
 palpebrant agrotantes, & suo obtutu manuum traie-  
 ctionem sequuntur: V el si quicquam \* profecerint, etiā  
 \* si melius ha toto obtutu conuerso attendunt: & inclamati, respi-  
 beant. cientes lachrymātur, nihil dicentes, sed uolentium re-  
 spondere uultum simulantes, odoramentis admotis iu-  
 cundis delectantur, atque iugi adducto spiramento.  
 Odoribus autem tetrīs delectationem non accommo-  
 dant sed auersa uoluntate eorū fugiunt putorem: dul-  
 cia atque amara sentiunt, si eorum linguae fuerint ad-  
 \* efflorescit. mota. Item perpuncti sentiunt, uel si eorum manum  
 \* morbo ten- quis extenderit, hanc recolligunt: uel lacepsiti horre-  
 tātur, & pra- scunt: & eorū uultus in ruborem \* florescit. Cū sudore  
 henduntur. scapius plurimo, atq; seruēti, & in dimissione synceri-  
 \* quoque pe- tati propinquātes rursum \* admonētur. At si ad peio-  
 Elori affixi con- ra passio fuerit deuoluta, seruor plurimus corporis in  
 ductio  
 \* extantes superficie, magis sentitur spiratio: oculorum conuer-  
 \* τὰ ἰσχυρά- sio: menti \* quoq; fixa conditio: manuum contractus,  
 ματα. & musculorum qui buccas colligant, tanquam riden-  
 \* quas tium: sudor igneus, & quibusdam in thorace atq; uul-  
 \* & ex affe- tu emergentes discolores, uel \* stantes in rotundita-  
 Elus te \* maculae, in similitudinem scatebrarum corporis,  
 \* gutturis stri- \* quos Græci ionthos uocant, \* & ē magnitudinis re-  
 dor ac soni- pentinus uirium casus: \* gutturis stridor, quem Græ-  
 tus sibilans ci rhogmon uocant: torpor frigidus: \* albidus uul-  
 πορμός arabes tus, & in ultimo \* cessatio, atque uitæ periculum. Alij  
 uocant oregmo-  
 na.  
 \* pallidus  
 \* suffocatio



uerò in phreneticā, aut lethargicā passionē reciderūt,  
 sicuti & ipsæ passionēs in semet per temporū motum  
 uenire consueuerūt. His igitur qui in phreneticā pas-  
 sionē ex ista deueniūt, pulsus sensim minuitur, atq; dē-  
 satur: & oculorū fixus obtutus mutatur, atq; mobilis  
 efficitur: leuiter etiā tanquā in somno, murmurātes, nō  
 recta secū loquuntur: & incerto motu, atq; tardo, suas  
 transferūt manus, uel digitos cōplicant. Qui autem in  
 lethargicā passionem deueniūt, inani afficiūtur pulsu,  
 atq; tardo, & corū palpebræ cōducūtur, & in torpore  
 sensuum, uel hebetudine perseuerāt. Qui autem in de-  
 clinationem passionis deueniūt, plurima, uel parua ac-  
 cidente humiditate releuantur, quibusdam accedenti-  
 bus quoq; aliis signis. Nam plerisq; plurimo per inte-  
 stina exeunte uento, uel mucilento humore, \* ut ster- \* aut  
 core, uentris subsedit inflatio: alij uerò humore pluri-  
 mo, atque crasso, \* perfecta dentium distantia ex ore \* perfecta  
 detracta, loquuti sunt: & alij \* sapientes quidem, sed \* sapient  
 concisis sermonibus loquuntur, alij iugibus. Propriē  
 igitur passionem suprā dictam, hoc est, catalepticā, siue  
 catocham, ut Græci appellant, designant febres acutæ:  
 uocis silentium: sensuum hebetudo: pulsus magnus, ac  
 uehemens, & plenus, & humectus: oculorum stans at-  
 que fixus obtutus. Est autem passio celeris, atque acu-  
 ta, etiamsi in chronias \* uenerit febres. & est magna:  
 atq; strictura & raptu corporis, quē Græci spasmon  
 uocāt, fieri perspicitur, nisi per immodicū fluxū \* dia-  
 phoreticus, tanquā in cardiacis, fuerit effectus. Huic  
 igitur similis est lethargia, apoplexia, stomachica pas-  
 sio, in febribus uocis \* ingerēs silentium: Itē animi de-  
 fectio per nimīā ieiunitatem: & matricis præfocatio,  
 & \* lūbricis uocis depressio, de qua capite de lūbricis  
 scribentes

\* etiā si à diu-  
 turna febre ex  
 citetur.

\* spasmus, quē  
 ex inanitione  
 factū dicimus.

\* ingens, à po-  
 via, à πύα.

\* & ex lum-  
 bricis

scribentes memorabimus: de aliis uerò leuiter, atque coactè nunc discretionem ponemus, Nanque lethargicis maior quidem pulsus, sed tardus, atque inanis inuenitur, & palpebrarum conclusio. Catalepticis autem pulsus maior, sed plenus, atque celer, & uehemens in-

\* adstante

uenitur, palpebrarum \* attestante distantia. Item apoplecticis paruus, celerrimus, durus, ac sine febribus

\* accidunt.

pulsus inuenitur. Siquidè hæc repenti \* accidunt. Item

\* affectus uehementia

stomachicis qui \* nimietate etiam uoce capiuntur, pulsus paruus, & imbecillis inuenitur cum stomachi \* so-

\* exolutione

lutione, uel tumore manifestius apparente, & frigidus torpore, qui sequitur post oppressionem factam, &

\* febricula cōcurrit.

non antecedenti \* febricula cucurrit, sicut in catalepticis. Item stomachici intelliguntur ex eo quòd iam

frequenter fuerint admoniti passione, & propterea typorum tenuerunt tarditatē, quibus acceffiones longo

\* abstinentia,

interuallo respondent. Item à ieiunitate, uel \* ab-

\* cibi defectu

stinentiæ defectu, siue ex capitis causa, quam Græci scotosin uocant, demersi ægri uidentur. Discernuntur

autem hoc modo, quòd primum oculos habent distentos, dentium \* concadente iunctione: attestante pulsu

\* coincidente

paruo, atque imbecillo: ita ut aliquando interire uideantur cum frigido torpore. Sed hæc & citò \* circū-

\* circumscri-

buntur, & is qui patitur, faciliè resurgit. Nam si per-

buntur, id est

seuerauerint catalepticam passionem designant. Item

finiunt.

non aliter faciliè sese resumere perspiciuntur; hi qui odore carbonum, uel unguentorum, sensuum oppres-

\* longis atque

sione, uel torpore afficiuntur. Item matricis præfoca-

solitis.

tione oppressæ discernuntur, primò quòd ipsa matrix

\* longis, id est,

se sustollat, atque supra umbilicum, uel uentrem extas

longo iā antea

uideatur, antecedente querela earum partium, ante

tempore inna-

oppressionis tempus. Aliquando etiam \* longis atque

dere consuetis.

solutis

solutis

solutis acceſſionibus admoneri ægrotantes inueniuntur, cum pulſu paruo, celeri, imbecillo. His etiam col- lum latius fit, cum palpebrarum concluſione, atque frigido corporis torpore. \* Ex duplici tertiana \* cõ-  
 fectis, in uehementiore acceſſione ſimiliter alternis re-  
 ſpondente diebus, \* lethargica fuiſſe oppreſſi paſſio-  
 ne, & ueluti complexu earum fuiſſe, acceſſionibus de-  
 monſtrando lethargicum ſimul atque catalepticum ef-  
 ſe confirmat ægrotantem non aliter quàm ſunt ex ty-  
 porum complexione in una atque eadem ægitudine  
 \* repente. Hæc ſunt quæ in intelligenda paſſione, atq;  
 à ſimilibus diſcernenda poſuimus.

Quomodo curandi ſunt hæc paſſione  
 laborantes. Cap. XI.

**D**Ehinc ob curationem adhibendam, oportet æ-  
 grotantem iacere, ſicut ſtriatura laborantes ſæ-  
 pe docuimus, adhibita abſtinentia, pro uirium qualita-  
 te, atque ſomento ex oleo dulci, & calido capiti, &  
 \* medianis partibus: Sed prætaetis mebris, quæ frigido  
 \* mortis torpore afficiuntur, calefactionibus etiam ad-  
 hibitis, cum obuolutione, atque modica ſtriatura ex  
 lanis effecta. Item ori, uel faucibus ſenſim inſundendus  
 humor, uel muſum, illis temporibus quibus alias paſ-  
 ſiones curantes docuimus. Clyſter etiam ſimplex adhi-  
 bendus, ſi uentris ceſſauerit officium. In declinatione  
 uerò, uel dimiſſione, os ægrotantis ſenſim diſtendimus,  
 atque hiſcere tentabimus. Aliis item dimiſſionibus ca-  
 taplaſma mediis adhibemus partibus, & clunibus, ob  
 abſtinentiam urinae ſoluendam: item ceruici, uel maio-  
 ribus neruis, quos tenontas appellant, & muſculis qui  
 buccas colligant, quos \* ſiagontas uocant. Iniectione  
 \* parua olei per clyſterem utimur, & cucurbita ap-  
 poſitione

\* At  
 \* affecti  
 \* lethargica  
 ſimul & hæc  
 oppreſſi paſſio-  
 ne, ac ueluti  
 harum comple-  
 xu, quidam  
 dentur, ſigno-  
 rum & acceſ-  
 ſionis demon-  
 ſtratione le-  
 thargicum ſi-  
 mul & cata-  
 lepticum ægro-  
 tantem eſſe cõ-  
 firmante, non  
 aliter quàm  
 ſunt typorum  
 complexiones  
 \* repente  
 \* ventri ac  
 ilius  
 \* motus

\* ſiagontas  
 \* præterea

positione nunc simplici, nunc scarificatione adiecta, ob

- \* Tum singultum & tumorem uentris atque stomachi\*: Tunc  
 \* cerotariis uaporatione spongiarum, atque \* cerotaria. Rele-  
 \* reuatis uatis partibus mediis caput tondemus, cucurbitamque  
 \* instituitur apponimus: quorum nihil in catalepticis \* inuenitur.  
 Præterea scarificamus occipitium, & tempora, uel  
 cogentibus causis alia quoque capitis loca, si qua po-  
 \* Tum tuerint cucurbitæ appositionem accipere. \* Tunc fo-  
 \* in seffum, so- mento utimur olei, atque \* embasin toto adhibemus  
 \* lium, labrum corpori, ac opis etiam leuioribus utentes, quæ mitius  
 \* Tum neruorum faciant laxamentum. \* Tunc post \* pun-  
 \* scarificatio- ctionem, cibum damus declinationis tempore uarium,  
 \* nem atque bibilem, ut ouum sorbile, cerebrum, olus quod  
 non sit uirtutis acrioris, & magis nutritibile. Dehinc  
 \* ut ficu, po- adhibemus lauacrum sine ullo \* cibo, qui in se habeat  
 \* mis, uis. uini qualitatem. Tunc proficienti ægroto pomorum  
 quicquā damus, ut ficum recentem, uel pyrum ex mel-  
 le: tunc mulsum, uel aquam: atque completo sanitatis  
 officio, & depulsis omnibus quæ passionis recursum  
 \* leue fore sollicitant, dabimus uinum tenue, \* leue, sicut salu-  
 taribus præceptis docuimus.

Quomodo aliarum sectarum principes  
 istam curauerunt passionem.

Cap. XII.

- M**ulti aliarum sectarum principes, quos inter  
 Chrysippus scribens de catalepticis in ultima  
 parte libri, ubi etiam catocham nominauit, in his qui  
 \* hac mediocriter tardasse in \* eadem passione inueniuntur,  
 acrioribus utitur unctionibus, ob stuporē articulorū,  
 uel tremorem, hoc est cyprino, admixto pipere, & ni-  
 tro: & fomento ex aqua salsa, cōcoctis sulfure & bi-  
 tumine: dehinc perūgit unctione, quā appellauit tripti-  
 cen,

cen, quā conficiendā dixit ex calamo aromatico, ſchoe-  
 no, cachry, pyrethro, irino, manna, ſingulorū partibus  
 oleo admixtis, atq; contritis ſed hæc nos ob acrimoniā  
 reprobamus. Siquidē \* ſit paſſio celeris atq; acuta, etiā \* eſt  
 \* ſi iandudū tardātibus atq; inueteratis febribus irrue- \* ſi cūm  
 rit: quippe cūm chroniæ febres iſta paſſione neceſſa-  
 riò in\* ſuperpoſitionem ueniant, quam Græcè epithe- \* paroxyſmū,  
 ſin uocant, quæ ſimilis ſit neceſſariò acutis paſſionibus, ac exacerba-  
 tionem  
 & ob hoc mitigationem depoſcit. Prohibemus etiam  
 ſupradictis rationibus unctiōem ex illo liquore arti-  
 culis adhibendam, uel ex eo quicquam potandum, aut  
 cibo admixcendum: item ſternutamenta, uel raſuram  
 capitis, aut articolorum ſinapiſmum, aut ſupponenda  
 podici acria collyria ob prouocandum uentrem, quæ  
 appellauit balanos. Item diagridium, atque caſto-  
 reum, & omnia grauabilia fomenta, ex quibus tumor  
 magis augetur, & ſoporifera preſſura geminatur.  
 His etiam compeccauit Themifon libris quos perio- Themifon  
 dicos dixit, adhuc quidem in iuuentute conſtitutus:  
 nec dum Aſclepiades in libris ſuis eos diſcreuerat.  
 Ait enim, ſi iam tardantibus atque inſidentibus fe-  
 bribus apprehenſiones, uel oppreſſiones aduenerint  
 ſenſuum, atque in acceſſione uocis ſilentium fecerint,  
 cæteris, ut ſuprà diximus, ſimuliter adhibitis, ante  
 acceſſionem tribus, uel quatuor horis ſeruatis, ſi  
 uenter non fluit, diagridij obolum cum tribus, uel  
 quatuor obolis caſtorei dabimus cum aqua: occipi-  
 tium atque tempora capitis inungentes thapſia, quam  
 nos ſerulaginem dicimus, aqua contrita, ut quendam  
 ſenſum atque leuationem mediocrem per corporis fa-  
 ciat ſuperficiem. Cibos etiam inquit dādos ſolidiores,  
 niſi præcordia fuerint in tumore cōſtituta: quod ſi ob-  
 ſtiterit

\* bibiles, *ut supra* stiterit, \* bibulos dabimus cibos. Nec dum ista quidem ait satis providens, quia etiam si in alijs partibus tumores fuerint corporis, sorbiles interea cibi conueniunt. Siquidem laxamentum passio deposcit, quam necessario \* accendit, atque erigit thapsia magnificum tumorem. Est etiam castoreum acre, inueteratæ qualitatæ causa, sicut omnis caro. \* reposita. Prohibemus propterea ob dentium faciendam distantiam immittendos uolenter cuneos. Etenim ex his commotæ partes atque quassatæ asperant tumentia. Quamobrem dentium \* concasus uehementior fiet, cum magis sit utile, ac necessarium in tensione partibus constitutis, requiem adhibere, ut declinationis tempore, uel potius \* demissionis \* dimissionibus, laxatis musculis, sine ulla ui digitis immisissis dentium facilius distantiam faciamus. Nocent etiam \* succi frigidi, ut hederæ, fomentati, atque capiti impositi. Etenim tumores constringunt, & passionis asperant motum. Et si qua his fuerint genere similia, sicuti in lethargicis contra sectarum principes scribentes docuimus, prohibemus. Est autem improprium, atque loco carens \* nimium frigidis uti fomentis, in declinationibus uero calidis, atque feruentibus, iuxta imitatione recentium uulnerum. In his enim priusquam tumor emerferit, frigida probantur. Sed omnis sensuum pressura, uel \* apprehensio in ista passione tumoris esse perspicitur: \* uel hoc præcedentes super fieri. Hæc sunt quæ de catalepticis sua \* potentia Soranus ordinauit.

\* oppressio  
\* & hoc (sub tumore) præcedente supersit.  
\* experientia

De pleuritica passione. Cap. XIII.

**P**leuritis à parte corporis quæ magis patitur, nomen sumpsit. Latus enim ipsa passione uexatur, quod Græci pleuron uocauerunt: fit autem ex uariis ante ceden

antecedentibus causis, ut ceteræ passiones: magis tamen profunda perfrictione, aut uinolentia, aut usu uenero, plurimo nimis potu, indigestione continua, aut percussu uehementi, aut ponderis magna subuectione, uel cursu uehementi: sed neque secundum has differentias differens erit adhibenda curatio. Vna est enim atq; eadem passio, ex qualibet ueniens causa, quæ una atque eadem indiget curatione. Hanc definiens primo de adiutorio libro Aristoteles sic tradendam credit. Pleuritis (inquit) est liquidæ materiæ coctio, siue densatio. Nec tamen differuit utrum ne totius, quod falsissimum: siquidem phlebotomati ægrotantes\* li- <sup>\* non den-  
satum</sup> quidum sanguinem reddunt, an uero particule, sed cū hoc tacuit, \* non promisit. Mitto etiam oculorū suf- <sup>\* legendū pu-  
to, necessariū  
prætermisit</sup> fusionem nihil aliud esse, quàm liquoris coeuntis densitatem, nec tamen pleuritim. item Apollonius qui ap- pellatus est Mys uolumine uicesimooctauo, quod de secta Herophili conscripsit: Pleuritis (inquit) est communiter passio <sup>a acuta</sup> temporalis, atque celeris, secundum laterum membranas quas hypezocotas uocant, atque inter eorum\* carnem: aliquando etiam in\* pulmonis <sup>\* id falsum  
costarum mu-  
sculis,</sup> partibus, sæpiissime sine\* tumore\* uel ex solis causis effecta. Propriè autem tumorem secundum supradictas <sup>\* externo  
aliquādo ex-  
ternis solis cau-  
sis</sup> membranas, uel carnem lateribus interiectam: aliquādo etiam secundum pulmonis partem, sed in utraque diffinitione peccauit. Primo enim sunt prolixæ atque narrabiles. Secundo plurima alia prætermisit, nam necessario passioni febris est.\* Corruptum autem atq; <sup>\* falso tribu-  
tum & asser-  
tum</sup> usurpatum dicimus in pulmone passionem hanc posse constitui, sicut ex consequentibus docebimus. Item Asclepiades libro definitionum, Pleuritim dicit esse humoris fluorem temporis parui, atq; celerem inte-

\* quàm  
\* nimirum tu-  
more, & fluo-  
re,

\* quod  
\* falsum id

\* qui tussien-  
do reicitur.

riorem, lateris partium, cum febre, atque tumore : sed erat melius tumorem dicere \* atq; humoris fluorem. Etenim quoties ex complexa \* passione cōficitur, tumorem perspicimus superare. Et igitur secundum Soranum pleuritis dolor uehemens interiorum lateris partium, cum febribus acutis, & tussicula, qua uariæ qualitatatis liquor excluditur. Frequentat autem hæc passio in masculis magis quam in fœminis, atq; in senibus magis quam iuuenibus. Tussiculosa enim atque frigida senilis est ætas, quo intelligimus profecto hanc passionem pueros difficulter incurrere : frequentat etiam hyberno magis quam autumnii tempore, \* quo hyemi uicinatur. Acstate \* uero difficulter occurrit. Est præterea passio acuta, atq; celeris & uehemens, & aliquādo sola ex strictura confecta: aliquando admixta solutione, ob plurimum \* tussiculæ liquorem. Etenim uentris defluxio non implet in pleureticis signorum concursum, sed magnitudinem passionis docet. Quapropter ex his solum dicimus agnoscendam, quæ supra memorauimus. Alia uero concurrunt plurima, atq; differentia, pro passionis magnitudine, ac temporum mutatione, quæ quia prætermittenda non sunt, prosequamur.

Quæ consequuntur. Pleuriticos. Cap. xiiii.

\* omophatam  
nisi legendum  
clauem

**P**rosequitur in passione constitutos acuta febricula cum tussicula dolor lateris uehemens, atq; usque ad iugulum, & \* palam eiusdem partis perueniens, quibusdam etiam brachium tangens, & pectus atque ilium, & est stimulosus, ac pulsuosus, & igneus iugis, aut intercapedinatus, seruato ordine, aut confuso, & infixus atq; perscuerans iisdem locis, aut mobilis, & recurrens atq; mutabilis, cum suspirio, & diffi-

cili



cili spiratione, quam Græci *ῥόστρον* uocant, at-  
stante tussicula, aliquibus arida, frequenter tamē cum  
liquidis excrementis, & primo spumosis, dehinc sangui-  
nolētis, \* ita fellofis ac inde saniosis. \* Sequitur etiam \* postea  
egros supra id latus iacendi difficultas, atq; cum se su- \* id male di-  
pra contrarium latus uerterint, dolor, ut adduci sen-  
tiant \* suo pondere euidentia tumentium partium \* uisce \* sua gravita-  
ra: sequuntur etiam uigilia, atq; siccitas, & asperitas te ca-  
linguæ. Peiorante passione augentur omnia supra di- \* pondera  
cta. \* Addit etiam articulorum frigidus torpor, gena- \* Accedit  
rum rubor, oculorum sanguineus color, uētris \* u sape comi-  
fluo-  
ratur.  
spumofus, ac felleus. Vrinæ quoq; frequens, atq; paula-  
tim, albida egestio, pulsus densior celer, fortis, & ue-  
luti \* fluctuans, & suo percussu pressuram significans: \* si sudor in-  
spiratio etiam circumdolens, atq; frequens, & obtusa, \* stas, aliqui te-  
uultus & thoracis roscida humectatio: mentis aliena-  
tio, gutturis stridor, uel sonitus interior \* resonas, aut \* durus, ser-  
sibilans, in ea parte quæ patitur. Acceptorii etiam per \* rauila,  
uolutum recursio, & iacendi negata, atq; \* si sudor in-  
omnis positio, sputa facile \* siccātia \* & magis saluo-  
sis ea quæ fuerint contra naturā, uel in densitatē coa-  
cta. Etenim spumosa sanguinis in qualitatem transcunt: \* stas, aliqui te-  
sanguinolenta in liuorem. Item fellea, cruginosa, atq; \* durus, ser-  
prasina, uel nigra \* efficiunt, saniosa, focculenta, uel su-  
mosa & odore grauiā, & inæqualia, mutato etiam \* si sudor in-  
sepe ordine suæ \* egestionis: item post felleā, uel sanio-  
sam qualitatem in sanguineam transcunt, uel quālibet \* stas, aliqui te-  
coloris uarietate. Tumoris etiā uehementia \* resonas, aut \* durus, ser-  
alia \* in soliditatem coguntur, alia in nigredinē ueniūt, & rotunda  
ob feruoris uisurā. Aliqua ruptis uasculis funduntur, \* Nam spuma  
quapropter saniosa qualitas, post sanguinea perseue-  
rat, sed \* spumosa rursus fit, cum singulas per partes \* aut calore: aut  
retroque

tumor quatiens liquida spiritu turbato spumofam sufficit qualitatem. In ultimo autem cogente periculo celerrima fit spiratio, & præcordiorum suspensa adductio, pulsus innordinatus, aut deficiens, aut deferens in his quæ in peripneumonicam passionem, aut apostema transire noscuntur. At si \* ipsa fuerit leuigata, singula mitescunt, & uentris egestio coagulatur, aut fellea carebit qualitate: & per tuâiculam exclusa saniosa minime in sanguinolenta redeunt. Discernendum etiam quæ sint sputa \* saniosa, & quæ sit sanies. Nam saniosa iam mitescentis tumoris, atq; declinantis esse probantur. Sanies uero ex apostemate, quod etiâ vomicam dicere poterimus, uel certe ex ulcere probatur uenire. Discernitur autem \* exercita inuentione: hoc est colore, & substãtia, & odore: frequenter enim tectri odoris est sanies. Item saniosa admixtione aquæ facile soluantur, sanies autem difficile. Dolorem uero peiorem alij dexteri lateris probant ob pulmonis uicinitatem, alij sinistri, uicinantis cordis causa forsitan, & quia frequentius sinistra dextris debiliora uidentur. Item pleuritis, nunc eodem tempore febricula concurrat, nunc superuenit, nunc antecedit, nec cessante febricula perseverat.

\* passio

\* purulenta  
ea sunt, alba  
læuis, æqualia\* exercitata  
observatione.

Quomodo intelligimus pleuriticã passionem in peripneumonicam transeuntem, aut in vomicam venientem. Cap. xv.

**I**ntelligimus eos qui in augmento pleuriticæ constituti passionis, proni atq; faciles in peripneumonicam uidentur, quum cæteris omnibus peiorantibus signis, atq; in magnitudinem extentis, solus dolor minuitur, atq; incendi positio ex parte faciliior ac leuior supina ægro fuerit uisa, aucto genarum rubore: conductu

ductu etiam supercilliorum è medio \* uehemēter, tan- \* uehementi:  
quam in mœstitudine constitutis, oculorum attestante  
seruore. Eos etiam qui in uomicam transeunt intelli-  
gimus ex eo, quòd dolor infixus eodem permaneat  
loco, accedente tussicula arida, atque tremore \* typi-  
co, & inordinato, spiratione difficili, quā Græce dy- \* febris, quæ  
spnæan uocant, cum dolore leuiore, & pulsu denso. \* suppurationis  
tempore inna-  
dit, ex Aphor.

Quis locus in pleuriticis patitur.

CAPVT XVI.

**Q**uæsitum etiam est à ueteribus quis in pleuri-  
ticis locus patiatur, & quidam pulmonem pati  
dixerunt, ut Herophilus. Item quidam hypozocota  
membranam quæ latera, & interiora cingit, ut Dio-  
cles, Erasistratus, Asclepiades, & eorum plurimi se-  
ctatores. Horum primi aiunt non esse in lateribus tu-  
morem, quum neque extantia ulla earum partium in-  
spectione sentiatur: neq; rubor: nec motu, nec tactu, do-  
lor acutus, uel fortis, tanquam manifestis tumoribus:  
accedit etiam quòd facile supra id latus quod patitur,  
iacere possint ægrotantes, supra aliud uerò quod pas-  
sione liberū uidetur, si se iactauerint, difficultas spira-  
tionis accedat, siquidem nunc sustentatæ pulmonis par-  
tes iacent: nunc ueluti pendere sentiuntur. Dehinc  
etiam tussicula signum est ex accidentibus consequens  
morbum fibrarum pulmonis \* resudati corporis liquo \* resudate ab  
ris, siue cannæ gutturis, singula etiam \* tussita de pul- \* eius corpore li-  
mone uenire manifestum est, qui neque uenis, neque \* quore per can-  
arteriis, neque fibris contiguus, uel admixtus esse la- \* nam gutturis.  
teri uidetur, ut per ipsum latere accepta excludi \* extussita  
posse credamus. Vnde igitur dolores? nunquid  
ne pulmonis sensibiles partes in passione constitu-  
tæ causa sunt? an uero eius tumore latera uicinantis

comprimuntur, & propterea dextrarum fibrarum tumor dextri lateris dolorem facit, sinistrarum sinistri? Sed in peripneumoniciis totus tumet pulmo, nec ullas tamen sequitur dolor. Sed huic quidem sententiæ contrarij aiunt propterea neque ruborem, neque extantiam, uel dolorem ægrotantes consequi, quoniam in alto tumor esse uideatur. Quod autem supra patiens latus quosdam iacere prohibet, alios uero contra, mittescendo releuat, illa causa est, quod incumbendo obiectu straminum pressa materia refugiat, atque ex partibus quæ patientur, ad sanas partes rediens, dolorem non faciat. At uero partibus non patientibus expressa, atque fugata, se patientibus impatiens, & has distendens, dolorē facit. Tussicula uero fit\* cum patientibus hypezocoti membranae uicinis, atque contiguis partibus. \* Et tussita itidem sputa per pulmonem feruntur, siquidem in ipsum ueniunt ex uicinis, accepta per uias mente sensas, quas logothecoretos appellat, sicuti & in \* uoinicis contingit, quanquam frequenter ad externas partes uerticem faciant: uel fracto latere sanguinolenta\* excludantur sputa. Nam profecto insensibilis omnis est pulmo. Debit igitur nullus fieri dolor. Sed si ex oppressione hypezocotis membranae \* ex pulmone uicino tumente, dolor fit, debuit magis ægrotans tunc dolere, quoties iacuerit in latus, siquidem tunc magis incumbens opprimit pulmo: dehinc etiam peripneumonicos dolere oportuit. Si enim ex parte tumens pulmo dolorem facit, magis omnis in tumore constitutus facere debuit. Patitur itaque hypezocos membrana, & propterea dolorem uehementem facit? siquidem est nervosa atque lateribus infixa. \* Hinc denique, quoties tumore densa

\* compatiens  
tibus

\* Extussita

\* abscessibus  
pectoris uic  
λειτουργησι.  
\* excluduntur

\* a

\* Hac

\*densatur, \* ossibus uicinantibus\* abstenta ire latius prohibetur, & \* eorum conuersione naturali quatitur motu, atque acuti doloris accipit causas. Item \* spirationum thoracis, adducti spiritus uicinitate, pulsata, insustentabiles dolores facit. Manifesta nanque coniectura est, quod ipsa patiatur. Siquidem tumoris augmento \* collectione in pleuriticis, facit & \* expirantibus saepe agrotis nigra inuenitur. \* Hos denique \* uenatos quidam putauerunt. Igitur in pleuritica passione non simplicem lateris dolorem, uerum etiam febre acuta attestante totum corpus pati uidemus. Et enim febres totius corporis sunt: plus tamen pati hypoxocota membranam recte dicimus, siquidem sunt in ipsa dolores constituti.

Quæ sunt similia pleuriticae passioni. Et quomodo internoscuntur. Cap. xvii.

Similia pleuriticae passioni dicuntur, \* dolor lateris<sup>b</sup> collectio in eius medio constituta: item uomica, quam graeci empyema uocant, suspirium siue spiratio difficilis, quam iidem dyspnoeam uocant. Item adnares catarrhus, quæ uocant coryzan, & \* anhelatio. Siquidem supradictis tussicula, atque spiratio difficilis adiuncta esse uidetur, & febricula, & dolores accedentes pleuriticae passionem \* fingant. Sed discerni atque internosci suis proprietatibus possunt. Nam dolor \* lateris etiam sine febre plerumque est, & longo tempore perseuerat: uel quoties celer est, sine uarietate sputorum, uel excrementorum esse perspicitur: in pleuriticis uero dolor acutus, cum febribus acutis, & sputis supradictis inuenitur. Itæ ab empyicis hoc est uomicosis, \* si-

cat: Empyema Abscessus calidus: ex fluxione: suppuratione, transmutatione: uel puri coaceruatio, ex humoris citra tumorem putredine: uelceris sordibus.

\* asthma. \* fingunt \* compunctio est flatu: Telum. \* & à

\* membrana  
\* costis  
\* repulsa latius & amplius distendi  
¶ a & eorum conuersione. i. costarum motu quæ simul cum thorace deprimuntur & attolluntur. Quidam legunt, & corpori conuersione

\* spiratione  
\* abscessum  
\* morientibus  
\* quibus mortuis membrana succingens costas nigrescit  
\* veneno sublatos

\* compunctio  
Plinio: Telum  
Serenio, & Isidoro.

\* Abscessus.  
¶ b Collectio: Abscessus frigidus, nempe Meliceris, Altherma. Steatuma: Hippocr. singula ex his Tubercula cruda, quæ uicinat, & uocat.

ue collectione laborantibus discernitur pleuritis, quòd febres noxiæ atque acutæ & inordinatæ in pleuriticis inueniantur. Vomicosis uero uel collectione laborantibus, antecedente corporis horrore frigido, atq; dolore pungenti, eodem tempore, hoc est \* quo in uomicam transeunt ægrotantes, sputa sequuntur, quæ antea nulla fuerāt<sup>c</sup> reiecto \* prius pure coaceruato in latere collectionis causa: <sup>d</sup> laterum quoq; ueluti conuersionem hic sentiunt, aliquando etiam sub ipsis extans, uel prominens collectio sentitur. In pleuriticis uero febricula ex initio uehemens, atque sputa contra naturam, & uaria reperiuntur. Item ab \* spiratione difficili, & orthopnoea, & catarrho quem supra diximus ad nares \* fieri, & \* anhelatione, celeritate discernitur, & feбри atque dolore. Siquidem illa tarda sunt, & sine febribus, aliquādo etiā sine dolore.

Quomodo curandi sunt pleuritici.

CAPVT XVIII.

**I**Acere pleuriticos conuenit mollibus stramentis, loco lucido, atque calido, & mediocriter amplo: schemate quo se melius ac facilius haberi peruiderint: adhibita requie, & cibi abstinentia usque tertium diem: accessionis tempore, uigilantia: cum articulorum tenaci, blandaque defricatione manu calida. Vaporanda etiam quæ sunt in dolore constituta calidis pannis, & cum accessio statum sumpserit, lanis limpidis, ex oleo dulci calido expressis, contegenda. Adhibenda fomentatio lenis capiti, atque inguinibus, & sitis sub umbilico locis, ex eodem oleo, similiter calido, & magis quando fuerint indulgentia corporis releuati ægrotantes. Sin minus, addenda etiam cotaplasmata ex polline, atq; lini semine, & fœnugræci, cum aqua, & oleo

\* quo prius sit  
 & c reiecitur  
 uero prius prius  
 coaceruatum.  
 prius.

\* id est, antequam horreat, refrigerentur, & febris occipet.

& d laterū conuersionem uocat, fluctuantis puris & agitati strepitum, ac uelut inundationem, cū ex altero latere in alterum æger vertitur.

\* Dyspnoea  
 \* ferri  
 \* asthmate

oleo coctis. Tunc oris collutione utendum & potu aque calidæ, moderato quidem, ne plurima liquoris humectatio sputorum prouocet fluorem. Tunc somno dimittendus ægrotans. At si uenter fluxerit, poterit somnus ante dimissionem, permittente hoc est declinante accessione adhibitis accersiri, scilicet laxatiuis cataplasmatibus. Sed si dolor uehemens fuerit, phlebotomiam conuenit adhibere, si nullus uentris fuerit fluor, \* intra tertium diem. Sin uero fuerit adiuncta uentris \* infra solutio prorsus in ipsa diatritho erit phlebotomia adhibenda sic ut prædiscere possimus, utrum sit perseuerans, atq; superior strictura magis quam solutio. Sæpe enim concurrens uentris solutioni sanguinis detractio, ægrotanti nouissimam intulit deflectionem. Quapropter perspicendum utrum usq; ad dimissionem accessione fluor uentris perseueret, uel eius meatio mordicationem quandam faciat podici, uel intestinis. Suspecta etenim habenda est istiusmodi defluxio. Ita adhibenda phlebotomia, sed ex alio brachio, quod fuerit dolenti lateri contrariū, \* certæ rationis causa quam \* id falsum sæpe memorauimus. Tunc post mediocrem sanguinis \* ex coniectura quam leuissimæ missionem, quæ magis coniicienda est ex \* coniunctione quæquæ leuissimæ solutionis quiescere permittimus \* cibo refocillatum ægrotantem, atq; \* resumptū laxatiua perunctione curari, oris etiā adhibita fomentatione, \* digesto scilicet \* i. sedata peradiutorij turbore, dabimus sorbilem cibum ex oleo turbatione, quam excitauit sanguinis missionis auxilium. dulci confectum siue melle, ne liquidorum prouocetur sputa importunitate temporis, hoc est initio, siue augmento passionis. Dabimus etiam pultem calidā, atq; madidam, sine sale: uel panem ex aqua calida. Sed si \* frigidum autem inimicum uenter fluxerit, pultem dabimus crassiorem, sed calidam, quoniam in tumentes \* prius partes incurrit, tunc ri, &c.

post cibum somno diruttimus egrotantes usq; ad solitum\* accessio-  
 \* accessio tum\* accessionis tempus, quæ cum fuerit effecta, erūt  
 adhibenda quæ supra memorauimus congrua. Adhi-  
 bendus etiam cucurbitæ leuissimus raptus: sed cum sta-  
 tum coeperit accessio, adiecta etiam scarificatione: cū  
 ad dimissionē declinando peruenerit, tunc spongiarum  
 adhibenda uaporatio atq; cataplasmata laxatiua, fre-  
 quenti mutatione nouata. Sed si uentris fuerit fluor,  
 erit quidem his utendum ob tumorem. Siquidem immu-  
 tabilis dolor auget liquidorum defluxionem, uigilia-  
 rum atq; corruptæ digestionis causa ungendi sunt. Igi-  
 tur egrotantes plantaginis succo reficiuntur: & ali-  
 quando simplici, aliquando admixta acacia, aut pti-  
 sane succo, quo sit præcoctus mali punici cortex, uel  
 \* celsarubus myrti, aut agrestis\* celsæ coma, quam rubum uocant,  
 aut rosa, uel galla, & his similia. Etenim alia queque  
 nimium cōstrictiue uirtutis, uel multorum admixtio-  
 \* immodica ne composita, \* in modica densatione maiores mem-  
 branarum prouocāt necessario tumores, quos passio-  
 nis nequitia & tardare faciles, & adiutoris medici-  
 nalibus cedere difficiles facit, adiuncta scilicet solutio-  
 ne. Quare cum proluxiores fieri uiderimus dimissio-  
 nes, clystere utemur, solutione cessante: cataplasmati-  
 bus autem, & cucurbitæ scarificatione, cum doloris  
 fuerit dimissio. At si solutus fuerit aut leuigatus dolor  
 ut ordinem accessionum seruans, magnitudine tamen  
 \* vnctione: minutus esse uideatur, urgente etiam solutione, \* inie-  
 nempe adstrin- ctione utemur supradicta adhibita scilicet uaporatio-  
 gente ne atq; cataplasmatibus admotis, & scarificatione su-  
 pradiicta, apponentes palmulas quas patetos uocant  
 \* liquor pluri- contritas, & cū pannis calidis. Potū dabimus calidum  
 mi spūti, nec quidem, sed omnino paucissimum, ut neque \* liquore  
 pluri



plurimo sputorum, uel uentris augeatur de fluxio, & tepore quodam tumentia mitigentur. Omne etenim frigus tussiculam commouet. Deinde dabitur pulticula, sed \* constrictior: uel panis ex aqua calida, diligenti infusione atque in nouatione calidæ elutus, & expressus, ut suæ densitatis positu \* elentescat. At si iugi uexatione tussicula, atque conatu frequenti ruptio uenula sanguinem per os emitti coggerit, dabimus plantaginem dimissionis tempore, oleris uice mandandam. Etenim in accessione omne quod datum fuerit, corrupti atque acescere necesse est, olera præcipue. Dabimus etiam decoctorum aquam cydoniorum. At si in ipsa accessione id facere coacti sumus, insistentem periculo dabimus poscam. Tunc in dimissione cibum: ut liquori soliditas accedat, Alicam ex aqua calida, in qua fuerint præcoctæ palmulæ Thebaicæ, uel mala cydonia, ut eorum frigore sanguinis fluor teneatur, feruore uero iusculi tussicula leniatur. Erit præterea si uires egrotantis permiserint, alternis diebus dandus cibus, donec passio declinet. At si imbecillitas coegerit, etiam ante declinationis tempus erit quotidie nutriendus egrotans. In statu uero mitescentibus atque \* segnescentibus sputis, & nullis irruentibus nouis saniosæ qualitatis, sine uentris fluore, conuenit post cataplasmata atque uaporationem ante cibum dare bibendum \* mulsum diebus duobus, uel tribus. Etenim tussiculam mitigat, & spirationem facilem facit, liquidorum tenacitatem laxat, & eas partes, ex quibus sputa feruntur, depurgat. Cibus præterea dabimus sorbilem ex melle: atque halicam, uel siliginis panem, & amyllum, aut ptisanam, aut panem ex mulso, aut ouum halpalum. Declinante passione, si aliqua fuerit sputorum difficultas

\* spissior

\* deluatur, in liquidis iusculum dissoluitur.

\* parcius ex-  
euntibus\* Nam ventris  
fluxione præ-  
sentem magis  
irritaret mul-  
sum.

\* quoniam hu-  
mor sputo reii-  
ciendus cras-  
sior est

\* effusa

\* Prodest

\* Hoc remedi-  
genus iun-  
gunt vocant.

\* Plin. sic vo-  
cat coccalum  
Hippocratis.  
lib. 4. de vict.  
rat. acut.

Ceratum Dia-  
tragaçum

difficultas, ob debilitatem uiriū, uel liquidorum \* cras-  
situdinem, erit sœnugræci succus admiscendus melli,  
hoc genere confectus. Duobus diebus erit sœnugræci  
semen infundendum, sed frequenti mutatione aqua in-  
nouanda, \* præfusa scilicet anteriore. Tunc donec co-  
lor uirescat, aqua coquenda, & eliquata admixto mel-  
le, ægro, supra dicta moderatione bibenda. \* Potest  
etiam ipsum sœnugræci semen tritum cum melle \* lam-  
bere: uel lini semen assatum, melli admixtum: uel ui-  
tellum oui assati \* nucleis recentibus contritum, atque  
decocto melli admixtum: uel simul omnia, admixtis  
etiam amaris amygdalis. Tunc conuenit uario iam ci-  
bo ægotantem reficere, pultribus, ouis hapalis, uel  
cerebro porcino, aut hædino, aut agnino, coctis cum  
sale modico, uel pede porcino in ptisana decocto, aut  
molli gallinaceo pullo, uel columbinaceo. Tunc post  
tres uel quatuor dies solutis febribus adhibendum la-  
uacrum: sed à uino temperandum. Illis quoq; partibus,  
quæ dolore tanguntur cerotaria ponenda ex oleo dul-  
ci, uel cyprino confecta, admixto sœnugræci polline,  
uel meliloto tuso, atq; creto, admixtis etiam adipibus.  
Utendum quoq; medicamine quod diateffaron uocāt,  
cera, resina terebinthina, iri illyrica, pice, equis pon-  
deribus. Dehinc post diem unum uel duos adhibendum  
lauacrum, & dandum uinum, apponendum malagma,  
quod diachylon uocant, uel Dia Manna. Hæc ratio  
secundum Soranum curationis: antiquorum uero Era-  
sistratus & Herophilus de pleuriticis nihil dixerunt.

Ad Hippocratem.

Cap. xix.

**H**ippocrates uolumine, quo de ptisana scripsit, ad  
pleuriticos curandos hæc ait. Lateris dolor si-  
ue ex initio effectus, siue supernatus, principio uapo-

ris erit curatione tentādus, in qua meliorē probamus,  
 ex aqua calida in \* uentriculo, uel uesica excepta, uel \* *utriculo*  
 ad eundem modū in aeneo uasculo, siue testaceo, suppo-  
 sito quolibet stramine molli, ne quassatio fiat locorū,  
 scilicet qui in dolore sunt. Probat etiā spongiā mollē,  
 magnā, ex feruenti aqua expressam, atq; pannis inuolu-  
 tam, tunc apponendam. Circumtectus, inquit, enim atq;  
 inclusus uapor plurimo tēpore perseverat. Admouēda  
 etiā, tanquā odoramētum, ori, uel naribus egrotantis,  
 ut spiramento adductus uapor suo ingressu laxamen-  
 tum partibus ministret. Utendum inquit etiā \* hordeo \* *hordeo uel a-*  
 uel orobo macerato, & calefacto, & celeriter sacello *robo in aceto*  
 incluso, tunc apposito: siue cantabro eodem liquore *miti, & c. miti,*  
 feruefacto: uel aride atque siccae uaporationes adhi- *id est dilute*  
 bendæ, ut sunt ex sale, siue milio fixo in sacellis lineis  
 aptissimē appositæ. Etenim lene atque conducibile est  
 milium. Soluit nanque naturali quadam mollitudine  
 illos dolores, qui iugulum in ipsis passionibus pulsant.  
 Non aliter etiam illos qui ægras partes pulsauerint,  
 soluit. At si dolor uaporationibus minimē fuerit miti-  
 gatus, uel \* abscessus, non oportet plurimo tempore in \* *absentius, id*  
 hac perseverare curatione. Etenim pulmonem uapo- *est repressus*  
 ratio siccatur, atque purulentum fieri cogit: sed si dolo-  
 ris significatio ad iugulum uel ad brachium tetenderit  
 cum grauedine, ut etiam pectus uel mamillam tangere  
 uideatur, oportet in brachio uenam diuidi, \* sed in eo, \* *sic ut ex eo*  
 ex quo multa fieri detractio possit, donec \* plurimum *multa fiat de-*  
 rubrior sanguis excludatur, uel ex rubro ac limpidio *tractio*  
 liuidus. Vtraque inquit enim eueniunt. Sed si sub pe- *\* plurimus &*  
 ctore fuerit dolor, & ad iugulum nō tetenderit, emol- *rubrior*  
 liendus est uenter, aut helleboro nigro, aut peplio ni-  
 gro, admixto dauco, uel seseli, aut cumino, siue aniso,  
 \* uel

\* vel alio quocunq; odorato. Pepino vero admiscendum putat silphij succum: atq; hæc, si inter se miscantur, quæ supra diximus sibi esse similes. Ex Hipocrate. Similigena ἐπιώρπη καὶ ῥεττίς, quæ pariter eodẽ temporis spatio purgāt, nō autem hoc citius, illud tardius. \* cathartica \* alui solutionẽ \* optima  
 ¶ a cessauerit \* paulatim, & pauciorẽ quàm accipere cõsueuit. Nam minus rationi cõgruũ est inter ventris deductionem sorbere. Ex Hipocrate.  
 \* & in vsu succi ptisanæ \* contrarium  
 occurrit, (ait Gal.) si magna cruditas est, quæ phlegmonem facit; vel si ante indicationem copiosa sorbitio-  
 ne ægum iudicare non putamus.

\* uel aliud quodcunq; trāquillum admiscendũ putat, id est portulacā, uel peplij succum præstare, quæ enim admiscemus sibi similes. Hæc sunt quæ supra diximus. Deducit autem melius uentrem helleborum nigrum, quàm peplion. Peplios autem helleboro nigro uentositatem melius tollit, per podicem prouocatā. Hæc deniq; utraq; dolorem solunt: mitigant etiam alia \* plurima. Hæc sunt, inquit, deducuntia siue detrahẽtia per \* effusionem, \* summa, quæ ipse sciui atq; posui. Etiam in sorbilibus dantur deducioria, quæ non ualde sunt insauia, aut amaritudinis causa, aut alia qualibet insauitate, ut copię, uel coloris. Ptisanam igitur quādo medicamen æger biberit, statim oportet superbibere, \* nihil minus à cõgrua est ratione, uel quantũ accipere consueuerit, dehinc paulatim inter uentris deductionem nouerit sorbenda: sed quando humorum<sup>a</sup> declinauerit exitus, tunc minus sorbeat ægrotans quàm consueuit. Dehinc adiectio perseuerare debet, donec dolor \* cesset, uel nihil contrarium occurrat. Hæc mihi (inquit) ratio est, \* & in succo usus ptisanæ. Etenim (dixit) melius est statim sorbendi initium sumere, non autem iam antecedentibus uasorũ euacuationibus. Ergo est initium sorbendi tertia, uel quarta, uel quinta, uel sexta, uel septima die, nisi intra id tempus fuerit ægritudo præiudicata. Hæc sunt quæ in primis partibus libri ordinauit. Alias quoq; passiones curās, in ultima scripturæ parte rursus peripneumoniam atque pleuritim curās hæc ait: In peripneumonico, & pleuritico oportet inspicere utrũne acuta febricula, atq; dolores alterius, uel utriusque sint lateris. Et utrum

ascendente

ascendente spiritu dolor admoneat, & tuſſicula adſit,  
 uel ſputa fuerint abundantia, flaua, uel liuida ac te-  
 nuia. uel ſpumofa, uel florida, aut alia qualibet quali-  
 tate à ſupradictis differētia, ſic agi oportet, ut ſi dolor  
 pungens, penetrans ad iugulum, \* uel cinctum, uel bra- <sup>\* uel māmiam:</sup>  
 chia tetēderit, uenam incidamus in quacunq; parte ſa- <sup>Hippoc.</sup>  
 ciliior fuerit uiſa. Detractionis autē modus cōueniens  
 ſecundū corporis hebetudinē atq; temporis, ætatis, uel  
 rigionis conſiderationē accipitur. Plurimam enim de-  
 tractionem oſtendit celer atq; acutus dolor, quæ uſque  
 ad anini defectionem erit faciēda. Tunc clyſter adhi-  
 bendus. Si inferior thorace fuerit dolor, & plurimum  
 ægroti diſtenderit uentrem, danda purgatio, ſed medio <sup>Ex Hippoc.</sup>  
 tempore purgationis, hoc eſt quo uentris officiū nō-  
 dum ceſſat nihil (inquit) accipiēdum, ſed poſt perfectā  
 effuſionē muſum ex aceto exhiberi iubet, quod oxy-  
 meli uocāt. Item \* quartanum typum<sup>a</sup> medicamine cu- <sup>\* quartū diem</sup>  
 rans expeſtat, tribus aliis diebus adhibendū clyſterem <sup>& a purgatio-</sup>  
 probat, & ſi paſſio nō fuerit releuata, tunc inquit pur- <sup>ne</sup>  
 gatione rurſum utendū. Præcauendū etiā monct, donec  
 dies ſeptē \* intacti febribus tranſigūt ægrotantes. Tūc <sup>\* illaſi, inof-</sup>  
 (inquit) tutō<sup>b</sup> ſuccum dabimus \* tenerum, atq; paruum. <sup>fenſi</sup>  
 At ſi facilius agere cōperit ſputa, atteſtante ſpiratio- <sup>& b ptifane</sup>  
 ne meliore, & ſine ullo dolore, atq; ut ſuprà dictū eſt <sup>\* tenuem</sup>  
 ceſſante febricula, paulatim craſſiore, ac plurimo, &  
 bis in die utendum præcipit ſucco: ſin uerò non facile  
 hæc fuerint releuata, \* leni potu, atque ſorbili utemur <sup>\* pauciore</sup>  
 cibo, hoc eſt ſucco paruo, & ſemel in die, tempore ſci- <sup>Hippoc.</sup>  
 licet quo leuius æger habuerit. Atque id intelligi uri- <sup>\* matura.</sup>  
 næ inquit inſpeſtione. Tunc dandum ſorbile quidem, <sup>Hippoc.</sup>  
 nec prius tamen quàm urina, atque ſputa uiſa fue- <sup>\* medicamen-</sup>  
 rint \* mūtiora. Sed ſi \* medicatus plurima excluſe- <sup>to accepto pur-</sup>  
 rit. <sup>gatus</sup>

rit, necessariò paruum atque tenuem dabimus cibum. Non enim potest præ inanitate, somno, uel plena affici  
 \* cibi coctione \* digestionem, neque passionis atque naturæ cōflictus sus-  
 \* Verum ubi tinere, quos Græci Crises appellant. \* Sed cum cor-  
 erudorum col- poris defluxio tenuem fecerit egrotantem, retentione  
 li puatio facta cessante (qua \* naturali uigor & corporis nutrimenta  
 fuerit, & que tardantur) succorum, nihil ualebit retinere. Intelligi-  
 remittuntur re- mus autem mitiora sputa, quando sunt similia. Item u-  
 secta, nihil ob- rina cum fuerit rubrior \* uini similitudine. Nihil etiam  
 stabit. Hipp. (inquit) prohibet doloribus lateris adhibere tepores,  
 \* naturalis atq; cerotaria, & unctionem crurū & \* clunium \* pin-  
 \* tui. Hipp. gui atque calido oleo frequentare. Præcordia uerò se-  
 \* lumborum mine lini cataplasmare usque ad papillas. His Soranus  
 Hipp. respondens ait: In calefactionibus acres esse sales, ac  
 \* inguedine. necessariò tumorem prouocare, febremq; accendere.  
 Hipp. Poscam etiam constringere, & stricturam passionis  
 augere. Item milium frixum graueolens & nidoro-  
 sum, atque capiti graue, maximè acutè febricitantium  
 esse perspicimus. Spōgiis etiam erat melius quenquam  
 in dimissione patientes partes uaporare, atque oleo  
 calido perfundere. Est præterea improprium, ac sine  
 ratione, tunc uti phlebotomo, quoties ad superiora  
 dolor tetenderit: prohibere autem quoties ad inferio-  
 ra descenderit. Oportet ergo sub hoc argumento neq;  
 \* inferiora difficultate tumorum partibus inferioribus impeditos  
 phlebotomare: neque etiam podagricos, si quidem \* in-  
 teriora tumere uideantur, sed necessariò quoties do-  
 lor ad superiora tetenderit, phlebotomiam adhiben-  
 dam uidemus. Siquidem sæpe peiorante uentris fluore,  
 hoc adiutorij genus prohibetur. Neque etiam (ut ait)  
 \* releuantur oportet interiorem uenam diuidi. Siquidem & exte-  
 riori & media diuisa, corpora \* releuantur. Quippe  
 quum

quum e contrario interiore prohibeāt, propter magnitudinem, ne tumor augeatur. Item sanguinis mutatio iners est detractiōis moderationi, sicuti de adiutoris scribentes demonstrabimus. Scse denique idem Hippocrates impugnat in consequentibus, dicens, usq; ad animi defectum faciendam detractiōem, quod magis uehementer est nocens: siquidem est periculosa defectio, & neque si sit temporaliter defectiōis causa, sensu carens egrotans, dolore releuatus, uidebitur (quum resumptus fuerit) rursum nō dolere, quum magis atque magis eiusdem magnitudinis \* passiōis debilia corpora uehementius afficiant. Item purgatiua medicamina (quæ Græci *κυσταρτικὰ* uocant) acrimoniæ causa, stomachum tumentem, atque hypezocotamembranam acuunt in tumorem: & \* in periculum uentris effusionem prouocantia, magnificam passiōis ingerunt uehementiam. Nutrire etiam cibo post medicamen non oportebat. Pugnat enim purgationi faciunde illatum cibi nutrimentum. Quippe quum medicamine corruptum, officij sui careat uiribus. Mitto etiā quod ex initio acescere facile ptisanæ succus perspiciatur, confectus quippe ex ordeis succo, qui sit digestione difficilis. Dehinc egrotantis corpus non ualeat tantum sustinere nutrimentum, quantum sanitatis tempore solitum uidebatur. Item mulsum ex aceto (quod oxymeli appellauit) sine \* discretione accipimus. Est etiā \* immodica usque ad septimum diem cibi abstinentia, <sup>num meta-  
cuius, aut aquo-  
sim.</sup> quam custodiendam ordinauit. Quippe cum nullus uehementiam passiōis sustinere ualeat, nisi nutrimento quamuis paruo toleratus: & neque in declinatione passiōis aliquid humanius cibo \* largitur, sed in iisdē \* præbetur sorbilibus perseuerandum existimat succis. At cum

\* quod  
 \* occurrit  
 \* nullis cibis  
 recreato  
 \* plus

\* laxadū mol-  
 liendum.

\* toti corpori  
 non adhibita  
 \* qua  
 \* corporis

fuerint sputa segniora, tunc ut existimat, erit primo eger nutriendus, \* quomodo necessario declinante passione \* occurrunt \* intolerato. In cæteris reliquendum temporibus absq; nutrimento egrotantem apertissime indicauit, quum semper \* plurimum utilitatis adiutorium cibi, quam cætera possunt adiutoria, largiatur. Omne etiā corpus erit unctiōe \* coequādum, & non rursus particula. Quippe cum totum cibo nutriatur, ipsa quoque unctio non \* exerta, anxietatem ingerit egrotanti, \* qua latentem difficultatem, atque accessione ueniente \* corpus prouocat incendium.

Ad Dioclem. Cap. xx.

**D**iocles etiam similiter phlebotomat egrotantes, eadem discretione adhibita. Purgat etiam catharticiis medicamentis. Quapropter eadem dignus accusatione iudicatur. Cibum uero iuuenibus undecima die dandum statuit, sed æstatis tempore elixum magis, & frigidum: hyemis uero, assum atq; feruentem. Est enim summæ \* peritiæ in ordinandis qualitatibus; non passionum genera sed tempora hyemis uel æstatis attendere: scilicet ut æstate timore laborantes, frigidō cibo nutriti \* altiora percutiant.

\* altius percu-  
 tiuntur

Ad Praxagoram. Cap. xxi.

**P**raxagoras signa docēs futuræ pleuritidis præcauendum iubet, dando bibendum piper cū mulso ex aceto, uel abrotanum, aut absinthium: phlebotomat etiam nō ultra quintum diem sed eos qui non \* perfrictionem incurrerint, neque frigido tempore, & neq; senes; neque si debiles corpore ante ægritudinē fuisse uideantur omnia inquit \* corpore curanda, & fame magis utendum: dandum bibere mulsum ex aceto, ali- quando etiam hyssopo admixto: item succum ptisanæ, fortilem

\* refrigerati  
 corpore fuerint

\* tempore



sorbilem: si celerius; quarta die: si tardius, sexta: atque  
 ex illo tempore quotidie: item celerius senibus, atque  
 \* à sanitate debilibus: dehinc usque ad septimum diem \* in  
 uentrem emolliendum iubet, & unctionibus utendum  
 pauide persuadet, atque \* respirationem inquit intuen- \* spiritum qui  
 dam, utrum sit calida, & odoris tetri. Quibus autem naribus oreq;  
 redundantur  
 redundantia est humorum in uenis, exceptis senibus;  
 & \* à sanitate debilibus, helleboro nigro purgandos \* in  
 existimat. Item deponendos secunda uel tertia die  
 egrotantes in aquam calidam iubet, uel utribus eos  
 calefacere, fouendo \* crura donec dolor excludatur: \* latera  
 Hic uerò etiam non futuram pleuritim ex his quæ  
 ordinat, efficit. Omnia enim constrictiua, atque acria  
 esse uidentur, ut mulsam ex aceto, & piper, & ab-  
 sinthium, quæ necessario tumores accendunt, \* co- \* tempore  
 maxime tempore quo etiam aqua sumpta in qualita-  
 tem deuenit fellis, ob nimium in alto feruorẽ. Dehinc  
 phlebotomari oportet etiam eos, qui ex frigore in-  
 currisse uidentur, & eos qui \* senilibus annis uiden- \* dum prorsus  
 tur affecti. Non enim necessario debiles esse proban- decrepiti, ac u-  
 tur. Quapropter etiam \* illis qui in sanitate corpo- ribus effectis  
 ris debilitate uidebantur affecti. Exigit enim magni- non sint.  
 tudo passionis adiutorium. Purgatiua uero medica- \* illos  
 mina quæ cathartica appellantur, \* prærumpunt cor- \* perrumpunt  
 pus, atque \* sollicitam eidem passioni solutionem pro- \* difficilem ac  
 uocant. Item fames tantum noxia quantum refectio laboriosam  
 commoda. Non igitur sexta die cibum iudicamus dan-  
 dum. Longa est hæc ieiunitas: & neq; semper quarta  
 die: sæpe etiam tertia die: caput autem implet. \* Fib \* quod biben-  
 autem hoc ex aromatibus: dehinc calidæ aquæ so- dum datur ex  
 mentatio importuna est, & frigescere facit agro- aromatibus.  
 tantes.

## Ad Asclepiadem. Cap. xxii.

**A**sclepiades secundo uolumine celerum, uel acutarum passionū, pleuriticos phlebotomat, prædicens primo locis ubi consistunt uel commorantur, utrum regio adiutorium phlebotomiæ permittat adhiberi: se enim uidisse testatur apud Athenas atq; urbem Romā phlebotomia uexatos, uel peius acceptos esse pleuriticos. In pario uerò atque Hellesponto resumptos ac releuatos. Prohibet propterea sitim, atq; clysterem, uel ante cibum bibere: & si (inquit) oportuerit, deducendi uentris causa, adhibendum semel uel secundo clysterem. Potum dat magis ac plurimū mulsum, aliquando etiam & rutam, & hyssopum cum mulso. Nocere inquit radicem herbæ, quam Græci phlomon uocant, quapropter omnino dandam negat, uel certè semel dandam, ubi dolor coegerit. Cibum inquit dandum \* præcauta secunda die, siquidem alternis

\* vitata  
 \* admonentur,  
 i. febris exacerbat.  
 \* ptisanam  
 \* sexto die

\* admonētur diebus: & quarta, siquidem grauior est: uerum quinta & tertia (inquit) die dabimus \* succum, & ut sæpe sufficiens, probat quotidie dandum. At si plus defecerint, nutriendos etiam post accessionem \* quinta diei permittimus: declinante passione uinum damus, & uarium cibum. Huic Soranus occurrēs ait, semper phlebotomandos pleuriticos, stricture cogente, & apud Romam deniq; nos (inquit) utemur phlebotomo, nulla regionum discretione confusi. Etenim quærendum utrum Asclepiades proprietate regionis noceri suspicatur eos qui fuerint in \* eodem phlebotomati pleuritici: an uero proprietate passionis: ex quibus si primum putat, hoc est, regionum proprietate, uexari omnes oportuit, non solum pleuriticos, uerum etiam synanchicos, & qui fuerint phlebotomati,

\* cura

\*curati, & epilepticos etiam, quos phlebotomandos \* in curatione  
 imperat aptissime. At si secundum, hoc est proprieta-  
 te passionis uexari putat, non apud Romam solum  
 phlebotomatos pleuriticos, sed in omni regione no-  
 cერი debuit indicare. Clysterem uero rectè prohibet  
 propter acrimoniam, sed non rectè semel uel secundo  
 adhiberi permittit. Multo enim melius est omnino  
 innoxium quicquam, quàm leuiter nocens. Hinc etiam  
 phlomi herbae radicem, tanquam natura noxiam re-  
 probans, non rectè semel adhiberi ait ubi dolor coe-  
 gerit. Dehinc omni ex parte ratione caret, prohibe-  
 re clysteres tanquam augentes incendia, & rutam,  
 uel hyssopum adhiberi, quæ sunt uehementius arden-  
 tia ob suæ qualitatis acrimoniam. Item mala atque  
 caduca intentione confirmat circa quartum diem ci-  
 bum non dandum generaliter, ac necessario quintum  
 diem\* seruandum. \* His enim qui iugibus afficiuntur \* expectando  
 febribus, quoties initium ex die sumpserint, quarta \* in  
 die necessario dandus est cibus. Non aliter iis qui  
 maiore hemitritæo ægrotant, & ex nocte sum-  
 pserint initium. Ipse quoque Asclepiades in phre-  
 niticam passionem uenturos grauius indicat affi-  
 ci quarta die: neque tutò ante dimissionem decli-  
 nante accessione \* dandus, ut existimat, \* cibus est, \* dandum  
 atque semel datum sufficere, nisi pulsus fuerit de- \* cibum esse  
 fectio. Non enim oportuit uirium debilitate captata  
 cibum dare, quum fuerit nostræ potestatis opportunè  
 antè ægrum, quàm deficiat, reficere. Vinum etiam  
 & uarium cibum declinante passione dandum re-  
 ctè consulit, sed non suo conueniens iudicio. Etenim  
 phreniticis atque lethargis ante declinationem \* ui-  
 num dedit.

\* nempe mul-  
 sum cum ruta  
 & hyssopo.

Ad Themisonem.

Cap. xxiii.

**A**T Themison alias quidem pleuriticis recte curauit, peccauit autem quarta die cataplasmando, dehinc cerotarium apponendo: \* ex aliquo uirtutis feruentis ungendo, atque ruta: sunt enim acria. Dehinc cerotarij tempus declinante est passione.

Ad Heraclidem.

Cap. xxiiii.

**H**eraclides Tarentinus sanguinis extimens abundantiam, secunda die utitur clystere, bis, aut tertio, atque post paululum phlebotomat, conturbans corpora requie indigentia. Etenim querendum quid magis esse \* confirmat, utrum ne fluorem uentris, aut tumorem & retentionem stercorum. Sed si fluor est, hunc duplicat, adhibendo clysteres: at si tumor est, hunc eorum duplicat acrimonia. <sup>2</sup> Credas etiam eandem iniectione suspensam raptu quodam patientibus aduenire partibus, & propterea uehementius nocere. Hic quoque etiam nulla est phlebotomie utilitas. Vexata etenim tribus clysteribus uires, sanguinis prohibent detractionem. Dehinc neque omnes, neque secunda necessario phlebotomandi sunt die, sicut supra docuimus. Cataplasmat etiam aqua solutis \* pollinibus (quod Græci \* omen lysin appellant) admixto fico, uel panace, aut chamæpity, quorum \* complexio ob qualitatis acrimoniam noxia indicatur. Probat post usum cataplasmatidis, malagma \* quod Apollonphanis appellamus, siue polyarchion. Item sua inuentione conscriptum: quæ omnia sunt accerima, & propterea recusanda. Dat præterea mulsum præbibendum in quo præcocta uel præinfusa fuerit ruta. At si sputa excludi cœperint, dat medicamen bibendum quod conficit ex hyssopo, iride, & melle. Si (inquit) non fuerint

con

\* optet: uel: comperiat: deprehendat.

¶ a Credibile enim eam iniectione dispersam.

\* ordeï & tritici

\* ωμύρ λυσίρ

\* vel temperata, & facultas: vel compositio & compositio.

\* constat paribus portionibus cera, resina liquida, amomi, cardamomi, iunci quadrati, fuliginis thuris: an thore Celsolib. 5. c. 18

congrue uel sufficienter exclusa, addendas absinthij drachmas sex: sed si nausea occurrerit, apium uorare iubet egrotantes, uel oliuam ex aceto mandere. Hæc quoque sunt acria, & stomacho\* in hærentia. Ipse denique tætatione expertus ex supra dictis euerſionem fieri stomachi, ordinat ob nauseam retinendam,\* incongrua scilicet, quæ constringere possint. Ait enim, si non recesserit sputorum emissio, sequenti die iniicienda atque excludenda, commoueat iris, eadẽ clyster per uentrem detrahi prouocet, noxia noxiis committens. Siquidem etiam per clysterem iniecta, ex eadem sunt materia, ex qua sunt ea, quæ bibenda ordinauit, quo fit ut commouens tumorem, magis\* faciat excludenda quæ putat retineri. Dat etiam uiscellum gallinaceum cum mulso\* ex uino, uel succo ptisanæ, quæ sunt in corruptione facilia, atq; instantia, & uentrem in fluorem mouentia. Dari præterea uinum iubet his qui fuerint uiribus debiles, nisi caput (inquit) doluerint: non aduertens quia temporis opportunitate permittente omnibus conuenit dare: ut e contrario resistente, neque imbecilibus. Etenim si (ut existimat) ualentes uiribus uexat, multo magis imbecillos. Neque recte sentit ita dandum, nisi caput doluerint. Dolor enim si prohibet capitis, non aliter etiam lateribus\* prohibere perspicitur, prius quàm passio declinauerit\* importunum datum. Nanque omnia quæ patiuntur exagitat, nec solum caput. Dicit etiam declinante passione gobiones pisces dandos, accedente profectu etiam carnem, atque panem, non conueniens, quia omnis acrimonia tussientibus, uel spirationis difficultate laborantibus, uel spuentibus sanguinem inimica est, etiam declinante passione. Simile enim

\* aduersantia

\* incongrua:  
aliq; incongruè¶ c sputorum  
emissio ac nau  
sea, quam iris  
commouet, ex  
eadem clystere  
iniecto exclu  
denda per ven  
trem detrahi  
oportere.

\* prouocet

\* aut

\* officere

\* importunè

quiddam facit, quale contingere uidemus in externis corporis partibus uulneribus constitutis, quæ cum sunt adhuc nouitate tenera, cicatrices acrioribus \* exusta facile resoluuntur.

De peripneumonia.

Cap. xxv.

Consequens atque uicinum est peripneumoniæ dicere curationem, quæ non ut priores uoluerunt, à parte corporis quæ patitur nomen sumpsit, sed ab ea quæ plus patitur. Si quidem neq; sine febribus esse uidetur. Perficiunt hanc passionem causæ quæ etiam pleuriticam faciunt, ut uenenum sumptum, uel ex opio atq; hyoscyamo confecta tusipientibus medicamina, uel his \* similibus uirtutibus: Item catarrhus uel coryza, uel, quod est rarissimum, synanchica \* præcedens passio. Nam frequentius antecedere pleuritica, peripneumonia sequetur, <sup>2</sup> quò fiet ut perniciosior sit antecedente, siquidem uexatis prius uiribus, atq; adiutoriis ex parte incassum prærogatis, in secundam \* ueniant ægri passionem. Afficiuntur autem iuuenes magis atque ætatis mediæ; at senes, uel pueri, atque mulieres difficile. Hanc igitur \* desinientes passionem \* Demetrius Herophilus libro duodecimo de passionibus, peripneumonia, inquit, est tumor in toto pulmonis corpore, ex parte enim si fuerit pleuritis dicitur. Addere autem debuit cum febribus: siquidem sine his peripneumonia esse non potest.

Quæ est peripneumoniæ intelligentia.

CAPVT XXVI.

\* Definire

Diffinire \* Methodici iuxta Sorani iudicium declinant. Asclepiadis sectatores aiunt esse peripneumoniã parui temporis solutionem cum tumore, atq; febre, solutionem (inquiunt) ob humorum emissio-  
nem:

¶ a Hunc autem iudicio re pugnat Hippocr. in Coacis. his verbis. Peripneumonia ex Pleuritide transmutata iustiores sunt quæ ab initio fiunt.

\* veniunt

\* desinient

\* eundem citat supra pag. 65.

nem: parui temporis, ad discretione phthisice passionis, quæ est & ipsa solutionis uel effluëtis humoris per tussiculam exclusio. Peripneumonia (inquiunt) ad discretionem aliarum passionum, parui (ut supra diximus) temporis, solutionem ingredientium, ut <sup>a</sup> oculorum uel aurium: adiecerunt etiam cum tumore atq; febre. Si quidem solutio, hoc est, eruptio parui temporis\* ad pulmonem<sup>b</sup> fit, peripneumonia ad eas partes sine febribus. Huic Soranus occurrēs definitioni ait: Quum semper strictura in his obtineat, non oportuisse passionem rheumatismum uel solutionem dici cum tumore, sed forte tumorem cum rheumatismo. Etenim parua maioribus postponuntur. Est igitur secundum nos peripneumonia strictura uehemens, atque acuta, pulmonis, cū sputis, & siti, & febricula celeri, atq; acuta.

<sup>a</sup> a oculorū in ophthalmia, et Delachrymationibus: auris cum ex inflammatione sordide & purulente fiunt.

\* ex pulmone

<sup>b</sup> b quæ Peripneumonia nō est sed sine tumore ac febre.

Quomodo intelligitur peripneumonia.

CAPVT XXVII.

Intelligitur ex his quæ concurrunt. Etenim peripneumonicos\* sequuntur febres acutæ, grauedo thoracis, & sensus laborantium quadam difficultate laterum, atque <sup>a</sup> medium papularum: iacendi etiam facultas supinæ positionis, atque paulo erectior: frequens etiam sedendi delectatio, atque supra latus iacendi difficultas, ita ut præfocabilis esse sentiatur: uultus rubor, tanquam florens: oculorum ueluti <sup>a</sup> pinguis aspectus, atque etiam splendor, scilicet in partibus albidis quæ præter pupulam uidentur, & magis cum alterna conuersatione aspiciunt ægrotantes. Sequitur eosdem etiam anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta, atque fellea, uel <sup>a</sup> fumosa iactans <sup>a</sup> spumosa sputa, & in comparatione pleuriticorum fuluiora, uel

\* sequuntur

\* mammarum & papillarum

\* languidus flaccidus

\* spumosa

spumofiora: spiratio difficilis: desiderium frigidi atq;  
 \* haustu plurimi aëris \* hausti rapiendi: frigidi etiam potus ap-  
 petitio: os siccum: lingua aspera, ac primo subalbida,  
 dehinc rubra: pulsus uehemens & celer & anxietas,  
 iactatio, uigiliæ inges, ingemens atque turbulentus  
 somnus. Peiorante passione thorax etiam extantior  
 \* crebritate & \*  
 \* vehementis,  
 fiet, accedente spirationis \* persecutione cum quo-  
 dam sibilatu uehementi, atque aspero. Sequitur etiam  
 colli ac uultus inflatio: & oculorum aut immobilitas,  
 aut difficilis motus: uisus nubilosus, uel nubilus: men-  
 tis alienatio: articulorum frigidus torpor, attestan-  
 te liuore: lingua crassior, atque conductione breuiat-  
 \* colli-frontis:  
 \* temporum.  
 ta: sudor \* superiorum partium: pulsus latens aut  
 formicabilis, quem græci myrmizonta uocant: in ul-  
 timo, etiam pectoris resonans stridor, quem rhogmon  
 appellant. At si salutaribus prosperata signis passio  
 ceperit in melius uergere, omnium supra dictorum  
 fiet paulatim deductio, aliquibus etiam semel am-  
 putata decisio. Quidam denique in pleuriticam pas-  
 sionem redeuntes releuati uixerunt, accedente dolo-  
 re, & plurima spirandi difficultate. Etenim prædi-  
 cta quæ peripneumoniam designant, uel concurrenti-  
 tia complent, sunt hæc, febres acutæ, spirationis  
 celeritas, ac difficultas, tussicula, atque sputorum  
 uaria emissio, grauatio sine ullo dolore, aut cum  
 \* sensu  
 \* excitata, ge-  
 nita.  
 paruo, præfocationis \* sensu. Est autem passio gene-  
 raliter acuta, atque strictura \* suffecta, adiuncto le-  
 ui humoris fluore, quem rheumatismum uocant. Quo  
 fit ut magis stricturam uocemus, etiam si dolor non  
 \* somnolentiâ fuerit. Quippe cum inesse grauedinem atque \* pres-  
 suram uideamus, & asperitatem, & siccitatem, &  
 accessionem, uel his similia signa.



Quis locus in peripneumonicis patitur.

## CAPVT XXVIII.

**P**Ati in peripneumonicis Diocles uenas pulmonis inquit: Erasistratus uero, arterias. Praxagoras eas inquit partes pulmonis pati, quæ sunt spine coniunctæ: \* etenim omnia inquit pulmonē pati<sup>2</sup> Herophilus. Si uerò febrem (inquit) fuerint passi, \* pleuriticam facit. Asclepiades uero, eas pulmonis partes pati, quæ \* arteriæ sunt adherentes, quas appellant bronchia. Item Apollonius Herophilus inquit, ipsius pulmonis uenas atq; arterias pati. Soranus autem cuius uerissimas apprehensiones latino sermone describere laboramus, totū inquit corpus passione uexari, sed pulmonem uehementius, quod quidem \* estimatum, & non ad expressam fidem accipiendum iudicauit. Est etiam inutile curationi, quippe quum nihil obstat locorum neglecta specialis apprehensio, ubi totum corpus laborare senserimus, & neque mutabilis sit adiutoriorum qualitas, pro patientibus locis, sed talis perseueret in genere, donec passio ipsa perseuerat. Manifestum autem ex supra dictis, quomodo possunt similia quæque peripneumonicæ passionis internosci & accipi. Pleuritici enim, uehementi dolore lateris afficiuntur: dyspnœici uerò quos Anhelosos dicere poterimus, siue suspiriosos, sine febribus esse noscuntur, & non solum celeri atque acuta afficiuntur passione, sed aliquando etiam tarda, atque obtusa, quam græci chroniam uocant.

Quomodo curandi sunt peripneumonici.

## CAPVT XXIX.

**C**onuenit peripneumonicos iacere in loco \* modice lucido atq; calido, & ita haberi uel componi, ut recli

\* At enim  
 \* a Herophili  
 \* lus supra pag:  
 97. Pleuritum  
 aliquando fieri  
 putauit, inflā-  
 matione in pul-  
 mone oborta.  
 \* Pleuritis ef-  
 ficitur  
 \* arteriis  
 \* opinione po-  
 tius quam cer-  
 ta & indubita-  
 ta cognitione:

reclinato leuiter thorace collocentur. Ad hoc enim  
 \* positionis \* passionis, siue schematis genus, ipsi quoq; ægrotantes  
 \* releuantur \* releuentur: dehinc abstinentia adhibenda, usq; ad pri-  
 mam diatriron, si nulla obstitit urgentior causa: ser-  
 uandi etiam à somno uigiles accessionis tempore, ad-  
 \* manu hibita articularum leni atque calida \* manuum defri-  
 catione. Calefactionibus etiam lenibus ex pannis uten-  
 dum, actum quum statum sumpserit accessio, lanarum  
 appositione thoracem secus, atque medio scapularum,  
 sed quæ sint ex oleo calido ac dulci expressæ: declinā-  
 te accessione os colluendum, ac deinde potus dandus  
 aqua calida. Tunc somnus permittendus, adhibita etiā  
 phlebotomia, permittentibus uiribus, sed si intra dia-  
 \* curationem triron in \* passionem uenerint ægrotantes, quod qui-  
 dem est rarissimum, erit tum phlebotomia adhibenda.  
 Si autem non in ipsa diatriron, tunc unctione utendum:  
 dehinc aqua ora fomentamus, & damus sorbilem ci-  
 bum, atque tenuem ex alica. Etenim ptisana inflatio-  
 \* simila nem facit. Itē oryza cōstringit. \* Simila quoq; in ini-  
 tiis grauis est. Cōficiendus itaque erit, ut suprā dixi-  
 mus, sorbilis succus melle, atque anētho & oleo. At si  
 \* quoque æger sorbilia \* quæq; horruerit, uel recusauerit, ali-  
 cam dabimus ex aqua calida, aut ouum sorbile. Tunc  
 usque ad declinationem totius passionis alternis ciba-  
 bimus diebus, si uires ægrotantis permiserint. Atq; ita  
 thoracē cataplasinamus, & inter scapulā, quod Græci  
 metaphronon appellant, leni scilicet cataplasmate, uel  
 mulso mediocriter decocto, aut pane ex aqua calida,  
 ex polline, atque fœnugræco, & aqua mulsā, uel fici  
 \* efflata, id est aridi decoctione. Eius quanquam sit \* reflata succosi-  
 coquendo ab- tas, tamen manet ueluti mellosa dulcedo. Tunc cucur-  
 sumpta bita eisdem locis cum scarificatione adhibenda, sed di-  
 missionis

missionis tempore. Leues autem, quas  $\kappa\epsilon\phi\alpha\varsigma$  appella-  
mus, etiam in acceſſione adhibere poſſumus, & fre-  
quentes, atque multis partibus. Tunc uaporatio ſpon-  
giarum & cataplaſmatum apta: & ſi ſeſe ad tempus  
grauari ſentient egrotantes, eorum appoſitionem æ-  
grè tolerantes, tamen ex his plurimum deinde com-  
modi conſequentur. Erunt adhibenda, anguſto \* licet  
tempore detracta, atque ruruſum appoſita, quo etiam  
tuſſiculæ mitigetur iniquitudo, & ea quæ egeruntur  
facilius \* tuſſa ſine ullo tormento reddantur. Erit de-  
coctum muſum dandum, uel ſœnugræci decoctio cum  
melle: facit etiam \* nucleorum contritio muſſo admix-  
ta, uel amyllum aqua contritum. Dabimus etiam eleg-  
mata ſorbilia ex lini ſemine, ac ſœnugræci, nucleis, &  
melle decocto, & ouorum uitellis conſecta. Quum ſta-  
tum ſumpſerit paſſio, geſtatione leui utemur. Quum  
uerò declinauerit, uario nutrimus cibo, ſeruantes ac  
præcauentes multo tempore ex \* liquamine & oleo  
cibos, ſiquidem tuſſiculam commouent: tunc lauacrum  
adhibemus, & ultimo uinum damus. Pectori autem  
atq; à tergo circulatim cerotaria apponimus, & oleo  
dulci conſecta, uel cyprino, admixta iridis radice de-  
cocta uel meliloto, & ſecundum aliquos ſampsucho.  
Sed eſt hoc \* acerrimum, quanquam ſit calidæ uirtu-  
tis. Poſt cerotarium uerò apponimus quod appellatur  
diachylon, uel Mnæſei. Aliqui etiam adhibuerunt il-  
lud quod \* Nileus appellatur. Item \* Antiphantis,  
quæ non ſunt ita uehementia, & propterea permit-  
tenda. Horum ſanè compoſitiones de medicaminibus  
ſcribentes, interrogationum docuimus libris. Ex anti-  
quis autem Eraſiſtratus, & Herophilus de iſta paſſio-  
ne nihil dixerunt. \* Hippocrates uerò libro regulari

(quem

\* ſcilicet

\* tuſſa

\* τῶν πυκνὰ-  
λων

\* Caro.

\* aptiſſimum

\* Malagma

Nilei, & A-  
pollophanis à  
Celſo deſcribi-  
tur lib. 5.\* Apollopha-  
nis.\* Hæc nec in  
tribus libris

Hippocratis

De diæta ex-  
tant, nec in li-  
bro PolybiiDe diæta ſa-  
lubri. Quare

librum eum

Hippocratis

Dieteticum

periſſe arbi-  
tror.

(quem dieteticum uocauit) peripneumonica inquit  
 \* croco. remedium aptandum ex \* cocco, atq; galbano, atq; at-  
 tico melle, uel abrotano, ex aceto mulso atque pipere  
 admixto, & helleboro nigro. Summum (inquit) est e-  
 tiam panacem in mulso ex aceto confecto decoquere,  
 & liquatū dare bibendū. Sed hæc somnia Soranus esse  
 iudicauit, & propterea reprobanda, adiiciens, quod  
 mulsum ex aceto factum consiringat, & sit inconue-  
 niens tumori. Item Diocles ait peripneumonicos qui  
 \* ptisana chy-  
 lo annum sextum natu excesserint, post iniectionē \* suc-  
 co cibari oportere. Sed fortiores atque ualidos uiri-  
 bus, leuius: imbecilliores uerò, plenius. Omnes tamen  
 cōmuniter parum refici iubet, qui ultra annum quar-  
 tumdecimum fuerint hac passione agrotantes, adhi-  
 bēs acerrimos clysteres, & propterea noxios: dehinc  
 \* putans sine ratione ad dierum numerum cibum dandū \* putat.  
 Item libro quem de passionibus atque causis & cura-  
 tionibus scripsit phlebotomandos dicit, & adhiben-  
 dum tempus tacuit. Dehinc uentrem commouendum  
 \* exiccans existimat, exagitans atq; \* exsuccans interiora. Ad-  
 dit etiam unguentum naribus adnouendū, & succum  
 scamoniae, quam diagridium appellamus, & hellebo-  
 rum & opium \* succo conspersum, obsidens odora-  
 mentis perniciosissimis caput. Vsq; ad quintum diem  
 mulsum ex aceto solum dandum præcepit, excitans  
 \* que in aceto profectō tumorem, \* constrictiue uirtutis causa, &  
 est. immoderata abstinentia uires absumens. Vtitur etiam  
 cum his potionibus uexatiuis, absinthio infuso & thy-  
 \* dat mo decoctis: & eisdem \* dans quoq; transuorandū atq;  
 sorbendum passum cum aceto & mulso confecto. Quæ  
 omnia (ut ratio demonstrat) sunt acria, & propterea  
 tumori cōtraria. Item Praxagoras eandē pleuritico-

rum atque peripneumonicorum tradidit curationem. Aſclepiades uerò, ſecundo libro celerum, uel acutarum paſſionum, phlebotomiam recuſauit. Siquidem nullo dolore ægrotantes afficiuntur, & propterea ſi fuerit adhibita ex initio, ſanguis tenuis atq; ſubtilis exire uidetur. Sed \*errans plurimū (ut Soranus ait) neq; enim \*errat moderatio detractiōis ſanguinis, mutatione demonſtratur: neque etiam ſolos dolentes phlebotomandos accipimus, ſicut idem Soranus libris quos de adiutoriis conſcripſit, edocuit. Dehinc ipſe Aſclepiades ait, quosdam peripneumonicos dolere: oportuit igitur etiam nunc, ſicut in pleuriticis, non \*ex cauſa reproba-  
 re phlebotomiam, ſed à \*commorantibus inquirere, ut  
 trū in omnibus peripneumonicis obefſe \*regionaliter  
 uideatur. Prohibet etiā cataplaſmata, & uaporatio-  
 nes, quorum eſt utiliſſimus uſus, ob relaxandā ſtrictu-  
 ram. Item reprobatur clyſteres, atq; omnia medicamina,  
 & quidem rectè, ſed non ſuis conueniens placitis. In phreneticis enim clyſteres adhibuit. Item libris quos de uini datione ſcripſit, in febricitantibus, iugibus, in-  
 quit utendum clyſteribus. Dat etiam cum aqua mulſa hyſſopum, uel tragoriganum, & ſunt hæc acria, atque  
 medicofa, quæ Græci pharmacode appellant. Miteſ-  
 cente inquit interea paſſione, cataplaſmata adhiben-  
 da, atque cibus, aſſerioribus diebus, nutriendos æ-  
 grotantes exiſtimat, quum nos oporteat ſæpe leuio-  
 ribus diebus cibos dare: tunc puriores ſiquidem di-  
 miſſiones occurrunt. Item Titus huius ſectator bis in  
 die adhibendam inquit defricationem, quam quidem  
 ueluti quāſſantem in acutis paſſionibus reprobamus.  
 Themifon uerò, alia quædam de paſſione rectè com-  
 poſuit. Sed peccat iubendo eos ſecunda uel tertia die  
 geſtari

gestari, quoniam nondum sumpserit passio statum. Iubet etiam cum scarificatione adhiberi cucurbitam de-

\* quod discuti-  
at, & impa-  
ctos humores  
digerat, & ut  
loqui solet au-  
tor, quod stri-  
cturam soluat.

clinante acceſſione, quum sit adiutorij genus \* destri-  
ctiuum, & propterea proprium dimissionis: dat etiam  
bibere aquam frigidam, uel frigidae uicinam, & non  
est consequens sorbilibus cibis, atque curationi laxa-  
tiue potus constrictiuus. Si, inquit, incensa atque lon-  
ga fuerit acceſſio, ut ardore ac siccitate difficultatem  
faciat excludendi ea quæ tuſſicula emitti coguntur,

\* siue  
\* amygdalas  
amaras. Sic le-  
gendum oſten-  
dunt ſequētia.

dabimus pityidas, \* uel nucleos, aut cucumeris semen  
bibendum cum aqua, aut \* secundum modum collecta,  
& sunt hæc maxime contraria. Augmenti etenim at-  
que acceſſionis tempore, etiam aqua quæ nullius est  
qualitatis, noxia perſpicitur. Vtitur etiam amygdalis  
amaris, quæ ob amaritudinem tumores uehementius  
accendunt. Item Heraclides Tarentinus eandem iudi-  
cauit curationem adhibendam, quæ pleureticis est or-  
dinata. Multi Empirici potionibus atque sorbilibus

\* Pityidibus

cibis uſi ſunt. Item \* pityida, & ruta, & mēta, & tra-  
gorigano, & abrotano, & pulegio, atque origano:  
alii hæc ſingula, alij ſecum mixta adhibentes: ſic deni-  
que amyllum cum aqua percoctum melli admifcent, ac  
tunc amygdalas amaras tritas addunt, & hæc ſorbilia  
mouent ramo hyſſopi: dant etiam irin, & gentianam  
decoctam cum pulegio, & anagallide herba, & eryn-  
gio, & marrubio, & his ſimilibus, quæ omnia ratione  
circuſcripta \* reprobanda ſunt.

\* damnata,  
repuſcata.

\* Cardiacam  
paſſionē dicit,  
quā nos Syn-  
copē vocamus.  
\* Hæc ſynco-  
pe ſtomachica  
eſt.

### De Cardiacis. Cap. xxx.

Cardiacam \* paſſionem aiunt quidā duplici ſigni-  
ficatione nuncupari, communi & propria. Sed  
communem dicunt eam, quæ ſubſtantiam in \* ſtomacho  
atque ore uentris habuerit, ubi etiam mordicatio ſe-

quitur

quitur supradictarum partium, ut Hippocrat. primo  
 & secundo libro epidemion commemorat, & Erasistratus  
 libris quos de uentre scripsit: propriam autem  
 dicunt eam, quæ cum sudore fuerit, atq; pulsu imbecillo,  
 de qua nunc dicere suscepimus. Nomen autē hæc  
 sumpsit passio, ut quidam uolūt, à parte corporis quæ  
 patitur. Siquidem putant principaliter cordis esse  
 ægritudinem. Alij uero aliter sentiunt. Siquidem uul-  
 gus quadam consuetudine, propria atq; dominantia  
 \* magis nominibus appellat, ut magnum mare, sacrum  
 mare atq; luem \* deificam epilepticam passionem. Est  
 igitur in nobis proprium, atq; uigens, & dominium  
 uitæ continens, cor: quapropter tanquam magna pas-  
 sio ab ea parte quæ uim summæ potestatis habet no-  
 men sumpsit.

\* hæc vera  
 syncope est as-  
 fectu proprio  
 cordis excitata

\* nempe mor-  
 bum Hercu-  
 \* magni  
 leui.

Quid est cardiaca passio, vel quomodo eius  
 agnitio tradenda. Cap. xxxi.

**D**efinitiones \* enim Soranus dicere declinauit. \* Definitionē  
 Cognitio igitur siue intelligentia eius passionis eius  
 ab Artemodoro Sidenſi Erasistrati ſectatore tradita  
 eſt hoc modo. Cardiaca (inquit) paſſio eſt tumor ſe-  
 cundum cor. Item Aſclepiadis ſectatores aiunt tumo-  
 rem ſecundum cor, corpusculorum coaceruatione ſiue  
 obtruſione effectum. Soranus uero (cuius hæc ſunt) tu-  
 moris inquit ſignum nullum ſubeſſe quod in cardiacis  
 uideatur. Item cor pati, non ualde plurimis probabile  
 uidetur: ſed ait cardiacam paſſionem eſſe ſolutionem  
 celerem atq; acutam, qua diſiici \* corpora per omnes  
 uiarum particulas apprehendit. Fit autem magis æſta-  
 tis tēpore, atq; in uiris potius quam in mulieribus, &  
 calidis atq; iuuenibus corporibus, uel habitudine ple-  
 nis exercitis. Sed præcedētes cauſæ quibus hæc paſſio

\* corpora illa  
 prima & ato-  
 ma, quæ noſtri  
 corporis elemē-  
 ta ſtatuebant

sufficitur, multæ atq; uarie sunt: magis autem iugis indigestio, uel uinolentia, aut post ciuū lauacra, aut post cœnam uomitus, aut mœstitudo uel timor, \* in quæ consentiens corpus soluitur in sudores. Emergit autem frequentius quinta uel sexta die, in febribus continuis, uel ardentibus, atque \* flammatis.

Quomodo intelligimus eos, qui in cardiacam venire possunt, aut etiam in ipsa constitutos.

## CAPVT XXXII.

**I**ntelligimus eos qui in cardiacam passionem deeliues atq; proni uidentur, & eos qui sunt iam in eadem constituti, ex his signis quæ concurrunt. Sequitur

- \* talem febrem enim in passionē pronos, \* febris cauta, atq; celerrima syncopalem uocant Arabes & flammosa: pulsus celer, densus, humilis, & quasi humectus toto accessionis tempore, aliquando etiam usq; ad dimissionem, ut etiam, si feruoris releuatio fuerit quadam \* circumscriptione collecta, non tamen simili profectu pulsus quoq; erigi uideatur, quippe cū magis sui comparatione demersior esse noscatur: aliquando etiam ut inordinatus occurrit, sed non ita ut deficiens intelligatur sed celeritate coactus, implicatis saltibus, \* ordine caret \* ordinibus careat modo. Sequitur etiam fastidium, sitis immodica, somnus paruus, & facilis in suscitatio-  
 \* acri in quiete corporis iactatio. ne, hallucinatio, hebetudo, \* iactatio: Item genuū gelidus stupor, atq; cubitorum & tibiæ, crescēte accessione, uel usq; ad eius finē. Hæc concurrūt aliquando non præuexatis uiribus, sed ratione passionis effecta: aliquando uero præuexatis ob nimiam sanguinis detractionem, uel uentris coaccruatam effusionem, uel cuiusq; materie corporis immoderatā \* eliquationē, ut peiorantibus febribus dissolutio sit. Addunt uel attendunt quidam etiam aeris æstus \* uel utrum temporaliter



raliter \* abundant solutiones, aut æger sit lactea \* an multi ue-  
 corporis habitudine, uel si tenerum atque albidum, & lut populari  
 diffusum ac pingue habuerit corpus, & aquatum co- morbo virium  
 lorem, sit ne etiam hac passione tentari cōsuetus. Sed dissolutio re  
 hæc (ut Soranus ait) sunt incerta & instabilia. At ue-  
 ro si iam fuerit præsens, sequitur ægros articularum  
 frigidus torpor, aliquando etiam omnium crurum, uel  
 manuum, aut totius corporis: pulsus densus celer, par-  
 uus inbecillus, inanis, & quasi fluens: in crescente pas-  
 sione etiam demersus, obscurus, tremultus, & forni-  
 cabilis, & innordinatus ac deferens: attestante hallu-  
 cinatione, animi desponsione, cum uigiliis iugibus, &  
 quibusdam repētino atque coacernato per totum cor-  
 pus sudore. Quibusdam uerò primum ceruice tenus,  
 & uultum, paruus, tenuis, aquatus, dehinc per totum,  
 ut supra diximus, corpus plurimus, ac tunc crassius, &  
 \* trahiuosus, atque uiscosus, uel male redolens, tanquā \* glutinosus  
 lotura carnis, respiratio parua atque anhelæ, & insu-  
 stentabilis, & per \* projectum rara loquutio, ac tre- \* morbi pro-  
 mula. Ora pallida, oculi concaui, thoracis grauedo de- gressum,  
 bilitatis causa, animi defectus imminentibus accessio-  
 nibus. Aliquando etiam \* translatis lingua humecta: \* prolata  
 aliquibus uero ob complexionē tumoris parui in ui-  
 sceribus cōstituti, arida atq; sicca, attestante desiderio  
 frigidi potus. Deficiente \* ergo, uisus obscuritas, arti- \* egro  
 cularum liuor, unguium uncatio, quā \* gryposin uo- \* adunci vn-  
 cant, & plurimis mentis integer sensus, quibusdam gues  
 uero falsitas intellectus, cordis saltus crebrior. De-  
 hinc uehementius deficiente corporis superficies ru-  
 gosa, & ea quæ percuntibus frequenter occurrunt, ut  
 solutio uentris. Perniciosum etiam signum est inuo-  
 luntaria lachrymatio, hoc est sine ulla ratione: uel ocu

\* lippitudo  
\* vulgus vocat  
la taye, quasi  
telā. Ea saepe  
videtur in mo  
ribundu.

\* ob fastidium

\* virium exo-  
lutionem: ani-  
mi defectū ac  
deliquium.

\* perstringi, i.  
ut supra dixit,  
Solutione ten-  
sari.

\* lassati

\* demissum

lorum ex aliqua parte saniosa atque purulenta\* simi-  
litudo, uel ex\* oculi circulo, quæ nigro colore appa-  
ret nata albida macula quæ in unguis similitudinem,  
uel nascentis, uel crescentis lunæ cornibus respondens  
paulatim sumit augmentum. Hanc Græci *διουχα* uoca-  
uerunt: item coaceruata integri atq; non masticati ci-  
bi transuoratio, cum quodam sonitu, perniciem denun-  
tiat, & magis si immutata atq; indigesta post sumptio-  
nem fuerint immorata plurimo tempore, & tanquam  
in utriculo, moto uentre, sonitum reddant, quæ Græci  
*βόμβον* uocauerunt, Est enim signum mortuorum cor-  
porum, ut tanquam inanimato atq; insensibili tegmi-  
ne cibus depositus uideatur. Peius etiam omnibus cibi  
sumptionibus priuari, \* fastidio, atq; omnino accipien-  
da recusare, uel etiā uinum non appetere, aut post ac-  
ceptum cibum grauari potius, uel febrire: Tunc rur-  
sum in\* solutionem recurrere: ut leuiter resumptum,  
celeriter\* restringi, uel accepta reiicere, & uentrem  
fluere, aut labiorum pati tremorem: mordere etiam  
in accipiendo cibo, uel potu, cochlearia, uel poculorū  
labra. Etenim deficientis spiritus est signum tanquam  
\* lassantis, nec ualētis oris partes attollere, sed morsi-  
bus inuoluntariis succumbere. Est etiam grauius dia-  
phoreticū delirare. Siquidem neq; uini datione, neque  
uarietate ciborum ad subleuandas cōstantius uires uti  
possumus. Itē grauius est post dationē ac resumptionē  
rursum in febres recurrere. Tunc cū quadā mōstitu-  
dine accidit latēter disici per sudorem, atq; marcere.  
Etenim solubile ac\* dimissū fit agrotātibus corpuscu-  
li robur: atq; uisus obtusus: lingua aspera, & arida:  
præcordiorū etiā raptus ad superiora: & post cibum  
grauatio. Sic etiā agrotantes multis diebus marcere  
quodam

quodam demersi moriuntur. Neq; enim paruo atque simplici cibo sufficienter refici possunt: neque multo ac solido, ualentius\* tolerata occurrere digestionem in \* laesa ventri-  
 quibusdam etiam sine sudore uires soluantur, & na- culi  
 turalis uigor, dissectione occulta, quam græci ἀδύλον  
 Διαφύσσειν uocant, extinguitur: quum omnis corpo-  
 ris habitudo laxior, atque dimissa, & \* friabilis fuerit \* fluxibilis  
 facta. At si in salutaria signa uenire cœperint ægro-  
 tantes, pulsus resurgit: corporis frigus frangitur, &  
 difficultas respirationis minuitur, accedente animi  
 quadam securitate, & post sumptionem cibi, uirium  
 profectus: somnus quoque altior, tanquam post labo-  
 rem dormientium.

Vtrum ne febricitent cardiaci.

C A P. XXXIII.

**Q**Uæritur etiam utrum cardiaci febricitent: & plurimi quidem ante Asclepiadem febricitare cardiacos negauerunt. Alij uero contraria dixerunt, ut Apollonophanes Erasistrati sectator. Item Asclepiades plurimos inquit non febricitare. Libris enim quos ad Erasistratum fecit, & appellauit contradictorios, dico, inquit, cardiacos non febricitare: sed secundo libro \* oxeon non, inquit, febricitare frequenter cardia- \* ὀξεον νόσων  
 cos. Item Themison & Thessalus, Demetrius Aponicus quosdam febricitare aiunt: quosdam negauerunt. Demetrius uero Aponicus incipiente inquit passione atque crescente omnes febricitare. Post uero cum uehementescere cœperit febris, passio recedere fertur. Igitur qui nullum aiunt febricitare cardiacum, dicunt quod febricitantibus plurimus necessario feruor adest: & grauedo cum difficili motu corporis: & ariditas: uel tanquam \* uulnerationis singularum uiarum \* operatio.

sensus, & ruor, atq; extēſio præcordiorum nihil in-  
quiunt horum in cardiacis incurrere: quapropter ne-  
que febricitare probant. Dehinc ſecundum Aſclepia-  
dem febricula eſt, ſeruor plurimus in omnibus ſiue plu-  
rimis corporis parti. us, commutatione pulſus in uehe-  
mentem, ob obtruſionem facta. At in cardiacis neq; ma-  
ior eſt pulſus ſed magis humilis, neque uehemens, ſed  
magis imbecillus: neque ſeruor plurimus, ſed magis in  
aliis p. ruius corporis parti. us, in mediis omnino leuiſ-  
ſimus. Utendum igitur clyſteribus in his qui ſine fe-  
bribus fuerint iu et conſtantiſſime. Quidam uero  
concluſioni uiarum cauſam febrium aſcribentes, aiunt  
diſſectionem ſiue diaphoreſin diraratis partibus fieri

\* febrem uero  
iis denſatis nō  
pe ex affrica-  
tione corporū  
naſci.

\* ſic, i. cum fe-  
bre.

\* etiam ſi dia-  
phoreticus ſu-  
dor caſſauerit,  
repreſſusq; ac  
ſedatus ſit, ma-  
nere tamen fe-  
bris reliquias,  
quod oſtendit  
præceſſiſſe fe-  
brem, quæ ſyn-  
co non uel exci-  
tauerit, uel co-  
mitata ſit.

\* ac

\* qualia eſſe

totius corporis: \* in his uero febrem denſatis, quarum  
ex affricatione quadam naſci ac proſiciſci ſeruorem.  
Apollophanes omnes inquit cardiacos febricitare ſe-  
cundum Eraſiſtratum, ſiquidem cardiaca paſſio ex  
cordis tumore fieri uidetur, febricula autem magni  
tumoris ſit cauſa. Item aliqui nouelli ſcriptores aiunt  
non ſignū eſſe periculofæ paſſionis, ſine febribus ægro-  
tare, atque malignas paſſiones accedentibus fieri fe-  
bribus, \* tunc diaphoreſin \* uenire \* uel ceſſantibus ſu-  
doribus perſeuerare febriū reliquias. Sed hæc utraq;  
Soranus excludit, nam primo dicto reſpondens ait  
aliud eſſe ſignum, aliud accidens. Nam ſignum, neque  
recedit, & ſemper ſignificato coniunctum eſt. Acci-  
dens autem, quod Græci ſymptoma uocant, nunc adue-  
nit, nunc recedit, ex \* quibus eſſe intelligimus ſingula  
quæ febricitantium accidentia dixerunt, ut corporis  
difficilem motum, grauedinem, tenſionem præcor-  
diorum. Etenim aliqui febricitantes nulla ex ipſis  
patiuntur, ſi febricula ſecundum ſolutionem fuerit  
facta

facta: sed feruor mordicans, atq; febrē designans, \* tan-  
 quam ex alto, quibusdam cardiacis ineſt. Aſclepiades  
 ait ſecundo libro acutarum uel celerum paſſionum nō  
 ſemper ſed frequenter \* ex febricula fieri hanc paſſio-  
 nem. At ſi cardiacos ſine febribus eſſe uoluerit, quo-  
 niam non adſunt ſecundum ipſum febrīū ſigna, reſpon-  
 dere poterimus, cum peccare non uidendo uera febrīū  
 ſigna. Nam manifeſte atq; prompte in initiis acceſſio-  
 nis atticuli frigidi reperiuntur, & pulſus humilis &  
 imbecillus: quod ſecundis poterit obſci, \* quo putant  
 denſitatem uiarū eſſe febrīum \* cauſa. Item aliqui aiūt  
 \* complexa ægritudine ægrotare cardiacos, qui cum  
 febribus fuerint. Nam cum aliæ ſint uix laxatæ, aliæ  
 denſatæ, raritate diaphoreſis fit, denſitate & corpo-  
 rum adfricatione febricula. Nos uero Sorani ſequen-  
 tes iudicium, & ſolutione abſoluta fieri febres acci-  
 pinus, hoc eſt raritate uiarum, ut & ipſis eſt conſe-  
 quens, ſicut libris de febribus docuit. Item Eraſiſtrati  
 ſectatoribus reſpondetimus, falſum eſſe omnes febres  
 ex tumore fieri: ſiquidem quædam fiunt ſolutione. At  
 ſi hoc parum etiam probauerint, cardiacam tamen  
 nullo ex tumore fieri non negabunt. Nam quum ſint  
 ægrotantes integro iudicio mentis, & nullo ſenſu  
 doloris, uel cæteris ſtriſturæ ſignis afficiantur, cordis  
 ineſſe tumorem erit falſiſſimum, atque omnes cardia-  
 cos febricitare. Sed neque periculofas paſſiones ſigno  
 febrīum deſignari rectē dixerunt. Eſt enim cholericæ  
 grauīs atque periculofa paſſio, quæ nunquam cum fe-  
 bribus fit. Antecedere autem febres cardiacam paſſio-  
 nem uerum eſt, & aliquando ſudoribus ſolui, ſicut  
 etiam tumor ſoluitur in humorem purulentum cōuer-  
 ſus collectione \* ſuffectæ. Falſum etiā eſſe perſpicimus,  
 \* inducſa, &  
 \* cauſam.  
 \* complicata  
 \* conſecuta.

cessantibus sudoribus manere febriculæ reliquias. Ple-  
rique enim sine febribus reperiuntur. Dicimus igitur,  
(sicut omnes nostri methodici) quosdam sine febribus  
esse cardiacos, ut eos qui sanguinis emissionem soluuntur:  
quosdam uero febricitare. Nanque inanibus &

• ilibus, &  
partibus exter-  
nis quæ ante vi-  
scera sitæ sunt.  
\* occurrit

\* celatis locis, uel supra quæ iacuerint antea, apposita  
manu, tarda persequatione \* occurat plurimus, &  
mordicans ascendens feruor ex alto, febrium referens  
signum, attestante anhelatione feruenti, cum dele-  
ctatione frigidi potus. Quibusdam etiam lingua sicca  
atque aspera inuenitur.

Quis in cardiacis locus principaliter patitur.

CAPVT XXXIIII.

**P**Ræpati in cardiacis Erasistratus, & Asclepia-  
des cor dixerunt: Alij \* membranam quæ cor cir-  
cumtegit: alij diaphragma, hoc est membranam, quæ  
a \* uisceribus discernit intestina: Alij stomachum: alij  
pulmonem, \* atque iecur. Sed hi qui cor pati dixe-  
runt, aiunt primo ipsius se nominis testimonio iuari:  
siquidem ideo cardiaca \* dicatur passio, quod ex cor-  
dis ueniat causa. Nam cardiaci græci cor uocauerunt.

\* præcipua.  
\* propriè. i. per  
i καρδιακῶν.

\* falsum hoc  
quod pro con-  
fesso sumit.

\* quod

\* nempe motum  
qui in sinistra  
thoracis parte  
sentitur, esse ar-  
teriarum, non  
cordis: similes  
inter se ambo  
sunt.

Secundo, quod eidem cordi, in ipsa passione constitu-  
tis, saltus inesse uideatur, in sinistra parte, secundum pa-  
pillam, atque thoracis grauedo. Tertio ex ipsius passio-  
nis \* magnitudo, quæ fieri non posset, nisi aliqua corpo-  
ris parte principali atque \* propria \* patiente. Est au-  
tem cor præstans atque salutaris corpori particula, præ-  
ministrans omnibus \* sanguinem membris, atque spiritum.  
Sed his quidam occurrentes primæ propositioni respon-  
derunt, quod passio à magnitudine nomē sumpsit. Se-  
cundæ \* quomodo similis \* arteriarum cordis est motus  
quod grauedo etiam quibusdam cardiacis occurrit in toto  
thora

thorace, & nō solū in sinistra parte, quæ si fuerit, poterit hypezocote membrana patiente fuisse\* suffecta, uel cuiusquam alterius uicinātis corporis, si\* locis ascribendæ sunt causæ. Tertio dictæ respondententes aiūt, multas fieri periculosas passiōes, quæ non patientis cordis habeāt causas. Non enim ubi magna fuerit passio, necessario\* propriam corporis partem pati accipimus.<sup>a</sup> Quippe cum omnes partes propriæ sint corpori. Alij uero propterea magis falsum dicunt esse, cor ista passiōe uexari. Siquidē eorū testimonio quī hoc asseuerant, si propria pars atq; principalis salutē, & propterea\* mox pati cœperit, morte præuenit sensum: uulnerata deniq; cum fuerit, statim atq; sine ulla mora, mors uulneris antecedit effectum.\* At si multo paruissime fuerit lesa, nihilominus mortē necessario\* perficit, & non similiter cæteris partibus, aut emoritur, aut durefcit, aut in paralyfim soluitur. Sed his rursum primi respondententes aiunt, quod uulneratū cor celerius interficit, quoniam multis ante præcisis partibus uulnus\* accipere, &\* pomposa, atq; coaceruata sanguinis fit effusio, nec tamen diaphoresis. Quod autem neq; emoritur, neq; edurefcit, neq; paralyfi afficitur, argumentum est quidem non omnino cor pati negās, sed leuiter pati. Si enim cæteris similiter partibus corporis est natura confectum, iisdem necessario similes sustinet causas. Nos uero\* cum Sorani iudicio cū totum uidemus corpus in solutionem laxari, totū necessario pati accipimus: neq; ualde nobis de præpatientē loco certandum est, ne in occulta quæstione uersemur. Non enim aut\* significatio, aut curatio secundum hæc differenter accipitur, quū oporteat omnibus corporis partibus adiutoria\* prolitari. Aliqui deniq;

\* inuēta genita  
\* quamuis

\* præcipuam  
\* principem.  
¶ a Si quidē omnes partes nobiles ac principes esse dicunt, falsum id est: at si omnes partes integritati corporis cōstituendæ proprias & necessarias esse aiūt, verum id, sed τὸ ἀπορροιαῖα  
\* ambiguitate uocis fallit.  
\* magni momenti  
\* ac si  
\* perficit.  
\* accipit.  
\* copiosa  
\* ex

\* morbi cognoscendi & ab aliis discernendi ratio  
\* præcogitari

alios ex corde, alios ex membrana quæ cor circumtegit, aiunt diaphoresi uexari: & propterea eos qui ex  
 \* animo lib. membrana cordis \* soluuntur, adiuncto dolore laborare, qui punctionibus crebris egrum afficiat: eos uero qui  
 quuntur ex corde, grauedinem solam sustinere. Sed his quoque respondemus, quod signa sibi fingunt, uera existimantes, cum oporteat, sicuti supra diximus, patientibus quibusque  
 \* cordis uicinis atque contiguis \* cordi aliquando stimulantem dolorem, aliquando grauedinem consequi.  
 Quomodo discernimus cardiacos ab his qui stomacho patiente sudauerint.

## CAPVT XXXV.

**Q**UONIAM plerisque stomachicis adest in accessione sudor, atque articulorum frigus, cum paruo pulsu, & animi defectu & pallore, quæ omnia sunt communia cum cardiacis, horum quoque discretionem faciendam existimo. Asclepiades igitur hæc discernens ait, cardiacos, atque eos qui stomachi \* supinitate \* decoquuntur, inter nosci, quod in cardiacis \* omnis pulsus sit paruissimus, atque imbecillus, cordis uero saltus maior, & uehemens, cum grauedine thoracis, atque spiratione præfocabili: in his uero qui stomacho patiente deficiunt, \* atque coaccruant, cæteris arteriis pulsus cordis imbecillus inuenitur, \* exceptis cæteris accidentibus, quæ symptomata Græci uocauerunt. Nos uero magnitudinem \* pulsus in corde fieri cardiacis non inuenimus. Quippe quum cor ipsum pati sit existimabile potius quam uerum: grauantur tamen quidam thorace, atque præfocabili spiramento spirant: quidam stomacho patiente defecatione uirium sola fuerunt uexati: atque rursus, cardiaci quidam nulla spiramenti præfocatione iactantur. Dicendum itaque stomacho

nunc



nunc tumente, nunc\* deficiente feruorem atque dolo-  
 rem fieri sub his partibus pectoris quæ costis tegun-  
 tur, uel ex aduerso inter palas: aliquando etiam post  
 cibum\* pressuram. At uerò si defectione fuerit sto-  
 machus affectus, fluxor sequitur salinarum, & hume-  
 ta\* callositas, & nausea, uel uomitus liquidorum, at-  
 que cibi, frigus etiam articularum. Initio enim nunc  
 feruore nunc frigore afficiuntur. In cardiacis uerò ne-  
 que dolor neque post cibum grauedo, neq; uomitus es-  
 se perspicitur, & torpor frigidus idem atque æqualis  
 \*perseuerat. Dehinc sudor aliquando cardiacis cras-  
 sus excluditur, & male redolens, ut saniem uel cruo-  
 rem simulet: his uero qui stomacho patiuntur, tenuis  
 omnino atq; aquatus sudor inuenitur. Item animi de-  
 fectio stomacho\* incipiente magis acceptione fit, car-  
 diacis uerò, recedente. At si uero utraque passionis  
 eodem concurrerint tempore,\* obscuratur discretio-  
 nis fides, sed nihil curatio impeditur. Si quidem iisdem  
 adiutoris\* curentur. Item in cholericiis, & tetanicis,  
 uel tumētibus matrice, aut præfocatis plurimus sequi-  
 tur sudor, adiuncto frigido torpore, qui ita discerni-  
 tur, quum singularum passionum fuerit consideratio  
 perspecta. In\* alia enim uomitus: \*in alia colla incli-  
 nari: In\* alia matricem tumere: in alia\* tumorem ue-  
 hementem esse necesse est. At si nihil ex antecedenti-  
 bus causis, quæ passionem facere ualent, fuerit reper-  
 tum,\* si tamen præsens atq; prouocata corporis\* solu-  
 tio, quæ cardiacam designet, certo inesse passionem  
 dicimus: nec satis necessarium, unde illa solutio ue-  
 nerit, inuenire. Non enim curatio pro differentia  
 antecedentium causarum mutanda accipitur. Vo-  
 catur autem secundum aliquos quædam passio etiam  
 Cardi

\* imbecillo &  
 languido

\* vel grauita-  
 tis sensum: vel  
 ut aliquos an-  
 tea locis, somno  
 lentiam.  
 \* aquositas

\* non autem  
 incalcescit.

\* patiente  
 \* difficilior est

\* curantur

\* cholericæ  
 \* tetano  
 \* tumore ueteri  
 \* præfocatione

\* sit  
 \* virium exo-  
 lutio

*Cardimona* Cardimona, quam Græci Cardiogmon uocauerunt. Hanc necessario sequitur dolor oris uentris, quem plurimi idiotæ cordis \* dolorem uocauerunt. Generaliter autem cardiaca passio est solutionis, atque una acutarum & uehementium passionum, sed aliquando huic miscentur quædam stricturæ accidentia, ut tensio, uel tumor partium \* mediarum, quæ non speciali con-  
 \* *τὸ καρ- rlio xap- rimi idiotæ cordis*  
 \* *διαγίγναι xp* ter autem cardiaca passio est solutionis, atque una acutarum & uehementium passionum, sed aliquando huic miscentur quædam stricturæ accidentia, ut tensio, uel tumor partium \* mediarum, quæ non speciali con-  
 \* *hypochōdrio rum, sicut, uen-*  
 \* *tris.* cursu, ac significatione sunt cardiacis ascribenda.

Quomodo discernimus cardiacos ab his, qui prospero sudore liberantur, quem Græci Criticum vocant.

Cap. xxxvi.

\* *quod uidea tur & appa-*  
 \* *reat simile esse* **Q**uoniam etiam prosperi sudores, quos Græci Criticos uocant, habent quiddam circa \* uisum similitudinis cum cardiacis ob ipsam redundantiam, quippe in solutionem uehementium uel continuarum febrium salutari motu uenientes, utile duximus eorum ponere discretionem. Multi etenim imperiti Medici prosperos atque mediocres sudores constringentes, morbosa ægrotantibus reddiderunt corpora, diaphoreticos adiuuantes, causa mortis extiterunt. Quare eorum differentiam necessario ducimus ordinandam, quæ uaria ratione colligitur. Nam primò ex præteritis, dehinc ex genere passionum, & magnitudine, & temporibus, & sudoris ipsius ordine, & quâtitate, & qualitate significatio firmatur. Ex præteritis inquam quum cōsideramus utrum signa futuri sudoris diaphoretici, an salutaris præcesserint. Ex genere passionū, quum qualitatem attendimus passionis. Si enim solutio inest, sudor etiam inutilis ac diaphoreticus esse monstratur: sin uerò strictura inest, attendēda magnitudo. Parua enim passio diaphoresim pati non potest. Si au-  
 tem

tem magna fuerit, attendendum tempus. In statu enim totius passionis, atque \* temporalis acceptionis, uel lim- \* particularis  
pida dimissione, criticus magis dolor ostenditur, in ini- paroxysmi  
tio autem uel augmento, perniciosus. Ex ordine in-  
quam sudoris ipsius. Aequalis enim bonus, inæqualis  
malus sudor iudicatur. Ex quantitate signum accipi-  
mus moderationem considerantes. Modicus enim su-  
dor bonus, immodicus malus accipitur. Sed denique su-  
dantes, excessa \* moderatione, diaphoresin incurre- \* cum sudor ni-  
runt. Ex qualitate autem significationem accipimus, mius & immo-  
quum tactus iudicium adhibemus. Salutaris enim sudor ducus est.  
calidus, tenuis, & non malè redolens probatur: per-  
niciosus autem sudor, frigidus, & \* succidus, & malè \* glutinosus,  
redolens, atque putridæ carni similis inuenitur. De- viscidus, & re  
hinc ex præsentibus atque concurrentibus signis con- supra dixit,  
firmada significatio. Nam diaphoreticis, magis paruus traclusus.  
atque creber, & imbecillis, & inanis pulsus inueni-  
tur, thorax etiam grauatus cum respiratione frequen-  
ti, & iactatione, ac desponsione animi, uocis etiam te-  
nuitate, attestante pallore. Rectè autem sudantibus,  
pulsus erectior, respiratio faciliior, ac leuior efficitur,  
& in \* somno prona delectatio, & omniū aduersorum \* somnum  
minutio, cum animi atque corporis releuatione.

Quomodo curandi sunt cardiaci.

Cap XXXVII.

**D**Ehinc cardiacorum \* ordinamus curationem, \* ordinemus  
(Deridendi etenim sunt qui hoc passionis genus incurabile iudicantes reliquerunt.) Multos enim \* o- \* nos  
mnes Medici iuxta sententiam Sorani liberari uide-  
mus. Liuore nanque commoti, argumentatione turpi,  
aiunt quidam, eos liberari, non qui sint, sed uideantur  
esse cardiaci. Quapropter Sorani nos iudicium seruā-  
tes

tes, iacere facimus locis refrigerantiis, atque umbrosis, & obscuris, ut sunt plerumque hypogea, uel spelunca, atque ad aquiloniam partem \* conclusa, uel certe solis \* tactu difficilia. Semper enim atque magis in y. a passione solem præcauendum accipimus, & propterea uehementiæ eius ingressum, si qua ex parte uenerit, prohibemus. Conuenit etiam neque maiora loca esse, \* solubilis enim plurimus aer esse perspicitur: sed neque plus satis breuia: sunt enim præfocabilia, & quæ facile feruorem ex ingressu hominum concipiant, quos naturalis impedita spiratio aerem accipere, atque reddere anhelitus raptu necessario cogit. Denique si non fuerit naturaliter frigidus locus, hoc afflatimus, \* specularia detrahentes, nisi sol obsiterit, aut aeris \* inæqualitas adiungitur. Frigore inducto purgatior aer \* ingrediens locum, qui sua nouitate ac nutu accessu reficiat ægotantem. Flacellus etiam latenter aerem refrigerandum dicimus, aqua frigida aspergentes solum, & ea quæ \* influxione sui, quam Græci aporrhæam uocant, spirationem facilem ægotantibus facere ualent, circum proiici iubemus, quæ tamen sine ullo percussu atque odore graui \* ualeant aerem facere constrictum, ut uitis folia, aut myrti, aut quercus, aut pini atque lētisci, aut mali punici, uel rosæ, atque his similia. Sic enim \* corporis fluor aeris occurrentis afflatu densatus prohibetur. Decocto denique supra dictarum materialium liquore, frigido tamen terram persundimus. Cooperimenta præterea atque stramenta tenera & tritiora probamus. Etenim noua uaporatione sui corpora resoluunt. Generaliter autem ipsa lecti concubatio neque dura, siquidem uigilias facit, neque plus satis mollis, ut eji floccorum, uel leuium plumarum, crit

\* reclusa  
\* tactus difficilia. i. minime accessu, aut peruia.

\* solubilis

\* quæ fenestris obiciuntur, vulgò les chafis, les voirrie-res.

\* incommoditas

\* ingreditur  
\* effluxione

\* possint

\* spirituum dissipatione, Ataxo- quærit

erit procuranda. Etenum recessu facili corpori \* ce-  
 dens \* utrique orarum \* circūleuat tegmina, quæ am-  
 plexu quodam corpus \* cingendo, uaporatione sui re-  
 soluant. Denique etiam quum fuerit \* mollior, \* crunt  
 coarctanda \* straminum uelamento, ne facili (ut suprā  
 diximus) recessu concaua \* faciat. Lecti etiam latitu-  
 do atque spatium tantum probatur, quantum sufficiat  
 ægro, alterna conuersatione alterius loci frigus acci-  
 pere, ac \* desertum uapore carere, quo mutua uice  
 semper ueluti noua repetendo, frigida inueniat, ut sine  
 ulla lectorum mutatione, in eodem lecto mutatio fieri  
 uideatur. In altera enim parte ægro constituto, alte-  
 ram sternere poterimus: quippe quum sepe translati  
 ægotantes ex lecto ad lectum senserint defectio-  
 nem, atque paruo motu asperata passionis fuerit ma-  
 gnitudo. Tunc \* amplexu atque ligatione \* paulo \* te-  
 naci utemur articulorum, iubentes eos quiescere,  
 non solum corporis officio, sed si fieri poterit, etiam  
 cura animorū, lecto mutato ad \* grabata ægros trans-  
 ferendo. Augetur enim solutio meatu quolibet. Mul-  
 tum denique sanguine fluentibus prodesse immobilitas  
 ualuit. In statu autem accessionis fouēdum dicimus ca-  
 put oleo frigido, atque hispano recenti adhibito, etiā  
 æquali motu aëris accommodato. Densantur enim  
 corpora aëris motu percussa, atque plurimus sudor,  
 non solum \* cedentis aëris, uerum etiam irruentis tan-  
 quam reperiussu \* abstinetur. Utendum etiam spon-  
 giis teneris ex aqua frigida expressis, quibus ora atq;  
 colla \* ægotantes circumtegentibus uirium resum-  
 ptionem faciamus, temporum interuallis innouantes.  
 Tunc totum etiam pectus atque oris partes, eodem  
 modo percuramus, \* frigida infundentes spongas, ad-  
 miscentes

\* qua iusto  
 mollior est.  
 \* utrinque  
 \* attollit, susti-  
 net.  
 \* ac id contin-  
 gendo.  
 \* lecti concu-  
 batio  
 \* erit  
 \* superiniecto  
 stragulo  
 \* fiat  
 \* straminum  
 uaporatione  
 \* lintheis ac  
 uinculis, qui-  
 bus articulos  
 refrigeratos ob-  
 uoluunt & ad  
 stringunt.  
 \* paulum  
 \* a adstricta  
 \* lectulos hu-  
 miles, aut hu-  
 mi strata cu-  
 bilia.  
 \* cedit aër, cū  
 remouetur fla-  
 bellum: irruit  
 cū admoue-  
 tur, quod alter  
 natim fieri so-  
 let ab iis qui a-  
 gitato fiabello  
 uentū faciunt.  
 \* coercetur, re-  
 tinetur.  
 \* ægotatis cir-  
 cumtegentes  
 \* frigidas

miscentes etiam aceti quiddam, ac iugiter mutantes, ne perseueratione tactus ex uapore tepescant, & amisso frigore non ualeant facere densitatem. Aliquando etiam linteola tenuia tingentes similiter, aut succo plantaginis, aut polygoni, aut portulacæ, aut herbæ

\* p<sup>h</sup>ij  
\* viii

\* pulicariæ, uel semper \* uiuentis, aut myrti, aut rubi comæ, aut rosarum, uel mali punici decoctionibus, aut hypocistidis herbæ, aut acaciæ resolutæ ex posca, aut oleo hispano, uel lentiscino, pectori atque ori uentris apponimus. At si sudorum perseuerauerit fluor, probandam etiam asperginem quæ suo frigore ac propria

\* etiam refri-  
gerantia  
\* emplastica,  
psychetica  
\* refrigerantia

uirtute, uel obtrusione constringat, iudicamus: \* cuius frigerantia, atque \* obrudentia tactu. Densantia sunt hæc, terra samua & cimolia: \* frigerantia uerò, rosa arida, contusa atq; creta: etiam alumen scissum, plumbum exustum, atque lotum, gypsum, mala punica, cænathæ, acantha ægyptia, quam nos Latine spinam ægyptiam dicere poterimus. Hæc singula commixta, atque corpori aspersa per linteolum rarum, sudantibus locis, uel omnibus locis prodesse probantur. Oportet

\* ut ex iij le-  
ma diapasma-  
sa fiant

autem hæc singula \* diligenter contineri, atque ad summam tenuitatem deduci, ut patientibus irruentia, in iis ingressu quodam uehementem faciant constrictionem, & nulla corpus asperitate afficiant, qua possit æger aliter inquietari. Hinc nanque commotus Thessalus unus è principibus nostris eorum usum iudicauit cohibendum. Etenim rectè quoque ualentibus (inquit) parua cuiusquam asperitas contagio uigilias facere solet, stramentisq; irruens, terga iacentium, uel alias corporis partes laceffendo inquietat. Est autem possibile ex supradictis, & oleo hispano, aut alio similibus uirtutis, unctionem facere constrictiuam, non ir-

ratio

rationabiliter. Namque plurimi medici ad retinendos sudores mannam thuris oui alboribus conterentes, ita ut crassitudinem mellis simularent, tota corpora perunxerunt. Retenta etenim, ut ita dixerim, his uirtutibus corporis superficie, necessario solutio constringetur. Probamus etiam cataplasmata eiusdem uirtutis, sed alia simplicia, alia ex simplicibus composita, uel uariata. Pro magnitudine etenim passionis extendi, atque minui uirtutes medicaminum debent, ex quibus sunt hæc: Palmule nucleales quas <sup>\* caryotas</sup> cariotas appellant, tritæ cum oleo hispano, aut mirteo, aut lentiscino, aut melino, aut <sup>\* Rosaceo a-</sup> roseo asperso, admotoq; uel polenta, <sup>spersa, admo-</sup> præterea & palmule, sepe uino infusæ, aut aceto, aut <sup>teq;.</sup> posca uehementius profuerunt. Utremur etiam præinfusis Thebaicis palmulis, & malis cydoniis elixis singularibus, uel admixto amylo diligenter contrito, atque creto. Cogente passione, etiam galla tusa, atque creta admiscenda erit, uel acacia, uel alumen <sup>\* & hy-</sup> & hy- <sup>\* aut</sup> pocistidis succus, aut rhus Syriacus cataplasmatibus. Utendum & aliis simillimæ uirtutis, ut palmulis, & malis contritis singularibus, uel cum <sup>\* aceto</sup> altero, uel uitis <sup>\* Rubi quem</sup> foliis, atq; amylo, & <sup>\* Aizoo</sup> rubus, quæ Græci baton appel- <sup>\* Solano</sup> lant, uirgultis cōtusis, & contritis, myrto etiam, & polygono, & semper uiua herba, quam <sup>\* Rhois</sup> aizoon uocāt, & plātagine, & rosa, & uua <sup>\*</sup> lupina, & portulaca, & intybo, cum polenta, uel palmulis, & pane. Horum singula apponenda sunt pectori egrotantis, & præcordiis, ac frequentissimè mutanda, quò frigida perseuerent, atq; extēta medcantur. Possunt etiam <sup>\*</sup> rhus Sy-

\* horis

\* &amp;

\* cum supra  
duclis\* purissima fa-  
rina triticea,  
aut ordeacea.

\* in aqua

\* minimè

\* coherentem,  
solidam, firmā

\* symptomata

\* à Galen. sal-

sum esse mon-

strat p. assertim

in natura γαλ

αποχόλων, lib.

methodi.

dus \* uncis duabus donec coagulata omnia fiant, in-  
 ductibiliāque & digitis conuoluta nullam corpori  
 infectionem dimittant, ut unam \* uel eandem \* quali-  
 tatem sufficiant. Similiter enim imposita constri-  
 gunt fluida, atque laxata corpora, & stomachi uigo-  
 rem representant. At si tumor aliquis in præcordiis  
 fuerit, non sine præcautione erit cataplasmatibus his  
 localibus utendum: supra dictis denique erit panis ad-  
 miscendus, quo nimietas constrictiue uirtutis tempe-  
 retur. At si plurimus fuerit tumor, adhibendum sim-  
 plicis \* pollinis cataplasma, siue panis \* infusi, quod  
 Græci omen lysin uocant, iisdem scilicet locis, sed \* ne-  
 que calidum, ne corpus prouocet in sudorem. Nos de-  
 nique iuxta Sorani indicium præcordiis imponere hoc  
 cataplasmatibus genus solemus. Palmulas quas Græci  
 patetos uocant, conterentes cum melle leuiter præ-  
 cocto, asperso lini semine, atque contrito, ita ut qua-  
 litatem faciat \* inducibilem, & ut sæpe diximus quæ  
 attrectata manibus nihil de se inquinamenti dimittat:  
 Græci denique amolynton uocauerunt. Tunc linteo-  
 lo illitum apponimus medicamen. Vtimur etiam pane  
 cum palmulis: atque secundum pectus uel thoracem,  
 prioribus, & à tergo partibus aliqua ex supra dictis  
 apponimus. Potum dabimus frigidum, paruum, atque  
 paulatim, ne liquoris multitudine corpus irrigatum  
 lixetur, sed magis tactu frigide qualitatis densetur.  
 Tempus autem cibandi si adiuncta febricula diapho-  
 resi fuerit, erit ex seruire corporis accipiendum, si-  
 cut primo libro de febribus scribentes docuimus. At  
 si sine febribus fuerit passio, ex pulsu signum accipere  
 poterimus, cum leuiter erectum senserimus, atque  
 alia \* concurrentia fuerint leuigata. Etenim \* nunquā  
 ægros



egros nutrire potest accessionis tempore quicquam datum: quippe cum magis opprimat, atq; anxium faciat egrotantem. Quapropter affectandum artis industria, aliis rebus vires usq; ad dimissionis tempus seruare, & ita cibo nutrire. Vtimur\* nanque odoramentis. Hæc enim sensim quodam nutrimento reficiunt, ac resumunt, latentem adiectionem corporis faciētia, & cum quadam constrictione ac densitate. Denique neq; simpliciter, aut indiscretè omnibus debemus bene olētibus uti odoramentis, aut omnibus acrioribus. Alia etenim\* percutiunt: alia diaphoresim prouocant in fluorem. Sit igitur polenta infusa, atque panis assus aceto infusus, uel mala cydonia, aut myrta & his similia. Hæc enim defectu extinctam corporis fortitudinē retinent, sicut ratio probat, atque Democriti\* dilata mortis exemplum fama uulgatum. Vtendū etiam mulso bene decocto ne uentrem fluidum faciat. Oportet nanque tribus sextariis, etiam tres uncias mellis admiscere, & ad tertiam decoquere partem, & exinde singulos dare cyathos bibendos. Sic enim corporis seruabimus vires, usq; ad cibi tempus. Aliquādo etiam pyra concoquenda duracina, quæ crustumina uocant, uel cydonia mala: cum nondum audemus quicquam de uino dando tentare his utemur, quæ leniora proculdubio probantur. Erit enim suaue, atq; stomachum reficiens, & constringens supra dictum mulsum, tunc cum cibandi tempus uenerit, quod plurima cum cautione erit\* apprehendendum. Siquidem plerisq; ex initio accessionis febrium sudores concurrunt, plerisq; etiam in statu, aut declinatione. Cum itaq; inhumectum atq; siccum fuerit corpus, erit præcurandum unctione olei frigidi lentiscini, aut hispani: ora etiam fouenda

\* ad id

\* caput tētant

\* per triduum,  
paniscalidi va  
pore & olfa-  
ctu  
Vide Laertii  
lib. 9.

\* obseruandum,  
& ammaduer  
tendum, ne su-  
dore exeunte  
egroti cabēdi,  
declinationisq;  
tempus adesse  
omnino putet.

\* siccum enim  
corpus, hume-  
ctare proposi-  
tum est.

aqua frigida ex spongia, cum singularum partium at-  
trectatione. i. blanda frictione. Tunc collutione oris  
ex aqua frigida dentium limus detergendus. Dandus  
cibus simplex, sed aliquantulum coagulatus, ac frigi-  
dus, ne statim sudorem corpori moueat adiectus. Sit  
autem eius materia panis ex aqua frigida diligenter  
elutus, ut \* sui carcat \* difficultate, itemq; oryza, &  
alica ex aqua frigida, \* uel suauitatis causa quiddam  
decocti mellis admixtum. Pultes etiam non oleatæ,  
oua hapala. At si uires minime fuerint reparatæ, fe-  
bribus declinatibus, \* ut totius passionis minui magni-  
tudinem \* demonstrent, uariius est dandus cibus, ut cum  
prædictis demus aliquid pomorum, \* ut pyra duraci-  
na, & cætera quæ stringere ualent, & uini similitu-  
dinem seruant. Sed hæc nunc cocta, nunc syncera dare  
debemus, mala etiam cydonia atque ea quæ orbicula-  
ta uocant, & mespila, & paleales uuas, uel pensiles,  
quæ iandudum fuerint siccatae, & damascena, carnis  
etiam quiddam sed neque indigestibilis, neque diffici-  
lis, neque pinguis, neq; \* bromosæ, sed eius quæ sit &  
digestione facilis, & corporis densabilis, ac nutritibilis,  
& sufficiens leuamento fortitudinis extinctæ, ut sunt  
pulli columbarum, uel gallinæ pastæ, assæ, perdices, at-  
tagenes, quorum omnium pectora magis offerenda, &  
horum \* interius, cocta ac \* tenuiter accurata ex oleo  
aqua, anetho, & sale. Facile enim corrumpunt curio-  
sa, atque grauabiles conditurae. Item si friabilis fuerit  
caro assata, \* tanquam cornea efficitur. Quapropter  
si quisquam delectatione affectus \* accurari uoluerit,  
erit primo coquenda, tunc assanda. Dandi etiam por-  
cini pedes, ora, auriculæ, & summitates articulorum:  
dandum etiam cerebrum & uulue; dehinc hœdina ca-

\* omni: alij. ut

salu

\* siccitate ut

inquit.

\* &amp;

\* cum

\* demonstrat,

\* sicut

\* fatentiu, vi-

rosa, putida.

\* interiora, i.

uiscera

\* grauitur: alij

simpliciter

\* obserua dili-

genter

\* accurate

ro, uel \* mollium caprarū, uel syluestrium \* caprarum, \* tenellarū ac  
aut aprorum \* clunes, quas Græci  $\psi\acute{o}\iota\tau\epsilon$  uocant. Item iuencularum.  
ex mari mullos, squillas \* bācos, acus, labraces. At si fa \* caprearum.  
stidiosi fuerint egrotantes, damus spondylos, & con- \* lumbi potius  
chylia, buccina, peloridas. Si hæc omnia fastidio erūt, \* cancos  
dabimus ostrea, & echinos. Item olerum intuba, plan  
taginem, asparagos. Si neque ita uires surrexerint  
tanquam continuationem \* humaniorem indulgētiā \* humanioris  
pro dedignatione passionis accipientes, ad uini datio- indulgētiā pro  
nem descēdimus, quod ita \* summum generaliter pro indignatione  
bamus, ut album, atq; non \* confusum, & subausterum \* in summa &  
& medijs temporis eligamus: qualia sæpe ita uina pro turbidum.  
bantur, quæ Surrentina dicūtur, uel Falerna, & Tri-  
folina, uel Albana, quæ in Italia nata probātur: item  
Græca, Chia, & Lesbica. At si febres tenuerint cor-  
pus, leuiora, atque tenuiora offerenda erunt uina, ut  
sunt in Italia Sabina, & Tyburtina, & gentiliter  
Surrentina appellata, uel in Asia Trifolina. At si fe-  
bres nihil obstiterint, erit melius Surrentinū, uel Tri-  
folinum, atq; Albanum. Si uehementer corpus in solu-  
tionem disci uiderimus, & ex frigido corpore uexa-  
risine ulla febricula, dabimus nutritiora, ac firmio-  
ra uina, ut Setinū, & Falernum. Sunt enim hæc effi-  
cacia & quæ facilius omnia quæ de uino speramus, ac-  
celarent, sufficiētia fortificare, & totam releuare ha-  
bitudinem corporis, omni etiam parti atq; particule  
se se insertare, & per omnes tenuis uias celeri potu  
percurrere, alia quoque nutrimenta se cum trahere,  
& inducta corporibus insinuare. Sed hæc cum pri-  
mum dantur medio cibo sunt offerenda cum alica, uel  
quolibet simili succo. \* Aquata etiam atq; \* parua mo-  
deratione temperāda uel certè cū pane dissoluto atq; \* congrua

- \* *minus ac infuso dāda: dehinc paulo* \* *plus ac mediocriter mixta,*  
*cum aqua frigida, ac recenti, uel niuiū liquore. Conii-*  
*ciendum etiam ut mediocriter cibum demus, sed per*  
*interualla frequentius, præsentes iam fuisse dige-*  
*sta prædata. Quapropter melius erit paulatim atque*  
*frequenter offerre, quàm semel ægrum nutriendo gra-*  
*uare. Multi etenim largioribus cibis oppressi, refracti*  
*sunt potius quàm resumpti. Nam sicut parua scintilla*  
*plurima coaceruatione lignorum opprimitur, uel lu-*
- \* *flamma ac-* *cerne* \* *flamam accersens, olei multa infusione fru-*  
*creseens* *stratur, parua autem adiectione, atque sumptione re-*  
*crecit, & rursum ardescit, non aliter corporis uirtus*
- \* *dissipata, ex-* \* *insumpta immodicis nutrimentis oppressa mortis da-*  
*hausta.* *bit effectum. Signa autem detrahendi uini hæc sunt.*
- \* *infracti* *Primo torpor atq; stupor corporis* \* *infractus: pulsus*  
*ercitior: sudoris quoq; fluor primo non frigidus, de-*
- \* *abstentus* *hinc* \* *ablinetur: sonuus insequens, & ad omnia quæ-*  
*que facilis ægrotantis arrisio. Tunc denique oportet,*
- \* *confertim:* *non* \* *dense atque semel uinum detrahere, sed paulatim*  
*abgius.* *subducere, & magis si febres nullæ fuerint repertæ.*
- \* *quæ vires es-* *At si post sudoris* \* *abstinentiam, febrium fuerint ac-*  
*se reparatas do-* *cessiones subsequutæ, & ægrotantes sufficienter re-*  
*cet.* *sumptos senserimus, omnino uinum extemplo detra-*  
*himus. Sin uero adhuc imbecillos uiribus uiderimus,*  
*dabimus uinum moderatione cautissima. At si forte*  
*cibum reiectaueyint, debilitate stomachi concurrente,*  
*constrictiuis medicaminibus utemur, non solum an-*  
*terioribus partibus, sed etiam posterioribus pecto-*  
*ris apponentes, addita articulorum ligatione, &*  
*appositione cucurbitæ, multa flamma subiecta, quæ*  
*infigenda erit ori uentris, atque interdum à tergo,*  
*nunc ante cibum, nunc post cibum, qui quidem fre-*  
*quen*

quenter ac pene continue erit offerendus. At si in <sup>\* totum</sup> to- <sup>\* continerint</sup>  
 to non <sup>\*</sup> tenuerint cum uino accipientes, tunc ex aceto  
 dabimus quicquam. Si neque ita, rursum ex aqua ten-  
 tabimus dare. Plerique enim ex uino atque aceto su-  
 mentes, cum accepta non tenuissent, aqua coniuncta  
 magis cibos tenuerunt. In his uero qui fastidio uexan-  
 tur, erit tentandum ciborum uarietate pugnare. So-  
 lent enim ueluti tentandi pulmenti causa, ex multis  
 parua sumendo, unam facere cibi sumptionem. Affe-  
 ctanda etiam <sup>\*</sup> odoramenti resumptio erit, uel nu- <sup>\* odoramenti</sup>  
 tribilium cataplasmatum atq; <sup>\*</sup> ductionum appositio. <sup>\* inunctionum</sup>  
 At si omnis spes fuerit absumpta, erit per clysterem  
 cibus iniiciendus, sed neque ptisanæ, aut cuiusquam  
 labilis qualitatis, quod facile lubrica faciat intestina.  
 Est enim perniciosissimum in cardiacis, fastidio <sup>\*</sup> at- <sup>\* presente</sup>  
 testante uentris fluorem commouere. Quapropter  
 erunt <sup>\*</sup> hæc ex lenticula adhibenda, & primo par- <sup>\* cataplasmata</sup>  
 uissima. Tunc in uino cum aqua panis attritus, & ex-  
 pressus. Sic enim corpori fit additio: atque uires re-  
 surgunt: & stomachus iamdudum supinus fortifica-  
 tur, <sup>\*</sup> altiora <sup>\*</sup> constringentur. At si omnes partes <sup>\* quæ sunt in</sup>  
 fuerint solutione laxatæ, similiter hæc omnibus sunt <sup>profundiore</sup>  
 adhibenda, in illis etiam quæ occulta diaphoresi con- <sup>corpore</sup>  
 tabescunt. Differentia etenim accidentium muta- <sup>\* constringun-  
tur.</sup>  
 ta uidetur, genus autem passionis idem manet. De-  
 binc si profectus quisquam fuerit supra dictorum ad-  
 iutoriorum, erit implenda resumptio usque ad perfe-  
 ctionem desideratam: sed tunc à lauacro temperan-  
 dum, aut multo tardius adhibendum. At si febres per-  
 seuerauerint, ut in marcorem uenire ægritudo medi-  
 tetur, quem Græci marasmon uocant, ad eius cura-  
 tionem descendemus, sicuti libris de febribus scriben-

tes docebimus. Hæc est secundum Soranum cardiacorum methodica curatio.

Quomodo aliarum sectarum principes cardiacos curauerint. Cap. xxxviii.

**A**ntiquorum plurimi cardiacorum curationem tacuerunt, aliqui uero memorauerunt, ut Serapionis, atq; Heraclidis sectatores, & quidam Herophili, item Asclepiades & Themison paruissime quidem, at uisdem deceptionibus implicati. <sup>a</sup> Phlebotomant enim, & clysteres adhibent acerrimos, & ob calefaciendum articulorum frigus pannos applicat calidos, & Linas oleo infusas, ac sulfure fumigatas. Tetrunt etiam oleo ueteri ac sycionio cum pipere sulfur, & cachry, & ammoniaci guttam, & laserpiciu cum bulbis. Cataplasmant præterea ex lasere & bulbis,

\*sympasmatib. utetes, quæ nos aspergimes dixerimus: item & calce cum pipere: cibus acribus utentes, atque

\*edacibus: \*alij salsamento, & lasere: & per totum diem atq; noctem uino usq; ad ebrietatem replerunt.

Alij uero in aquam frigidam \*ægros deposuerunt. Eudemus Themisonis sectator ait per clysterem aquam frigidam iniiciendam. Sed hæc omnia graua, atq; execrabilia, & ægrotantibus perniciofa esse perspicimus. Etenim phlebotomiam nihil iugulatione differre ratio testatur. Quippe cum hæc faciat quæ ipsa nititur

passio, mentem disicere, & corpus in mortem per sudores soluere, ac ad sua <sup>b</sup> primordia renocare defluxionem, atq; casum uirium augere. Quibus deniq; cōmoti eorum successores aiunt esse eos phlebotomandos qui proni ac decliues in cardiacam sint passionem, non aduertentes, quia ipsa quoq; in passionem prona decliuitas nulla re alia corpus affici quàm solutione testatur.

¶ a ea remedia videtur instituta ad ἀναλυτικὰς, quas ob symptomatum similitudinem veteres ij medici ad Cardiacū morbum pertinere credebat.

\* alij vocant διὰ πᾶσιν αἵματι \* erodentibus \* aliis.

\* id valet ad syncopen nata ex immodica diaphoresi

¶ b è superficie corporis materiam retrahere ad cor, & eas partes quæ præcipue ac potissimum sunt affectæ.

testatur. Clysteres etiā adhibentes quos utiles probauerunt corpora resoluunt, & ob acrimoniam aperiunt. Sed aiunt coaceruatā atq; celerē per superficiem corporis \* insumptionem retineri, cum ad uentrem, uel <sup>\* dissipationē</sup> intestina fuerint conuersa fluentia. Hoc quidem si more mechanico, ac simili miraculo se facere posse promittunt, ut aperientes uentris interiora, superficiem corporis claudant, erit credibile quod promittunt. Sin uero, ut in omnibus uidemus, superficie fluētia augeri potius quam minui interiorum fluxu, debilitate crescente cognoscunt, \* contrarius proculdubio clysteris usus accipitur, atque fluentium relaxator. Dehinc consequens non est, imò etiam incongruum iudicandū, articulos \* igneis medicaminibus conficere, ut ex alto ad semet materiam ducant. Iniicere quoq; intestinis acriora, ut illuc concurrens ex articulis materia, atq; ex omni corporis superficie attrahatur, rursus ad altiora corporis conducta, similis erroris esse probatur. Est igitur melius propria uiarum ac naturæ spiramenta seruare, & non infracta corporis fortitudine, acutiori atq; celeri solutioni corpus aptare. Feruentia uero & ignea & urentia ad uisa mentis simplicia, quæ appellant phantasiam, sunt frigori atque torpori congrua, ad uirtutem tamen incongrua. Est enim solutioni accidens atque comes corporis frigidus torpor, qui seruētibus rebus aucta passione necessario duplicatur. <sup>c</sup> Seruiunt enim dominantibus appendentia. Dehinc acria, siquidem non sint mitigatiua, celeritatem passionum acutiorem faciunt adiuuando. Prohibemus \* iniectionem aquæ frigide. Siquidem celerissime calefacta interiorū seruire \* adiuuet solutionem: facit etiā delectatione quadā uentris officiū pro-

\* noxiū & inutile

\* ignis more feruentibus, ac rodentibus.

¶ c si frigidus torpor solutionem sequitur, & acria solutionem augēt, augebunt & torporē. Nam torpor qui appendet solutioni dominantis, ei seruit, & cū ea simul augeatur.

\* cum clystere adiuuat



uocari. Non aliter & in aquam frigidam deponendos prohibemus egrotos: non enim manet lenis atq; mitis

\* quæ ex aqua  
frigide balneo  
perficitur.

\* est

\* apta compa-  
ratio

\* corpulentia  
videtur

\* noscitur

\* constrictio. Item ex sinapi cataplasma prohibemus. Siquidem \* sit recorporatiuæ uirtutis, quam græci *ταχυρρησις* uocant, cum passio atq; eius celeritas mitem demonstret atq; exigat curationem. Præterea sinapis acrimonia hortationem fieri sudorum, nemo est qui nesciat. Sicut enim semper lachrymā \* commouet oculorum acrioris humectatio collirij, non aliter supradicta contingunt. Item bulborum putamina molliunt, non constringunt. Illa uero quæ eorum \* corpulenta uidentur, recorporatiuæ uirtutis esse \* noscuntur. Reprobamus etiam aspergines ex calce atq; facibus, & pipere. Hæc enim singula corpus incendunt, & in ignis uicem suburunt, & superficiē corporis uulnerāt: quo fit ut sæpe transitum faciant in grauissimos tumores. Nō sunt hæc deniq; ex genere mitiū adiutoriorū. Est etiā iners allium dare atq; laser, & salsamēta, uel cōmuniter acriores cibos: sunt enim digestionē in uentre difficiles, \* atq; in spiratione corporū tardi, & inflant. Hæc nūc communiter omnib. respōdēda. Etenim Tarētinus Heraclides phlebotomat atq; clysterizat, & calidis, & laxatiuis utitur cataplasmatibus. Nunc quomodo Asclepiadem adhuc quidā rectē loquutū accipiant, & ea quæ posuit principalia, retractemus.

\* digestionē ac  
distributionē  
in corpore.

Vtrum rectē Asclepiades cardiacos curauerit.

#### C A P V T. XXXIX.

**H**ic quoq; secundo libro celerum, uel acutarum passionū prouidens ne qua sit in corpore cruditas, clysteres adhibet operātissimos, ob \* trāsersionē faciendam. Primo nescius quæ sit operans in cardiacis causa, & tanquā \* Herophilus sectator indigestionē,

\* auersionem,  
& reuulsionē.  
\* Herophili se-  
ctatores

atq;



atque corruptionem intuemdam existimans: Secundo ignarus, quia post antecedentem diem esse in corporibus indigestio potest: at uerò cardiacorum passio frequenter quinta, uel sexta die emergere perspicitur. Tertio est grauis, atque noxia clysteris iniectione, non solum solutione laborantibus celeri, sed etiam strictura affectis. Siquidem commouet atque turborem corporis efficit, quando fuerit operosior ac frequens: ut uerò Asclepiades iubet in diaphoreticis \* interfici, liuor esse probatur. Ipse denique Asclepiades de peripneumoniacis scribens confitetur noxios esse clysteres, dicens, clysterum genus nō in peripneumoniacis solum noxium, sed in omnibus etiam sine febre passionibus insidiosum, atque uexabilem corporum, eorum usum \* iudicans, item specialiter indicans iniectionum uexatione corporum solutiones augeri, atque iactationes, & sitim uehementem. Siquidem sunt inquit, uirium captrices. Idem clysterum uexationem etiam in pleuriticis demonstrauit. Simuliter & in phreneticis tanquam interseptricem metuit uentris turbam solutionem, quorum debuit memor neque in cardiacis clysteres adhibere. Alios enim plurima stercoreum grauatione oppressos, & propterea sudantes salutare est releuare clystere ad mentis \* alienationem detrahendam, sed hoc simplici atque miti usu clysteris, quos ita affectos non dicimus esse cardiacos. Item post iniectionem adhibet cataplasma sinistrae mamillae constriictionis uirtutis: sed corpus ob excludendum frigidum torporem calefaciendum probat unctionibus olei ueteris, ac defricandum manibus calidis, & pannis circumtegenda loca: ex quibus, calefactiones atque unctiones superioribus dictis excludendas asseruimus.

Constri

\* inimici noxiū

\* abdicans

\* alienationem

Constrictiua uerò cataplasmata non solum sinistrae  
 mamulae erunt apponenda, sed omni pectori, atque  
 praecordiis. Erat autem Asclepiadi consonans appro-  
 banti tumorem in corde constitutum, similiter laxa-  
 tiua cataplasmata eidem adhibere. Dehinc est incon-  
 gruum, atque non consequens affectare per clysterem  
 e corde aliquid trahere, & constrictiuis cataplasma-  
 tibus e superficie corporis materiam ad id quod pati-  
 tur reuocare, ut stricturam quam esse in tumore cor-  
 dis aduerterat, duplicare uideatur. Iubet etiam dari  
 uinum \* noctibus, diurnis, atque iugiter: sed id uinum  
 cui salem miscuerimus, & quod appellauit tethalaf-  
 somenon. Citò enim inquit currit, ac labitur, & ad  
 omnia corporis membra peruenit. Cibum dat betam  
 cum lenticula, quem appellauit seutlophacen, uel len-  
 ticulam cum ptisana, aut oryza, aut alica, uel aliqua  
 ex maritimis, & quid ultra inquit? ea nos dare con-  
 uenit, quae aegri fuerint uoluntati gratissima. Pro-  
 bat autem uinum dandum \* post cibum: siquidem so-  
 lum facile \* penetret, ac \* pertransseat corpora, non  
 aliter quam si sine ulla faece per \* liquatoria funda-  
 tur, quorum cauernae, nullis obstantibus, facile acci-  
 piunt, atque reddunt accepta. At si post cibum (in-  
 quit) datum fuerit, manebit, non aliter quam si cum  
 faece, ut supra dictum est, in liquatoria fundatur. Iu-  
 bet etiam meracum non mixtum dari. Hac enim ra-  
 tione (inquit) exusta uiae tanquam ex igni condu-  
 ctæ sudorem retinendo constringunt. Est autem iners,  
 & inertiae plenum, tota die atque nocte uinum dare,  
 & cibo nutrire. Plurima enim adiectione nutrimenti  
 uires opprimi necesse est. Item ptisana uentrem com-  
 mouet, in fluorem lapsum, \* suae faciens qualitatis.

\* noctu, inter-  
 diu

\* ante  
 \* penetrat  
 \* pertransit  
 \* per colum

\* sua fundens  
 & patefaciens  
 qualitate.

Contra

Contraria denique lenticulæ qualitati probatur. Vinum quoque incongruum, atque intemporale, & immodicum probatur. Incongruum, siquidem est falsum, quod appellauit tethalassomenon, & propterea uentrem \* soluat, & ex omni corporis parte uires \* deponat. Sit præterea inflabile, atque uirium uexabile, non solum ægrotantibus, sed etiam sanis hominibus. Forsitan<sup>a</sup> hoc & feruens \* dederit. Tacuit enim frigidum dandum. \* Culpans denique libris, quos de lue conscripsit, Cleophanti sectatores uinum frigidum dantes. Immodicum diximus, siquidem plurimum \* det atque extentum: & meracum temperamento querit, cum etiam sani quanto plus biberimus, tanto plurimum sudoris effundimus. Intemporaliter autem: siquidem ante declinationē dandū iussit. Est præterea ridiculum, quod post cibum dandum uinum propterea \* dicat, ne citius currens corpora pertransseat, probans e-  
 \* interdcat  
 contrariò falsum dandum, quo citius corpora penetret, ac suos effectus exhibeat. Hic est ille Asclepiades frigidans, atque calefaciens, exantlans atque replens, & contrariis semper utens rebus, in his passionibus.

Vtrum rectè Themison cardiacos curauerit. Cap. XL.

**T**hemison uerò quædam rectè dixisse perspicitur ob cardiacorum curationem, quædam prauè. Vino nanque cum amylo, trito cum bulbis, & ammoniaci gutta cum uino & oui albore, & pipere trito cum sinapi, corpora defricanda existimat. Dat etiam cibo allium cum pipere: dehinc in scaphulam deponi iubet ægrotantes, quæ sit aqua plena calida. Item post cibum adhibet gestationem, siquidem sint, inquit, imbecilla, ac debilia nimium corporis officia, & indigeant

geant hoc adiutorio, quo partim etiam caro commo-  
 ueatur, \* sed <sup>a</sup> promota substantia, hoc est spiritu, at-  
 que nutrimento, ex quibus concreta perspicitur: quæ  
 omnia facere ualet gestatio, omni corpori suffundens  
 materiam. Mox denique inquit alleuatos, atque ma-  
 gnitudinem accipientes pulsus inuenimus. Sed hæc Af-  
 clepiadis nugis sunt adiungenda. Demonstrauimus e-  
 nim feruentium medicaminum fricamenta esse neces-  
 sario noxia, & sinapi. Tentat etiam instabiles ci-  
 bos: & quanquam hæc sint omnibus celeribus atque  
 acutis passionibus inimica, multò tamen uehementius  
 cardiacis. Gestatio uerò & incongrua, & intem-  
 poralis esse probatur. Incongrua inquam, siquidem sit  
 laxatiua. Omnis etenim motus uiarum efficit rarita-  
 tem. Intemporalis autem, siquidem post cibum fieri  
 iubeatur. Etenim si sanos post cibum uexat motio,  
 non permittens naturæ quadam requie, ac tacito mo-  
 tu ad suos effectus \* accepta perducere, quid sperare  
 de ægris ac solutione laborantibus poterimus? Pulsus  
 uerò post gestationem erigitur cardiacorum, non ob  
 resumptionem uirium, sed ob turbationem corporis  
 motu conceptam, ex qua magis \* adiuuari passionem  
 dissolutione corporis iudicamus. Hic ratio cele-  
 rum cum febricula passionum curationis  
 terminatur. Nunc transeundum ad  
 eos qui sine febribus esse  
 noscuntur.

\*

C A E L I I A V R E L I A -  
N I M E T H O D I C I S I C -  
C E N S I S O X E O N , L I -  
b e r T e r t i u s .

De Synanche.

Cap. I.



Elerum cum febricula passionum curationem præscriptis tradidimus libris : nunc autem earum quæ sine febribus esse noscuntur ordinabimus, quo cunctarum perfecta distinctio compleatur. Initium nanque à synanchica passione sumemus, quæ nomen à suspendij similitudine habet, quòd non aliter quàm laqueus præfocans interficiat: nam Græci Anchonas suspendia uocauerunt, siue quòd spiritum continendo spirationem neget: græci enim συνέχεειν continere appellant. Alij uerò etiam cynanchen, uel lycanchen hanc passionem uocauerunt, siquidem frequenter hæc animalia afficit. Nam canes cynas, lupos \* lycos uocauerunt, quorum quoque similes uoces, siue ululatus in synanchica passione constituti, cum præfocari cœperint, emittunt. Synanches igitur alia est sine manifesto indicio, alia cum uisibili atque manifesto: & alia intra oris spatium, alia exterius, alia ex utroque, \* hoc exteriore, atque interiore, parte dextra uel sinistra, aut in utraque. Denique quidam specialem discretionem etiam nominibus posuerunt, ut Valens phisicus libro tertio curationum. Eam igitur quæ sine manifesto tumore est, sine nomine reliquerunt. Eam uerò quæ cum manifesto, si in \* dextra & sinistra parte faucium utraque (aiunt) parte \* interiorum fuerit, cynanchen uocandam

uocandam. Siquidem facit difficultatem spirationis, atque oculorum prominentiam, & linguam procidentem, tanquam canibus avidis sæpe contingit, cum ea quæ minimè transuorare possunt, admonente natura, auiditate impauida, minas cōtemnentes inuadunt, quæ sæpe faucibus in hærentia, atque ancipiti retentione tardata, neque percipere, neque reddere ualuerunt. Eam uerò, quæ in altera fuerit parte, paracynanchen uocauerunt. Item in exterioribus, atque utraq; parte tumore constituto hyanchen appellauerunt. Siquidem suum colla his sæpißimè inflatioibus \* afficiatur, quos Græcè hyas appellant. At si interius atque exterius, & in \* utraque parte fuerit tumor, tunc proprio nomine synanchen memorant nuncupandam. At si in altera fuerit \* parte, parasynanchen. Nihil autè refert speciales differentias proprietate nominum separare. Antecedentes causæ quibus hæc sufficitur passio aliquæ sunt occultæ, aliquæ manifestæ, atq; cæteris quoq; communes passionibus, maximè tamen conabiles atq; laboriosi uomitus, plus etiam si post cibum iam corruptum. Item uinolentia, uel niuis potatio, aut exclamatio uehemens, atque eodem modo perseverans, quam Græci monotonon uocant: Item Catarrhus, & acriores cibi præter consuetudinem accepti, item feruentia, atque ignita medicamina pota, uel purgatio per helleborum prouocata, quibusdam etiam fœminis mēstrualis retentio purgationis. Afficiuntur autem hac passione magis uiri quàm mulieres, quorum plus ætatis mediæ & iuuenes, quàm pueri atque senes. Hanc \* diffiniens Asclepiades passionem secundo libro explanatorio aphorismorum Hippocratis, synanche, inquit, est humoris fluor, siue humectatio faucium, uel

summi

summitatis ipsarum, sepiſſime ex capite accidens, ſed hoc peccanter\* diffiniunt. Omnis enim humoris fluor\* definiit quem rheumatifmum uocant, multi liquoris eſt lapſus, ſiue egeſtio. In ſynanchicis uero tumor uidetur, & nō, ut ſupra diximus, humoris plurimi egeſtiones, niſi hoc aliquando ex preſſura uenerit. Nos uero iuxta Sorani ſententiam ſynanchen dicimus difficultatem tranſuorandi, atq; præſocationem acutam ob uehemētiam tumoris faucium, ſiue in locis quibus nutrimenta tranſuoramus. Adiecta eſt autem tranſuorandi difficultati præſociatio celerrima, ſiue acuta, ad diſcretionem tumoris tonſillarum ſiue uuæ. Vbi enim ſynanche fuerit, etiam tumor neceſſario locorum ſupradictorū conſequetur, ſed non illico, ubi tumor fuerit eorundem, etiam ſynanche nuncupatur. Siquidem qui mediocri difficultate fuerint tranſuorandi impediti, nondum ſynāchici uidentur. Hæc enim in magno tumore paſſio intelligitur habere ſubſtantiam. Item ad diſcretionem præſociationis illatæ per laqueū. Eſt enim ipſa quoque acutiſſima, atque celerrima præſociatio, ſed non ex tumore deſcendens.

Quæ conſequantur ſynanchicos. Cap. II.

**S**equitur autem eos qui iam paſſione tentantur querela ſine ulla ratione, atq; difficilis motus colli, & gutturis. Item ſaliuatio plurima præter tumorem, & ſubdolens faucium ſenſus, cum aſperitate ſenſibili. Item difficultas tranſuorandi liquoris ſoliti, ſaliuarum more collecti: \* tunc ſpirationis uelut impedimentum, tanquam, \* obſtantis craſſioris humoris. \* obſtate craſſiore humore  
Surgente uero ac crescente paſſione, ſic ut manifeſto tumore pars fuerit rubens facta, uidebitur tumor ſau-

cium, atq; uuae, & supra linguam partium, & summis  
 tatis gutturis, cum difficultate transuorationis omnium  
 acceptorum. Præfocatio etiam pro tumoris modo,  
 spirationis difficultas, & nausæarum prouocatio. De-  
 hinc sicca \* tensio si quis os ægrotantis aperuerit, &  
 digito linguam \* oppresserit, inuenitur. Crescente ue-  
 hemetius passione, omnium tumor efficitur, colli atq;  
 uultus, & humoris crassioris, ac saliuarum fluor, oculi  
 pronuntes, sanguinolenti, & uenarum extensio. At  
 si peius increuerit, lingue ultra dentes ad exteriora  
 prolapsio, ariditas siue siccitas faucium, articularum  
 gelidus torpor, pulsus celer, densus iacendi difficultas,  
 & magis in supino schemate, uel in latere: frequens  
 etiam sedendi cupiditas, item loquutio non articulata,  
 sed confusa, atque cum dolore. At si in exitium passio  
 cœperit ferri, liuor uultus: uocis amputatio: gutturis  
 atq; pectoris stridor: & recursio, siue recursus poti  
 liquoris: pulsus defectio, quam Græci ἀσφυξία uo-  
 cant, & quibusdam caninus uocis sonitus, quibusdam  
 oris spumatio. Tunc etiam necessario mortis effectus.  
 At si sine manifesto tumore fuerit passio, sequitur \* col-  
 lorum tenuitas, cum extensione atq; subreptione infle-  
 xibili. Item uultus & oculorum cauitas: frontis exten-  
 tio, color plumbeus, spirationis difficultas plurima,  
 nullo, ut supra diximus, manifesto tumore, siue \* infla-  
 tione aliqua apparente, neq; in internis, neq; in exter-  
 nis partibus, hebetudo plurima, atq; imbecillitas ægro-  
 tantis: & celerrimus, uel \* acutus cum præfocatione,  
 mortis effectus. At si circum colla se \* ignis sacer in-  
 fuderit, siue in pectore apparuerit, & fuerit perseue-  
 rans, frequentissime bonum portendit. Siquidem ascen-  
 sus tumoris ex alto ad superficiem uenire uidetur. At  
 si sine

\* inflammatio  
 \* depresserit

\* colli

\* inflammatione

\* acutissimus  
 \* erysipelas



si sine ulla ratione adintorij cuiusquā medicinalis beneficij, repente\* non apparet, salutem negabit, descēsus enim à superficie corporis ad altiora monstratur. At si forte non secundo irruens, uel ex alto acceptus ad superficiē fuerit ignis sacer, sed antecedens passionem: aut eidem concurrens, omnia mala significat. Humor autem plurimus siue salinarum fluor in crassitudinem coactus si in statu apparuerit, mala ostendit. Post statum uero passionis, salutaria pollicetur. Aliās enim plurimā præsocationē significat, aliās corporis laxamentum: in quibusdā etiam tantū tumor increscit, ut stricturā faciat in faucibus atq; gutture, & mento. Est autem passio stricturæ acuta, atq; celeris, & uehēmēs, & sepiissime continua, aliquando intercapedinata.

\* introrsum redit, atq; diuinescit.

Quomodo curandi sunt tynanchici. Cap. III.

**O**portet in passione constitutos, iacere loco lucido atq; moderatæ amplitudinis, nullo etiam odore corrupto, calido. Est huiusmodi laxatiuus aer, & qui primus tumentibus partibus misceatur. Iacendi schema esse supinum conuenit, paulo leuati capite collocato, firma atq; immobili positione, uel qua se magis releuari ægrotantes dixerint. Omnis enim motus\* dolidus est tumore oppressis. Lanis etiam mundis ac mollibus & non infectis, dulci atq; calido olco infusis colla protegenda cum thorace, adhibita articularum blanda fricatione. Transmittitur enim naturalis uaporis laxamentum, etiam ad illas partes quæ patiuntur. Adhibenda quoq; requies & abstinentia usq; ad primam diatriton cum gargarismate laxatiuo, cuius species siue materias paulo post subiiciemus. Adhibenda etiam fomentatio olei dulcis calidi, & apponēda exterioribus partibus uesticæ oleo dulci calido se-

\* molestus

miplena. Adhibenda etiam phlebotomia si uehemēter passio coegerit, intra diatriron. Etenim indiget repētina sanguinis detractione, ob celerrimū laxamātum. Si autem minus neceſſitas impulerit, in ipsa diatriron, uel durantibus uiribus etiam post ipsam, phlebotomia poterit adhiberi, si tunc neceſſitas emerſerit feciendi. Cuius ſacti rationem de ſpecialibus adiutoriis ſcribentes docebimus. Igitur intra diatriron phlebotomato erit post detractionem sanguinis caput ſouendum, atq; collum oleo calido, & ex eodem auribus quiddā im-mittendum, tunc gargarizandū. Potum dabimus aquā calidam, uel mulſum, & non coaceruatim, ſed paulatim, ne tranſuoratione graui ac percuffu tumētia<sup>\*</sup> indignentur. At ſi in ipsa diatriron flebotomiam adhibuerimus, oportet post detractionem ſactā circum ungere corpus egrotantis oleo dulci, atq; calido, & faciem aqua calida mediocriter ſcuere. Tunc ſorbilem cibum dare, ſed omnino tenuem, uel fluidum, uel panem ex mulſo tinctum. At ſi tranſuoratio fuerit difficilis, qua obſiſtente non percipiant egrotantes accepta, erit ſuf-ficiens uiribus fulciendis mulſum guttatim faucibus in-fuſum: perſeuerandum etiam uſq; ad declinationē paſſionis, in alterna dierū cibi reſtictione. Conuenit præ-terea post phlebotomiam ſequētibus diebus cataplaſ-matibus uti, quæ circum colla erunt extrinſecus appo-nenda, mitti tamen ſimplicitate conſecta, ut eſt panis calidus ex aqua & oleo, uel mulſo diligenter emolli-tus, uel pollines tritici aut hordei, aut ſeminis lini, aut ſœnugræci. Singula hæc ſiue commixta ex calida & oleo & melle, uel aqua in qua fuerit decocta hibiſci radix, aut contrita & admixta. Mutanda præterea frequentius erunt hæc cataplaſmata, ne perſeueratio-ne ſui,

<sup>\*</sup> irritentur

ne sui, corrupta corporis exhalatione, \* in acorem ue \* in rancorem  
niant, Erunt etiam calefacienda, quo tardius maneant  
\* euaporata, positis extrinsecus saccellis ex cantabro \* euaporantia  
aqua cocto confectis, uel uesticis calida & oleo semi-  
plenis. Conuenit etiam spongiarum uaporatio, expres-  
sarum ex aqua calida, aut admixto oleo, uel decoctio-  
ne mitium materiarum laxatiuæ uirtutis. Apponendæ  
quoq; spongiæ collo atq; gutturi, & his partibus quæ  
haustum negant, uel ori & naribus: iubendus etiã æger  
aperto ore ad semet uaporem rapere. Descendentes  
enim ad altiora haustu raptæ uaporationes tumorem  
relaxant. Sunt etiam gargarismata cõgrua cataplas-  
matibus ut oleum dulce est, atq; calidũ, uel calida &  
oleũ: \* tunc mulsum aquatũ, & decoctũ: & lac singu- \* tum  
lare, siue cũ melle, aut aqua admixtũ, ut omnia deter-  
gatur, quæ forte lactis tactu fuerat \* derelicta, ne rema \* delibuta, ne  
nentia seruire locorũ in acorẽ \* ueniant. Item utendũ \* remanens  
decoctione cantabri atq; glycyrizæ, uel lini seminis, \* ueniat  
ac fœnugræci, sed nusquã ad crassitudinem succi facta  
decoctione, ne ob uiscosam tenacitatẽ, humorũ fluori  
connexa, difficultatẽ faciat spirationis. Tunc etiã de-  
coctione hibisci utendum, uel maluæ agrestis, aut my-  
xarum Syriarũ, aut musci herbæ, atq; palmularũ pin-  
guiũ, uel fici succulẽti. Item succo halicæ aut ptisanæ.  
At si passio cœperit declinare, conuenit etiã \* cybari-  
ticũ & creticũ passum. Ea uero quæ sunt leuiter strin- \* Sybariticum  
gentia, & quæ appellant \* stymmata, nunc incongrua \* σφραγιστα  
iudicamus. His enim utemur quoties initia fuerint pas-  
sionis, leuibus adhuc querelis affecto ægrotatẽ, aut do-  
lore leui in faucibus, uel uua. Tunc enim etiam Thes-  
salus adhibendã poscam iudicauit, siquidẽ pronos atq;  
in passionẽ synanchicã declines, nec dũ tamen patien-

\* *cutaneri*

tes \* uocauerit. Utendum deniq; non solum posca, sed etia decoctione leuiter cōstringentium materiārū, ut rosarū, palmularū thebaicarū, lenticulæ, myrti, lentisci, mastichis, quæ singula erūt in mulso decoquenda, uel quolibet ex supradictis succo, quoties uiderimus constrictiuā uirtutē admixtione laxatiui liquoris esse frangendā. Facit etia oryza succus, atq; diacodiō medicamen mulso resolutū, ac \* sepe substātia seruata fauibus \* illitū. Non aliter etia quod diamoron appellatur, & dioporon, & \* dyamirrhion, \* siue Andronis, & Polyidæ sphragis, & anthera cū melle, & omne medicamen quod confectum sit ex malo cotoneo, aut punico, uel rosæ flori: us, uel mali punici cortice, siue galla, uel omphacio aut lycio, & his similibus. Sed in augmento passionē constituta illis utemur, quā supra iandudum memorauimus. Humorē præterea seruore

\* *densatum*

\* si glutinosum  
factum oculis  
uiderimus tan  
quam superna  
stantem,

\* dyprene im  
misso

\* nutritum \* si glutinosum uiderimus factū, tanquā in oculis supernatantē, spōgia calida deterginus: sin uero in alto fuerit cōstitutus, \* dyprena immissa præfecto eius capite lana molli, ac limpida. Etenim si remiserit, præfocatiōē magis accelerat. At si nimium altiora tenuerit, ut uideri nō possit, erit tenuādus, dādo mulsum, sed præcoctum. Est enim efficacioris uirtutis, quā si nō fuerit coctū. Quidam etiam ptisanā dederūt paruo sale admixto. Sed sunt fugienda quæ usque ad sensum ueniunt mordicationis: siquidem tumoribus prouocatis fluor quoq; humorum crassescit. At si uenter officium non agnouerit, etiam clystere utemur, iniicientes aquam calidam cum oleo, nunc solam, nunc admixto melle. Etenim surgens ex isto liquore uaporatio \* collaxat tumentia, & egestus uenter facilia facit spirantēta non solum synanchicis, sed etia sanis

\* *colla laxat*

sanis hominibus. Manens enim <sup>\* alienitas</sup> grauat, atq; <sup>\* excrementorum aliena</sup>  
 oppreſſione quadam accerrimas facit corporis exhalationes, quibus tumentia <sup>\* & superuacua</sup> prouocetur, caput impletur. <sup>ſex.</sup>  
 Sed poſt clyſteris uſum erunt etiam cucurbitæ cum ſcarificatione apponendæ, dimiſſionis tempore. At ſi continuatio fuerit, initio lucis, quo tempore etiam cæteris <sup>\* prouocantur</sup>  
<sup>\* diſtrictiuiſ</sup> adiutoriis uti conducit. Apponendæ aliæ igitur collo tenus, uel gutturi quæ loca antherœona Græci uocauerunt: item ceruici, ſiue neruis maioribus, quos tenontas appellant. Item <sup>\* ſtricturam</sup> ſingulas ex utraq; <sup>diſſoluentibus.</sup>  
 parte ſub aurium lacunis, quibus in locis etiã faucium poſitio eſſe perſpicitur. At ſi paſſio perſeuerarit, & <sup>\* ſingule</sup>  
 æger ad perſerendam curationem fuerit, mollis, ut ferri cuſpide metu ſe contingi prohibeat, ſanguisugas, quas Græci ρεδιδας appellant apponemus iſdem locis, quæ ſupra memorauimus. <sup>\* tum</sup>  
 Tunc poſt earum caſum, ſi <sup>\* parcia</sup> minime factam ſanguinis detractiōem uiderimus, cucurbitas apponemus, ut præſecta ſanguisugarũ uulneratione, raptu cucurbitæ detractiō compleatur, & olei ſomento utemur atq; cataplaſmatibus <sup>\* conuenientibus: idoneis.</sup> conſequentibus. & uaporationibus: dehinc epithematibus. oleo calido infuſis: <sup>\* tum</sup> tũc ſuperpoſitis ſpõgiis ex eadẽ materia expreſſis uaporamus. Etenim ſaccellorũ ſiccã uaporationẽ tanquã denſabilẽ reprobamus. At ſi maior fuerit tumor, ipſam quoq; linguã ſcarificamus, atq; fauces & palatũ tenui ac lōgiore phlebotomo. Etenim loco calidi ſanguinis detractiōe tumentia relaxantur. Tunc poſt ſcarificationẽ mitibus gargarismaſibus utemur. Si declinare paſſio cœperit, etiam ſubunctionibus faucium, uel interiorum utemur, ut melle decocto: uel medicamine conſecto decoctione agreſtis maluæ, & ſœnugræci ſeminis, & lini, cum amylo, & melle, &

oleo; uel uuae passae medio, proiecto ac secreto semine,

- \* *contrito* \* *contritis cum pane*, uel decoctione lini seminis: uel melle, & passo cretico, quibus incocta sit radix agrestis maluae, uel alicae, atq; lini seminis polline. At si passio perseuerauerit, secundo uel tertio scarificationem adhibemus, non solum gutturi, uel tonsillarum uicinitati, quam Graeci \* *antheona* uocant, & neruis maioribus ceruicis, quos tenontas appellant, sed etiam occipitio & \* *palis*, & interscapulae, quod Graeci metaphrenon uocant, & pectori. Etenim quanquam uehementer loca transuorationis patiantur, caeterae quoque partes corporis necessario consentiunt. Multi denique non aduertentes rationem \* *reuincendae* passionis, sola auersione materiae pugnantes, atq; \* *in liquidis* \* *causis* ponentes, principaliter aiunt inguinibus cucurbitas insigendas, tum praecordiis, tum supra mammas, cum scarificatione, debinc gutturi, atque collo, eiusque partibus. At si declinatio fuerit confirmata, dabimus cibo pulcem, atque oua sorbilia, uel porcinum cerebrum, longè \* *seruantes* omne quod fuerit acre, siue immodicè \* *appetibile*, uel inurens, uel umosum, uel asperum, aut aridum, uel quod ualeat transuorationis loca lacescere. Facile etenim passio ex occasione parua recurrit. Apponenda etiam cerotaria ex oleo dulci, aut cyprino, uel \* *glaucino*, aut irino confecta, uel malabathrino, cum radice hibiſci. Tunc lauacro utendum, ac deinde uino.

Quomodo Synanchicos aliarum sectarum principes curauerunt. Cap. IIII.

**A**ntiquorum Hippocrates libro quem ad sententias Cnidas conscripsit, ex utroque oportere inquit brachio synanchicos phlebotomari. Sed hoc erit cuitan

euitandū. Siquidem coaceruata sanguinis effusio, animi facit defectiōem, & propterea prohibet tantum detrahi, quantum sufficiat ad relaxandam stricturam. Diuidit etiam uenas sub lingua constitutas, quod est non solum inutile, uerum etiam noxium. Siquidem incongrua est ex locis patientibus sanguinis per uenas detractio. Plurima etenim in exitum prouocata materies confluens, necessario completis locis abstenta, modum superat detractiōis, ut grauatae partes potius aduentu, quā releuatae recessu materiae uideantur. Dehinc subleuandarum uenarū causa erit laqueus collo circundandus, & tunc maxime, quando sine ullo manifesto tumore synanchica fuerit passio. Laqueus autem, quod praefocationem augeat, nulli dubium est. Quinetiam sanguinis fluorem ex supra dictis uenis difficile posse abstineri perspicitur. Neque enim aliqua cōstrictiua adhibere sine ullo periculo poterimus, neque diuisa colligare erit cuiquam possibile. Est etiam naturale tumentia loca post diuisuram in fluorem sanguinis facile deuenire. Vtitur quoque gargarismatibus calidis, atque uaporationibus, quorum materiā non enarrauit. Dehinc caput corradī, & iugiter uaporari iubet spongiis, tunc contegi cerotario, atque lana. Potum dat aquam calidam, & mulsum. Passione declinante succo cibandos dicit, cuius speciem non enarrauit: nescius etiam, quod in plerisque declinatio post quinque dies, uel sex adueniat, & sit immodica usque ad eius initium cibi abstinentia. Vaporem uero oportet, sed non caput magis, quam colla atque gutturis exordium, quod Graeci anthereona uocant. Tunc post uaporationem fucere, atque cerotarium declinante passione apponere. Item neque potum, quantum dandum,

uel quomodo, uel quando, manifestauit. Præterea secundo libro de morbis, clysterizandos inquit, atq; purgatiuis medicaminibus releuandos, quæ Græci cathartica uocant, quorū ex acrimonia magis tumentia prouocantur. Phlebotomari quoque ex locis sub mamilla constitutis, noxium atque \*putidum iudicamus. Noxium, siquidem plurima oportet corpora diuidi, cum neq; facile sub uisum uenæ deuenire \*possunt. Putidū, siquidem sine ulla difficultate ex brachio poterit sanguinis approbati detractio. Dehinc iugis atq; coaceruata materiarum detractio, clysterum & purgatiuorum medicaminum, & phlebotomiæ, uexabilis esse perspicitur. Item si plurima (inquit) præfocatio occurrerit, clysteris ualiscum quem nos tibiam dicere poterimus, faucibus inquit immittendum, incedens hyssopum, sulphur, bitumen, quorum rapere odorem præcipit egrotantem per eandem fistulam: \*quorum sine dubio promptus est error. Nititur enim immittere fistulam faucibus, quæ neq; ærem tenuissimum percipere possunt, ui passionis oppressæ. Dehinc austero fumo ægros implendos existimat, quo sæpe etiam sani præfocatione afficiuntur. Vltimo etiam ex duobus brachiis atque uenis sub lingua constitutis sanguinem detrahendum probat, quod supra damnantes \*frustrauiimus. Non enim sine multa corporis uexatione fit. Diocles uerò libro, quo de passionibus & causis & curationibus scripsit, sanguinosos inquit homines ex utroque brachio phlebotomandos. Eos autem qui minus sanguinis habuerint, solum scarificandos. Tum felle taurino cum herba pediculari, quam staphida agrian uocant, & nitro, & cocco cniidio, iugiter inquit ungendos, utens etiam gargarismatibus  
iisdem

\* vanum: flodum: inutile.

\* possunt

\* quæ in re

\* frustra fieri diximus.



iisdem. Dat quoque sub lingua pipcr continendum,  
 uaporans spongiis collum, & crotariis contegens,  
 præcipiens agrum tenuandum, ultra quam fas est. Ne-  
 que nunc solos phlebotomandos sanguinosos proba-  
 mus, sed omnes passione affectos, permittentibus uiri-  
 bus; neq; ex utroque brachio, ut supra docuimus, neq;  
 acerrimis utendum unguentis, & gargarismatibus, si-  
 cut neque in tumoribus oculorum similibus inunctio-  
 nibus. Etenim staphisagria etiam sanos plerunque sy-  
 nanchicos fecit, quum repente \*inflationem faucium  
 fieri cogit. Dehinc omnino neq; tenuari, deducendo  
 corpus, siue eius habitudinem, conuenit medicinæ, sed  
 relaxare tumentia rebus congruis ac remissiuis. Item  
 Praxagoras quarto libro curationum, synanchicos  
 clysterizat, & sudoribus prouocatis\* deducit, aliquã- \*extenuat,  
 do etiam phlebotomat, dans quoq; medicamen uomifi- emaciat: ut pa  
 cum, quod emeticon appellant. Tunc uia præcidit, uel ginaprecedens  
 aliquando\* diuidit, & picē lēta uulnēra curat, sed ho- \*scarificat  
 rum iudicium ex aliis accipiendum probamus. Nam  
 uomitus ingens distentione & præfocatione sepe pe-  
 remit. Dehinc tumens uua laxatione indiget, non am-  
 putatione, sicut neq; aliæ quoq; corporis partes, quæ  
 necessario erunt mitigabiliter relaxandæ. Erasistra-  
 tus secundo libro anatomicorum de singulis passioni-  
 bus scripto, in quibusdam inquit synanchicis uapora-  
 tione utendum spongiarum, atque cataplasmatibus,  
 & ex uino, medicamen transuorandum quod catapo-  
 tium appellauit, ex castoreo confectum: sed omnia pec-  
 canter. Etenim uinum constringit: castoreum uero  
 acerrimæ esse uirtutis nemo negat, quæ indubitanter  
 sunt tumori contraria. Herophilus de synanchicis ni-  
 hil dixit. Asclepiades uerò secundo libro celcrum uel  
 acuta

- acutarum passionum inquit: synanchicis conuenit sanguinis detractio atque uentris depurgatio, & cataplasmata, & oris collutio, & gargarismata, & superunctiones tenuabiles, atque \* aperibiles, ut sunt ex hyssopo, origano, & thymo, meliloto, absinthio, fici coctione, nitro, staphide agria, centaurea, elaterio, felle taurino, cedria, adiiciens etiam cucurbitæ usum cum scarificatione. Negans quidem \* quicquam posse cucurbita sanguinis elicere, siue, inquit, quod cum febris sit passio, siue quod maior causa sit tumentium partium, quæ contrario raptu superet cucurbitæ feruorem, \* & non possit efficere detractionem. Tum phlebotomiam probat ex fronte faciendā, uel angulis oculorū, uel uenis quæ sub lingua sunt, uel è brachio. At si \* scarificandæ maior (inquit) passio fuerit, \* diuidendæ sunt fauces, hoc est tonsillæ, & partes supra uiam constitutæ: etc.
- \* summi auxilij  
\* homoiotomiam
- nim \* summa est in his æqualis siue par incisura, quam appellauit \* homotomiam. Dehinc à ueteribus probatam approbat arteriæ diuisuram, ob respirationem faciendam, quam laryngotomiam uocant, uariæ ac multipliciter peccans. Omne etenim quod acre fuerit, atque tenuans, incendit humorem. Ipse denique in phreneticam uenturos passionem multa inquit affici materia, ad hæc eiusdem acrimonia. Est etiā noxia & patientibus locis phlebotomia, sicut supra docuimus. Item clysteribus utendum ob auertendam materiam, uel auocandam à locis patientibus, inconsequenter iubet. Est enim contrarium detractioni per uenas ex patientibus locis faciendæ, quam ipse probauit. Item inordinatè scarificandum primo, dehinc phlebotomandum iudicauit. Etenim locales detractiones \* insidente atque infirmata, \* & stante passione, adhibendas probamus.

bamus. Est etiam inexerciti Medici ob febrium causam suspicari materiam raptu cucurbitæ non elici. In usu enim uidemus sine ullo impedimento in febricitantibus effectum cucurbitæ provenire, atqueeductam detrabi materiam. Adducitur nanque caro, & spiritus, & sanguis. Dehinc neque crescente acceßione cucurbitas infigimus, tempore quo ad \* altiora materia cõducitur. Est præterea tumentium partium molestissima atque periculosa diuisura. Vehementes nanq; sanguinis effusiones efficit, & quæ prohiberi minimè possint. Si enim easdem constringere uoluerimus, celerissima præfocatio consequetur: at si abstinere neglexerimus, celerior mortis effectus sanguinis effusione perspicitur: uel si fortè sanguinis fluorem effugerit quis, cancerum \* atque gangrenam non effugiet, ob augmenta tumoris. \* Non enim naturali habitu constituta \* condiuiduntur, quanquã constrictiue tractata sepißimè tumescere uidentes, in tumore constituta cum diuisa fuerint, si constringendi caruerint facultate, uehementius in tumorem uenire, sperare poterimus. Nam omnino in tanto tumore, in quo digitorum immisio \* improba esse perspicitur, atque cataplasmatum, & gargarismatum usus \* æger atque difficilis egrotanti uidetur, quomodo non altiorum diuisura inimica salutis probatur? Est etiam fabulosa arteriæ ob respirationem diuisura, quam laryngotomiam uocant, & quæ à nullo sit antiquorum tradita, sed caduca, atque temeraria Asclepiadis inuentione affirmata: cui, ne nunc occurrentes, latius respondere uideamur, aut tantum scelus angusta oratione damnemus, libris quos de adiutoriis sumus scripturi, respondebimus. Themison uerò sine febribus acutas passionés rectè curare  
Asclepia

\* externas partes

\* siue

\* Nos

\* cum diuiduntur

\* laboriosa,

molesta

\* grauis

Asclepiadem probans, huic accusationi subiicietur. Serapion primo libro curationum, clysteribus synanchicos euacuat, atque phlebotomia, & cataplasmatibus, & unguentis acrioribus utitur, & prouocatiuis, & \* apertiuus, quæ \* anastomatica appellant. Precauet autem in omni abstinentia cibum uel potum dare. Sed est etiam hic facile accusabilis. Etenim acria atque tenuatia excitare tumorem nemo dubitat: phlebotomia uero adiecta clysteribus uexabilis esse percipitur. Dehinc dicens \* materiarum nomina, ea ex quibus adiutoria conficiuntur scribere neglexit. \* Cum nullo alio quolibet adiutorio minus utilis cibatio, atque potus \* probentur, arte adhibita, atque formata. Heraclides Tarentinus 3. lib. curationum, de internis scribens, eos, inquit, qui sanguinis multitudine uexantur clystere præpurgatos phlebotomamus, nunc ex brachio, nunc ex uenis, quæ sub lingua sunt: uaporationibus spongiarum admotis collo atque gutturi, ex aqua calida, in qua fuerit præcocta ruta, uel pulegium. \* Tunc cataplasmata \* apponendo probat quod omen lysin appellamus, ex mulso confectum, cui erit admiscenda chamæpitys, uel iris illirica, aut ficus. Nocte uero, inquit, cerotarium apponendum ex irimo oleo, atque resina iusta parte in comparationem ponderis cere. In his uero quibus \* locorum crassitudinem suspicatur, ungendas inquit fauces melle atque omphacio, & gargarismate utitur mulso, in quo præcoquit ficum, uel origanum, & admiscet piper. Dat etiam elaterium in pondere denariorum septem. Multis uero obolum dimidium cum melle & aqua, aut mulso. Dehinc medicamen quod appellauit emeticon uomificæ uirtutis, & conficitur hoc modo: Origani, atque heracleotici pa-

\* apertiuus  
\* anastomatica  
næ ea sunt

\* medicinarum  
\* Præterea

\* Probatum

\* Tum  
\* apponendum

\* succorum

\* quod

nacis, manipulum accipiens, demerge, inquit, in uascu-  
 lum rubri æris, tum \* rhus quod appellamus rubrum,  
 heminas quatuor, atque cepulas \* germanas uiginti,  
 quibus circumtollemus exteriorem corticem, & has  
 quassantes \* immittimus. Tunc \* infundimus uinum  
 Chium, uel Rhodium, aut Cnidium quatuor heminis,  
 & sub sole ante ortum caniculæ uiginti diebus, atque  
 post hortum uiginti diebus, ponemus. Tunc cum fuerit  
 liquor insumptus, infundemus alias quatuor heminas,  
 atque \* alia sub sole linquimus. Tunc iisdem diebus  
 mittimus medicamentum in pilam, & conterentes for-  
 mamus trochiscos, quorum maiores erunt drachma-  
 rum singularum, & dimidiæ: Alij uerò drachmarum  
 singularum: item alij dimidiarum drachmarum: singu-  
 los dabimus, uirium comparationi congruos, cum mul-  
 so, uel pro eclectario cum melle. Etenim: uomitum hu-  
 moris uiscosi hoc efficit, & uentrem deducit. Aliqui,  
 inquit, etiam melanteriam admiscant, & tapsiæ \* suc-  
 cum obolos tres. At si difficilis fuerit uomitus, penna  
 oleo ueteri intincta, atque faucibus immissa prouocan-  
 dum probat. Utitur etiam aliquando medicanime ex  
 omphacij succo, & elaterio confecto, atq; diagridio,  
 cum nigro helleboro, & sale, si fuerint in uomitum  
 difficiles ægotantes: uel elaterio cum aceto, & ruta:  
 & rursum elaterio cum sinapi, & salibus. Eos inquit  
 qui perfrictione synanchici fuerint effecti, phleboto-  
 mari prohibemus, atque clysteribus depurgari, cæteris  
 uerò omnibus ex qualibet causa synanchicis effectis,  
 erunt hæc adhibenda: fulciendos etiam omnes indicat  
 uel nutriendos sola aqua, uel mulso, cætera quoque ci-  
 borum prohibet. Sed hoc omne experimentum siue  
 tentatio promptissimè ex \* occultis suspicionibus ui-  
 detur

\* rhois

\* Germanas:

sic fortassis bul

bos vomitorios

appellat

\* immittimus

\* infundemus

\* alio

\* succi

\* dubiis, & in  
 certis, non ma-  
 nifestis & a-  
 pertis.

detur esse prouisa. Etenim empiricus solam seruationem intuens, quam terefin uocant, sanguinosos nunc phlebotomandos existimat, non aduertens quia omnes synanchicos ob stricturæ uehementiam oportet phlebotomari, promittentibus uiribus. Denique ridendum est etiam, quòd eos, qui ex perfriktione synāchici fuerint effecti, phlebotomandos negat, non aduertens præsentia, & inquirens factorum causas. Noxia etiam sunt cataplasmata, quæ adhibenda probat, atque uaporisationis genus, acrimoniæ causa earum specierum quas admiscendas iubet: siquidem sunt \* incendiosa. Item uomifica, quæ emetica appellat, etiam nō tumentia in tumorem faciunt deuenire. Etenim ferulago, quam thapsiam appellant, sufficiens est etiam \* putredinem partium quas attigerit facere, atque \* inflare naturali habitu constitutas. Non aliter etiam illa quæ conficiuntur ex cepe, & omphacij succo, & rhu rubro, uel horū similibus. Item oleum uetus acre est. Illa uerò, quæ cathartica appellat, per chlysterem adhibenda, quæ nos purgatiua uocamus, turborem magnum faciunt, atque stomachum uexant, & cætera quæque neruorum. Est præterea iners, tempus dandi cibi non definire. Nostræ etiam sectæ quidam adhuc ueterum errore detenti, insuetas graues materias adhibendas probauerunt. Nunc urinam siue \* finum humanum cum melle, & \* myrtha, atque ruta: nunc centauream, & absinthium, & abrotanum, & thymum, & aristolochiam, & tymbrā, quam nos satureiam dixerimus, & sinapi: nunc Pythagoricum atque Isyperium trochiscum, nomine inuentoris appellatum: nunc polyidæ sphragida quam appellant, atque \* constrictiua, tum unctiones & cerotaria ex unguentis sampsuchi, atque

roris

\* incendiosa

\* putredinem

\* inflare

\* pueri, &amp; canistercus Galenus probauit

\* Myrtha

\* constrictiua: ut supra pag. 167.

toris marini, quorum singula tumoris sunt prouocati-  
ua ob feruoris nimietatem, atq; desiccandi uirtutem,  
& \*recorporandi, cum sit celeritas passionis simpli-  
cibus curanda uirtutibus.

\* τοῦ μεταπο-  
νεῖν.

## De Apoplexia.

## Cap. v.

**A**poplexia dicta est, quod tanquam ex letali per-  
cussu repentinum faciat casum. Est autem op-  
pressio sæpe sine febribus, repentina, & \* quæ sine febribus  
priuet corpora, & semper celerrima, & nunquā  
tarda esse probatur. Sed eius antecedentes causæ com-  
munes cum cæteris esse accipiuntur, magis tamen iu-  
gis adustio, & perfrictio uehemens, & indigestio fre-  
quens, lauacris \* exercita, usus etiam ueneris, & ma-  
gis in senibus. Item uulneratio \* membranæ, in pueris  
uero etiam uehemens \* saltus mēbranæ cerebri. Qui-  
busdam igitur ante casum nullum præuidetur signum:  
quibusdam uero præcedunt quædam significantia pas-  
sionem, ut grauedo, uel dolor capitis, aut uertigo: aut  
aurium tinnitus, & in solitos usus difficilis motus:  
uultus mæstitudo: saltus \* membrorum, & magis præ  
cæteris partibus laborum: tremula loquutio, & ue-  
luti minus expressa: aut interruptio proferendi sermo-  
nis, sine ulla ratione: uel obliuio mox dictorum: uultus  
etiam plenitudo: egestionum difficultas. Sed hæc com-  
muniter antecedunt, uel præeunt etiam his qui in epi-  
lepsiā, uel furorem uenturi uidentur. Irruente pas-  
sione uocis amputatio sequitur, & mētis oppressio ex  
repentino casu, immobilitas perfecta totius corporis,  
atq; conductio uultus: quibusdam etiam suspensio pal-  
pebrarum, atq; oris hīscēs distantia: pulsus densus, &  
quadam persecutione fugatus: articulorum gelidus  
torpor: parua respiratio: color plumbeus, atq; inuo-

\* ut paulo post,  
& quæ sensi-  
bus priuet.

\* excita  
\* meningis qua  
cerebrum tegit  
\* illius mem-  
brana, quæ dū  
mouetur, uici-  
nis ossibus se  
impingit.

\* palpitatio  
παλμῆς

luntaria lachrymatio. Peiorante passione atq; in exitium egrotantis crescente, uultus adductio, ita ut longior nota uideatur imago: præcordiorum prominentia, atq; totius corporis frigidus torpor: pectoris stridor, & superiorum partium sudores frigidi: immobilis etiam & supersuspenſa palpebrarum ac superciliorum positio. At si passio fuerit leuigata, & in salutaria deuenierit signa, corporis fugabitur torpor, atq; frigus redeunte seruire: partes etiam quædam saltu errante mouebuntur, in his qui omnino caruerant: distillatus humor faucibus transuoratur, quamquam difficile, nec tamen\* prisca intercessionem impeditur. Pun-  
ctus etiam uel inclamatus egrotans palpebram mouet, atque labia conducit, significans sese audire uocantem posse: & uniuersali dicto, quod Græci\* catholicon uocant, quidam prima die moriuntur, quidam duobus, uel tribus diebus superuiuiunt: Alij uero saluantur, quorum alij statim sese resumunt, alij paralyſi partis, uel partium corporis uexantur. Item quidam parua conuersione mentis afficiuntur, ut aut alienentur, aut tristes, & somniosi uideantur, ut si eos quisquam è somno excitauerit, aliquid alienum loquantur. Est autem passio striclura, atque celer & acuta, & uehemens, & in senibus abundans, & hyemis tempore & autumnii fine. Vocatur etiam à quibusdā paraplexia. Vehementius autem in ista passione patitur caput, sicuti conuiciendum ex his quæ antecedunt, atq; corporis oppressione. Et sunt difficiles curationes fortium hominum. Debiles etenim oppressionibus magis superantur, atque ferre maiora adiutoria minime possunt. Hinc etiam foeminas specialiter difficiliter uiris curari perspicimus, atque senes, & pueros, à perfectis ætatibus,

& tab

\* æquè mole  
sta ac prius.

\* καθόλου δι  
εῖλον, quod ad  
omnes in uni-  
uersum patet,  
& spectat.



Et tabidos magis, quā qui habitudine uigent. Item eos  
 qui prætacti fuerint ægritudine magis quā qui nulla  
 fuerint mortis cōtagione sauciati. Adiuuat etiā diffi-  
 cultatem hyems, non solum q̄ corpora denset, uerum  
 etiam q̄ quibusdam adiutoris\* oppugnet, ut gestatio-  
 nibus\* liberis, ac nudis. Similis autem ac uicina est apo-  
 plexiæ lethargia, epilepsia, matricis præfocatio, secū-  
 dum aliquos, Et paralysis, Et grauatio, quam Græci  
 caron appellant Et dissolutio. Discernitur ergo à le-  
 thargo, siquidē omnis lethargus in febrē, atq; cum fe-  
 bre fit, rarum habet pulsum Et neq; semper sensibus  
 \* priuet: Apoplexia uero Et sine febris fit, Et par-  
 uum atq; densum facit pulsum, Et repentinū tanquam  
 ex letali percussu facit casum. Item\* q̄ ex membranæ  
 uulneratione apoplexia fiat, lethargia uero nunquā.  
 discernitur etiā ab epilepsia. Siquidē epileptici qui to-  
 tius corporis conductione\* agitētur, Et spumas\* agāt,  
 apoplectici uero nunquam: Item post accessionem epile-  
 ptici integro habitu\* consurgant frequentius, apople-  
 ctici uero paralytin partium sustinent: Item apoplexia  
 acuta atq; celeris semper accipitur, Epilepsia uero e-  
 tiam tarda sæpiissime inuenitur. Item matricis præfo-  
 catione discernitur. Siquidem non præcedit capitis  
 querela matricis præfocationem. Item in accessione  
 conducta atq; sese sustollens matrix inuenitur, in apo-  
 plecticis uero hoc nunquā contingit. Dehinc cessante  
 accessione apoplectiæ scemina nesciunt gesta, illa uero  
 quæ matrice fuerint præfocata, \* resipiant atq; nar-  
 rent quemadmodum fuerint oppressæ. Item matricis  
 præfocatio tarda esse perspicitur, hoc est chronia,  
 Apoplexia uero nunquam. Discernitur etiam para-  
 lisi apoplexia, quanquam idem multis uideatur ue-

\* repugnet  
 \* non operis,  
 ut in lectica.

\* priuat

\* hoc falsum

\* agitantur  
 \* agunt

\* consurgunt

\* resipiunt atq;  
 narrant

\* is putauit ἀ-  
ποπληξίαν esse  
corporis vni-  
uersi παρὰ λυ-  
σιν.

teribus, ut \* Hippocrati, & Diocli, & Praxagoræ,  
& Asclepiadi Titienfi, & Demetrio, & si qui alij  
præterea. Inquiunt enim apoplectos toto corpore ui-  
tiatos paralyfi, Paraplectos uero particulis. Them-  
ison uero capitis uel in capite paralyfin cum mētis im-  
pedimento, proprie apoplexiam uocat. In aliis uero  
partibus corporis, sine impedimento mētis, hanc ipsam  
paralyfin. Sed non oportet certare de his ex quibus  
curationis ratio non sumitur. Solum tamen cōmemo-  
randum est, quòd apoplexia celeris atq; acuta natura  
intelligatur, paralyfis uero propria quæ dicitur, tar-  
da semper intelligatur. Item \* grauatio & \* dissolutio  
inter \* resumptionē ueniunt, & nunquam præcordia  
suspendunt, & neq; difficultatem resurgendi ut \* alij,  
faciunt. Curationem uero principaliter apoplexiæ  
nullus nobilium priscorū tradidit. Siquidem paralyfi  
generaliter hanc \* adscribendam. Solus Hippocrates  
ait, apoplexiam uehementem soluere impossibile, im-  
becillem uero non facile. Item aliarū sectarum succes-  
sores aceto atq; oleo caput fouent, cæteras autem par-  
tes corporis uino, & oleo, lanis contegentes rudibus,  
atq; intreclatis. Secundo studiose caput fouent, admi-  
scentes hederam, uel serpyllum, aut peucedanum, quo-  
rum fugienda est acrimonia atque constrictio. Adhi-  
benda est igitur passioni congrua curatio. Nam lo-  
candi sunt ægotantes loco lucido mediocriter, atque  
calido. Utendum etiam articuloꝝ blandi tactus  
\* continentia, atque limpide lanæ tectione mediis  
partibus capitis, & collo. Adhibenda etiam olei fo-  
menta dulcis, atque calidi, & expressa ex aqua calida  
spongia uultus circumtegendus. Potus dandus aqua  
calida, uel mulsū distillandum sensim faucibus.

Adhib

\* in quæ mor-  
bo conualescūt  
\* κάρσις  
\* κατὰ λυψιν  
\* Apoplexia  
\* adscribunt

\* contrectatio-  
ne

Adhibenda etiam phlebotomia, non necessario expectata diatrito, dimissionis tamen tempore, uel circa primæ lucis exortum, cum ex aliqua parte corporis frigidus torpor uisus fuerit \*egelari. Etenim qui prius \*regelari. quæ hæc prouisa sunt, in materiæ detractiōe festinauere, latenter accessiōis tempore decepti, phlebotomiā adhibēt, uel certe iam expirātes ægrotos phlebotomādo, nihil prodesse potuerūt. Siquidē neq; materiæ fieri potuerit exitus, cum corpus \*desertū exitū san- \*uiribus destitutum guinis negat, quanquam diuisa uena uideatur. Adhibenda etiā abstinentia, usq; ad primā diatriton: tum unctio calida, atq; spongiarū calida expressarum uaporatio, & sorbilis cibus, uel panis aqua calida infusus, uel mulso. At si uentris officium nō cessauerit, clyster simplex adhibendus, cum cucurbitæ appositione cum scarificatione, tempore quo sæpiissime docuimus, occipitio atq; omni spinæ: spongiarum uaporatione utendum, & cataplasmatibus laxatiuis, tum radendum caput totum, & multis partibus eius cucurbitæ similiter apponenda, & usq; ad declinationem passiōis, alternis diebus cibus dandus: uel si uiribus fuerint ægrotantes fatigati, erunt quotidie nutriendi. At si passio declinauerit, cerotaria apponenda, & in oleum, uel in calidam & oleum deponendum, atq; fouēdum corpus. Tum uarius cibus dandus, adiectis oleribus, \* tunc piscibus, & \* tum uolantum carnibus: dehinc etiam lauacrum adhibendum, atq; pomorum quicquam dandum: dehinc uinum.

\* Seruandus etenim magis est supra dictorum connatus atque coaceruatus usus, ob passiōis difficultatem. At si quisquam ex apoplexia liberatus aliquas corporis partes paralyti \*uitiauerit, harum curatio- \*uitiatas habentem ex libris quos de tardis passiōibus scribentes do-

cebimus, sumendam iubemus. Eos uerò qui membranæ uulneratione in hanc passionem cadunt, ita curandos monemus, ut inferius demonstrabimus.

De conductione, quam Græci spasmon vocant, & distentione, quam Tetanon appellant, & earum speciebus. Cap. VI.

Consequens est de conductione atq; distentione, & earum speciebus dicere. Vtraq; igitur passio ab accidente nomen sumpsit, conductio, à conducendo atque contrahendo; extensio, ab extentione patientium partium. Sed eius species sunt, emprosthotonia, & opisthotonia, quas nos prorum raptum, atque supinum appellare poterimus, alterum\* habeo, quod in anteriora conductionem facit, alterum quod ad posteriora. Sed antecedentes causæ supra dictarum passionum, sunt hæ, percussus maiorum neruorum, quos tenontas appellant: uel supra ipsos\* iacendi iugis positio, duris incumbens suppositis: uel graue quicquam ceruicibus inpositum: uel meracum potum, aut profunda\* perfrictio: aut, ut sæpe contingit, uulneratio neruorum, uel musculorum, atque uinum iisdem uulneribus manentibus potum, uel\* frigidum, & magis eo tempore, quo sordibus carentia purgari uulnera uidentur, uel in cicatricem uenientia, sæpißime raptus occurrit. Aliquando etiam celerius, hoc est, adhuc uulneribus in tumore constitutis. Est autem iuxta definitionis formam conductio, quam spasmon Græci appellant, inuoluntaria tensio, atque conductio partium, cum uehementia, & acuto dolore, ob strictionis nimietatem. Distentionem autem, quam tetanon uocant Asclepiadis sectatores dicunt extensionem corporum, ut alij uerò partium, nescij quomodo etiam uolun

\* adeo

\* iacentis

\* vsq; frigoris  
sensus

\* frigide aquæ  
usus

uoluntate tendimus quasdam partes : & in his qui satyriasi uexantur, uel podagra, extensio est genitalium partium, uel pedum, nec tamen distentio, quam græci tetanon uocant. Alij aiūt distentionem esse tensionem musculorum secundum colla, atque \*buccarum, quos siagonitas uocant, cum tensione, ac dolore effecta. Alij nostræ sectæ scriptores pro tensione conclusionem uocauerunt, sub alio nomine ad ipsum significantes. Hanc enim causam passionis esse uoluerūt. Sed his omnibus communiter respondendum est, quomodo causa à passione plurimum differt. Dicendum est igitur non quæ causa sit distentionis, sed quæ sit distētio. Etenim causa, siquidem sit occulta, \*discrepat, atque pro captu mentis, \*signorum, uaria esse inuenitur. Ea uero quæ concurrūt passioni, \*hæc esse conductioni, prompta, atque manifesta, & omnibus intelligibilia esse probantur. Et est amandum, ut uires patiuntur, ex his quæ non discrepant, disciplinam si tradamus. Secundū nos igitur, distentio, siue extensio, quam, ut supra diximus, tetanon græci uocauerunt est inuoluntaria tensio, recto atque inflexibili porrecta \*cremento collo-

\* buccas

\* varia atque  
 varia est: differe  
 rentias multas  
 libet.

\* ac signis  
 siue

\* libramento

\* parati \* Tentantibus igitur in has passionibus deuenire hæc obueniunt: difficilis cervicis motus: iugis oscitatio, & magis \* locis in affe- etum venien- tibus. re iacendi positio, atque nervorum maiorum quos tenontas appellant, levis tensio, & durities: punctio interpellans ex spina usq; ad occipitium, atque bibendi difficilis transuoratio, contemptibilis tamen: temporum dolor & magis eo tempore crescens, quo hiscere atq; os aperire uoluerint patientes: auditus grauis: linguæ impedimentum, & imprompta loquutio: saliuarum fluor continuus: surum atq; uestigiorum dolidus sensus, & sine ratione ueluti ridens uultus, cum quadam \* palpitatione mobilitate suarum partium. Ascendente passione, atq; erumpente, distentio dura, & durities partium fit, cum dolore uehementi colli, atq; musculorum qui buccas colligat: rubor uultus, & colligatio supradictorum musculorum: dentium quoq; concubitus, hoc est, incumbens confixio: sudor plurimus: articulorum frigidus torpor: pulsus obscurus: extensio colli: spiratio difficilis: contractio crurum atq; manuum, & infusi & destillati liquoris in os recursio per nares fit: quibusdam etiam mentis alienatio, cum celerrima spiratione sequitur: gutturis & pectoris stridor. Sed tetanicis recto ductu distenta magis uidentur colla, atque ita, ut inflexibilia fiant. Opisthotonicis uero contractus ad posteriores partes fit, cum nimia tensione, atque dolore dorsi, & clunium. His etiam crura conducuntur, & \* neque manus distenduntur: digitos conductos atq; implicitos habent ut Hippocrates ait, & maiorem digitum, hoc est, pollicem cum cæteris tenent, ut frequentius contingit: se quoq; continere non possunt, sed quadam mobilitate resiliunt, cum

cum dolor irruerit. Hi sunt peiores tetanicis, & omnes\* ab alteris, quoties non sine uulnere, sed in uulne-  
 ribus\* priorum ac salutarium locorum his egri-  
 fuerint affecti passionibus. Emprosthonicis autem  
 colla conducuntur in anteriorem partem, atque men-  
 tum pectori configitur: tenduntur ilia, & præcordia  
 cum frequenti delectatione urinæ egerendæ, & diffi-  
 cili flexu digitorum. Liberari uerò ex his omnibus  
 difficile egrotantes, si in uulneribus spasmus emerse-  
 rit, uel si spinæ fuerit innata durities. At si sine febr-  
 bus spasmus irruerit, facilius liberantur.\* Febrem ue-  
 rò secundum Hippocratem in spasmus uenientem, sa-  
 lutarem accipimus, Spasmodum autem in febrem, per-  
 nitiosum: quanquam eius excludant sententiam, di-  
 centes quia secundum ipsum febres corpora grauant,  
 multo magis geminant incommodum, cum uehemen-  
 tibus doloribus. Laxat enim, inquiunt, tumorem na-  
 turalis ac mediocris feruor: febrium uerò acer, &  
 contra naturam immodicus, uexat. Quapropter ex  
 minutione eorum, quæ\* passionis sunt, spem futuræ  
 sanitatis melius accipimus.

\* alij  
 \* principum  
 partium.

\* aph. 26. li. 2.

\* quæ passioni  
 adiuncta sunt.

Quomodo discernimus raptum quem græci  
 spasmus vocant, à tremore atque saltu.

## CAPVT VII.

**D**iscernens raptum à tremore, atq; \* saltu Deme-  
 trius Herophili sectator, in corporibus, inquit,  
 raptu uexatis, motum fieri per extentionem, atq; con-  
 ductionem: in iis uerò qui tremore afficiuntur, agita-  
 tione crebra. Item in his qui saltu afficiuntur, leuabi-  
 lem & \* possibilem motum fieri indicauit, & magis in  
 partibus sensibilibus, ac neruis qui uoluntario\* motu  
 subiecti sunt: spasmus uerò etiam in \* colligationibus sit.

\* Palpitatione

\* pulsabilem  
 \* motui  
 \* in ligamen-

membrorum fieri sensit, & non solum in quibusdam sensibilibus partibus, uerum etiam in his quæ sensu carent, atq; ita inquit, gaudio quædam membra saltum sustinere, quædam uerò nunquam: item senectute tremorem fieri, non raptum, asserit. Addendum tamen,

\* quod

\* quomodo sine ulla distentione saltus mouetur, atque tremor efficitur: cum tensione autē uehementi, raptus membrorum fit. Item secundum Asclepiadem extensio atq; conductio partium tarda, & perseverans esse perspicitur: spasmus uerò breuissimi tēporis & celer-

\* motus

rimi \* tremor. Sed saltum ab his discernentes quidam Asclepiadis sectatores aiunt, non extensione uel cōductione fieri, sed leuatione ac depositione, quod quidam non cōsenserunt. Etenim ex tanta leuatione, inquiūt,

\* æquē

\* ac

atq; depositione quā sustinent, \* atq; lenata \* ut deposita, extensionem, atq; incuruationem uel flexum fieri

\* probant in

hoc motu mē-

brorum, quem

ita fieri perspi-

cimus. Deni-

que medium

tempore. Nā

iugem

\* latius

\* probāt. Hos deniq; motus manuū, quos ita fieri per-

spicimus, medium aiunt esse saltum raptus, atq; tremor-

is, magnitudine, hac distātia \* temporis iugem exten-

tionem atq; conductionē in tremore fieri magis quā in

in saltu, rarā uerò in raptu: Item paruam extētionem

ac conductionem in tremore, maiorem uero in saltu,

ingentem in raptu. Dehinc nomen quoq; dicunt com-

munius esse atq; \* latē diffusum, quoniā, saltum solemus

etiam cordis uocare & arteriarum motum. Hippocr.

denique inquit frontis uenas saltum sustinere, cum

\* fiat

neque tremor in his partibus \* fiet. Est enim passio

neruorum. Sed his respondendum est, oportere etiam

uenas atque arterias & raptu uexari, atque tremore

affici, quantum in ipsis est. Siquidem etiam motus

earundem partium, alios atque alios fieri magnitu-

\* differentes

dine atque temporis distantia \* differenter uidemus.



## De Curatione.

## Cap. VIII.

**A** Egrotantes iacere oportet loco sufficientis magnitudinis, lucido mediocriter, atque calido, nullo etiam odore infecto, mollibus atque calidis stramentis. Prima enim celeritatis morborum mitigatio est straminum mollities. Dehinc sine cibo facimus egrotos durare usque ad primam diatriron, si vires permiserint, summo cum silentio iacentes. Tum lanis mollibus, ac mundis, oleo dulci & calido infusis colla circumtegemus, & buccarum musculos quos siagonitas uocant, & maiores neruos cervicis, tenontas appellant: tum clunes, atque omne quod doluerit. Sed\* ob permanentem feruorem, erunt extrinsecus apponendi saccelli, uel cuiusquam materie uaporationes, aut uesicae oleo calido repletae, aut panni calidi, aut, ut supradictum est, saccelli lini semine torrido pleni, uel cantabro feruente aqua, & oleo decocto. Articulos quoque manibus tenentes calcificimus, & sudorem ob pressuram ac turborem uenientem pannis calidis excipimus. Frigescit enim permanens, & consensu partium passionem gemit. At si uehementes fuerint dolores, erit adhibenda phlebotomia, dimissionis tempore, atque ante tertium diem, si passio coegerit: si minus, in ipsa diatriron, aut post ipsam, uiribus permittentibus. Tunc colluere aqua calida permittimus, & potum accipere. In ipsa uero diatriron oleo dulci atque calido, & mulso corpus omne perungemus. Ora etiam aqua calida fouentes, tunc cibo nutrimus fortili, atque tenui, ex alica, uel amylo, aut pane ex mulso, uel pane insuccato ex eodem mulso. Oportet enim etiam cibum elibi potius quam masticari, ob densum conclusionem: quam leuiter digitis aperire tentabimus, prohibentes ligneos, ut plerique

\* ut permaneat feruor, lae ne qua admota est:

plerique adhibent, cuneos. Etenim quassationem partium atque indignationem faciunt, toto tempore cibi sumendi permanentes. Tum cæteris diebus ea quæ fouimus, cataplasmatibus curamus: dehinc etiam spinam totam cum lini \* semine, polline, & fœnugræci \* semine, singularibus, uel commixtis ex aqua mulsa, cataplasmamus, superponentes extrinsecus quicquam de suprâ memoratis calefactionibus, quò possint cataplasmata multo tempore calida permanere. Item per clysterem oleum calidum iniicimus: uel calidam & oleum: aut aquam in qua fuerit decoctum semen fœnugræci, uel radix agrestis maluæ. Simul enim & stercorea detrahimus \* præmentia, & tumentes partes fouendo relaxamus. Utimur præterea cucurbitis, & magis cum passio sumpserit statum: sed in accessione, leuibus: in dimissione uerò, etiam scarificatione adiecta. Erunt autè infigendæ occipitio, & collo. Sed aliquando ante impositas cucurbitas, expressas spōgias ex aqua calida oleo, aut decoctione fœnugræci, aut lini seminis, aut hibisci apponemus. Aptæ etenim uehemēter ex his uaporatio \* lentescenti liquori ac neruis laxandis accipitur, & quæ musculos buccarum, quos siagonitas uocant, sit sufficiens relaxare. Tunc post uaporationem cataplasmatibus utendum. Aliqui denique non sine ratione commoti, etiam \* teneris & exercitis pellibus agnorum, uel hædorum, oleo calido tinctis, atque madefactis, loca patientia uaporaucrunt. Damus etiam oleum calidum ore continendum, & quanquam omni tempore conueniat, magis tamen cum cataplasmata apponimus, hoc probamus faciendum, quo ex interioribus quoque buccarum colligatio laxatur, cibum dantes alternis diebus, donec passio declinet: si uires ægro-

tantis

\* seminis  
\* seminis

\* prementia

\* viscido, len-  
to, glutinoso

\* tenerorum  
excoriatis

tantis permiserint, in iisdem perseverabimus, solam  
 aquam calidam, uel mulsum calidum, dimissionis tem-  
 pore, offerentes. Tunc cum ex parte passionem miti-  
 gatam senserimus, \* embasim olei uel aquæ & olei ad-  
 hibemus: cuius rationem atque ordinem libris specia-  
 lium adiutoriorum docebimus. Dehinc quotidianis die-  
 bus humaniore cibo nutrimus, præcauentes etiam nunc  
 dura quæque ac difficilis transuorationis dare man-  
 denda, sed magis pultes offerentes, uel olera, uel cere-  
 bra, uel pisces teneros, & omne quod facile accipi ac  
 digeri potest: ne ob uehementem masticationem natu-  
 rales colligationes buccarum, quas Græci \* chalinos  
 uocant, moueantur. Erunt præterea loca ipsa quæ pa-  
 tiuntur cerotario curanda ex oleo dulci, uel cyprino  
 confecto. Item diachylon medicamento, & quod ap-  
 pellant Mnasei. Tunc etiam acopis utemur quæ fiunt  
 ex amylo, atque adipe, & ex infusionibus ac decoctio-  
 nibus scœnugræci, & lini seminis, & his similibus.  
 Tunc lauacrum adhibemus, præcauentes aquam frigi-  
 dam: dehinc dabimus etiam uinum, ut sæpe docuimus,  
 qualitate, atque natura, & quantitate congruum. Ve-  
 terum medicorum Erasistratus tetanicam passionem  
 non memorauit. Herophylus uerò nihil plus inquit,  
 nisi quòd uehemens opisthotonia rectiora facit ea quæ  
 nodorum spinæ \* euulsione arcuata uidentur, & quòd  
 febricula irruens passionem soluat. Item Serapion  
 primo libro curationum sic inquit curandos tetanicos,  
 quemadmodum phreneticos, quapropter sumēde sunt  
 contra ipsum responsiones, quas de phreneticis dicen-  
 tes docuimus: \* item ex his curationem huiusmodi  
 passionis tradiderūt. Hippocrates libro quem ad sen-  
 tentias \* Cnidas scripsit, cerotario inquit ungendos  
 opistho

\* ὑβασίς, so-  
 lium.

\* tanquam ea-  
 rum fræna, &  
 compages.

\* curuatione:  
 alij cōnexionē

\* quoniam  
 \* libro 4. De  
 rat. vict. in  
 morb. acut.

opisthotonicos, & aqua calida eorum crura fouenda. Iacere iubet in lineis stramentis, utens ad uentrem mouendum collyriis quæ appellauit \* balanos, & potionibus ex radice bryoniæ, & dauco, atque uino confectis. Offert præterea farinam coctam tepentem in partem cibi ut sæpiſſimè facit, permittens etiam uinum superbibendum, quando uoluerint egrotantes. Tetanicos uerò phlebotomat, non aduertens adhibendam uere phlebotomiam, sed non ſolam. Non enim dignum atque ſufficiens tantæ paſſionis unum adiutorium eſſe probatur. Item collyria, ſiue balani, & potiones ſuprà memoratæ, & uinum in temporaliter datum patienti-

\* Talia bus, contrarium atque ſaluti noxium monſtratur. \* A-

\* importuno lia enim tempore \* importuna neruis officiunt. Item

\* Hoc idē ſcribit lib. de Hu moribus, & Aphor. 21. lib. 5. quando conducibile tetanico ſine uulnere effecto, atque \* primæuo corpore, & habitudine uiginti æſtatis tempore plurimæ frigidæ ablutionem, ſiquidem feruorem \* reclamet ac reuocet. Dat etiam nigrum hel-

\* iuuenili \* reclamat ac reuocat \* aſinino cum Caro cocto leborum cum pipere, & lacte \* aſinino carne concocto potat, atque ſternutamentum commouet. Mirandum igitur quòd in his qui tali paſſione afficiuntur frigida utendum exiſtimat Hippocrates, qui iamdudum

\* Aphor. 18. lib. 5. \* ait frigida quæque eſſe inimica oſibus, neruis, dentibus, & cærebro. Sternutamenta etiam commouere tumores nulli dubium eſt. Item aſininum lac nulla ratione laxare tumentia probatur. Dehinc ſtomachū euer-

\* eſt tet: ſiquidem \* ſit tetri odoris & ſaporis. Item helleborum nigrum neruos obſidet, atque purgando, uel

\* extenuando \* deducendo corpus, exagitat. Diocles libro quo paſſiones atque cauſas, atque curationes ſcripſit, tetanicis inquit adhibēda niſtoria medicamina, quæ appellauit diureti

\* βάλανοι, ſeu collyria, glâdes medicorum.

\* iuuenili \* reclamat ac reuocat \* aſinino cum Caro cocto

\* Aphor. 18. lib. 5.

\* extenuando \* deducendo corpus, exagitat.

diuretica: tum uentrem deducendum, atq; uacuandum: dat etiam bibendum passum aquatū pueris, uel his qui ex uulnere in passionem ceciderunt. Prohibet etiam cibum dari & iubet ea que passione tenduntur, uaporari, & emolliri. Item tertio libro de curationibus similiter clistere utitur, & uinum dulce dat bibendum, adhibens uaporationes nunc siccas, nunc humectas: & ungit cerotario, atque lanis patientia contegit loca. Sed ex his primo mictoria uesicam mouentia omnes prouocant nervos, qui tunc summo atque attento sensu \* habitantur. Dehinc clisteres acerrimi, adurendo, \* efficiuntur tumores asperiores efficiunt, quos adhibendos existimat. Est etiam uinum repugnans, priusquam passio declinauerit. Et quanquam omne, magis tamen dulce, quod opportunè datum inflat: denique etiam sanos, & indigestos, atque \* inutiles & \* implicitos facit. \* segnes, tardos. Est etiam profectò peccantibus prohibito cibo uinum dare. Item uaporationes humide siccis atque aridis \* anxios, marstos repugnant: & usus cerotariorum soli passionis declinationi cōueniens inuenitur. Praxagoras tertio libro curationum uaporationibus utitur & clistere, & uomitu. Quanta autem uexatio sit uomitus, arbitror superfluum dicere. Est enim etiam impossibilis usus eius in his, qui neque ad transuorandum potum os aperire possunt. Heraclides Tarentinus secundo libro interiorum passionū tetanicos & opisthotonicos clistere curat, & præpotat iure gallinaceo & lasere, cum primo sint hæc uentris inflabilia. Item laseris uirtus acerrima, clysterū uerò incendiosa. Dehinc Asclepiades secundo libro celerum uel acutarum passionum incipiente, inquit, dolore tetanicos aqua calida somētamus, nocte atque die scilicet, ut præter incongruæ qualitatis

Nota compa-  
rationē haud  
illeepidam.

\* lib. I. de rat-  
vict. in morb.  
acut. idē Hip-  
pocr. scribit.

\* hoc falsum,  
et si credatur,  
perniciosum?

\* obseruare.

\* istum

qualitatis percussum, etiam temporis peccato, atque immodicæ quantitatis, dolentia prouocentur, quum sit tunc mitigationis atque blandimenti opportunitas. Interea inquit sacculus ex milio confectis fouemus, uel cachry, uel salibus, quæ quidem sine dubio ob acrimoniam acutis passionibus sunt contraria, tanquam acre collyrium his qui acutis doloribus oculorum afficiuntur. Hic præterea etiam inquit aridas uaporationes operantius mederi, quàm cataplasmata, non aduertēs, quia tunc nerui ob colligationem tumoris indigent laxamento atque indulgentia. Ex siccis autem uaporationibus, ut etiam ipse \* consistetur, siccantur, et tenuantur, et arescunt corpora. Conuenit etiam ( inquit ) cataplasma simplex, quod omen lysin appellant, pueris atque mulieribus, et uiris quorum corpora fuerint dimissa, atque mollia, uel tenera, cum potuerit id omnibus conueniens dicere. Quid \* enim tam uanum atque ( ut ita dixerim ) ridiculum, quàm ob usum cataplasmatum naturam, uel ætates, ac uitæ consuetudinem \* præseruare? Dehinc possunt pueriles ætates, uel muliebria corpora non libere educata, neque mollia inueniri: quo fit ut cōmuniter in omnibus utilissimum cataplasmatum adiutorium prohiberi uideatur. Ob \* istius errorem qui non manifestis intentionibus res aduertendo, falsis curationibus implicatur, adhibet etiam clysteres acerrimos, atque uehementius operantes, salutarem putans ex his febrem generari, quo raptus, siue adductio materiæ è partibus patientibus ad intestina fiat. Quæ igitur maior accusatio esse potest acerrimi clysteris, quàm quod febrem facere promittatur? Quid enim utile ex eo sperare possumus, ex quo id perficitur quod etiam sine tetanica passione graue corporibus

bus existimatur? Probat etiam uehementes\* feruores\* <sup>vapore sale</sup>  
 similis acrimoniae, iubens saccello sale pleno aqua ca-  
 lida tincto partes quæ patiuntur uaporari: \* <sup>tum</sup> Tunc duo-  
 bus cauteritis alternis sales incendi, ut ex ipsis inua-  
 dens quædam spiratio penetret altiora. Sed horum  
 acrimoniam iam pridem reprobauimus. Idem \* ignem <sup>ωαρίπτασις</sup>  
 plurimum accendens, & \* superponens ægotantem, <sup>Asclepiadis,</sup>  
 omnes spondylos spinæ olco per diem atq; noctem iu- <sup>mirū auxiliū.</sup>  
 giter fricat, \* at est uehementer culpabile. Omnis ete- <sup>prope appo-</sup>  
 nim impressio, & tumentia prouocat & dolorem ge- <sup>nens</sup>  
 minat. Item iugiter diem atq; noctem \* id facere iubet, <sup>quod est</sup>  
 usu etiam sanos potest quadam uexatione \* in consen- <sup>quod facere</sup>  
 sum mittere: quippe cum sæpe in uno latere iacentes, <sup>dolorem in</sup>  
 atque eodem tardantes schemate, uexemur. Item plu- <sup>iis per consen-</sup>  
 rimus frictionis usus densat: deniq; etiam in seruētibus <sup>sum excitare.</sup>  
 lauacris corporis superficies perstipatur. Et quid ul-  
 tra dicam: cum sit euaporatiuæ uirtutis paroptesis, te-  
 tanos autem mitigatione indigeat, ob celeritatem sui. <sup>\* Idem</sup>  
 \* Item ait cucurbitā utilem magis quā phlebotomiam <sup>\* per cucurbi-</sup>  
 huic probari passioni, nisi (inquit) febres prohibue- <sup>tulas, vide pa-</sup>  
 rint materiæ \* detractionem: uel in uenis plurima fue- <sup>gina 272. &</sup>  
 rit plenitudo. Tunc enim erit phlebotomia adhiben- <sup>273.</sup>  
 da in ipsa uehementiæ summitate. Difficile enim inquit <sup>\* prælator eius</sup>  
 detractionem fieri corpusculorum posse, tempore di- <sup>usus quam cu</sup>  
 missionis. Sed dicimus contra neq; raptum cucurbitæ <sup>curbite</sup>  
 posse febribus cohiberi, sicut in ipso sæpe opere proba- <sup>\* licet, ut neq;</sup>  
 uimus: neq; melior phlebotomia, uel \* prælator usus <sup>\* amputantia</sup>  
 cucurbitæ esse potest. Etenim in augmento phleboto- <sup>remedia, quæ</sup>  
 mia locum habet, quo tēpore cucurbitā adhibere non <sup>nunc Eradica</sup>  
 \* licet: neq; cucurbitæ tēpore phlebotomiā, quo no- <sup>tina vocant.</sup>  
 xia probatur. Tēpus etiā phlebotomiæ illud est, quod <sup>\* adiutoriorū,</sup>  
 etiā aliorū \* amputātium \* adiutoriorū, ut est dimissio <sup>nempe dimis-</sup>  
 sio, non totius <sup>augmentū pas-</sup>  
 sionis. In aug- <sup>mento enim,</sup>

nis, in totius augmēto passionis in acceſſione enim ſim-  
 pliciter mitigantibus utimur adiutoriis. Aſclepiades  
 autem ob extinctam falſis intentionibus \* cauſam, neq;  
 aptum ſcire potuit phlebotomiæ tempus. Declinante  
 igitur paſſione egrotantes nutrit, atq; ſuccis, & ſor-  
 bilibus cibis. Sera igitur ſi declinatio fuerit, quam ex-  
 pectandam ob nutriendum putat, aut ut ſæpe contigit,  
 poſt decē dies effecta, immodica atq; interſeſtrix tāta  
 abſtinentia iudicatur. Dehinc quæ agro adhibenda  
 ſint, docere neglexit, utrūne piſcium, an uolantium,  
 uel quadrupedum, ſed omne genus \* corruptibile atq;  
 inſtabile complexus eſt. Præterea linquēs uerē reſum-  
 ptoria adiutoria, quæ magis fuerant demonſtranda,  
 aliena ordinauit. Hæc ſunt quæ Aſclepiadi reſponden-  
 da probamus. Cōmuniter autem repudianda eſt omnis  
 alia \* quæq; fuerit acrior materia. Etenim quidam, ſi-  
 cut Clodius Aſclepiadis ſectator memorauit, laſer,  
 quem Græci opon cyrenaicon uocāt, cera inuolutum  
 bibendum tradiderunt. Dant etiam caſtoreum præbi-  
 bendum, & ſerulagine, cū euphorbio colla perungūt,  
 atq; ſpinam. Item pleriq; ſuperficiem uulnerant ignis  
 uſtura, & ex ſinapi atque fico adhibent cataplaſma.  
 Alij frigida ſouent, cum nimiam uiderint tenſionem,  
 & poſt perſuſionem frigide, fricant calidis rebus. Alij  
 utuntur etiam lauri baceis, & thymo, & origano, &  
 nepeta, & hyſopo, & herba ſaluia, & butyro & ce-  
 dria, & herba \* pulicaria, \* & ſemper uiua: auſi etiā  
 quidam uiſcellum ranarum dare, quæ omnia prompta  
 atq; maniſeſta peccata probantur. Alia enim ob acri-  
 moniam tumorem \* prouocant, ut euphorbium, & ſe-  
 rulago, & laſer, & ſinapi, uel his ſimilia: alia cōſtrin-  
 gendo perfectam ſtriſturam \* cōtendunt, ut herba pu-  
 licaris

\* rationem

\* nempe ſuccos  
& ſorbilia

\* quæcunque  
fuerit

\* Pſillo

\* ut illarū hu-  
more duritiē,  
tenſionem, ſic-  
citatē neruo-  
rum mollirēt,  
laxarent, emē-  
darent.

\* irritant

\* intendunt. i.  
augent.



licaris, quam psyllium uocant, & semperuiua, quam aizoon uocant, & aqua frigida. \* Viscellum autem ranarum \* experimentum esse dicitur, & est odiosum, in semet nihil habens commodi, quod ratio probet.

\* iecur  
\* nulla artifi-  
ciosa ratione  
inuentum.

De Hydrophobia. Cap. ix.

**D**Einde hydrophobia quæ nomen sumpsit ab accidenti. Est enim uehemens timor aquæ. Nam Græci timorem phobon uocant, aquam hydor appellant. li deniq; detracta litera & adiicientes γ, hygrophobiam uocauerūt, q. omnem \* liquorem metuat: sed consuetudo magis primum obtinuit nomen, \* siquidem plus aquā timeant egrotantes, uel q. inter ceteros liquores plurimum aqua præstet. Alij quoq; phobodipson appellant, q. cū timore sitiāt: polybus pheugydron: siquidē \* aquā fugit. Nos deniq; aquā fugā dicere poterimus. Andreas Cynolysson uocauit, ueluti ex rabie canina morbum conceptū. Accendens autē causam passionis, est canis rabidi morsus, uelut quidā memorant, ceterorum quoq; animalium, quæ \* sint simili rabie noxia, ut luporum, urforū, leopardorū, equorū, & asinorum. Hominum \* hydrophobarū quidam in hydrophobicā passionē deuenērūt solius aspirationis odore ex rabido cane abducto, cum \* deflectione quadam naturalis spiratio uexata nenenosum aerē adducit, & \* talibus inserit partibus. Alij rabidi animalis unguibus læsi in rabiem deuenērunt. Memoratur deniq; sic mulierē in hydrophobicā passionem uenisse cui facies fuerit leuiter à paruulo \* catulo laceßita. Quidam à gallo gallinaceo pugnante leuiter læsus in rabiem uenisse dicitur. Sartrix etiam quedam quum chlamidem scissam rabidis morsibus, sarciendam sumeret, atq; ore stamina componeret, & lingua pannorū futuras lam-

\* liquorē egri  
metuant;  
\* quoniam

\* aquam egri  
fugiant.

\* sunt

\* hydrophoborum  
\* defatigatione

\* principalibus

\* fortassis Me-  
lita, quem in  
delitiis habebat.

beret assuendo, quò transitum acus faceret faciliorem, tertia die in rabiem uenisse memoratur. Est præterea possibile, sine manifesta causa hanc passionem corporibus innasce, cum talis fuerit strictio spõte generata, in passionem ueniunt, quidam tardius. Ideo etiam post annum aut eo amplius afficiuntur, sed magis plures post quadraginta dies.

Quæ est diffinitio siue agnitio hydrophobia.

## CAPVT X.

**E**st agnitio hydrophobia, appetentia uehemens, atq; timor potus, sine ulla ratione, ob quandam in corpore passionem. Adiectum est autem, sine ulla ratione, atq; ob quandam in corpore passionem, quod alij timeant potum, ut ueneni admixti suspitione, uel arte prouidentes: quia si intemporaliter sumpserint, periclitabuntur. Neq; illico hi ratione timentes, hydrophobi esse uel dici possunt.

Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicam passionem proni ac decliues esse uidentur.

## CAPVT XI.

**S**equitur eos qui in istam passionem proni ac decliues esse noscuntur, cum iam prætangi cœperint, anxietas quædam sine ulla ratione, atq; iracundia, & corporis difficultas, insolitus motus: somnus etiam suspensus, atq; turbatus, uel uigilia, & simul cibi corruptio, stomachi grauedo, crurum atq; brachiorum extensio, oscitatio iugis, & impigra\* leuandi uoluntas: insueta etiam querela aeris, tanquam austrini, quamuis serena fuerit quies: Item difficilis toleratio, atque tædium, & recusatio imbrum, parua bibendi uoluntas contra consuetudinem. Obtimente passione appeten-

tia

\* qualis è ueneno.

\* leuandi stomachum. i. uolendi. nisi manibus legere, laudari, quod magis probo.

tia bibendi, atq; timor, primum ad ipsius aquæ uisum;  
 secundo etiam si eius audierint sonitum, uel nomen.  
 Dehinc timor fumentationis olei, pulsus densus, par-  
 uus, inordinatus: quibusdā febricula, saltus stomachi,  
 torpor, atque stupor articularum, subreptio atq; ex-  
 tentio præcordiorum ad superiores partes, & officij  
 uentris abstentio. Urinæ reddendæ paulatim frequen-  
 tatio, tremor atque conductio neruorum, uox obtusa  
 & uelut latrabilis\* corporis\* spui similis, siue canina  
 inuolutio: spiratio difficilis, iactatio corporis\* omnis  
 ad ingressum hominum, tanquam secum aquam asseren-  
 tium. Rubor uultus, atque oculorum, & corporis te-  
 nuitas, attestante pallore, cum sudore partium superio-  
 rum, ueretri frequens tensio cum seminis inuolunta-  
 rio iactu: lingua prominēs. In ultimo etiam singultus,  
 & uomitus fellis, ac frequentius nigri: quibusdā  
 etiam\* timor: manus\* oculis tenus admotæ, \* uel cir-  
 cum tractæ: quidam se agnoscere fatentur esse natura-  
 lem uel consuetum aquæ liquorem, \* cum sibi monstra-  
 tur, sed commoueri cum uiderint, ut seipse quoq; So-  
 ranus uidisse testatur, in hac passione constitutū\* hor-  
 tatum liquorem ut sumeret, nec tamen potuisse. Aiunt  
 & militem quendam, ut Artorius memorat, in passio-  
 ne constitutum, sibi indignatum, q, in bello nulla ti-  
 muerit uice, sed\* nunc aquam cum uidisset, quæ esse  
 consuetudini\* iocunda\* solet, metu inenarrabili ter-  
 reretur. Eudemus Themisonis sectator memorat fuisse  
 hydrophobum medicum, qui cum prænosceret pericu-  
 lum, suppliciter\* ingredientibus exoraret, & cum la-  
 chrimarum fluore guttis destillantibus tangeretur,  
 exiliens uestem\* consciderit. Dehinc Soranus memo-  
 rat se infantem hydrophobum uidisse ubera matris  
 \* conscinderet

\* & corporis  
 decubitus ca-  
 num dormien-  
 tium cōtractio  
 ni similis.

\* sui similis  
 siue canis.

\* pavor ad o-  
 mnium homi-  
 nū ingressum  
 tāquam, &c.

\* tremor  
 \* poculis  
 \* sed retracta  
 \* qui

\* sese hortantē

\* tunc  
 \* iocunda  
 solebat

\* ingredientibus  
 ne propius ac-  
 cederent, ora-  
 ret,

\* conscinderet

\* longius ire  
prohibito.

expauescentem. Item ait quendam Atheniensem sibi retulisse, quòd uiderit hydrophobum ex domo fugatum ad locum uenisse, ubi inclusus, corpore\* implicato, uitam finiuerit: sed in ipso loco fuisse canem iacentem, quem rabie accensus repente accurrens momorderit. Communiter autem est passio strictura, atq; uehemens, & acuta, uel celeris. Etenim ob nimium tumorem, & humoris defectum egrotantes celeriter interficiuntur. Nec Demetrio danda fides est dicenti quòd etiam tarda hæc passio possit esse, hoc est diuturna, quam Græci chroniam uocant: siquidem dicit in ista passione leui \*tumore affectos biennium transsegisse. Neq; Asclepiadis sectatores intelligibile quiddam asserunt, qui propterea passionem tardam putant, quia post plurimum tempus morsus inflicti, egri morte afficiuntur, cum non oporteat illud tempus egrotanti imputari quo nòdum rabie uexatur, quippe cum passio necdum corpus afficiat, & cum\* emicuerit, non habeat\* superpositiones, seu dilationes, \*specialiter tardis afficiuntur passionibus, & ob hoc celerrime egrotantes interficiat, non solum ut acuta, sed etiam ut continua passio.

\* timore nempe aquæ passione

\* agrum corripuerit

\* exacerbationes, per interualla sese remittens, ac ingrauescens.

\* ut in his qui specialiter

Quæ sunt similia hydrophobiæ: & quomodo internoscuntur. Cap. xii.

Similes sunt hydrophobicæ passioni phrenitis, mania, quam nos furorem, siue insaniam dixerimus: sed hæc discernuntur, siquidem plus in \*ipsis caput patitur: in phreniticis uerò etiam febres\* sequuntur: in hydrophobicis uero plus stomachus: & sine febribus esse perspicitur, & acuta atque celeris passio. Mania uero etiam tarda frequentius inuenitur. Eudemus Themisonis sectator inquit \*melancholiam esse hydro

\* Maniacis  
sequuntur.

\* melancholicam

hydrophobicam passionem, sed ab hac quoque discernitur. Siquidem tarda\* sit melancholia, acuta uel \* est celeris hydrophobia. Alij quoque aërophobas aiunt esse similes supra dictis, sed internosci. Siquidem aëris \* sit timor, quod generaliter phreniticis ascribitur. Etenim phrenitici quidam aërem lucidum extimescunt, quidam obscurum. Andreae sectatores memorant esse \* pantaphobas, quos nos omnipauos dicere poterimus, siquidem omnia timere \* dicantur. Si uere tamen hæc esse poterit passio, discernitur quidem quod non solius potus, sed omnium rerum timorem faciat.

\* Pātaphobos.  
παντοφόβος  
\* dicuntur

Utrum ne animæ an corporis passio sit hydrophobia.

Cap. XIII.

**Q**uestum etiam utrū animæ an corporis passio sit hydrophobia. Etenim quidem esse aiunt animi passionem. Siquidē appetere uel desiderare est animæ speciale, non corporis. Denique purpuram cupientes, uel statuas, uel militiā, aut regnū, aut pecuniam, neq; uenis, neq; nervis ægrotare dicuntur, uel arteriis, sed animæ affici passione: quo fit ut etiam hydrophobia animæ sit passio. Est enim appetentia potus: quippe cum timor & moestitudo & iracundia passionibus sint animæ. Timent igitur aquam \* hydrophobæ, quo necessario animo ægrotare noscuntur. Nam omnis phantasia, cuius diuersitates Latini uisa uocauerunt, ut Tullius, siue illa naturalia siue contra naturam fuerint, animi non corporis esse noscuntur. \* Hydrophobæ igitur phantasia iactantur, scilicet ea quæ contra naturam esse uideatur: quo assumitur, eos animi affici passione. Sed his qui hæc asserunt consentiendum non est. Etenim appetere uel delectari

\* hydrophobi

\* Hydrophobi

\* etiam

potu, sicut etiam mandere, ex corporis quadam nascitur passione. Timor\* enim per consensum animæ corpori compatiens nasci perspicitur: quo fit ut corporalem esse passionem hydrophobicam manifeste perluceat. Etenim antecedens morsus, ex quo causa descendit, utique corporis fuit, & non animæ. Antecedentia autem atq; consequentia, ut est singultus & difficilis corporis motus, & grauedo, & his similia corporis esse noscuntur. Nam animæ passiones, ut Philosophi uolunt, nostri sunt iudicij: hydrophobica autem passio ex corporis necessitate descendit: quo fit ut sit corporis passio, sed etiam animæ occupet qualitatem, tanquam in furiosis uel melancholicis.

Quis locus in hydrophobicis patitur.

## CAPVT. XIII.

\* spasma: &  
convulsione.

\* ueteri ut  
supra

\* uentriculi os.

Vicina etiam questio est supra dictæ, quis nam in hydrophobicis locus corporis patiat. Equidem Democritus cum de Emprosthonicis diceret, neruos inquit: coniiciens hoc ex corporis\* conductione, atque\* ueteri tentigine. Asclepiadis sectatores alij membranam aiunt cerebri. Si quidem secundum Asclepiadem omnis passio quæ mentem turbauerit in ipsa consistit, ut phrenitis, lethargia, epilepsia. Quo assumitur, ut etiam hydrophobica passio eidem membranulæ ascribatur, quæ animum conturbat. Alij aiunt diaphragma pati, siquidem in ipso est dolor constitutus. Arthemidorus Erasistrati sectator, & Artorius Asclepiadis sectator, de hydrophobia scribes, atq; plurimi nostræ sectæ scriptores, aiunt\* stomachum pati: siquidem singultus sequitur & uomitus fellis, & appetentia insatiabilis bibendi, quorum singula stomachi passionis esse noscuntur, consentire tamen etiam memb

membranas cerebri. Sed nonnulli Asclepiadis sectato-  
 res stomachum atq; \*uentrem pati dixerunt. Etenim \* τῶν ἐν τῷ  
 bibendi appetentiam non solum stomachi \* paruiſſimis \* τῆς γαστρίδος  
 uis, sed etiam uentris fieri probant: uomitum quoque  
 utriusque partis effici passione. Gaius Herophili se-  
 ctator libro quo de timore aquæ scripsit, ait cerebrū  
 & eius membranam pati. Etenim uoluntario \* motu \* κινήσει  
 seruientes nerui, atq; stomachum colligantes, initium  
 uel originem inde sumpsisse noscuntur. Magnus uero  
 Ephesius secundo libro epistolarum, ait sigillatim esse  
 dicendum, omnia quæ difficultate motus in hac passio-  
 ne afficiuntur, pati, hoc est cor, stomachum, diapra-  
 gma, caput, ilia. Non enim pulsum malignum fie-  
 ri posse suspicatur, nisi præpatiente ea parte cor-  
 poris, unde initium sumit, quæ necessario \* sine ulla sue \* cum ulla  
 rit uexabili passione. Pulsus mutari in peius nunquam  
 etiam potest, neq; difficultas spirationis fieri, si dia-  
 phragma atq; pulmo naturali positione maneant, ac  
 nullo modo tentata: neq; tentigo frequens, atq; ultra  
 naturam, nisi uirilia, siue \* radius uirilis fuerit in tu- \* radius uiri-  
 more constitutus: neque uisa mentem fallentia, quæ lis  
 Græci phantasmata uocauerunt, nisi capite patienti  
 fieri possunt. Siquidem in \* ipsa uel in \* ipso sensus om- \* mente  
 nes sunt constituti, ac sensuales uis ex ipso ad cor \* re \* capite  
 feratur, quorum nihil est ad medicum necessario per- \* referuntur,  
 tincens. Sufficit enim agnouisse caput pati tempore  
 quo mens fuerit alienata: quippe cum etiam ex an-  
 tecedentibus signis pati noscatur. Præcedit enim qui-  
 busdam dolor capitis atq; aurium tinnitus: uisus quo-  
 que falsitas, prouolantium ueluti animalium minuto-  
 rum tanquam culicum aspectu, quapropter palpebra-  
 tionem frequentant: nec non etiam uultus seruator cum

rubore per ora se insinuans, attestante lachrymarum, fluore, cum angulis oculorum sanguinolentis, extantibus uenis ex utraque parte temporum, apparet. Sed horum singuli ratione commoti, uera quidem, sed deficiente, hæc posuerunt. Præpatitur enim ea pars, quæ morsu fuerit uexata, unde initium denique passionem sumere nemo negat. Patitur enim totum corpus, quod probamus ex his quæ singuli dixerunt. Cum enim alij alias asserunt pati partes, omnes pati consentientur. Fit autem probabilius ex his quæ manifeste hydrophobicos sequuntur. Ea sunt saltus membrorum, raptus siue contractio neruorum, sitis, aquæ timor, tentigo, abstinentia uel retentio egerendorum. Plus tamen stomachum pati, atque uentrem recte dicimus. In ipsis enim plurima sunt accidentia signa, & manifestiora, ut singultus: saltus: egerendorum retentio: conductio uel contractio: sitis intolerabilis. Sed nihil horum ad curam necessario refertur. Vbi enim passionem inuenimus, eidem parti iuxta magnitudinis comparisonem adiutoria adhibemus.

Vtrum noua passio sit hydrophobia.

CAPVT XV.

\* ioco

**Q**uidam logicorum quæsiuerunt pro \* loco utrū noua passio sit hydrophobia, ut si nouam inuenirent, nouam etiam causam atq; curationem inquirerent: quod à nobis quidem alienum est. Fieri enim potest ut particulares uel speciales passionem nouæ fieri possint, generales autē uel principales, quarū dominio ceteræ quæq; subiiciuntur, fieri nunquā possint. Hæ deniq; consuetis atq; congruis curationibus similiter curantur: sed ut plenius omnia perspiciantur, singulorū placita, siue uisa, uel existimationes \* ordinamus. Etenim

\* ordinabimus

quidam



quidam aiunt nouam esse hydrophobicam passionem, quidam negauerunt. Et alij \* omnino, ut Artemidorus Sidensis. Alij \* specialiter, ut Caridemus sectator Erasistrati. Item nouam esse passionem plurimi dixerunt, \* sed ob astrictiorem probandæ nouæ passionis, aiunt, neminem ueterum hanc memorasse passionem, ac soli, inquit, nouelli inuectores eandem aduerterunt. Certè \* si sunt apud ueteres, nec tamen hæc memorata cognoscitur. Secundò confundit atque turbat hæc passio non solum inertes, sed etiam artifices: quo probatur ob tantam ostentationem magnitudinis noua inueniri. Dehinc aliarum passionum causæ apprehensibiles sunt, scilicet actiue atque operantes, quas synepticæ uocant: istius autem passionis incomprehensibilis est, quod est signum probabile nouæ passionis. Ad dicitur etiam quòd sit incurabilis. Sed his contraria sentientes falsum esse inquit, quòd hanc passionem nullus ueterum memorauerit. Etenim Democritus \* qui Hippocrati conuixit, non solum hanc memorauit passionem, sed etiam eius causam tradidit, cum de opisthotonicis scriberet: ipse quoq; Hippocrat. etsi non principaliter de ipsa passionē \* tractans, sensu tamen doctorum hanc memorasse monstratur, in Prædictiuo libro dicens phreneticos \* paruibibulos, sono quolibet pulsatos, tremore affici. Alienatione autem mentis hydrophobos uexari uidemus: quapropter hos Hippocr. phreneticos dixit paruibibulos, quos brachypotas uocant, hoc est, \* quòd modicum biberent, ob timorem liquoris. Item polybus hanc passionem memorauit, dicens aquifugas citò interire, quos pheugydros appellauit. Homerus quoq; hæc agnouisse passionem probatur. Coniicit enim per figuram cum de Tantalo dicit.

Item

\* nullam esse nouam.  
\* hanc nō esse nouam.

\* et

\* multa descriptæ sunt

\* vide initium capitis precedentis

\* tractat

\* βραχυπότης

\* qui

Item ubi inducit Teucrum occisis octo, Hectorem non potuisse percutere, atque ita loquutum ut diceret se hunc interficere nō posse rabidum canem. Cum igitur memorauit Homerus id ex quo fieri hydrophobæ possunt, erit consequens, ut & quod fieri possint, scierit. Item Comicus Menander inducens senem irascentem, istius passionis imaginem uinolentis adscripsit, dicens non posse bibere eos qui uinum usque ad uexationem potant. Ratio quoque hoc ostendere uideatur. Etenim superioribus temporibus aut erant canes, aut non erant: sed non fuisse nemo dicere audeat. Passionis etenim causam prompte Homerus memorauit. Si igitur fuerunt, etiam rabie affecti sunt: quo fit ut cum fuisse causa ex qua hydrophobi fierent, <sup>\* possent.</sup> atque homines qui fierent, uel pati <sup>\*</sup> potuissent demonstretur, erit rationabile, ut apud antiquos hæc passio fuisse credatur. Expauescere autem siue confundi, ut aiunt, non solum inertes, sed etiam artifices hac passione, non necessario signum est eandem incurabilem pronuntiandi. Etenim plurimæ aliæ passionēs non aliter uidentium mentem confundunt, ut satyriasis, apoplexia. Item causa præcedens eius passionis, incomprehensibilis ut putant, non est, quam plurimi medicorum atque philosophorum tradiderunt. At si esset incomprehensibilis, quod ex ea sequitur, manifesto esse apprehensibile, nulli negant, uel si esset incomprehensibile, id quod sequitur, hoc est passio, non tamen incurabile. Ac si incurabile, non necessario nouum, ut neque carcinoma. Sed aiunt principaliter ex his quæ sequuntur, uel designant hydrophobicam passionem nihil esse eiusdem proprium, ut singultus, qui quanquam eos sequatur, sit tamen communis eorū qui hydro

hydrophobi non sunt. Sitis etiam sequitur, atque uomitus fellis, sed febricitantibus hæc sæpe contingunt. Item turbatio mentis atque timor, sed etiam phreneticos sæpe comitantur. Si igitur nihil proprium sequitur hydrophobos, sed sunt omnia communia aliis passionibus, non poterit noua passio nuncupari. Nos quoque his consentimus. Videtur etenim hæc passio etiam frequentare quibusdam temporibus, uel locis, ut apud Cariam atque Cretam. Hæc enim insula aliorum uenenosorum animalium \* difficilis, atque pene libera, sola canum rabie uexatur frequentissime. Poetarum quoque testimonium longè \* uetustissimum, \* atq; non rectis necessariò uerbis destinatum, accipiendum ducimus. Item Hippocrates magis phreneticos memora- uit, non hydrophobas, paruibibulos. Nam inquit eos, quod in quibusdam phreneticis frequentare uidemus, aut fastidio possessos, non solum cibum, uerum etiam potum refugere: uel certè traductos uisis, quæ Græci phantasiâ appellant, (ut ait Eudemus) ut accipien- dum non existiment potû: uel suspitione \* delirationis affecti, admixta putent uenena liquori: \* tremunt quoq; nonnunquam debilitate neruorum, & ad omnem sonitum \* commouentur, scilicet alienationis proprietate, & non \* necessariò hydrophobicæ passionis. Quapropter aliis utendum est rationibus ad demonstran- dum esse nouam hydrophobicam passionem.

Quomodo curandi sunt hydrophobæ.

Cap. xvi.

**C**urandos hydrophobas conuenit iacere loco mediocriter calido, atque lucido, adhibita articulo- rum defricatione, \* seruatos etiam insomnes usque ad laxamentum temporale. His quoque partibus quæ rapiuntur

\* raro alitrix  
& procrea-  
trix.

\* nempe Ho-  
meri quem su-  
prà citauit.

\* sed non

\* ob deliratio-  
nem affectos,  
ut admixta

\* tremere

\* commoueri

\* necessitate

\* seruari

rapiuntur, uel conductione uexantur, calidis atque  
 \* aut mundis lanis, \* ut pannis præteſtis, adhibendæ etiam  
 molles uaporationes. In ſtatu acceſſionis, dulci atque  
 calido oleo clam lanis tinctis, uel foris à cubiculo in-  
 fuſis, tum immiſſis ſouendæ, ne uiſu liquoris ægrotantes  
 in commemorationem timoris reducatur. At ſi aliqua  
 \* indicanda, fuerit indulgentia paſſionis, quæ erit \* apprehenden-  
 & cognoscenda. da, ſi etiam febres fuerint, ex minutione ſeruioris, ſi  
 etiam non fuerint, minutione timoris, erunt phleboto-  
 \* Præterea mandi ex brachio, quo uena facilior occurrerit. \* Ita  
 \* auertenda in fluenti ſanguine \* aduertenda ſunt ægrotantium  
 ora, atque manu excipendus fluor, ne ſonitu percuſſi  
 commoucantur. In diatriſto uerò erunt primò pungen-  
 di, ſed pannis oleo tinctis (eorum enim tractu latenter  
 \* diatriſto corpora perungentur) extergendi quoque: at \* alia  
 \* inunctis ſouentur aliis calidis atque \* immundis conſequenter  
 pannis, uel linteolis: tunc poſt perunctionem cibus dan-  
 dus tenuis, & ſorbilis, quo latenter cum cibo etiam po-  
 tus inducatur: & panis aqua inſuſus, uel alica ex a-  
 qua: facilè enim accipiunt. Sed oportet magis tempora  
 dandi ſeruare cibum & potum: quod fiet hoc genere,  
 ut ex obliquo fabulantes de conſueta uita loquantur,  
 lauacra memorando, atque bibendi copiam. Tunc ſi  
 ægri his dictis placidi permanſerint, ſidenter offeri-  
 mus potum, dimiſſionis tempore inuento. At ſi com-  
 moti, uel irati fuerint, audito lauacro, uel potu, erit  
 differenda oblatio: dandus interea potus in fictili ua-  
 ſculo, ſubtili cauerna perforato, tanquam ſunt papillæ  
 \* proiecto ocu- uberum, & dandus ægrotantibus, \* præſecto obſtacu-  
 lis obſtaculo. lo oculorum, uel temporaliter clauſis fenestris. Eſt  
 enim omnifariam mitigatione paſſionis prouidendum,  
 ut nulla occaſio detur excitandi furoris. Oportet de-  
 nique

nique etiam ministros aptissimos esse, & primò ut sint  
 taciti, neque fabulas iniicientes, sed eius respondentes  
 dictis, & ipsa respondentes, ut \* cedenter, ac sine ulla \* cedentes  
 \* constantia cum consentiendo coerceant, atque eius \* resistentia ei  
 uisa, quæ mentis falsitate efficiuntur, eidem sensim di-  
 splicere, atque incredibilia faciant. Dehinc conuenit  
 laxatiuis cataplasmatibus thoracem curare, \* & à \* & à tergo in  
 tergo inter utrasque palas, quod Græci metaphrenum  
 uocant. Cum autem statum sumpserit passio, etiam cu-  
 curbita apponenda iisdem locis, cum scarificatione: pag. 168.  
 tum spongiarum uaporatione utendum: quæ quidem  
 latenter erunt ex oleo atque calida exprimendæ, &  
 apponendæ, obuolutæ pannis, uel lintcolis, ne humoris  
 sensus aut sonitus exagitent ægotantem. Tunc etiam  
 caput detondendum, & iisdem adiutoriis concuran-  
 dum: gestatio adhibenda, in lectulo suspensio ægro, siue  
 portatoria sella. At si passio perseuerauerit, iisdem  
 perseuerabimus adiutoriis. Illud etiam erit affectan-  
 dum, ut si omnino potum recusauerint, qualibet tamen  
 parte quiddam liquoris assumant, & nulla indignatio-  
 ne ægotantes afficiantur uisu perterriti. Quod ita  
 facere poterimus, si calidam atque oleum clystere per  
 podicē iniiciamus, & hoc si fieri potuerit, alternis alijs  
 diebus: paruum quidem: tunc enim poterit contineri.  
 Nam si fuerit plurimus humor, sua redundantia ac pō-  
 dere prouocat excludi. Erit enim eius continentia uti-  
 lis ad minuendam sitim. Nam neque solum dysentericis  
 iniectum medicamen superiora inuadens sæpe stoma-  
 chum atque caput uexare accipimus, siquidem eò ne-  
 cessariò peruenit, sed etiam calidam & oleum perue-  
 nire posse concipimus, quo partibus iisdem irrigatio-  
 nis præbeat laxamentum. Post iniectionem deniq; ma-  
 nibus

nibus admotis, impressione moderata, ex inferioribus ad superiora ducentes, liquorem ascendere prouocamus. Declinante passione erunt agrotantes resumendi, sed multo tempore à lauacro abstinēdi, atque uino, ne in periculum redcant. At si ex ista passione, ut saepe contingit \* satyriasis fuerit effecta, erunt adhibenda

\* veretri, ut antea dixit, tē-  
tigo.

\* Diosco. cap. 36. lib. 6. Themisonem quorūdam sermonibus ait à cane demorsum fuisse: aliorum verò fama, in hunc furorem incidisse, quod amico aquam expauescentis inferuisset, ac officium exhibuisset.

\* relaberetur.

\* vas

\* alios

\* illius

\* Aiunt denique Themisonem quanquam uolentem, nō potuisse: siquidem ex rabido cane quondam fuerat uulneratus, et si eius curationem assumeret mente, quippe scripturus, continuò admonitus in eandem \* laberetur.

Democritus uerò iubet origani decoctionem dari, atque ipsum poculum quo bibunt in sphaera rotunditatem formari. Est autem hoc genus decoctionis acerrimum, atque stomachum uexans, & incendens: in quo etiam idem sibi repugnare perspicitur. Ait enim hydrophobiam esse incendium neruorum. Quidam Medici, ut Artorius memorat, alios in \* uasculum plenum frigida miserunt, alios in puteum posuerunt, saccis immisos, uel inclusos, ut necessitate bibere cogerentur, \* alij in aquam calidam, nescij quòd passionis curatio \* illa sit, non ut bibant agrotantes, sed ut bibere uelint: quod fiet cum passio fuerit adiutoris destructa.

Multi denique etiam bibentes raptu affecti sunt grauiore. Quapropter etiam toto corpore infundendos, ut putant, in aquam frigidam, magis uexabile comprobamus. Omne etenim frigus extendit tumentia. Nam propterea, ut Artorius dixit, raptu interficiuntur. Aristoxenus ad \* corruptionem atque abundantiam liquoris intentus, \* prædandum dicit potum, atque clysteribus utendum, cōmuniter omnibus, \* depurgatiue

\* potionem  
\* semper dan-  
dum

\* errypticis,  
vel epicera-  
stis.

uel

uel\* temperatiuæ uirtutis: sed hæc tumorem passionis <sup>\*errypicu vel</sup>  
 intendendo geminant\* comitantia. Tullius Bassus etiā <sup>epiceraſticu</sup>  
 sternutamentis utitur, & clysteribus, cum generaliter <sup>ſymptomata</sup>  
 hæc paſſio mitigatione indigeat ob acutiſſimam cele- <sup>\* reſcorporati-</sup>  
 ritatem, & non, ut hic putat\* corporatiuis adiutoriis <sup>uis</sup>  
 ſit\* aſpergēda, quæ Græci metaſyncritica uocāt. Ni- <sup>\* exaſperāda</sup>  
 ger eius amicus etiam album helleborum dedit. Eude-  
 mus autem phlebotomans helleborum dat ſecunda uel  
 tertia die, atq; cucurbitas affigit uſq; ad partium pu-  
 ſtulationem. Agatinus libro de helleboro conſcripto  
 iubet etiam dari helleborum in initio paſſionis. Alij  
 podicem cataplaſmandum iubent helleboro. Alij colly-  
 ria ex ipſo facientes quæ appellauerunt balanos, po-  
 dici ſupponunt. Sed erunt communiter omnes culpā-  
 di, cum ſit paſſio acuta atque celeris, & uehemens, ac  
 ſæpiſſimè continua. Quippe cum nunquam puram atq;  
 ſynceram habeat dimiſſionem, & eſt helleborum re-  
 corporatiuæ uirtutis, ac propterea tardis paſſionibus  
 conueniens, quas Græci chronias appellānt, & in ea-  
 rum principaliter lenimēto, atq; regulis ciborū ægro-  
 tante præparato, \* quod Græci dietam uocant, quod <sup>\* quas</sup>  
 utiq; non ſine tempore prolixo fieri poteſt. Sine his  
 igitur nihil ueneno differet helleborū datum. Eſt etiā  
 graue uſq; ad puſtulationem corporis cucurbitas appo-  
 nere. \* Et ſimile quidā, tumentes oculos ligneo bacu- <sup>\* appoſita cō-</sup>  
 lo inungere. Quidam caſtoreo potādos iubent hydro- <sup>paratio</sup>  
 phobas: alij roſaceo oleo: alij diagridio, aut elaterio,  
 aut lacte, uel pinguibus iuſculis incongruè agitant  
 atq; grauātes ægros, & nō eo tēpore quo permitti po-  
 tuit uſus ſupra dictorū, præcautionis cauſa ac effugiē-  
 de paſſionis. \* Nunc etiā ſi præſens indigeat congrua <sup>\* nō autem cū</sup>  
 curatione. Clyſtere quidam depurgant uel temperant <sup>præſens indige</sup>

\* communitate, i. indicatio-  
ne  
\* Quidam ni-  
hil aliud  
\* illius  
\* ligneo  
\* lupi. Ad id  
laudat Aetius  
pellē Vrsi, &  
Phoca, sed pre-  
cipue Hyane  
ut legendum  
putem, (vel  
Hyane be-  
luæ pelle.)  
Plin. cap. 30.  
lib. 8. ait, um-  
bræ Hyane  
cōtactu obmu-  
tescere canes,  
eāque vo-  
mitam homi-  
nis imitari, ad  
canes solutan-  
dos, quos inua-  
dat.  
\* obserua su-  
perstitiosum re-  
medium qua-  
liā multa noi-  
re inuimus.  
\* sinuosos an-  
fractus  
\* compressio-  
nem exitumq;  
negatum.  
\* obtrusiones:  
alijs fluctuationes, obtrusiones magis conuenit cum iis quæ proximè sequuntur.  
\* sepimentum: oclusionem

uim ueneni, quæ semper post effectam passionem con-  
temnenda est, urgentiore cogente\* cœnoteta. \* Item  
nihil aliud quam potum dare quoquo modo nituntur,  
nunc gelu, uel niuem offerentes egrotis, nunc uiridem  
ficum, uel pyrum, aut cucumerem, & his similia. Alij  
calami perforati initium ori egrotantis immittunt,  
dehinc ex alia parte per\* aliam cauernam aquam in-  
fundunt. Alij poculo\* lineo panno subter imposito, uel  
\* beluæ pelle, potandum putant, \* scilicet superstitione  
traducti, q. naturalis authoritas beluarum quæ ca-  
nibus est contraria, timorem egrotantium soluat. Sed  
hæc quæ uulgus per experimenta probata putat, lon-  
gè aliena ab arte monstrantur. Alia quoq; quæ facien-  
da ordinauerunt, ratione reiicienda sunt, ut ea quæ  
sunt uinosa ante declinationem offerenda. Item frigi-  
da sunt ob tumorem incongrua. Constringunt enim  
atque extendunt stricturæ difficultatem, ex qua sine  
dubio hydrophobica passio confecta probatur.

De acuto tormento, quod Græci ileon appel-  
lant. Cap. xvii.

**T**ormentum dictum est, quod existiment egro-  
tantes conuolui, atq; torqueri suorum intestino-  
rum\* uerticula: uel quod spiritus ob\* abstinentiam  
clausus sese inuoluens, \* uinctiones atq; tormenta effi-  
ciat, uel quod uehementia dolorum supra eas partes  
quæ patiuntur, egrotantes arcuati conuolutiq; pli-  
centur. Salimachus autem ait quosdam Pythagoricos  
apud Siciliam medicantes Græco nomine\* phragmon  
uocare, siquidem obtrusis naturalibus uentris officiis  
fieri uidetur. Item hanc passionem tertio libro acuta-



rum uel celerum passionum Asclepiades definiuit hoc modo. Tormentum est contortio extenta, atq; longi temporis intestinorum: sed \* hoc improprie dixit, q; sit longi temporis tormētum. Est enim acuta atq; celeris passio. Deniq; intestinorum tormentum dicimus esse, contortionem \* extentam, atq; perniciosam: sunt autē eius antecedentes causæ cōmunes, quæ etiam alias facere ualent passiones: sed magis perfrictio, indigestio: atq; cibi grauabiles, & instabiles, uel noui: aut uenum potum, aut cibo datum, aut fungi comesti. Sequitur autem in passione constitutos uentris uehementēs inflatio, & intestinorum, & dolor nimius iliorum, atq; osium, quæ à pube usq; ad ilia perueniunt, quæ Græci ephæbia appellauerūt, totius quoq; uentris atq; superpositæ cutis inflatio, & membranæ maioris, quam peritonæum uocant, scilicet quæ omnia interius tegit atq; continet uiscera. Consensu etiam, uesicæ, & officij uentris perfectæ abstinentia: stomachi euersio per nauſeam, salinarū fluor, sitis uehemens: spiratio \* hirta, atq; anhelatio: articulorum frigidus torpor: pulsus densus: singultus: exitus per podicem uenti nihil relictantis: ac si quicquam per clysterem fuerit iniectum, aut non admititur ob nimietatem stricturæ, aut admissum retinetur exitu negato: aut si fuerit redditum erit connexum pinguibus ac \* uesiculosiſ. Mulieribus etiā matricis adductio ad superiora fit, uomitus quoq; humorum \* pinguium, qui in uentriculo & ipsius officio adhærescebant contumaciter. His uero qui perniciosius atque \* specialiſ iactantur, etiam stercorum uomitus fit. Tunc quoque pulsus concidit: nigrescit corpus cum nimia linguæ asperitate: aliquando etiam ut Heraclides Tarentinus memorat, quarto libro de

\* hic

\* acutam

\* officij vētris,  
& cōsensu etiā  
vesicæ, perfe-  
ctæ

\* τὸν Ἀσκληπ  
quæ vox signi-  
ficat & den-  
sam, & hirtā,  
non satis apte  
hic vertit lar-  
tam.

\* spumeſis.  
\* crassorum,  
viscidorum.

\* exitialis

\* peritonai distenta tela

\* at

\* obserua

\* eicitur.

\* cæliacum affectum

\* ἡ τῶν κατὰ τὴν διάθεσιν  
\* obserua discer-  
ns ventricu-  
losos à colici,  
ventriculosos.

Græci vocant  
κατὰ τὴν διάθεσιν

\* superiore

\* species acutæ  
passionis

\* tormentum  
à chordapso.

internis passionibus, intestinorum uerticula distentis cutibus apparent, cum\* peritonæo dissecto sola fuerit ac superposita cutis. Alij uero memorant uentum per podicem redditum sine odore tetro perniciosum fore, \* ac si fuerit odoris tetri \* salutē promittere. In illis enim ob nimiam stricturam, tanquam liquatus spiritus purior excluditur, in his autem ob quandam laxamenti facultatem insectus exhalationibus stercoreū, \* excludetur. \* Torminosa igitur ab ista passione, quam specialiter tormentum diximus, magnitudine differre monstramus. Hi enim leui dolore afficiuntur, & ob hoc uentriculosi siue torminosi uocantur. Item discernuntur dolore uentris. \* Ventriculatio enim \* superius magis uentre est, atque sub præcordiis, & sæpe sine intestinorum tormento. Discernitur etiam à coli uexatione. Est enim principaliter coli uexatio, unius intestini passio, atque tarda, quam Græci chronicam uocant, & diutissime perseuerans. Tormentum autem \* solius acutæ passionis, est omnium intestinorū uexatio. Alij hanc passionem Chordapson uocauerūt, quòd non aliter quā chordæ intestina tēdantur. Nam ueteres Græci intestina chordas uocauerunt: sed hoc quoq; nomen alij commune uocabulum tormento posuerūt, ut Hippocrates, Praxagoras, Euriphon Gnidius. Alij differre\* dixerunt, ut Diocles libro de passionibus atq; causis & curationibus scripsit. Etenim tormentum non sine ructationibus fieri dixit, atque emisso per podicem uento, sine stercore egestione, uentrem quoque non necessario durum fieri, & clysteris iniectionem accipere: doloris etiam initium è superioribus magis accedere. In chordapso reicere ægrotantes, si mediocris fuerit passio, humorem: si uche

si uehemens, stercora: & neque iniectionem clysteris  
 admittere, uentrem durum, atque extentum iugiter, in  
 orbem tumoris subleuatum, \*interiores intestinorum \* inferiores  
 partes doloribus affici, \* stomachum \* quoque immo- \* supra dixit  
 bilem ac fixum, uel \* inflexum permanere. Sed de his stomachi euer-  
 huic dissentire necessarium non est: oportet enim in- sione per nau-  
 tentionem adhibere, atque intelligere, quod sit passio seam fieri  
 stricturæ, atque acuta uel celeris, & uehemens. Qua \* quidā legūt,  
 propter habendi sunt egrotantes loco mediocriter stomachū quo-  
 calido, atque lucido; adhibita requie cum silentio, & que non immo-  
 abstinentia cibi usque ad primam diatriron: prohibi- bitem  
 to quoque somno, donec accessio declinet. Incipiente i. non subuet-  
 autem eadem, articulorum adhibenda est blanda sum  
 manibus calefactio, & partes quæ doluerint, conte-  
 gendæ mundis, & mollibus lanis. Apponenda etiam  
 mediocris uaporatio, qua mitigari dolor possit, ut  
 sunt panni calidi, atque linteola, uel uestica \* calida \* sub aqua  
 ex oleo semiplena, uel saccelli ex cantabro calido & oleo  
 completi, uel polline, uel lini semine ex aqua mulsa.  
 Cum autem statum sumpserit accessio, iubemus eos, si  
 pati potuerint, iugiter foueri oleo dulci atque calido,  
 scilicet usu dextero, quo præcepto nuper infuso mox  
 nouū superfundatur oleum. At si dolor coegerit phle-  
 botomandi erunt scilicet ex brachio, dimissionis tem-  
 pore. Et si ante diatriron id factum non fuerit, \* fo- \* fouere primū  
 uentes primo os, deinde colluere permittimus ex os ac colluere  
 aqua calida, deinde \* dabimus potum paruum, ob miti- \* damus  
 gandum. Si enim plurimum sumpserint grauatis tu-  
 mentibus, prouocabitur passionis asperitas, sicut fit  
 cum graue quisquam cataplasma apponendum puta-  
 rit, ex plurima, atque \* corporosa induclura. At si in \* magna molē  
 ipsa diatriron fuerit adhibita phlebotomia, parum dif-

ferentes ob resumptionem, unctione corpus curamus,  
 & sorbile damus quiddam, tenue, atq; panem ex aqua  
 calida non quidem plurimum. Ea enim quæ ob appo-  
 sitionem cataplasmatibus exterius admoti asperantur,  
 magis plurimum distenduntur cibus uberioribus grauata.  
 Alternis denique diebus cibum dabimus, donec passio  
 declinet: dehinc cataplasmata adhibemus ex polli-  
 nibus, & lini atque scænuigræci seminibus, ex mulso  
 confecta, uel \* calida, oleo, illud curantes, ut calida  
 perscuerent plurimo tempore, & neque \* ualida atq;  
 robusta inductione grauabilia fiant pondere. Faciunt  
 enim egrotis dolores augeri. Tunc etiam cucurbitas  
 apponimus, sed eas quæ sint osculo latiore, atque la-  
 biis flexis. Lenius enim, atque blando tractu arri-  
 piunt membra. Tunc etiam scarificatione utemur, uel  
 in cucurbitarum uicem, ne earum pōdere graue quic-  
 quam egrotantes sentiant, uitrea apponimus uascula,  
 uel testea, quæ Græci amphoras uocauerunt. Tunc  
 spongiis uaporamus expressis ex calida, & oleo, uel  
 decoctione scænuigræci, aut lini seminis, aut agrestis  
 malue, & rursum cataplasmamus. Iniicimus etiam  
 per clysterem oleum calidum, uel calidam & oleum,  
 & ex supra dictis decoctionibus quicquam. Est etiam  
 consuetum nobis aquam oleo dulci, æquali modo  
 commixtam, cum hibisco coquere, donec aqua in-  
 sumatur. Tunc oleum remanens concepta lenitate,  
 atque \* pinguedine ex radice supra dicta, iniicere  
 per clysterem. Nam si solum oleum fuerit cum radice  
 hibisci non admixta aqua decoctum, necessario ni-  
 dorosum fiet. Adhibemus etiam encathismata ex ca-  
 lida, & oleo, uel quaruncunque laxatiuarum mate-  
 riarum decoctione. Cum autē declinare passio cœpe-  
 rit,

\* aqua

\* magna copio  
 saq; infartura

\* quod hodie  
 mucilaginem  
 dicimus

rit, etiam embasim adhibemus ex oleo, uel calida & oleo, aut decoctione laxatiuarum materiarum, non sine cautione. Declinanda est enim perfrictio: quapropter erit facienda in calido loco, uel balnei fornice, quem \* appellant achicholum, siue cameram. At si sensus aliquis permanens erit duritiæ, cataplasimabimus ex ordeï farina, & adipe porcino recente, & pice liquida. Tunc cerotaria apponemus, & malagmatum leniora, ordinantes etiam lauacrum, & uarium cibum, & uinum ultimo, præcauentes multo tempore frigida quæque, atq; indigestionem, & instabiles, uel acres, & minus digestibiles cibos. Veterum autem medicorum, Hippocrates<sup>b</sup> secundo libro de morbis, communiter inquit refrigeranda superiora, particulariter autem adhibenda uomifica medicamina, & phlebotomia ex brachio, & capite. Tunc sacculum aqua calida plenum \* deponendo iubet ægotantes: facere etiam collyrium decem digitorum, quem appellauit balanum, atq; hunc summo tactu selle taurino ungendum: Tunc si nihil \* profecerit clysterem adhibendum. Vel si \* hoc quoq; minus ualuerit, folliculo artis ærariæ immittendum inquit uentum per podicem, quo \* distantia uentris intestinorum replicatis folliculis fiat, tunc statim adhibendum clysterem probat, detracto supradicto folliculo, & podicem cum spongia obstruendum, atque in aquam calidam ægotantem deponendum. Utendum inquit primo tempore passionis melle decocto, atque uino. Secundo libro epidemion multum uini meraci, atque frigidi dari iubet; donec somnus, uel dolor fiat crurum, suspitione causarum sollicitatus: existimat enim uel constituit fieri passionem incedio superiorum, & frigore inferiorum.

¶ a Tholus studio, siue camera. In thermis duplex is fuit: alter ξηρός, quod Seneca sudatorium vocat, Assa Cicerone. alter quem ξηρό οἶνον, et μάλα ξινὸν, Trallianus vocat, ubi ungebantur.

\* appellant alii qui Tholum

¶ b In nostris exemplaribus quod citat ex Hippocrate legitur libro tertio de morbis, non secundo.

\* -appondere

\* profecerit

\* hic

\* distantia

Item ubi inducit Teucrum occisis octo, Hectorem non potuisse percutere, atque ita loquutum ut diceret se hunc interficere nō posse rabidum canem. Cum igitur memorauit Homerus id ex quo fieri hydrophobæ possunt, erit consequens, ut *et*, quod fieri possint, scierit. Item Comicus Menander inducens senem irascentem, istius passionis imaginem uinolentis adscripsit, dicens non posse bibere eos qui uinum usque ad uexationem potant. Ratio quoque hoc ostendere uideatur. Etenim superioribus temporibus aut erant canes, aut non erant: sed non fuisse nemo dicere audeat. Passionis etenim causam prompte Homerus memorauit. Si igitur fuerunt, etiam rabie affecti sunt: quo fit ut cum fuisse causa ex qua hydrophobi fierent, *\* possent.* atque homines qui fierent, uel pati *\** potuissent demonstretur, erit rationabile, ut apud antiquos hæc passio fuisse credatur. Expauescere autem siue confundi, ut aiunt, non solum inertes, sed etiam artifices hac passione, non necessario signum est eandem incurabilem pronuntiandi. Etenim plurimæ aliæ passionēs non aliter uidentium mentem confundunt, ut satyriasis, apoplexia. Item causa præcedens eius passionis, incomprehensibilis ut putant, non est, quam plurimi medicorum atque philosophorum tradiderunt. At si esset incomprehensibilis, quod ex ea sequitur, manifesto esse apprehensibile, nulli negant, uel si esset incomprehensibile, id quod sequitur, hoc est passio, non tamen incurabile. Ac si incurabile, non necessario nouum, ut neque carcinoma. Sed aiunt principaliter ex his quæ sequuntur, uel designant hydrophobicam passionem nihil esse eiusdem proprium, ut singultus, qui quanquam eos sequatur, sit tamen communis eorū qui hydro

hydrophobi non sunt. Sitis etiam sequitur, atque uomitus fellis, sed febricitantibus hæc sæpe contingunt. Item turbatio mentis atque timor, sed etiam phreneticos sæpe comitantur. Si igitur nihil proprium sequitur hydrophobos, sed sunt omnia communia aliis passionibus, non poterit noua passio nuncupari. Nos quoque his consentimus. Videtur etenim hæc passio etiam frequentare quibusdam temporibus, uel locis, ut apud Cariam atque Cretam. Hæc enim insula aliorum uenenosorum animalium \* difficilis, atque pene libera, sola canum rabie uexatur frequentissimè. Poetarum quoque testimonium longè \* uetustissimum, \* atq; non rectis necessariò uerbis destinatum, accipiendum ducimus. Item Hippocrates magis phreneticos memorauit, non hydrophobas, paruibibulos. Nam inquit eos, quod in quibusdam phreneticis frequentare uidemus, aut fastidio possessos, non solum cibum, uerum etiam potum refugere: uel certè traductos uisis, quæ Græci phantasiâ appellant, (ut ait Eudemus) ut accipiendum non existiment potû; uel suspitione \* delirationis affecti, admixta putent uenena liquori: \* tremunt quoq; nonnunquam debilitate neruorum, & ad omnem sonitum \* commouentur, scilicet alienationis proprietate, & non \* necessariò hydrophobicæ passionis. Quapropter aliis utendum est rationibus ad demonstrandum esse nouam hydrophobicam passionem.

Quomodo curandi sunt hydrophobæ.

Cap. xvi.

**C**urandos hydrophobas conuenit iacere loco mediocriter calido, atque lucido, adhibita articulorum defricatione, \* seruatos etiam insomnes usque ad laxamentum temporale. His quoque partibus quæ rapiuntur

\* raro alitrix  
& procreatrix.

\* nempe Homeri quem supra citauit.

\* sed non

\* ob delirationem affectos, ut admixta

\* tremere

\* commoueri

\* necessitate

\* seruari

rapiuntur, uel conductione uexantur, calidis atque  
 \* aut mundis lanis, \* ut pannis prætectis, adhibendæ etiam  
 molles uaporationes. In statu acceſſionis, dulci atque  
 calido oleo clam lanis tinctis, uel foris à cubiculo in-  
 fusis, tum immiſſis fouendæ, ne uiſu liquoris ægrotantes  
 in commemorationem timoris reducatur. At ſi aliqua  
 \* indicanda, fuerit indulgentia paſſionis, quæ erit \* apprehenden-  
 & cognoscenda. da, ſi etiam febres fuerint, ex minutione ſeruioris, ſi  
 etiam non fuerint minutione timoris, erunt phleboto-  
 \* Præterea mandi ex brachio, quo uena facilior occurrerit. \* Ita  
 \* auertenda in fluenti ſanguine \* aduertenda ſunt ægrotantium  
 ora, atque manu excipendus fluor, ne ſonitu percuſſi  
 commoueantur. In diatrito uerò erunt primò pun-  
 di, ſed pannis oleo tinctis (eorum enim tractu latenter  
 \* diatrito corpora perungentur) extergendi quoque: at \* alia  
 \* inunctis fouentur aliis calidis atque \* immundis conſequenter  
 pannis, uel linteolis: tunc poſt perunctionem cibus dan-  
 dus tenuis, & ſorbilis, quo latenter cum cibo etiam po-  
 tus inducatur: & panis aqua infuſus, uel alica ex a-  
 qua: facile enim accipiunt. Sed oportet magis tempora  
 dandi ſeruare cibum & potum: quod fiet hoc genere,  
 ut ex obliquo fabulantes de conſueta uita loquantur,  
 lauacra memorando, atque bibendi copiam. Tunc ſi  
 ægri his dictis placidi permanſerint, ſidenter offeri-  
 mus potum, diſmiſſionis tempore inuento. At ſi com-  
 moti, uel irati fuerint, audito lauacro, uel potu, erit  
 differenda oblatio: dandus interea potus in fictili ua-  
 ſculo, ſubtili cauerna perforato, tanquam ſunt papillæ  
 \* projecto ocu- uberum, & dandus ægrotantibus, \* præſecto obſtacu-  
 lis obſtaculo. lo oculorum, uel temporaliter clauſis fenestris. Eſt  
 enim omniſariam mitigatione paſſionis prouidendum,  
 ut nulla occaſio detur excitandi furoris. Oportet de-  
 nique



neque etiam ministros aptissimos esse, & primò ut sint  
 taciti, neque fabulas iniicientes, sed eius respondentes  
 dictis, & ipsa respondentes, ut \* cedentes, ac sine ulla \* cedentes  
 \* constantia eum consentiendo coercant, atque eius \* resistentia ei  
 visa, quæ mentis falsitate efficiuntur, eidem sensim di-  
 splicere, atque incredibilia faciant. Dehinc conuenit  
 laxatiuis cataplasmatibus thoracem curare, \* & à \* & à tergo in  
 tergo inter utrasque palas, quod Græci metaphrenum ter scapulas,  
 uocant. Cum autem statum sumpserit passio, etiam cu- quod Græci,  
 curbita apponenda iisdem locis, cum scarificatione: &c. ut supra  
 tum spongiarum uaporatione utendum: quæ quidem pag. 168.  
 latenter erunt ex oleo atque calida exprimenda, &  
 apponenda, obuolutæ pannis, uel lintcolis, ne humoris  
 sensus aut sonitus exagitent egrotantem. Tunc etiam  
 caput detondendum, & iisdem adiutoriis concuran-  
 dum: gestatio adhibenda, in lectulo suspenso agro, siue  
 portatoria sella. At si passio perseverauerit, iisdem  
 perseverabimus adiutoriis. Illud etiam erit affectan-  
 dum, ut si omnino potum recusauerint, qualibet tamen  
 parte quiddam liquoris assumant, & nulla indignatio-  
 ne egrotantes afficiantur uisu perterriti. Quod ita  
 facere poterimus, si calidam atque oleum clystere per  
 podicē iniiciamus, & hoc si fieri potuerit, alternis alijs  
 diebus: paruum quidem: tunc enim poterit contineri.  
 Nam si fuerit plurimus humor, sua redundantia ac pō-  
 dere prouocat excludi. Erit enim eius continentia uti-  
 lis ad minuendam sitim. Nam neque solum dysentericis  
 iniectum medicamen superiora inuadens sæpe stoma-  
 chum atque caput uexare accipimus, siquidem eò ne-  
 cessariò peruenit, sed etiam calidam & oleum perue-  
 nire posse concipimus, quo partibus iisdem irrigatio-  
 nis præbeat laxamentum. Post iniectionem deniq; ma-  
 nibus

nibus admotis, impressione moderata, ex inferioribus ad superiora ducentes, liquorem ascendere prouocamus. Declinante passione erunt egrotantes resumendi, sed multo tempore à lauacro abstineri, atque uino, ne in periculum redcant. At si ex ista passione, ut saepe

\* veretri, ut antea dixit, stigo.

\* Diosco. cap. 36. lib. 6. Themisonem quorundam sermonibus ait à cane demorsum fuisse: aliorum verò fama, in hunc furorem incidisse, quod amico aquam expauescenti inseruisset, ac officium exhibuisset.

\* relaberetur.

\* vas

\* alios

\* illius

\* potionem

\* semper dandum

\* errypticis, vel epicerafticis.

contingit \* satyriasis fuerit effecta, erunt adhibenda ea quæ paulo post dixerimus. Antiquorum autem medicorum nullus istius passionis tradidit curationem. Aiunt denique Themisonem quanquam uolentem, non potuisse: siquidem ex rabido cane quondam fuerat uulneratus, etsi eius curationem assumeret mente, quippe scripturus, continuo admonitus in eandem \* laberetur. Democritus uero iubet origani decoctionem dari, atque ipsum poculum quo bibunt in sphaera rotunditatem formari. Est autem hoc genus decoctionis acerrimum, atque stomachum uexans, et incendens: in quo etiam idem sibi repugnare perspicitur. Ait enim hydrophobiam esse incendium neruorum. Quidam Medici, ut Artorius memorat, alios in \* uasculum plenum frigida miserunt, alios in puteum posuerunt, saccis immixtos, uel inclusos, ut necessitate bibere cogerentur, \* alij in aquam calidam, nescij quod passionis curatio \* illa sit, non ut bibant egrotantes, sed ut bibere uelint: quod fiet cum passio fuerit adiutoriis destructa. Multi denique etiam bibentes raptu affecti sunt grauiore. Quapropter etiam toto corpore infundendos, ut putant, in aquam frigidam, magis uexabile comprobamus. Omne etenim frigus extendit tumentia. Nam propterea, ut Artorius dixit, raptu interficiuntur. Aristoxenus ad \* corruptionem atque abundantiam liquoris intentus, \* praedandum dicit potum, atque clysteribus utendum, communiter omnibus, \* depurgatiue uel

uel\* temperatiuæ uirtutis: sed hæc tumorem passionis  
 intendendo geminant\* comitantia. Tullius Baſus etiã <sup>\*errypliciu vel  
epiceraſticu  
ſymptomata</sup>  
 ſternutamentis utitur, & clyſteribus, cum generaliter  
 hæc paſſio mitigatione indigeat ob acutiſſimam cele-  
 ritatem, & non, ut hic putat\* corporatiuis adiutoriis  
 ſit\* aſpergēda, quæ Græci metaſyncritica uocāt. Ni-  
 ger eius amicus etiam album helleborum dedit. Eude-  
 mus autem phlebotomans helleborum dat ſecunda uel  
 tertia die, atq; cucurbitas affigit uſq; ad partium pu-  
 ſtulationem. Agatinus libro de helleboro conſcripto  
 iubet etiam dari helleborum in initio paſſionis. Alij  
 podicem cataplaſmandum iubent helleboro. Alij colly-  
 ria ex ipſo facientes quæ appellauerunt balanos, po-  
 dici ſupponunt. Sed erunt communiter omnes culpan-  
 di, cum ſit paſſio acuta atque celeris, & uehemens, ac  
 ſepiſſimè continua. Quippe cum nunquam puram atq;  
 ſynceram habeat dimiſſionem, & eſt helleborum re-  
 corporatiuæ uirtutis, ac propterea tardis paſſionibus  
 conueniens, quas Græci chronias appellānt, & in ea-  
 rum principaliter lenimēto, atq; regulis ciborū agro-  
 tante preparato, \* quod Græci dietam uocant, quod <sup>\* quas</sup>  
 utiq; non ſine tempore prolixo fieri poteſt. Sine his  
 igitur nihil ueneno differet helleborū datum. Eſt etiã  
 graue uſq; ad puſtulationem corporis cucurbitas appo-  
 nere. \* Et ſimile quidā, tumentes oculos ligneo bacu-  
 lo inungere. Quidam caſtoreo potādos iubent hydro-  
 phobas: alij roſaceo oleo: alij diagridio, aut elaterio,  
 aut lacte, uel pinguibus iuſculis incongruè agitant  
 atq; grauātes egros, & nō eo tēpore quo permitti po-  
 tuit uſus ſupra dictorū, præcautionis cauſa ac effugiē-  
 dæ paſſionis. \* Nunc etiã ſi præſens indigeat congrua <sup>\* nō autem cũ  
præſens indige</sup>  
 curatione. Clyſtere quidam depurgant uel temperant

\* communitate, i. indicatio-  
ne  
\* Quidam ni-  
hil aliud  
\* illius  
\* ligneo  
\* lupi. Ad id  
laudat Aelius  
pelle Vrsi, &  
Phoca, sed præ-  
cipua Hyæne  
ut legendum  
putem, (vel  
Hyæne be-  
luæ pelle.)  
Plin. cap. 30.  
lib. 8. ait, um-  
bræ Hyæne  
cōtactu obmu-  
tescere canes,  
eamque vo-  
mitum homi-  
nis imitari, ad  
canes sollicitan-  
dos, quos inua-  
dat.  
\* obserua su-  
perstitiosum re-  
medium qua-  
lis multa nos  
re inuimus.  
\* sinuosos an-  
fractus  
\* compressio-  
nem exitumq;  
negatum.  
\* obtrusiones:  
alijs fluctuationes, obtrusiones magis conuenit cum iis quæ proximè sequuntur.  
\* sepimentum: occlusionem

uim ueneni, quæ semper post effectam passionem con-  
temnenda est, urgentiore cogente \* cœnoteta. \* Item  
nihil aliud quam potum dare quoquo modo nituntur,  
nunc gelu, uel niuem offerentes ægrotis, nunc uiridem  
ficum, uel pyrum, aut cucumerem, & his similia. Alij  
calani perforati initium ori ægrotantis immittunt,  
dehinc ex alia parte per \* aliam cauernam aquam in-  
fundunt. Alij poculo \* lineo panno subter inposito, uel  
\* beluæ pelle, potandum putant, \* scilicet superstitio-  
ne traducti, q; naturalis authoritas beluarum quæ ca-  
nibus est contraria, timorem ægrotantium soluat. Sed  
hec quæ uulgus per experimenta probata putat, lon-  
gè aliena ab arte monstrantur. Alia quoq; quæ facien-  
da ordinauerunt, ratione reiicienda sunt, ut ea quæ  
sunt uinosa ante declinationem offerenda. Item frigi-  
da sunt ob tumorem incongrua. Constringunt enim  
atque extendunt stricturæ difficultatem, ex qua sine  
dubio hydrophobica passio confecta probatur.

De acuto tormento, quod Græci ileon appel-  
lant. Cap. xvii.

**T**ormentum dictum est, quod existiment ægro-  
tantes conuolui, atq; torqueri suorum intestino-  
rum \* uerticula: uel quod spiritus ob \* abstinentiam  
clausus sese inuoluens, \* uinctiones atq; tormenta effe-  
ciat, uel quod uehementia dolorum supra eas partes  
quæ patiuntur, ægrotantes arcuati conuolutiq; pli-  
centur. Salimachus autem ait quosdam Pythagoricos  
apud Siciliam medicantes Græco nomine \* phragmon  
uocare, siquidem obtrusis naturalibus uentris officiis  
fieri uidetur. Item hanc passionem tertio libro acuta-

rum uel celerum passionum Asclepiades de finiuit hoc modo. Tormentum est contortio extenta, atq; longi temporis intestinorum: sed\* hoc improprie dixit, q; sit longi temporis tormētum. Est enim acuta atq; celeris passio. Deniq; intestinorum tormentum dicimus esse, contortionem\* extentam, atq; perniciosam: sunt autē eius antecedentes causæ cōmunes, quæ etiam alias facere ualent passiones: sed magis perficilio, indigestio: atq; cibi grauales, & inflabiles, uel noui: aut uenum potum, aut cibo datum, ant fungi comesti. Sequitur autem in passione constitutos uentris uehemēs inflatio, & intestinorum, & dolor nimius iliorum, atq; osium, quæ à pube usq; ad ilia perueniunt, quæ Græci ephæbia appellauerūt, totius quoq; uentris atq; superpositæ cutis inflatio, & membranæ maioris, quam peritonæum uocant, scilicet quæ omnia interius tegit atq; continet uiscera. Consensu etiam, uesicæ, & officij uentris perfecta abstinentia: stomachi euersio per nauseam, salinarū fluor, sitis uehemens: spiratio\* hirta, atq; anhelatio: articulorum frigidus torpor: pulsus densus: singultus: exitus per podicem uenti nihil reuantis: ac si quicquam per clysterem fuerit iniectum, aut non admititur ob nimietatem stricturæ, aut admissum retinetur exitu negato: aut si fuerit redditum erit connexum pinguibus ac\* uesiculosis. Mulieribus etiā matricis adductio ad superiora fit, uomitus quoq; humorum\* pinguium, qui in uentriculo & ipsius officio adhærescebant contumaciter. His uero qui perniciosius atque\* specialius iactantur, etiam stercorum uomitus fit. Tunc quoque pulsus concidit: nigrescit corpus cum nimia linguæ asperitate: aliquando etiam ut Heraclides Tarentinus memorat, quarto libro de

\* hic

\* acutam

\* officij uentris, &amp; consensu etiā uesicæ, perfecti.

\* τὸν Αἰσίοαν  
quæ vox significat & densam, & hirtā, non satis apte hic vertit Lat.\* spume sis.  
\* crassorum, viscidorum.

\* exitialis

internis passionibus, intestinorum uerticula distentis  
 \* peritonæi di-  
 stenta tela  
 \* at  
 \* obserua  
 \* eiicitur.  
 \* cæliacum af-  
 fectum  
 \* ἡ τῶν κελιακῶν  
 κῶν διάθωσις  
 obserua discer-  
 ni ventricu-  
 losos à colicis,  
 ventriculosos.  
 Græci vocant  
 κελιακὺς  
 \* superiore  
 \* species acutæ  
 passionis  
 \* tormentum  
 à chordapso.  
 internis passionibus, intestinorum uerticula distentis  
 cutibus apparent, cum\* peritonæo disiecto sola fuerit  
 ac superposita cutis. Alij uero memorant uentum per  
 podicem redditum sine odore tetro perniciosum fore,  
 \* ac si fuerit odoris tetri \* salutē promittere. In illis  
 enim ob nimiam stricturam, tanquam liquatus spiri-  
 tus purior excluditur, in his autem ob quandam la-  
 xamenti facultatem infectus exhalationibus sterco-  
 rū, \* excludetur. \* Torminosa igitur ab ista passione,  
 quam specialiter tormentum diximus, magnitudine  
 differre monstramus. Hi enim leui dolore afficiuntur,  
 & ob hoc uentriculosi siue torminosi uocantur. Item  
 discernuntur dolore uentris. \* Ventriculatio enim  
 \* superius magis uentre est, atque sub præcordiis, &  
 sæpe sine intestinorum tormento. Discernitur etiam  
 à coli uexatione. Est enim principaliter coli uexatio,  
 unius intestini passio, atque tarda, quam Græci chro-  
 niam uocant, & diutissime perseverans. Tormentum  
 autem\* solius acutæ passionis, est omnium intestinorū  
 uexatio. Alij hanc passionem Chordapson uocauerūt,  
 quòd non aliter quā chordæ intestina tēdantur. Nam  
 ueteres Græci intestina chordas uocauerunt: sed hoc  
 quoq; nomen alij commune uocabulum tormento po-  
 suerūt, ut Hippocrates, Praxagoras, Euriphon Gni-  
 dius. Alij differre\* dixerunt, ut Diocles libro de pas-  
 sionibus atq; causis & curationibus scripsit. Etenim  
 tormentum non sine ructationibus fieri dixit, atque  
 emisso per podicem uento, sine stercorum egestionem,  
 uentrem quoque non necessario durum fieri, & cly-  
 steris iniectionem accipere: doloris etiam initium è su-  
 perioribus magis accedere. In chordapso reuice-  
 re ægrotantes, si mediocris fuerit passio, humorem:  
 si uche

si uehemens, stercora: & neque iniectionem clysteris  
 admitere, uentrem durum, atque extentum iugiter, in  
 orbem tumoris subleuatum, \* interiores intestinorum \* inferiores  
 partes doloribus affici, \* stomachum \* quoque immo- \* supra dixit  
 bilem ac fixum, uel \* inflexum permanere. Sed de his stomachi euer-  
 huic dissentire necessarium non est: oportet enim in- sionē per nau-  
 tentionem adhibere, atque intelligere, quod sit passio seam fieri  
 stricturæ, atque acuta uel celeris, & uehemens. Qua quidā legūt,  
 propter habendi sunt ægotantes loco mediocriter stomachū quo-  
 calido, atque lucido: adhibita requie cum silentio, & que non immo-  
 abstinentiā cibi usque ad primam diatriron: prohibi- bilem  
 to quoque somno, donec accessio declinet. Incipiente \* non flexum.  
 autem eadem, articulorum adhibenda est blanda i. non subuer-  
 ex sum  
 manibus calefactio, & partes quæ doluerint, conte-  
 gendæ mundis, & mollibus lanis. Apponenda etiam  
 mediocris uaporatio, qua mitigari dolor possit, ut  
 sunt panni calidi, atque linteola, uel uesica \* calida \* sub aqua  
 ex oleo semiplena, uel saccelli ex cantabro calido & oleo  
 completi, uel polline, uel lini semine ex aqua mulsa.  
 Cum autem statum sumpserit accessio, iubemus eos, si  
 pati potuerint, iugiter foueri oleo dulci atque calido,  
 scilicet usu dextero, quo prærepto nuper infuso mox  
 nouū superfundatur oleum. At si dolor coggerit phle-  
 botomandi erunt scilicet ex brachio, dimissionis tem-  
 pore. Et si ante diatriron id factum non fuerit, \* fo- \* fouere primū  
 uentes primo os, deinde colluere permittimus ex os ac colluere,  
 aqua calida, deinde \* dabimus potum paruum, ob miti- \* damus  
 gandum. Si enim plurimum sumpserint grauatis tu-  
 mentibus, prouocabitur passionis asperitas, sicut fit  
 cum graue quisquam cataplasma apponendum puta-  
 rit, ex plurima, atque \* corporosa inductura. At si in \* magna molē  
 ipsa diatriron fuerit adhibita phlebotomia, parum dis-



rit, etiam embasim adhibemus ex oleo, uel calida & oleo, aut decoctione laxatiuarum materiarum, non sine cautione. Declinanda est enim perfrictio: quapropter erit facienda in calido loco, uel balnei fornice, <sup>a</sup> quem \* appellant achicholum, siue cameram. At si sensus aliquis permanens erit duritiæ, cataplasma bimus ex ordeï farina, & adipe porcino recente, & pice liquida. Tunc cerotaria apponemus, & malagmatum leniora, ordinantes etiam lauacrum, & uarium cibum, & uinum ultimo, præcauentes multo tempore frigida quæque, atq; indigestionem, & instabiles, uel acres, & minus digestibiles cibos. Veterum autem medicorum, Hippocrates <sup>b</sup> secundo libro de morbis, communiter inquit refrigeranda superiora, particulariter autem adhibenda uomifica medicamina, & phlebotomia ex brachio, & capite. Tunc sacculum aqua calida plenum \* deponendo iubet ægrotantes: facere etiam collyrium decem digitorum, quem appellauit balanum, atq; hunc summo tactu selle taurino ungendum: Tunc si nihil \* profecerit clysterem adhibendum. Velsi \* hoc quoq; minus ualuerit, folliculo artis ærariæ immittendum inquit uentum per podicem, quo \* distantia uentris intestinorum replicatis folliculis fiat, tunc statim adhibendum clysterem probat, detracto supradiçto folliculo, & podicem cum spongia obstruendum, atque in aquam calidam ægrotantem deponendum. Utendum inquit primo tempore passionis melle decocto, atque uino. Secundo libro epidemion multum uini meraci, atque frigidi dari iubet, donec somnus, uel dolor fiat crurum, suspitione causarum sollicitatus: existimat enim uel cõstituit fieri passionem incēdio superiorũ, & frigore inferiorũ.

<sup>a</sup> a Tholus te-  
studo, siue ca-  
mera. In ther-  
mis duplex is  
fuit: alter fū-  
gis, quod Sene-  
ca sudatoriũ vo-  
cat, Assa Ci-  
cero. alter quẽ  
τιν ἰξω οἶνον,  
et μαλακτικόν,  
Trallianus vo-  
cat, ubi unge-  
bantur.

\* appellant ali-  
qui Tholum

<sup>b</sup> b In nostris  
exemplaribus  
quod citat ex  
Hippocrate le-  
gitur libro ter-  
tio de morbis,  
non secundo.

\* apponere

\* profecerit

\* hic

\* distentio



Contrarias igitur uirtute materias adhibendas iudicauit, non intuens passionem ex tumore fuisse confectam. Denique principio nonutus, quem adhibendum probat, asperat eius celeritatem: siquidem disiciendo corpora commouet. Phlebotomare autem conuenit non post uomitum, sed laxamenti causa, non ut Hippocrates affectandum putat, ob frigidandum corpus. Dehinc ex brachio, non ex capite, neque simul ex multis partibus phlebotomare oportet. Etenim repentina sanguinis effusio uirium defectum faciens, non finit congruam fieri detractionem, uel quantum magnitudini passionis est conueniens. Collyrium autem felle taurino perunctum, omnifariam nocens accipimus. Etenim ob acrimoniam fellis atque mordicationem tumentia prouocat in feruorem, & ob longitudinem digitorum decem immisum premit eas partes quæ neque tenuem liquorem sine grauatione accipere, uel ferre ualent. Nam ex arario folliculo quid dicere oportet, si ubi inflationis metus est, immittendum extrinsecus existimat uentum, atque, quod est maximi peccati, frigidum his partibus, quæ etiam naturali tactu prægrauantur, non aliter, quam si quemquam in tetanica passione constitutum cum sit potestatis laxatis curare uirtutibus, eundem organis distendere contendamus. Aduertendum igitur, quod magis roborat uexationem, uel duplicat corporis inflationem, adiciens grauiora, \* quo etiam per clysterem liquoribus magis \* prægrauet corpus, ut tumentia importune uento uexata, etiam liquoris percussu intemporaliter feriantur. Item sponsia apponenda quam probat, extenta magis premit. Utitur autem uino, malis quidem, sed sui similibus consiliis.

Neque

\* quoniam  
\* prægrauat

Neque enim temporaliter declinationem passionis ob-  
 scruiuit. Præterea usu immodico, siquidem plurimum  
 dari iubet, & intemperato, quod sæpe in sanitate  
 \*constitutos alienari mente perficit, \*Tunc etiam in-  
 congrue, siquidem frigido. Omne etenim frigidum  
 tumentia auget. Repugnanti ergo iudicio uinum dare  
 perspicitur, effectum somno atque dolori crurum a-  
 scribens, somnus etenim leuigata atque soluta passio-  
 ne efficitur: dolore autem peiorante, & asperato tol-  
 litur. Quod ita manifestum est ut demonstratione non  
 indigeat. Diocles autem libro quo de passionibus at-  
 que causis & curationibus scribit, phlebotomat in  
 passione constitutos, atque cataplasmaticus curat ex  
 polline, quod greci omen lysin uocant, & adipe &  
 uino, & fæce. Tunc præpotat atque clysterizat, ex  
 abrotani semine cum mulsâ, ex aceto & aristolochia  
 & cumino, & nitro, & fœniculi radice decocta  
 ex uino, admixta aqua marina, uel passo, uel acio-  
 re uino, siue lacte cum decoctione lini seminis, &  
 mellis, uel similibus. Quarto autem libro de curatio-  
 nibus iuuenes, inquit, atque habitudine robustos, &  
 magis quibus dolor ad latera fertur, phlebotomandos  
 probo ex \*manu dextera internam uenam, & sub-  
 mittendos in aquam \*calidam, foci uentri iniicere ad-  
 mixto sale clysterem, & rursum in aquam calidam  
 deponere, & fouere. Præpotandos autem iubet etiam  
 medicamentis, hoc est, panacis dimidia drachma, in  
 mulsâ \*ex aceto tepido resoluta, & myrrhæ obolos  
 duos cum peristeronis herbæ foliis in uino albo, uel  
 cumino æthiopico. Aduuat etiam plurimos plumbi  
 catapotium transuoratum. Impellit enim pondere, &  
 excludit obtrudētia. Diurnis, inquit, præterea diebus

\* constitutos  
 \* sum

\* manus de-  
 xtra internam  
 uenam  
 \* calidâ, qua  
 ubi foci sunt.

\* &

ſitientibus potandum uinum dulce, uel aquam temperatam, aut marinam cum uino albo, aut centauream herbam, aut nitrum uel eius ſpumam, ut ea quæ potuerit ſoluat. Danda etiam ſorbilia: uel cantabri lotura cum melle: uel bronii ſuccus: uel ptifanæ: aut cum farina olcera cocta, alia ex adipẽ, alia ex halica atque ſale: ſorbendum etiam & iuſcellum ſcari piſcis, & carabi, & buccinarum, & cancrorum. Tunc reſumptio, inquit, adhibenda. Cuius quidem materies percurrit, quas ſuperfluum eſt receiſere. Etenim ex ſupra dictis uaria atque iners commixtio materiæ demonſtratur. Non enim ſolos oportet iuuenes phlebotomari, ſed etiam alios in aliis ætatibus conſtitutos, neque ſemper è dextera manu uel interiore uena, ſed

\* Facta enim  
deſtractio

\* Uſus autem  
clyſterum acrimonia

\* mirum quod  
plumbi uene-  
nata ſere quã-  
litatem eſſe nõ  
ſcribit, ut quæ  
dysenteriam.

\* ſi zina.  
\* perficit.

224

\* oxy meli

\* radiculam  
metoriam.

etiam ex ſiniſtra atque exteriori. \* Facta detractio enim tumentia relaxat. \* Uſus atque acrimoniæ cauſa erigit in ſeruorem tumentia. Eſt præterea uexabilis præbibendi medicaminis potio. Etenim ſunt acria atque mordentia; & quæ non ſint mitigatiua celeritatis, neque tumoris relaxantia. \* Plumbum uero tranſfuoratum premit quidem, atque impellit pondere; ſed tactu neceſſario frigidat, atque inſeſſima denſitate coacta uexatione diſtendit. Iuſcella autem in corruptione facilia, & inſtantia eſſe noſcuntur. Item ptifanæ ſuccus eadem \* perficere. Vinum quoque in augmento inimicum. Praxagoras tertio libro curationum, clyſterem iubet adhiberi, dans medicamina purgatiuæ uirtutis, atque per uomitum corpora deſiccare: contendit etiam potandum \* mulſum ex aceto, cum pipere atque nitro, & recenti lacte: uel hæc etiam mulſo, & aqua. Dat etiam \* radices circa uesperam comedendas, prædato aut ſuperdato oleo. Vtitur præ-

terea

terea ad podicē collyrio, & clysterē iniicit, atq; prę-  
 potat absinthio agrotantes cum aceto, & uino synce-  
 ro, cum oleo irino: \* sed uomitu utitur, donec stercora \* ac  
 faciat euomi. Aliquos etiam post uomitum phleboto-  
 mat & uento per podicem replet, ut Hippocrates.  
 Item libris de causis atq; passionibus, & curationib.  
 uinum dulce dari iubet, & rursus Hippocratis ordi-  
 nem sequitur, cōgerens omnia peccata & nihil aliud  
 quā facere diruptionem intestinorum affectans, per  
 acrimoniam medicamentorum id tentat, & instabi-  
 lium potionum, & iniectione uirtute similiū, quę in-  
 festa tensione, ac tumore intestinorum aut retenta \* ru- \* ruptionem  
 ptione perficiunt, uel putredinem, aut aceruatim \* ex- \* exclusa  
 cluso, alio genere interfectionem faciunt. Item omne  
 stercus per uomitum emissum \* tumoris intestinorum \* phlegmones  
 est argumentū. Non enim sine tumore nimio hoc per-  
 fici potest. Nam ex intestinis expressum per uentrem  
 transiens, stomachoque incidens stercus per eam par-  
 tem excutitur, quo probatur magnificā mortem Pra-  
 xagoras magis quam curationem uoluisse scribere.  
 \* Quibusdam etiam manibus premēs intestina, magna \* Quosdam  
 quassatione uexauit<sup>a</sup>, quibus intestinum, quod gręci  
 τούλον έντερον appellant, in \* folliculum \* fuerit lapsum, \* a Nam ea  
 plurimis stercoribus \* confectum. Item confectis qui- \* uolunli sepe  
 busdam supradictis adiutoriis diuidendū uentrem pro- \* caussa est, quę-  
 bat pubetenus: diuidendum etiam intestinum rectum, \* admodum in  
 atq; detracto stercore consueđum dicit, in proteruam \* multis accidis-  
 ueniens chirurgiā. Oportebat enim si ad hoc acceden- \* se uidi.  
 dū necessitas imperabat, enterocelicorum approbare \* scrotum  
 curationē. Temere Erasistratus secundo libro de uen- \* fuerat  
 tre scribēs, culpans copiā atq; acrimoniam clysterum \* confectum  
 ab antiquis ordinatam, ipse quoq; utitur clystere, ex  
 nitro

nitro atque sale. Iniiiciendum etiam probat acre collyrium, & simulibus utitur cataplasmatibus, hoc est, omelysi cum myrto, uino, fico, & chamelea, & alij tinct à cibo usque ad passionis declinationem. Tunc dat mulsum tepidum, dehinc sorbilem ptisanæ succum. Sed hic aliorum accusationi iungendus est, etenim culpās tanquam nociuam acrimoniam iniectionum, \* non custodit earum uexationē: quin etiam ex cataplasmatibus constringens atque densans tumentia, grauius ægotantes affecit. Est etiam quibusdam usque ad passionis declinationem abstinentia uexabilis. Hic autem iam declinante passione mulsum dandum probat, quod ante declinationem fuerat ordinandum. Herophilus de his nihil loquutus est. Asclepiades tertio libro celerum, uel acutarum passionum, aliqua gratissimè, aliqua ualenter ordinauit, in quibus est etiam inhibitiō uaporationum ex aqua calida, tanquam facili frigentium: sed fricandas inquit partes, quæ patiuntur, oleo, plurimo tempore, atque operose quantum loca ipsa pati potuerint, fugienda inquit etiam declinationis tempore lauacra, non \* coniciens quoniam usum uaporationum, non genus damnauit. Potest enim quisque etiam in alia uaporationum specie perfrigescere, nisi dextro usu fuerint adhibita. Defricatio autem, adiutorium est chronicæ passionis non acutæ, uel celeris, sed magis, si, ut iubet, operantius fuerit adhibita, atque multo tempore. Si igitur uera intentione loquamur, neque sibi hæc quæ ordinauit conueniunt. Ait enim debere fricationem adhiberi multo tempore, uel quantū ipsæ partes patiuntur, cum neque tumentia ex initio fricationem fieri admittant, quippe cum neque cataplasmata graua ualeant sustinere. Lauacra in declinatione ad-

iuuant

\* non uitat

\* animaduertens

iuvant passionis solutionem. Vtitur etiam embasi ex oleo adhibita, & tempus non finit adiutoriis. Serapion uero, qui tertio libro curationum alia similia Erasistrato ordinavit, denique eius accusationi iungendus est. Vtitur etiam catapotio ex plumbi ramento, & cocco cnidio, & sale, & elaterio, & resina, & castoreo, & diagridio, quorum singula acerrimæ esse virtutis probantur: atque percutientia, & neque celeritati passionum, neque tumori congrua. Heraclides autem Tarentinus libro quarto internarum curationum, existimabiles constituens suspiciones, aliter inquit curandos tumore affectos, aliter eos qui \* cras-

sioribus intestinis laborant, & stercoribus opprimuntur. Vtitur autem per diem, & noctem cerotariis ex cera, & resina, & irino oleo, uel cyprino oleo, aut anethino: miscet etiam omæ lysi panacem tritum, & chamæpityn cum absinthio & cyprino oleo. Scribit præterea potiones, quibus inquit præpotandos agrotantes, ex aniso, castorea, nitro, hyssopo, calaminthe, mulso \* ex aceto. Clysterem etiam adhibet admixto absinthio, uel centaureo, aut cucumeris agrestis radice. Dat etiam \* mulsum ex aceto, & purgatiuum potandum medicamen, ex diagridio. \* Alia quoque uirtutum millia conscribit purgatiuorum medicaminum, que præbenda iubet, non aliter quam cætera acriora medicamina, & nullam curam adhibet mitigationis laxatiuæ, respiciens quâ possit tumor mitigari. Sed ait communiter omnibus aliarum sectarum principibus, quomodo intestina tumore densata, atque contenta plurima materia, & acerrima, & uulnerabili, ut illi probant, onerata, interfectionem faciunt agrotantis. Denique si fortè quisquam iliacam euaserit passionem,

\* per quorum  
intestina cras-  
siora stercus  
descendere non  
potest.

\* &

\* exymeli

\* Alia quo-  
que mille con-  
scribit virtutū  
purgatiuorum  
medicamina

nem, necessariò ex supradictis dysentericus fict. Item  
 Theſſalus primo libro de regulis, quas Græci diætas  
 uocant; alia quidem ut methodicus scripsit, alia culpa-  
 biliter, adiiciens quòd exiguum potum dare debeat-  
 mus, siquidem ad loca patientia descendit: quod contra  
 sectæ disciplinam uidetur sensisse, & contra seipsum  
 inconsequenter fuisse commotus, siquidem pro patien-  
 \* *reli-* tibus locis \* nolit esse mutabilem curationem. Secun-  
 do libro quem comparationem appellauit, contradi-  
 cens Erasistrato, hæc eadem ait, apertissimè discordan-  
 tia ueris sermonibus. Non enim pro differentia par-  
 tium mutatur liquidorum quantitas, sed obstricturam,  
 uel solutionem. Inconsequenter igitur is in iliacis, pa-  
 tientis loci causa, potus quantitatem minuendam exi-  
 stimat. Erat enim promptè dicendum, atque demon-  
 strandum, quomodo consideratione acutæ atque cele-  
 ris passionis minuenda fuit potus quantitas. Quidam  
 nostri scriptores Themisonis sectatores cuminum oleo  
 decoxerunt ob adhibendum sotum, aut tritum lanis  
 asperserunt. Alij oleo rutam decoquentes, iniiciunt per  
 \* *cineres, sub-* clysterem, & iubent uaporari ex cineribus: \* mixtos  
 etenim oleo, uel quodā laxatino liquori, ex decoctio-  
 ne congruarū materiārum \* præfecto, in \* uasculo duo-  
 \* *ante præpa-* bus digitis alto, atq; ambitu \* simili loci patientis mit-  
 \* *ato.* tendos, suppositis carbonibus, non flammis, donec li-  
 \* *uasculum al-* quor insumatur. Tunc circūtento linteolis uasculo, atq;  
 \* *lino* parum \* refrecto, conuertendos in linteola, ac \* refun-  
 \* *simili loco pa-* dendos cineres, colligatoq; uasculo fundo tenus, &  
 \* *ienti* constrieto linteo fortiori, patientia \* uaporare loca:  
 \* *ubi parum* Equidē uerè obtunditur admixtione olei & aquæ, cu-  
 \* *refrigeratum* mini uel cinerū asperitas, sed est melius ex initio usq;  
 \* *uerit* effundendos  
 \* *vaporari* ad finē recta intentione cōgrua passionibus adhibere.



## De satyriasi. Cap. XVIII.

**S**atyriasis, est uehemens ueneris appetentia, cum  
 Stensione \* ob ægram corporis passionem. Vocatur \* rigida uere-  
 autem, ut quidam uolunt, translatiue à similitudine sa- tri. Vocatur  
 tyrorum, quos, ut uulgus loquitur, siue fabula fingit, autem hac pas-  
 uinolentos, atque in usum ueneris pronos demones sio, ut  
 accipimus: uel, ut alij dicunt, ab herbæ uirtute, quam  
 satyrion uocant. Hanc enim accipientes in uenerem  
 prouocantur, cum tentigine genitalium partium. Sed  
 antecedentes istius passionis causæ sunt epota medica-  
 mina, ob usum uenereum excitandum, \* quæ satyrica, \* ut sumptis  
 uel entatica uocant: quæ sunt acria, atque incentiua, cantharidibus  
 & uernis improba. Item immodicus atque intempe- sepius accidit  
 ralis usus ueneris. Est autem communis passio uiris at-  
 que foeminis, quæ solet accidere ætatibus mediis, atque  
 iuuentuti. Hortatur etenim in usum uenereum prouo-  
 cans ætatis uigor. Sequitur autem ægrotantes uehe-  
 mens genitalium tentigo, cum dolore, atque incendio,  
 cum quodam pruritu immodico in uenream libidinem  
 cogente: mentis alienatio: pulsus densitas: anhelatio  
 crebra atque creberrima: \* desponsio: uigiliæ: hallu- \* desperatio  
 cinatio: sitis: cibi fastidium, & difficilis urinæ egestio,  
 ita ut plerunque stercorum abstentio fiat: quibusdam  
 etiam febres. Omnibus tamen in ultimo cōductio ner-  
 uorum fit, quam Græci spasmon uocauerunt, & inuo-  
 luntarius seminis iactus. Initio autem se leuiter putant  
 releuatos ex usu uenereo, atque seminis iactu, sed pau-  
 lo post uehementer extenduntur. Nocentur enim atque  
 uexantur hoc usu, quanquam parui temporis releua-  
 tionem falsam sentire uideantur, non aliter quàm si  
 scabiosi pruritu affecti, uel lippientes, manuum con-  
 tactum affectare frequentent, quod Græci chirapsian  
 uocant



uocauerunt. Declinante passione omnia supradicta  
 \* minuentur \* minuentur, quæ Græci symptomata uocauerunt, nos  
 \* minuentur  
 \* pudenda  
 turam. Indecenter enim \* ipsa in loca manus mittunt,  
 prurientibus uerendis, atque omnes ingredientiæ ap-  
 petunt, & suæ libidini seruire supplices cogunt. Dif-  
 fert autem à satyriasi gonorrhœa, quam nos seminis  
 lapsum uocamus, siquidem sine tensione ueretri sit se-  
 minis inuoluntaria atque iugis elapsio. Dehinc quod  
 satyriasis tarda non sit, quam Græci chroniam uocant,  
 ac simile quiddam habeat passioni, quæ à Græcis est  
 appellata priapismos. Eius memor est in libro signo-  
 rum Demetrius Attaleus, dicens quod hoc in quodam  
 \* masculinante  
 uiderit sene, atque in seipsum \* manu operante, nec  
 quicquam tamen potuisse peragere: tensionem autem  
 fuisse ueretri nimiam, cum paruo dolore, ut cornu pu-  
 taretur, & ita perseucrassse multis mensibus, nulli  
 quoque adiutorio medicinali cessisse, sed tardo atque  
 longo tempore requieuisse. Quo fit, ut sit priapismus  
 discernendus à satyriasi. Siquidem illa celer est, nec  
 tardat in corpore: \* ac fit sanè contractu neruorum,  
 & stimulo desiderio in ueneream uoluptatem. Est  
 autem passio strictura & celeris atque uehemens. Pa-  
 titur enim tota neruositas, quod est coniiciendum ex  
 mentis alienatione, & contractu membrorum: sed  
 plus atque præstantius pati seminales uias accipimus,  
 quas Græci spermaticos poros appellant: pati etiam  
 eas partes grauius, quarum congressione usus uene-  
 reus celebratur. Curantes igitur, iacere facimus æ-  
 grotantes loco calido, atque uigilanter silere iube-  
 mus, lanis limpidis eorum clunes, atque pubetenus,  
 quod

\* id est cōuul-  
 sione, ut paulo  
 post.

quod Græci ἰσχυρὸν appellant, cum inguinibus & ipso  
 ueretro contegentes, prohibentes etiam hominum in-  
 gressum, & magis iuuenum foeminarum, atque pue-  
 rorum. Pulchritudo enim ingredientium admonitio-  
 ne quadam prouocat egrotantes: quippe cum etiam  
 sani sepe talibus\* usi statim in uenerem\* ueniant uo-  
 luptatem, prouocati partium effecta tentigine. Initio  
 itaque accessionum conuenit nos eorum articulos ma-  
 nibus apprehensos continere, & ipsorum manus a lo-  
 cis patientibus arcere. Cum statum sumpserit accessio,  
 ex dulci atque calido oleo lanas expressas, uel deco-  
 ctione foenugræci, aut lini seminis, uel bibisei appo-  
 nere. In dimissione uero ob uehementiam etiam phle-  
 botomiam adhibere, cogentibus rebus, intra diatri-  
 to: permittentibus autem, in ipsa diatri-  
 to. Intelligimus sane dimissionem, si etiam febres affuerint, ex earum  
 indulgentia. Necesse est enim quando passio aspera  
 est, tunc etiam febres extendi: & cum rursum fuerit  
 remissa, febres quoque leuigari. At si febres non fue-  
 rint, ex ceteris accidentibus, quæ Græci symptomata  
 uocant, cum ea indulgentiora uiderimus, ut ruborem,  
 seruorem, pruritum, uel in usum uenerum cupidita-  
 tem, aut genitalium tentiginem, uel his similia. Post  
 phlebotomiam corpus perungemus, atq; ora lauantes,  
 cibum edamus halicam ex melle, uel panem lotum ex  
 aqua, & oia sorbilia. Aliis autem diebus eas partes  
 quas lana texeramus cataplasmate curamus, ex fo-  
 enugræci atque lini seminibus, aut pollinibus aqua  
 resolutis, quod Græci ὀμεν λυσιν uocant, aut aqua &  
 melle. Tunc etiam cucurbitas apponemus: sed in acces-  
 sionis statu leues: in dimissione autem cum scarifica-  
 tione, clauibus, atq; pube tenus, perrasis capillis. Appo-

\* uis  
 \* ueniant cupi-  
 ditatē ut pau-  
 lo post

\* remissione ac  
 imminutione

nimus etiam sanguisuga, et spongiarum uaporatio-  
ne utimur, praecostis in aqua quibusdam laxatiuis.

\* Adhibemus  
\* aut ex cali-  
da et oleo

\* Adhibentes etiam clysterem ex oleo calido, \* aut calida ex oleo, tunc rursum cataplasmautes ante ci-  
bum. Præterea etiam encathismatibus utimur, nunc ex

oleo confectis, uel ex calida, et oleo, nunc ex decoctio-  
nibus mitigantibus et laxatiuis. In mulieribus autem

\* femina alte-  
rius  
\* pudendali

etiam pessulum oleo calido infundentes, sensim cum  
\* sexualibus manibus in muliebri uerensum. Mitti in-  
hemus. Externas uero partes per latitudinem hanc

contegimus uel cataplasma uis, et utriusque \* fibræ cu-  
cubitatis infigimus. Declinante passione gestationem

adhibemus, et in oleum uel calidam egros infundi-  
mus, scilicet embasim facientes. Tunc etiam lauacrum

adhibemus atque melioribus sacis, et uariis cibis nutri-  
mus, fugientes ætiam pulmentum atque stinum, mul-  
to tempore. Et etiam etiam papicritum in partibus ap-  
ponimus. Mulieribus uero liquida et facientes et acris

\* clysteri vice  
inuenimus. Ad-  
hibemus  
\* medullis

uice utimur. Adhibentes etiam aqua et oleis, atque  
\* medulla, et incliloto, uel his similibus pessariis de

quibus latius in libris quos sanus de mulieribus scri-  
pturi docebimus. Aliorum autem medicorum excepto

Themisone nullus hanc passionem conscribit, tam non  
solum raro uerum etiam coaceruatione sepius inueni-

\* inuadere

sisse uideatur. Memorat denique Themison apud Gre-  
tam multos satyriam interfectos, quod quidem, quantum

creditur, factum est ignorantia ciborum, quæ frequenter  
ac plurimam maderent satyriam uerbam, nisi præter-

\* eleganti for-  
ma

ea apud Mediolanum iuuenem feminam atque aliam  
decentem, nuptam cuidam nobili, se uisita satyriam  
interfectam. Ponit etiam eius passionis curationem se-  
cundo lib. epistolarum, ad Asinium scribens imperans

phlebo

phlebotomiâ, atq; fomentationes, & cataplasmata frigide uirtutis adhibenda, quibus possit extingui ueneris appetentia: dans etiam potum frigidum: quæ omnia sunt inconsequentia, atq; incongrua. Siquidem pugnant phlebotomiæ laxamento, ex quo indulgentia corporis fit, & est cataplasmatibus, & fomentis \* ex \* & frigido potu effecta constrictio, atq; condensatio, ut supra diximus contraria: quippe cum appetentia ac delectatio concubitus accidens sit uerendorum partibus ob tumorem, sicut etiam mētis alienatio membranis cerebri tumentibus, quo fit ut ex frigidis atque constrictis rebus augeatur etiam uel geminetur ueneris cupiditas.

## De Cholericis. Cap. XIX.

Cholicam passionem aiunt aliqui nominatam à fluore fellis, per os atq; uentrem effecta, ueluti fellis suam passionem. Nam cholen fel appellat, & hanc à fluorem: alij à multitudine fluentium humorum qui sunt similes felli. Non enim inquit esse fella, sed esse liquida in eundem colorem transcūta: sed hoc differt nihil: Non est enim necessariū de etymologia certare passionis. Asclepiades libro de finibus hanc definitionem passionis dedit: Cholera, inquit, est humoris fluoris, celer ac parui temporis, uentris atq; intestinorum, ex concursu siue obtrusione corpusculorum, atq; ut saepe contigit ex indigestione initium sumens. Hanc quoq; \* diffinitionem quidam discretos aiunt, humoris fluoris \* definitionem rem dictum, siquidē hæc est generaliter cholera: parui etiam temporis, adiectum, ad discretionem cœliacorum: siquidem etiam ipse fluoris est humoris, sed longo frequentius tempore: (ob concursu autem corpusculorum) siquidem etiam ualigantulum \* quidam humoris fluxu

definitionem

\* cum primi  
nauigare in-  
piunt, maru a  
elatione ac s  
eluatione

afficiuntur, nec tamen ex corpuscolorum concursu. Adiectum etiam frequenter ex indigestione hoc fieri, siquidē ex aliis quoque causis sit cholericā passio. Aliqui nostrorum tradiderunt eandem definitionem, solum concursum corpuscolorum detrahentes, atque uia-  
rum raritatem adiicientes. Nos autē superfluum fuisse causas passionis dicere iudicamus, cum sit necessarium id quod ex causis conficitur edocere. Multo autem ac magis superfluum dicimus, etiam causas antecedentes definitionibus adiungi, quippe cum nec sola cholericā passio ex indigestione fiat, neque sola indigestio hanc faciat passionem, sed etiam aliæ causæ speciales, atque contrariæ uirtutis, quarum nihil ex ista diffinitione monstratur. Dehinc rheumatismus siue humoris fluor, non solum uentris atque intestinorum est, sed etiam stomachi. Quapropter, ut Soranus ait, Cholericā passio est solutio stomachi, ac uentris, et intestinorum cum celerrimo periculo. Sed antecedentes causas eius passionis dicimus, uimolentiam, uel ma-  
 \* ut sulphuro- lum medicamen. potum, aut aquarum. \* calidarum  
 se, nitroſe &c. potationem, uel iactationem maritimam primæ nauigationis, quæ commoueat insuetos: sed uehementius hoc facere dicimus ubi continuamus indigestionem ob plurimam sumptionem cibi, aut insueti, aut curiose conditi: quorum sane intellectus aptus rationi est ob causarum scientiam, inutilis uero ac necessarius curationi, uel naturæ. Huic passioni similis ac uicina est diarrhœa, atque stomachi resolutio. Sed diarrhœam Aesclepiadis sectatores discernunt. In cholericis aiunt uentris et stomachi rheumatismum, hoc est humoris fluorem, in diarrhœa uero ultimarum partium profluum. Nos uero dicimus in stomachi solutione solum  
 nomi

uomitum frequentare, & neq; simul uentris fluorem: qui si \* fuerit rursus uomitu non attestante, solius \* adfuerit. uentris significat solutionem, & appellabitur diarrhoea: in cholerica uero passione utrunque concurrit, hoc est uomitus atque uentris fluor, cum aliis quibusdam accidentibus signis, quæ post memorabimus. Item indigestionem aiunt \* genere differe: sed Asclepiadis \* et pro ea diff  
sectatores magnitudine inquirunt, siquidem paruus in ferentia nunc  
Diarrhoea sit ex indigestione corpusculorum con- Diarrhoeam,  
cursus, siue obtrusio, maior autem in cholericis: tem- runc choleram  
pore etiam differre inquirunt: siquidem præcedit indi- excitare.  
gestio choleram: sed horum prompta atque facilis est di-  
cretio. Etenim indigestio conficitur ex corruptione ciborum, etiam si quis neque uomat, neque humoris fluorem sustineat, quem Græci rheumatismum appellant; per uentrem effectum. Cholera autem ex uomitu atque uentris fluore turbatio est, etiam si cibus non fuerit corruptus: Nam & ex aliis antecedentibus causis aduenire, intelligi potest.

Quæ sequuntur eos qui cholerica passione afficiuntur.

Cap. xx.

**P**Ræcedit frequenter cholicos stomachi grauedo atque tensio: anxietas: iactatio: uigiliæ: tormentum intestinorum cum sonitu, quem Græci borborismon uocant. Ventris dolor: atq; per podicem \* uen- \* quidam ven  
ti fluor nihil releuans: ruæationes fumosæ: nausea: tru  
salinarum fluor: grauedo thoracis cum membrorum defectu: surgente passione iugis uomitus, & primo corrupti cibi, sicut frequenter occurrit, & humoris atque fellis flauidi: dehinc uitellis ouorum similis: tunc  
\* prasi, atque eruginosi: ultimo etiam nigri: uentris \* Prasiini.  
quoque turbatio cum dolore: & egestio uomitorum Potraci



similis; hoc est spumosa, & acerrima, cum frequentl  
 \* irritatione \* delectatione uomendi. Crescente passione aquati atq;  
 tenuis liquoris fit egestio, & aliquando similis loturæ  
 \* punitosa carnis. Feruntur etiam cum his humoribus plerunque  
 subalbida \* desputa: sequitur etiam densitas pulsus, &  
 articularū frigus, atq; uultus nigrore fuscatus: ardor,  
 atq; sitis insatiabilis: spiratio celerissima: & contractio  
 uel conductio membrorum, cum nervorum tensione,  
 ac surarum & brachiorum. Præcordiorum etiam ad  
 superiora raptus, cum dolore iliaco simili: aliquando  
 etiam egestio uentris sanguinolenta, uultus in ma-  
 \* deductus cieiem atque tenuitatem: \* deducti: oculi rubri: & in  
 ultimo singultus. Ista denique acuta atque celer-  
 rima passio esse à ueteribus memoratur, ut nun-  
 quam in secundum ueniat diem. At si in meliorem  
 partem uergere cæperit, ut leuior fiat, articularum  
 atque corporis frigus infusum mitescit: & pulsus  
 assurgens manifestior fit, ex altioribus ad superficiem  
 ueniens: parus etiam, atque intervallis longioribus  
 egestionis sunt: & paulatim releuatio eger effici-  
 tur. Accessiones autem apprehendimus ex his, que  
 sunt passioni consequentia. Cum enim anxietas atque  
 iactatio, confluentibus ad stomachum liquidis, &  
 contractio articularum occurrerit, accessionem præ-  
 \* minus an- \* cærit difflicere, stomachi occurrerit releuatio,  
 \* sius sit \* mitigata uentris mordicatione, cuncta minui  
 aduersa cæperint, dimissionem pronuntiamus. Ge-  
 neraliter autem passio est uehemens, atque acuta,  
 uel celeris, & aliquando solius solutionis, ali-  
 quando adiuncta ex aliqua parte strictura, ut dolores  
 ostendant stomachi, atque uentris, & intestinorum,  
 & arti

& articularum contractio. Magis autem patiuntur in ista passione Stomachus, & uenter & intestina: cetera uero membra omnia corporis consentiunt.

### Quomodo curandi sunt cholericici.

CAPITULUM XXII.

**C**holericos oportet primo similiter ut cardiacos locari, atque ut indigestos, uel qui cibos exclu-  
dunt: potum dari decet tepidum, ut quod immutatum corruptione uidetur, tanquam ueneni materia per uomitum deparetur. At si hæc corrupta excludi desierint, erunt ægrotantes seruandi in eodem schemate. Prouocabiles sunt enim liquidorum fluxionibus motus. Conuenit etiam articularum leuis, atque impressa defricatio cum quadam perseuerabili tenacitate: tum etiam eorum ligatio, quæ cum fuerint densa, phthisi-  
cum consentire stomachum cogant. Sed ne ex his ligamentis superiora torpescant, erunt sæpius committandæ ligationes. Tunc stomacho atque ori uentris spongia admouenda iugiter ex aqua frigida expressa, dehinc etiam ex posca, atque eisdem facies detergenda, quod deflectione submota in resumptionem ueniant ægrotantes. Vtemur etiam odorinantis, sicut in cardiacis ordinauimus, atque flabris, & cataplasmatibus frigida uirtutis, secundum thoracem, ac uentrem. Sed ut non sæpius hæc mutare cogamur, neque contrario, permanendo calida efficiantur, spongiis frigida expressis atque superpositis ea frigidamus, ut non sæpius uirtute constrictiua, uerum etiam frigido tactu fluorem constringant. At si dolor, uel intestinorum tormeta, plurimum coegerint, pro frigidis spongiis, aliqua temperata admouemus: tum deflectione

\* qui cruditate  
vetriculi laborant.  
\* vomitu reiciunt

\* que cum fuerit  
\* cogit  
\* superiniecit

\* tantum

\* dolorem magnam



\* spasmos com-  
mulsionēs  
\* cooperimus

mundarum lanarum, uel olei dulcis, atque calida infu-  
sionibus utemur. Similiter etiam propter \* cōtractio-  
nes, articulos lana circumtegimus, et pannis calidis  
\* colligamus. Infigimus præterea cucurbitas leues,  
quas Græci *κρούρα* uocant, scilicet sine scarificatione.  
Has frequenter detrahimus, atque differentibus locis  
infigimus, quò latenter ac sensim etiam stricture, quæ  
irruerat, resoluatur. At si dolores coegerint, et plu-  
rurgere uomitum uiderimus, solutione obtinente, ita  
cucurbitas infigimus, ut in cardiacis memorauimus,  
hoc est, constrictiui ori uentris, atque subsequenti-  
bus partibus. Aliquando etiam à tergo per interual-  
la dimissionis adhibemus. Præterea aquam frigidam  
sorbendam, damus per interualla quidem. At si uehe-  
mentius uires amputari, ac solutionem crescere uide-  
rimus, præcuratis ægris, ut in cardiacis docuimus, ci-  
bum damus dimissionis tempore, non expectata pri-  
ma diatrīto, deflectionis coacti periculis. Dabimus igitur  
panem ex aqua frigida, diligenter prælotum; ha-  
licam, uel oryzam ex aqua, uel posca: aut oua hapa-  
la, aceto prius infusa, et puliculam sicciorē. At si  
accepta reiecerint, paululum requiescentes, post in-  
teruallum rursum cibo nutrimus. Tunc, si res coege-  
rit, etiam tertio id facimus, uel quarto: et ob reti-  
nendum cibum cucurbitam latioris osculi unam uel se-  
cundam plurima cum flamma infigimus ori uentris,  
infra costarum finem eodem tempore quo cibum da-  
mus. Tunc post eius sumptionem idem facimus, quò  
constrictione, atque raptu, corporis ad inferiora ue-  
nire, et illic permanere cogantur accepta. Oportet  
præterea adiutoriorum mediocritatem intueri. Nam  
\* iugis cibi plurimi atque \* iugi cibo oppressione præfocati sepe  
sunt

sunt ægrotantes. At si distantia temporis longiore fuerit uomitus intercapedinetur, & uentris effusio isdem dilationibus \* dirarata, tunc, ut in declinatione totius passionis, ob appetentiae destructionem dabimus quicquam pomorum, ut pyra, uel mala cydonia, aut sorba, aut mali punici grana, aut damasce-  
 na, uel recentium uuarum \* palealium, intybi thyrsum, atque uolantium pectora, sed non pinguium, ut perdicis, uel phassæ, uel simulum, in posca decoctorum uel assorum cum aspergine corticis mali punici, in puluerem comminuti. Dehinc è cellario \* quæ Græci apotomiam uocant, colymbadas oliuas fractas. At si sufficienter ægrotantium surrexerint uires, dabimus etiam panem ex uino mediocriter austero, aqua frigida temperato. Dehinc etiam bibendum dabimus ex ipso mixtum potum, sed eo tempore quo cibum dabimus: multum enim bibere prohibemus: siquidem sitis siccare ualet humecta. At si febres fuerint consequutæ, & uires ægrotantis permiserint, abstinentia cibi abstinemus una die: si autem hoc ferre non potuerint, dabimus cibum dimissionis tempore: sin uero febres non coegerint, & passionem cessasse uiderimus, non sine cautione ac diligenti cura resomimus ægrotantem paulatim, atque modicis adiectionibus \* motus, uel ciborum, præcauentes superfluos cibos, ne in commemorationem passio reducatur. Resumptis igitur uiribus etiam lauacrum adhibemus. Hæc est secundum nos cholericonum cura. Veterum autem medicorum sententiæ uariant. Hippocrates \* cholicam  
 sel quoddam appellans \* choleurecam nominauit, atque agitudinem.  
 iliace passionis esse particulam siue concursum constituit. Ille denique eius curationem, neque memorare

dignū arbitratū est, sed quinto libro. epidemion cho-  
 \* *De Athe-* lericorum signa tradens \* helleboro dicit utē dum cum  
*mensi quodam* lenticula, \* uel singularem succum lenticulae biben-  
*cholera corre-* dum: Tunc inquit uomitum prouocandum esse, quod  
*ptio id scripsit* est non aliter contrarium, quam si quis fluore sangui-  
*Hippocr.* nis pereuntem, uel diaphoresi dissolutum phlebotom-  
 \* *ac* are, uel aut cardiacum sudore defluentem calido La-  
 \* *sudorificu* uacro, \* uel sudoriferis uaporibus uelit adiuuare. Nam  
 id ipsum quod passio uocatur, adiutorium quoque fie-  
 \* *ex Helle-* ri uehementius cogit. Et enim \* in helleboris nomi-  
*boro* tus factus etiam his qui nulla solutione affectuntur cho-  
 \* *Et Verba hec* lericæ passionis periculum solet asserere, & magis  
*sunt Hippocrata* cum non preparatis corporibus adhibetur. \* At si  
*tu. Hic Vera-* quisquam Hippocratem defendens dixerit ab eo non  
*trum in lentiū* datum, sed memoratum, quod quidam cholericus ac-  
*succo bibis: &* ceperit, uel sibi ipse dederit, frigida nititur defensio  
*alterum lentiū* ac. Ait enim Hippocrates profuisse datum: quod si  
*succū insuper* displiceret, culpam debuerat item Diocles libro quo  
*bibit, quātum* de passionibus atque earum causis, & curationibus  
*potuit: & post-* scripsit, frigerandos inquit cholericos, & do-  
*ea uomunt: cox* nec depurgentur, nihil eis accipiendum: sed tunc cum  
*Et aque sunt et* tempus uisum fuerit, dandam frigidam & in uom-  
*adstricta ipsi* tum prouocandos: balanos etiam per podicem inden-  
*ambo (uempē* dos. At si hyems fuerit, calida aqua utendum: tum  
*vomitū, &* nigrum dauidum uinum cum polenta, atque prouocatio  
*aliis presu-* somni & quiescendum: singulrui uero absinthium di-  
 \* *sio) & rē q.* cit conacnere, & ad \* solutionem bubulum uel hē-  
 \* *colibendum* prinum lac, dimidia hemina quantitate, cum papa-  
 \* *et rē q.* ueris atbi succi cyatho dimidio, & mali punici succo.  
 \* *et rē q.* Scribit etiam aliud curationis genus, quo memorat eu-  
 mino quoq; atq; sale & origano, & his similibus potis  
 utendum: Culpandus igitur primus est, quod calidum  
 potum

potum dari iubeat cholericis cum tempus hyemis in-  
tuetur, & non passionis considerat vires, neque con-  
citat quod calidum quicquid est, laxando prouocat vo-  
mitum. Addidit etiam nihil dandum, donec egrotantes  
depurgentur, & non docuit tempus cibi offerendi, ne-  
que demonstrauit quando post depurationem corrupto-  
rum dimissionis tempore erunt egrotantes nutriendi:  
denique tempus vini dandi non memorauit. Item ab-  
sinthium est acerrimæ uirtutis, & propterea incon-  
gruè, atque imperitè singultientibus ordinatum. Est  
enim ex tumore stomachi ueniens singultus. Lac etiam  
in eiusmodi passionibus facilius acescit, & effusionem  
uentris prouocatam extendit. Cuminum quoque &  
origanum acerrimæ uirtutis esse nemo est qui nesciat.  
Quo fit, ut aperiantur magis quam claudantur fluen-  
tia, & prouocentur mordicationibus quæ fortè sunt  
in tumore constituta. Praxagoras primo libro de cu-  
rationibus contrà docens, iubet dari plurimum mul-  
sum ex \* aceto confectum ebibendum: & calido pas-  
so, atque absinthio potandos probat. Vomitentibus ue-  
rò prius inquit \* calidum potum dandum. Tunc si plu-  
rimus inquit uomitus fuerit, lauandos egrotos calida,  
& post lauachrum somno dimittendos. At si dormire  
non potuerint, danda polenta, atque bibenda ex mulso,  
uel passo, uel frigida. Et cum uomitus quieuerit, len-  
ticula nutriendos, & uino potandos. At si uomitus  
perseuerauerit, post \* dationem, rursum lauandos, at-  
que iisdem utendum: at si perseuerauerint ea quæ per  
uentrem feruntur manente etiam uomitu, alia die rur-  
sum lauandos, atque similia adhibenda. Apparet etiam  
in hoc morbo erroribus implicari. Etenim mulsum ex  
aceto doloribus est incongruum, ut quod inflat tumen-  
tia

\* Sic vocat  
oxymeli

\* calide

\* calide: ut  
suprà.

tia ex aceti qualitate; absinthium uerò est nocens, ut superius memorauimus. Item calidis potus, uomitibus est inconueniens: lauacrum quoque fluenti corpori uehementer inimicum, quod iste non semel sed sæpius adhiberi confirmat: \* & neque cibo nutrit, quo facilius

\* ac uires ægrotantis diuersis intereant detrimentis. Neque saltem semel, sub hac \* lauacri frequentia dormire permittens, ut ipse uoluit. Item mulsum uentrem dissoluit, quippe non decoctum. Non aliter etiam dulce uinum. Ridiculum quoque est, atque cachinnos commouens, pausante uomitu lenticulam dare: perseuerante uerò, lauacrum adhibere, cum sint hæc in utroque contraria. Etenim lenticula constringit presentem

\* Nam tam frequens balnei usus somni, quem semel ab ægro capivult, occasionem & opportunitatē ægro præcipit.

\* colliguit

fluorem lauacrum uerò corpus \* coæquat post uomitus cessationem. Item Erasistratus secundo libro salutarium, utitur tepido potu, uomitum prouocans, uel acrimoniam temperans fellis. Contra dolores autem tepidis utitur uaporationibus, & cataplasmatibus ex farina & uino: at si sitis & defectio coegerit, uino potat Lesbio, cum aqua frigida, sed in aquæ cyathum uini guttas duas admiscendas iubens, uel tres, ut solum, inquit odorem uini habere aqua uideatur, atque hoc bibendum post singulos imperat uomitus, & post singulas uentris effusiones. Plus, inquit, aquæ admiscendum si febres irruerint, & similiter lenticulam dandam & uinum, aut malorum infusionem, uel decoctionem pomorum, aut pyrorum: & etiam lauacrum probat, & resumptionem adhibendam. Sed hic quoque excludendus in quibusdam est. Etenim contra dolores quomodo calidis, sic sine uino cataplasmatibus utendum: siquidem rigore quodam naturali, siue mordicatione, quam Græci rhigos uocant, uino \* constringant.

\* uina cōstringunt.

Esf

Est præterea eorum datio ante acclinationem passionis contraria, & magis cum sine cibo danda ordinantur, & immodicè: siquidem post singulos uomitus, id fieri \* præceperit, cum propter uirium solutionem oportuerit etiam cibi quiddam offerre, & non solum unum potandum dare. Febribus quoque irruentibus, & quantum credendum est humore \* interposito, inconueniens est lenticula, & infusiones siue decoctiones constringentium materiarum. Harum enim ad uomitum cogendum tantum fuerat usus necessarius. At Herophilus cholericorum curationem secundum se alijs nullam tradidit. Asclepiades uerò tertio libro celerum uel acutarum passionum, \* affectans uomitum ex rapaci haustu transuoratis potionibus eodem die \* leuat egrotantes, & uino potat cum polenta: & quid ultra? cum plurima approbet ueterum curatio num, solum prohibens ea die \* leuandos, nisi uires fuerint \* reparatae. Oportebat etiam uini tempus diffinire, atq; post cibum dandum ordinare. Empiricorum Serapion primo libro curationum, istius passionis medelam tradidit. Itē Heraclides Tarētinus libro quarto, sed communiter uterque rationalis logicorum \* consentiunt curationi: adiciunt etiā medicamina, quæ catapotia uocauerunt, multis ex speciebus confecta, quæ pharmiocode dicuntur, necnon potiones etiam ad retinendos exitus fluentium materiarum, ex quibus sunt, Hypscyami seminis, quem nos altercū dicimus, drachmæ duæ: anisi drachma una, opij drachma semis, contrita & superflua aqua dulci. Tunc collecta, & in triginta partes diuisa: \* singula faciunt catapotia, quæ dantur in \* aqua frigida, cyathis duobus. \* Abstinēt, inquit, etenim uentrem. His uerò qui fuerint uiribus illis,

\* præcipit

\* intercepto, i. inculcato, nec libera ventilatione diffusato.

\* moliens ac procurans

\* Lauat

\* Lauandos

\* uino &amp; polenta

\* consentit

\* Hac ratione singula catapotia pendunt grana septem. \* aquæ frigida

\* Abstinēt

sis,



\* prelixius ex-  
tendit

\* motum de morbo aut  
recurso, aut  
persenescione

uq

sis, conuenire dicit medicamen ex myrrha atq; papa-  
uere, & croco confectum, in quantitatem erui datum,  
cum uini cyatho; sed hæc \* uehementius ostendit He-  
raclides Tarentinus, dans etiam halicam cum uino ul-  
time expressionis, hydatode Græci uocāt, nos abusiue  
tortium, uel cum absinthio & oryza: uel lenticula,  
aut ptisana, cum contrariam uirtutem halicæ lenticula  
atq; ptisana obtineat. Item primo libro regulari, siue  
ut Græci dicunt, diatetico, nutriendos cholericos prima  
die, cæteris utens congruè. Postera inquit die eos ante  
uotum usque ad tertium diem neq; cibo nutriendos,  
neq; os collucere permittendos, si quicquam fuerit su-  
spicione \* sollicitum. Post tertium uero diem continen-  
ter atque cum cautione resumptionem faciendam. Sed  
huic erit respondendum: Vtrum in declinatione pas-  
sionis dari dixerit uinum, atq; uarium cibum, an ante  
ipsam, quod est intemporalis atque importunum. Sed si  
in declinatione, cur declinante passione, & quantum  
creditur, forsitan exclusa, usque ad primam diatriton  
abstinendos existimat ægrotantes? His enim qui forsi-  
tan ob eius defensionem dixerint, cum præcauere tur-  
sum ne febres irruant, respondemus, hoc esse occul-  
tum, & non oportere methodicum esse suspicionibus  
incertis occupatum, & uere. At si ob irruentem febric-  
ulam, que iam præsens esse uidetur, abstinentia putat  
utendum, erat melius dicere, cessante uotum, emergē-  
teq; febricula abstinentiam esse adhibendam, quod qui-  
dem facere uel memorare neglexit.

De defluxione, quam Græci diarrhœam  
vocat. Cap. XXXI.

**D**efluxio, est secundum Aselepiadem rheumatis-  
mus, siue fluor parui temporis, ultimarum par-  
tium

tium coli atq; sessionis, siue \* lōganonis, ut nos appella-  
 mus, quæ fit, inquit, ex cōuentu siue cōcursu atq; con-  
 gressu corpusculorum. Sed huic quidam responderunt,  
 quod non solum ultimarum partium coli defluxio esse  
 uidetur, sed etiam superiorū: item ex corpusculorum  
 concursu, siue conuentu, quem entasim appellauit, ne-  
 gant fieri posse defluxionem, sed magis abstinentiam,  
 uel retentionem. Alij rursus defluxionem dicunt fluo-  
 rem, siue ut Græci rheumatismum parui temporis, in-  
 testinorum, atque sessionis uel longanonis secundum  
 uiarum raritatem. Sed superfluum est causas adiciere,  
 cum passionem definimus, quibus fuerit confecta de-  
 fluxio. Item alij defluxionem esse dixerunt uētris tur-  
 bationem celerem, uel acutam, quæ fit ex corruptione  
 ciborum. Sed etiam nunc habet quædam superflua, dif-  
 finitio. Dehinc etiam sine corruptione ciborum, aut  
 simili causa posse defluxionem fieri probè uidemus. Se-  
 quitur autem defluxione laborantem sine ullo dolore  
 effusio liquidorū per podicem, hoc est, per anum, quæ  
 corporis facit corruptionem: aliquando etiam perse-  
 uerando intestinorum uulnerationem, ex qua dysente-  
 ria sæpe sequitur. Utendum ægrotante commodè lo-  
 cato, silentio, atque abstinentia cibi, & uini. Tunc e-  
 tiam cataplasmatibus constrictiuis, secundum clunes,  
 atque uentrem, uel pubetenus admotis. Alia die si de-  
 fluxio cessauerit, cibus adhibendus constrictiuus. Tunc  
 etiam uinum atque lauacrum adhibendum, & cætëra  
 quæ resumptionibus conuenire uidentur.

CAELII AVRELIANI  
 Methodici Siccensis Oxæon Li-  
 bri tertij finis.



*[The page contains dense handwritten text in a cursive script, likely from a historical manuscript or ledger. The ink is dark brown on aged, slightly discolored paper. The handwriting is very close together, filling most of the page area.]*

1433A2

# CAELII AVRE- LIANI SICCENSIS

IN V. LIBROS CHRO-

NION PRAEFATIO.

\* \*



RAESCRIPITIS celerū  
passionum libris tardarū  
placet curationes ordina-  
re, quæ solo\* suprapositio-  
nis tempore superioribus  
sunt similes, in lenimento  
vero varia recorporatione

\*exacerbatio-  
nis per inter-  
ualla redeuntis  
τῆς πικρίας.

formantur, & peritis medicinæ claram æter-  
nāque gloriam\* quærunt. Celeres enim, vel  
acutæ passiones etiā sponte soluantur, & nunc  
fortuna, nunc natura fauēte. Quo fit ut ignari  
homines elati sæpe medicos fugiant, cum hos  
\*prouentus incātationibus nouis ac\*ligamen-  
tis adscribāt, aut fortuna, cum\*quoties repen-  
tino nuntio læti aut territi agrotātes, mutatio-  
ne quadam corporis morbos excludunt, vel ea  
per intemperatiam gerunt, quæ ratione occul-  
ta sibi profutura nescientes, duce desperatione  
committunt. In\*vtrunque enim faciles celeres  
passiones accipimus. Pelluntur enim aut fluo-

\*parant

\*euentus

\* τοῖς ὑπὸ  
ἀλυσιν: amuletis  
\* aliquoties

\* latum aut  
transitum exitū.

re sudoris, aut sanguinis per nares, aut ventris.  
*\* passiones & morbi* Chronia autem uel tarda \* passionis morbi,  
 qui iam praeiudicio quodam corpora possederint, solius medici peritiam poscunt, cum neque natura, neque fortuna soluantur. Podagram denique, vel Phthisin, aut Elephasiafin, vel similes tarditate passiones resolui nulli sectarum principes meminerunt, sicut sepe febres acutae soluuntur. Hinc denique Graeci Asclepium \* *\* & Dei, & gloriosi medici Asclepius unde nomen inuenit. Themison.* no-  
 men sumpsisse dixerunt, quod dura curando primus superauerit vitia. Scribentium igitur medicinam nullus ante Themisonem tardarum passionum curationes principaliter ordinauit. Alij uero has omnino tacuerunt, tanquam impossibiles iudicantes, vel \* incurabilium passionum. Alij \* Alyptarum officio \* transmittendas crediderunt: Alij disperse \* atque de alijs passionibus \* scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropisino, paralyti, alopecia, vel quar-  
*\* incurabiles passiones Alyptae de talibus scripserunt Erasistratus. Asclepiades. Thessalus. Soranus.* tanis typis, ut Erasistratus, & Asclepiades. Themison autem tardarum passionum tres libros scripsit: item Thessalus secundo libro Regulari earum curationem ordinauit. Dehinc Soranus plenissime cunctarum diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturae formauit, de passione capitis initia sumens, quod nos quoque faciendum assumimus.



## CAELII AVRELIA-

NI SICCENSIS CHRO-

NION LIBER I,



De capitis passione, quam Græci cepha-  
laen nominant. Cap. I.



P A R T E corporis quæ pati-  
tur, passio nomen accepit. Nā  
cephalen Græci caput uocau- κεφαλή  
runt. Generatur autem sæpius  
perfrictione aut frigiditate,  
aut è cōtrario solis exustione,  
aut continuatione uigiliarum:

sed uehementius fœminas tenet ob diligentiam\* capil-  
lorum. Sequitur in passione constitutos dolor uehe-  
mens capitis totius, aut dimidij, quem consueto nomi-  
ne hemicraniam uocant, uel certe temporum, \*quem  
dolorem chrotaphon appellant. Occupat etiam ocu-  
lorum radices, & occipitium, atque colla, tendens  
usque ad spinæ partes, ut cum sedere ægrotantes uo-  
luerint, uertigine adficiantur, atque oculorum cali-  
gine, cum nausea, & scillis uomitu. Ac si passio\* uehe-  
menter cœperit, rubri atque prominentes oculi fiunt,  
deiectis & conclusis palpebris euitantes lumen, cum  
lachrimarum fluore, cibi etiam iugi fastidio, & obtu-  
sione uisus, aurium tinnitu, & difficili auditu, \*Sequen-  
tur etiam uigiliæ iuges, aut frequentes, dentium do-  
lor, & accessionis initio sanguinis è naribus paruissi-

Fæmina obno-  
xia cephalæe.

\* quos cum pe-  
tunt, comunt,  
tingunt, sum-  
mittunt, caput  
sæpius lauans  
Ημικρανία,  
\* quæ κροτά-  
φος

κροτάφος.

\* uehemente-  
scere, ut multis  
locis huius ope-  
ris.

\* Sequuntur

mus guttarum fluor, nihil releuans. Erit igitur locandus egrotans, si totum caput doluerit, supinus. Si autem ex parte, ea parte quæ patitur. Mitigatur enim quodam blandimento straminum, pars in dolore constituta. Peiorante passione sequitur uultus deprauatio, pulsus obscuritas, & omnes sensus obtusione afficiuntur. Hac passione alij celeriter atque cum febribus laborant quem dolorem proprio nomine sectarum principes\* capitis uocauerunt: Alij tarde, atque sine febribus, per interualla temporum admoniti & solo dolore capitis oppressi, quam passionem ueteres cephalæan uocauerunt. Pauci autem aliqui membranam cerebri dixerunt, alij eam quæ testam circumtegit, alij omnem cutem capitis, alij temporum atque buccarum musculos, quos\* siagonas appellant. Nos uero aliquando istorum aliqua, secundum quod se sensus doloris extendit: aliquando omnia, secundum quod fomenta uel accessiones passionum ordinate se ingerunt: similiter etiam sicut dimissiones atque delinimenta conuariant, & nunc\* longiores & puras, nunc angustas & sordidas accidentium malorum reliquias in accessionem reliquerint. Item secundum\* su perpositionem tempore accessionis. Item secundum quod nunc\* diurnas, nunc intercapedinas exacerbationes interpositis diebus, uno, uel duobus, sicut quos typicos, aut periodicos circuitus appellamus, aut hemitriticos, pro responsione temporum habuerint uariantes. Igitur de dolore capitis in acutis febribus accidenti prius libro de febribus memorauimus. De illo uero qui sine febribus, atque tardus, & sue passionis est, nunc dicemus. Cum itaque adhuc paruus fuerit sensus, oportet egrotantem iacere loco mediocriter frigido,

\*cephalalgiam

κεφαλίαν.

Σιαγόν.

\* Siagonitas

ut multus loci

operis πρὸ τῶν

ἔστων: quamuis

in hoc libro pas-

sim Siagonas

legamus.

\* longiores

\* τῶν ἐνίτασις

\* quotidianas

Diurnas dixit

pro continuas.

τυπικοί.

επιετρίκοι.

ἡμιτρίταικοι,

frigido, atque obscuro, paulo leuatiſſe capite collo-  
 cato, adhibito ſilentio, atque corporis & animi re-  
 quie, cum abſtinentia cibi uſque ad primam diatri- Διάτριτος.  
 tum. Adhibenda etiam articulorum leuiſſe frictio, cum  
 capitis ſomento ex oleo frigido, \* atque uiridi, uel  
 ſucco quolibet admixto, qui \* ſine reperiſſu ualeat  
 aſtringere, ut polygoni, arnogloſſe herbarum, aut  
 intybi, aut portulacæ, aut rubi, quem Græci batum  
 appellant, aut \* anulorum uitis, quos helicas uocant, \* omphacino,  
ἀμολογιδί.  
 uel uue \* lupinæ, aut anagallidis, uel ſideritis herbæ, \* ſuo  
Γελύγινος.  
 aut \* murte. Hinc etiam cataplaſmata adhibenda Βατίς.  
 ex horum ſingulis, aut admixta pulenta, uel compoſi- \* capreolorum.  
clauicularum.  
ἑλκ.  
 tum ex multis eiſ uirtutis medicamen frōti apponen- \* Solani uide  
lib. 2. cap. 7.  
 dum, ut eſt \* diatheon: ſi uerò uehementior fuerit do- \* in hoc exem-  
plariſſe perpe-  
tuo ſcribitur  
pro Myrti.  
Diatheon.  
 lor, crit locandus ægrotans loco amplo, atque ca- Diatheir.  
 lido mediocriter, & neque plurimum lucido, ne ni- \* deſcribitur à  
Gal. κ. τοπ. π.  
pag. 701. ab  
Ætio pag.  
727.  
 miuſ ſplendor officiat. Apponendæ etiam lanæ le- \* complicati  
panniculi.  
Πτύγματα.  
 nes, ac tenues, & limpide iſdem partibus, cum iugi \* & ſub tem-  
poribus bucca-  
rum muſculis  
admouenda:  
tum  
 ſomento ex oleo dulci, atque calido. Ac ſi coegerit  
 dolor \* ptygmata erunt uiciſſim & lanæ, æque mol-  
 lia apponenda, ex oleo calido expreſſa, \* tempori-  
 bus ſub buccarum muſculis immota. Tunc etiam ue-  
 ſicæ ſemiplenæ ex oleo calido, uel ſaccelli ex polli-  
 nibus calidis conſecti, manu etiam calida, atque di-  
 gitis, molli tactu loca dolentia contingenda, cum om-  
 ni ſilentio ac requie ægrotantis. Si autem dolor ad  
 dentes tetenderit, muſum calidum uel oleum damus,  
 quod in ore ſine ullo motu contineat: niſi quis hoc  
 horreſcens in naſeam fuerit prouocatus. At ſi ue-  
 hementius dolor conualuerit, & maiora \* exegerit, \* exegerit re-  
media, etiam  
 diu etiam permittentibus uiribus in ipſa diatri-

dignū arbitratuſ eſt, ſed quinto libro. epidemion cho-  
 \* *De Atbe-* lericorum ſigna tradens \* helleboro dicit utendum cum  
 niens quodam lenticula, \* uel ſingularem ſuccum lenticula biben-  
 cholera corre- dum: Tunc inquit uomitum promouendum eſſe; quod  
 pto id ſcripſit eſt non aliter contrarium, quā ſi quis ſuore ſanguis  
 Hippocr. \* ac nis pereuntem, uel diaphoreſi diſſolutum pblebotomare;  
 \* ſudoriſicu uacro, \* uel ſudoriſeris uaporibus uelit adiuuare. Nam  
 \* ex Helle- id ipſum quod paſſio uocatur, adiutoriū quoque ſieri uehementius cogit. Etenim \* in helleboris uomitus  
 boro factus etiam his qui nulla ſolutione affliguntur cho-  
 \* *Ca l' erba hęc ſunt Hippocratis. Hic Veratrum in lentiū ſucco bibit: & alterum lentiū ſuccū in ſuper bibit, quātum potuit: & poſtea uomit: coa Et aque ſunt et adſtricta ipſi ambo (nempe uomitus, & alius preſuſio) & Colibendam*  
 dignū arbitratuſ eſt, ſed quinto libro. epidemion cho-  
 lericorum ſigna tradens \* helleboro dicit utendum cum  
 lenticula, \* uel ſingularem ſuccum lenticula bibendum:  
 Tunc inquit uomitum promouendum eſſe; quod eſt non  
 aliter contrarium, quā ſi quis ſuore ſanguinis pereuntem,  
 uel diaphoreſi diſſolutum pblebotomare; uel aut cardiacum  
 ſudore deſluentem calido la-  
 uacro, \* uel ſudoriſeris uaporibus uelit adiuuare. Nam  
 id ipſum quod paſſio uocatur, adiutoriū quoque ſieri uehementius  
 cogit. Etenim \* in helleboris uomitus factus etiam his qui  
 nulla ſolutione affliguntur cholericæ paſſionis periculum ſolet  
 afferre; & magis, cum non preparatus corporibus adhibetur. \* At ſi  
 quiſquam Hippocratem deſcendens dixerit ab eo non datum;  
 ſed memoratum; quod quidam cholericus acceperit; uel ſibi ipſe  
 dederit, frigida uentur deſenſio ne. At enim Hippocrates pro-  
 fuiſſe datum; quod ſi diſpliceret, culpare debuerat. Item Dio-  
 cles libro quod de paſſionibus utque earum cauſis, & curationibus  
 ſcripſit; frigerandos inquit cholericos, & donec depur-  
 gentur, nihil eis accipiendum: ſed tunc cum tempus uisum  
 fuerit, dandam frigidam & in uomitum prouocandos;  
 balanos etiam per podicem indendos. At ſi hyems  
 fuerit, calida aqua utendum: tum nigrum daadum uinum  
 cum polenta, atque prouocato ſonno: quieſcendum:  
 ſingultui uero abſinthium dicit conuenire; & ad ſolutionem  
 bubulum uel cæprimum hęc, dimidia hemina  
 quantitate, cum papaueris albi ſucci cyatho  
 dimidio; & mali puniei ſucco. Scribit etiam aliud  
 curationis genus, quod memorat cum mijo quoque atque ſale  
 & origano, & his ſimilibus potis utendum.  
 Culpandus igitur primū eſt, quod calidum potum



potum dari iubeat cholericis cum tempus hyemis in-  
tuctur, & non passionis considerat vires, neque conii-  
cit quod calidum quicquid est, laxando prouocat vo-  
mitum. Addidit etiam nihil dandum, donec ægrotantes  
depurgentur, & non docuit tempus cibi offerendi, ne-  
que demonstrauit quando post depurgationem corrupto-  
rum dimissionis tempore erunt ægrotantes nutriendi:  
denique tempus uini dandi non memorauit. Item ab-  
sinthium est acerrimæ uirtutis, & propterea incon-  
gruè, atque imperitè singultientibus ordinatum. Est  
enim ex tumore stomachi ueniens singultus. Lac etiam  
in eiusmodi passionibus facilius acescit, & effusionem  
uentris prouocatam extendit. Cumini quoque &  
origanum acerrimæ uirtutis esse nemo est qui nesciat.  
Quo fit, ut aperiuntur magis quam claudantur fluen-  
tia, & prouocentur mordicationibus quæ fortè sunt  
in tumore constituta. Praxagoras primo libro de cu-  
rationibus contrà docens, iubet dari plurimum mul-  
sum ex \* aceto confectum ebibendum: & calido pas-  
so, atque absinthio potandos probat. Vomitentibus ue-  
rò prius inquit \* calidum potum dandum. Tunc si plu-  
rimus inquit uomitus fuerit, lauandos ægrotos calida,  
& post lauachrum somno dimittendos. At si dormire  
non potuerint, danda polenta, atque bibenda ex mulso,  
uel passo, uel frigida. Et cum uomitus quieuerit, len-  
ticula nutriendos, & uino potandos. At si uomitus  
perseuerauerit, post \* dationem, rursus lauandos, at-  
que iisdem utendum: at si perseuerauerint ea quæ per  
uentrem feruntur manente etiam uomitu, alia die rur-  
sum lauandos, atque similia adhibenda. Apparet etiam  
in hoc morbo erroribus implicari. Etenim mulsum ex  
aceto doloribus est incongruum, ut quod inflat tumen-  
tia

\* Sic vocat  
oxymeli

\* calida

\* calida: ut  
suprà.



tia ex aceti qualitate; absinthium uerò est nocens, ut superius memorauimus. Item calidis potus, uomitibus est inconueniens: lauacrum quoque fluenti corpori uehementer inimicam, quod iste non semel sed saepius adhiberi confirmat: \*

\* Nam tam frequēs balnei usus somni, quem semel ab agro capi uult, occasionem et opportunitatē agro praeipit.

\* colligat

et neque cibo nutrit, quo facilius uires aegrotantis diuersis intereant detrimentis. Neque saltem semel, sub hac \* lauacri frequentia dormire permittens, ut ipse uoluit. Item mulsum uentrem dissoluit, quippe non decoctum. Non aliter etiam dulce uinum. Ridiculum quoque est, atque cachinnos commouens, pausante uomitu lenticulam dare: perseverante uerò, lauacrum adhibere, cum sint haec in utroque contraria. Etenim lenticula constringit praesentem fluxorem, lauacrum uerò corpus \* coequat post uomitus cessationem. Item Erasistratus secundo libro salutarium, utitur tepido potu, uomitum prouocans, uel acrimoniam temperans fellis. Contra dolores autem tepidis utitur uaporationibus, et cataplasmatibus ex farina et uino: at si sitis et defectio coegerit, uino potat Lesbio, cum aqua frigida, sed in aqua cyathum uini guttas duas admiscendas iubens, uel tres, ut solum, inquit odorem uini habere aqua uideatur, atque hoc bibendum post singulos imperat uomitus, et post singulas uentris effusiones. Plus, inquit, aquae admiscendum si febres irruerint, et similiter lenticulam dandam et uinum, aut malorum infusionem, uel decoctionem pomorum, aut pyrorum; et etiam lauacrum probat, et resumptionem adhibendam. Sed hic quoque excludendus in quibusdam est. Etenim contra dolores quomodo calidis, sic sine uino cataplasmatibus utendum: siquidem rigore quodam naturali, sine mordicatione, quam Graeci rhigos uocant, uino \* constringant.

\* uina cōstringunt.

Est

Est præterea eorum datio ante declinationem passionis contraria, & magis cum sine cibo danda ordinantur, & immodicè: siquidem post singulos uomitus, id fieri \* præceperit, cum propter uirium solutionem \* præcipit oportuerit etiam cibi quiddam offerre, & non solum uinum potandum dare. Febribus quoque irruentibus, & quantum credendum est humore \* interposito, inconueniens est lenticula, & infusiones siue decoctiones constringentium materiarum. Harum enim ad uomitum cogendum tantum fuerat usus necessarius. At Herophilus cholericoꝝ curationem secundum se alijs nullam tradidit. Asclepiades uerò tertio libro celerum uel acutarum passionum, \* affectans uomitum \* moliens ac procurans ex rapaci haustu transuoratis potionibus eodem die \* leuat egrotantes, & uino potat cum polenta: & \* lauat quid ultra? cum plurima approbet ueterum curationum, solum prohibens ea die \* leuandos, nisi uires fuerint \* reparatae. Oportebat etiam uini tempus diffinire, atq; post cibum dandum ordinare. Empiricoꝝ Serapion primo libro curationum, istius passionis medicam tradidit. Itē Heraclides Tarētinus libro quarto, sed communiter uterque rationalis logicorum \* consentit sentiunt curationi: adiiciunt etiā medicamina, quæ catapotia uocauerunt, multis ex speciebus confecta, quæ pharmocodæ dicuntur, necnon potiones etiam ad retinendos exitus fluentium materiarum, ex quibus sunt, Hypocyami seminis, quem nos altercū dicimus, drachmæ duæ: anisi drachma una, opij drachma semis, contrita & superflua aqua dulci. Tunc collecta, & in triginta partes diuisa: \* singula faciunt catapotia, quæ dantur in \* aqua frigida, cyathis duobus. \* Abstinet, inquit, etenim uentrem. His uerò qui fuerint uiribus illis, \* Abstinent

\* intercepto, i. inculcato, nec libera ventilatione diffusato.

\* moliens ac procurans

\* lauat

\* lauandos

\* uino & polenta

\* consentit

\* Hac ratione singula catapotia pendunt grana septem. \* aquæ frigida

sis,

\* prelixius ex-  
tendit

\* motumulum  
de morbi aut  
recurfu, aut  
persecratione

1 ut  
-49

seorsus aut

seorsus aut

seorsus aut

seorsus aut

sis, conuenire dicit medicamen ex myrrha atq; papa-  
ueris, & croco confectum, in quantitatē trui datum,  
cum uini cyatho; sed hæc \* uehementius ostendit He-  
raclides Tarentinus, dans etiam halicam cum uino ul-  
time expressionis, hydatode Græci uocāt, nos abusiue  
tortinium, uel cum absinthio & oryza: uel lenticula,  
atq; ptisana obtineat. Item primo libro regulari, siue  
ut Græci dicunt, dietetico, nutriendos cholericos prima  
die, cæteris utens congruē. Postera inquit die eos ante  
uotum usque ad tertium diem neq; cibo, nutriendos,  
neq; os colluere, permittendos, si quicquam fuerit su-  
spicione \* sollicitum. Post tertium uero diem continen-  
ter atque cum cautione resumptionem faciendam. Sed  
huic erit respondendum: Vtrum in declinatione pas-  
sionis dari dixerit uinum, atq; uarium cibum, an ante  
ipsam, quod est intemporale atque importunum. Sed si  
in declinatione, cur declinante passione, & quantum  
creditur, forsitan exclusa, usque ad primam diatrion  
abstinendos existimat egrotantes? His enim qui forsi-  
tan ob eius defensionem dixerint, cum præcquere rur-  
sum ne febres irruant, respondemus, hoc esse occul-  
tum, & non oportere methodicum esse suspicionibus  
incertis occupatum, & uere. At si ob irruentem febric-  
ulam, que iam præsens esse uidetur, abstinentia putan-  
dum, erat melius dicere, cessante uomitū, emergē-  
tēq; febricula abstinentiam esse adhibendam, quod qui-  
dem facere uel memorare neglexit.

De defluxione, quam Græci διαρροῖαν  
vocat. Cap. XXXII.

**D**efluxio, est secundum Aselepiadem rheumatis-  
mus, siue suor parui temporis, ultimarum par-  
tium

tium coli atq; seſſionis, ſiue \* lōganonis, ut nos appella-  
 mus, quæ ſit, inquit, ex cōuentu ſiue cōcurſu atq; con-  
 greſſu corpuſculorum. Sed huic quidam reſponderunt,  
 quòd non ſolū ultimarum partium coli deſluxio eſſe  
 uidetur, ſed etiam ſuperiorū : item ex corpuſculorum  
 concuſſu, ſiue conuentu, quem entaſim appellauit, ne-  
 gant fieri poſſe deſluxionem, ſed magis abſtinentiam,  
 uel retentionem. Alij ruruſum deſluxionem dicunt fluo-  
 rem, ſiue ut Græci rheumatismum parui temporis, in-  
 teſtinorum, atque ſeſſionis uel longanonis ſecundum  
 uiarum raritatem. Sed ſuperfluum eſt cauſas adii cere,  
 cū paſſionem deſinimus, quibus fuerit conſecta de-  
 fluxio. Item alij deſluxionem eſſe dixerunt uētris tur-  
 bationem celerem, uel acutam, quæ ſit ex corruptione  
 ciborum. Sed etiam nunc habet quædam ſuperflua, diſ-  
 finitio. Dehinc etiam ſine corruptione ciborum, aut  
 ſimili cauſa poſſe deſluxionem fieri probè uidemus. Se-  
 quitur autem deſluxione laborantem ſine ullo dolore  
 effuſio liquidorū per podicem, hoc eſt, per anum, quæ  
 corporis facit corruptionem : aliquando etiam perſe-  
 uerando inteſtinorum uulnerationem, ex qua dysente-  
 ria ſæpe ſequitur. Vtendum ægrotante commodè lo-  
 cato, ſilentio, atque abſtinentia cibi, & uini. Tunc e-  
 tiam cataplaſmatibus conſtrictiuis, ſecundum clunes,  
 atque uentrem, uel pubetenus admotis. Alia dic ſi de-  
 fluxio ceſſauerit, cibus adhibendus conſtrictiuus. Tunc  
 etiam uinum atque Lauacrum adhibendum, & cætèra  
 quæ reſumptionibus conuenire uidentur.

C A E L I I A V R E L I A N I  
 Methodici Siccenſis Oxcon Li-  
 bri tertij finis.





# CAELII AVRE- LIANISICCENSIS

IN V. LIBROS CHRO-

NION PRAEFATIO.

\* \*



**P**RAE SCRIPTIS celerū  
 passionum libris tardarū  
 placet curationes ordina-  
 re, quæ solo\* suprapositio-  
 nis tempore superioribus  
 sunt similes, in lenimento  
 vero varia recorporatione  
 formantur, & peritis medicinæ claram æter-  
 nāmque gloriam\* quærunt. Celeres enim, vel  
 acutæ passiones etiā sponte solvuntur, & nunc  
 fortuna, nunc natura fauēte. Quo fit ut ignari  
 homines elati sæpe medicos fugiant, cum hos  
 \*prouentus incātationibus nouis ac\* ligamen-  
 tis adscribāt, aut fortunā, cum\* quoties repen-  
 tino nuntio læti aut territi ægrotātes, mutatio-  
 ne quadam corporis morbos excludunt, vel ea  
 per intemperatiam gerunt, quæ ratione occul-  
 ta sibi profutura nescientes, duce desperatione  
 committunt. In\* vtrunque enim faciles celeres  
 passiones accipimus. Pelluntur enim aut fluo-

\*exacerbatio-  
nis per inter-  
ualla redeuntis  
τῇ πικρίας.

\*parant

\*euentus  
\*τοῖς ἀπρό-  
πῳς: amuletis  
\* aliquoties

\*latum aut  
tristem exitū.

\* *passiones &  
morbi*

\* *& Dei, &  
gloriosi medici  
Asclepius vn-  
de nomen inue-  
nerit.  
Themison.*

\* *incurabiles  
passiones  
Alypte  
committēdas  
de talibus  
scripserunt  
Erasistratus.  
Asclepiades.  
Thessalus.  
Soranus.*

re sudoris, aut sanguinis per nares, aut ventris. Chronia autem uel tarda \* passionis morbi, qui iam prauidicio quodam corpora possederint, solius medici peritiam poscunt, cum neque natura, neque fortuna soluantur. Podagram denique, vel Phthisin, aut Elephasiafin, vel similes tarditate passiones resolui nulli sectarum principes meminerunt, sicut sepe febres acutae soluuntur. Hinc denique Graeci Asclepium \* nomen sumpsisse dixerunt, quod dura curando primus superauerit vitia. Scribentium igitur medicinam nullus ante Themisonem tardarum passionum curationes principaliter ordinauit. Alij uero has omnino tacuerunt, tanquam impossibiles iudicantes, vel \* incurabilium passionum. Alij \* Alyptarum officio \* transmittendas crediderunt: Alij disperse \* atque de alijs passionibus \* scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropisino, paralyti, alopecia, vel quantis typis, ut Erasistratus, & Asclepiades. Themison autem tardarum passionum tres libros scripsit; item Thessalus secundo libro Regulari earum curationem ordinauit. Dehinc Soranus plenissime cunctarum diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturae formauit, de passione capitis initia sumens, quod nos quoque faciendum assumimus.

C A E L I I



CAELII AVRELIA-

NI SICCENSIS CHRO-  
NION LIBER I,

35

De capitis passione, quam Græci cepha-  
læan nominant. Cap. 1.



P A R T E corporis quæ pati-  
tur, passio nomen accepit. Nā  
cephalen Græci caput uocau- κεφαλή  
runt. Generatur autem sæpius  
perfrictione aut frigidityte,  
aut è cōtrario solis exustione,  
aut continuatione uigiliarum:

sed uehementius fœminas tenet ob diligentiam\* capil- *Fœmina obno-*  
lorum. Sequitur in passione constitutos dolor uehe- *xia cephalæa.*  
mens capitis totius, aut dimidij, quem consueto nomi- *\* quos cum pe-*  
ne hemicraniam uocant, uel certe temporum, \* quem *ciunt, comunt,*  
dolorem chrotaphon appellant. Occupat etiam ocu- *tingunt, sum-*  
lorum radices, & occipitium, atque colla, tendens *mutant, caput*  
usque ad spinæ partes, ut cum sedere ægrotantes uo- *sæpius lauant*  
luerint, uertigine adficientur, atque oculorum cali- *Ημιαγρία,*  
gine, cum nausea, & fellis uomitu. Ac si passio\* uehe- *\* quæ uροτρί-*  
menter cœperit, rubri atque prominentes oculi fiunt, *γεις*  
deciectis & conclusis palpebris euitantes lumen, cum *Κρόταρος.*  
lachrimarum fluore, cibi etiam iugi fastidio, & obtu- *\* uehemente*  
sione uisus, aurium tinnitu, & difficili auditu. \* Sequen- *scere, ut multis*  
tur etiam uigiliæ iuges, aut frequentes, dentium do- *locis huius ope-*  
lor, & accessionis initio sanguinis è naribus paruissi- *ris.*  
\* Sequuntur



frigido, atque obscuro, paulo leuatiſſime capite collo-  
 cato, adhibito ſilentio, atque corporis & animi re-  
 quie, cum abſtinentia cibi uſque ad primam diatri- Διάτριτος.  
 tum. Adhibenda etiam articulorum leuiſſima frictio, cum  
 capitis ſomento ex oleo frigido, \* atque uiridi, uel  
 ſucco quolibet admixto, qui \* ſine reperiſſimo ualeat  
 aſtringere, ut polygoni, arnogloſſæ herbarum, aut  
 intybi, aut portulacæ, aut rubi, quem Græci batum  
 appellant, aut \* anulorum uitis, quos helicas uocant,  
 uel uue \* lupinæ, aut anagallidis, uel ſideritis herbæ,  
 aut \* murte. Hinc etiam cataplaſmata adhibenda  
 ex horum ſingulis, aut admixta pulenta, uel compoſi-  
 tum ex multis eius uirtutis medicamen frõti apponen-  
 dum, ut eſt \* diatheaton: ſi uerò uehementior fuerit do-  
 lor, crit locandus ægrotans loco amplo, atque ca-  
 lido mediocriter, & neque plurimum lucido, ne ni-  
 miſſus ſplendor officiat. Apponendæ etiam lanæ le-  
 nes, ac tenues, & limpide iſdem partibus, cum iugi  
 ſomento ex oleo dulci, atque calido. Ac ſi coegerit  
 dolor \* ptygmata erunt uiciſſim & lanæ, æque mol-  
 lia apponenda, ex oleo calido expreſſa, \* temporibus  
 ſub buccarum muſculis immota. Tunc etiam ue-  
 ſicæ ſemiplenæ ex oleo calido, uel ſaccelli ex polli-  
 nibus calidis conſecti, manu etiam calida, atque di-  
 gitis, molli tactu loca dolentia contingenda, cum om-  
 ni ſilentio ac requie ægrotantis. Si autem dolor ad  
 dentes tetenderit, muſum calidum uel oleum damus,  
 quod in ore ſine ullo motu contineat: niſi quis hoc  
 horreſcens in nauſeam fuerit prouocatus. At ſi ue-  
 hementius dolor conualuerit, & maiora \* exegerit,  
 diu etiam permittentibus uiribus in ipſa diatri-  
 to,

\* omphacino,  
 ὀμπακιδί.

\* ſuo  
 τοῦ λυγροῦ.

βατίς.

\* capreolorum.  
 clauicularum.  
 ἱλίσ.

\* Solani vide  
 lib. 2. cap. 7.

\* in hoc exem-  
 plari ſic perpe-  
 tuo ſcribitur  
 pro Myrti.

Diatheaton.

Diatheis.

\* deſcribitur à  
 Gal. κ. τοπ. π.

pag. 701. ab  
 Aetio pag.

727.

\* complicati  
 panniculi.

Πτύγματα.

\* & ſub tem-  
 poribus buccæ  
 rum muſculis  
 admouenda:  
 tum

\* exegerit re-  
 media, etiam

uel ante ipsam, sanguis erit detrahendus, phlebotomia scilicet: sed totum caput dolentibus, ex eo brachio quod facilius fuerit, detractio facienda. At si altera pars capitis doluerit, ex eius contraria detractioem faciemus, quo longius adiutorij commotio à parte patienti \* remota uideatur. Tunc os colluere permittimus, & aquæ calidæ potum damus. In ipsa uero diatrito unctionem adhibemus ex oleo dulci, atque calido. Tunc facinus foueri faciem ex aqua scilicet calida. Dehinc potum atque cibum damus, ut est panis aque calidæ elutione purgatus, quo difficultate deposita \* politus fiat. Vel certe \* aliqua similiter \* fiant, aut cum malsa mediocriter cocta \* aut ex panis pullicula confecta, quam torineton Græci uocant, cum paruissimo anetho, aqua, sale, & melle: item oua sorbilia. Quæ quidem cibatio erit alternis diebus adhibenda, donec dolores declinēt. At si passio durauerit, erit tendendus æger usque ad cutem. Hinc etiā patientes partes leuantur, cum ex alto reflatio quædam uiarum nuditate permittitur, & localibus interea adiutorijs præparantur. Tunc nouacula radendum caput, atque cataplasmatibus, & leui cucurbita in accessione, sine scarificatione \* autem & dimissione releuandum, ex illis scilicet partibus quæ plus patiuntur, uel fortiore dolore uexantur. Atq; ita sanguisugæ apponendæ, quas hirudines appellamus, & magis si locorum inæqualitas cucurbitæ non fuerit capax, quo inherere minime possit. Tum uaporationes spongiarum ex aqua calida expressarum adhibendæ, uel calida & oleo, aut decoctione hybisci, quam \* altean uocant. Ac si uenter non

\* remouere

\* remoto furfure sinuatur & iucundior sit.

\* alica

\* fiat

vide huius lib. 1. cap. 4.

\* aut pullicula

ex pane confecta

ut quædam Tor

yneton Græci.

τορνόν, rudicu

la, τορνόν, co

chlear τορνόν

in olla coquere

& elixare. το

ρνόν, pullicu

la in olla eli

xa, & inter

coquendum ru

dicula nel coch

leari assidue

& curiosè agi

tata, ne ura

tur, aut nido

rè oleat. Hanc

pulliculā è pa

ne confectam

vulgus appellat Du pain gratté.

\* cum scarificatione autem, in dimissione \* Alica

fecerit

fecerit officium plurimis diebus, \* tunc calidæ, & oleo \* tum ex calidæ  
rutæ, admixto melle, erit iniiciendus clyster: sic e-  
nim & intestinorum fatus fit, & stercorum detra-  
ctione caput releuatur, quorum motu, ac expirationis  
ascensu amplius grauabatur. Quapropter etiam pri-  
dem, si officium uenter non agnouerat, oportuit adhi-  
bere clysterem, priusquam cucurbitæ usus \* accesserit: \* accederet:  
dehinc cataplasmatum genus nunc laxatiuum conue-  
nit, ut est ex lini & fœnu græci seminibus: \* atq; pol- \* aus  
line, ex aqua, & oleo, admixto melle concocto: uel ex  
panico diligenter emollito. Declinante passione, cero-  
tarijs atque malagmatis simplicibus utendū, ut est dia-  
chylon. Tunc cibus uariis dandus, prædictæ simplicita-  
ti uicinus, ut est cerebrum porcinum, uel hædinum,  
\* piscis tencri, turdi, columbarum pulli, uel domestica \* piscet:  
rum gallinarum: olera quoque cucurbitæ, maluæ, be-  
tæ, nunc ex aqua cum oleo atque garo curata, nunc  
conciisa atque trita, & \* interius condita: magis enim \* curiosius ut  
ex his facilis uenter efficitur, quod sæpe etiam sanita-  
tis tempore \* omnibus profuit, quibus unius diei uen-  
tris dilatio caput impleuit. Ante cibum præterea erit  
adhibenda gestatio, \* portatoria scilicet sella, sine ue-  
hementi motu, quo partes uehementer patientes rele-  
uentur. Tunc etiam deambulatione utendum, & post  
perunctionem capiti adhibendus fatus, cum \* toto cor- \* totū corpus  
pore supradicto motu laxatum & spiramentis facili-  
bus agitata sit. Etenim motu densa laxantur, & re-  
tenta tenuantur. Dehinc \* cum declinatio firmior esse \* cū in decli-  
coeperit, lauacrū adhibendū. Tunc in alia diatrīto quid  
dam uini aquati offerendū. Ita cum capitis pausauerit  
dolor, longo tempore horæ solitarū accessionum erūt  
firmior

Μίλαγμα διὰ  
χυλῶν.

\* curiosius ut  
paulo post  
\* hominibus

\* fertoriū pau-  
lo post uocat.

\* cū in decli-  
natione ager  
firmior

euitandæ, atq; è memoria eiiciendæ : quibusdam etiam temporibus in requie seruemus ægrotos. Declinandum etiam omne quod potest accessionem in\* comme-

\* eius recidiuā  
facere

\* meracus

\* calida & fer  
uentia, tā na-  
turalia quam  
arte parata.

\* vter ob eas  
abstractus

\* ascensus.

morationem reducere, ut est adustio, indigestio, ue-  
nus, \*meratus potus, uel plurima masticatio durioris  
cibi, aut curiose conditi, necnon etiam uapores uehe-  
mentes atque \* ignea lauacra, exclamatio uehemens,  
iracundia, uel \* uenter nimis adstrictus, & magis post  
cibum, spiritus retentio, & eius ad ilia\* descensus. Sic  
enim oppressio quædam omne caput extendit. Deim  
tardante passione, & nunc superpositionibus exasper-  
rata, nunc lenimentis leuigata, oportet in super po-  
sitione temporis animaduersionem habere, iis deniq;  
quæ supra scripsimus, uti. Etenim quæ mitigant ce-  
leres uel acutas passiones, ea tardarum superpositio-  
ni conueniunt. In lenimento uero paulo audacius re-  
sumendi sunt ægrotantes, & non, ut nuper, timoris  
adiuncta cautione, tempore scilicet quo superpositio-  
nis asperitas \*declinabat. Adhibenda igitur uectatio

\* declinabit  
¶ fertoriam  
sellam posthac  
uocat cap. 5.


\* portatoria  
vt supra

\* uectationem

\* perfectio

pro uiribus ægrotantis<sup>2</sup> fertorio, uel sella\* procu-  
rata. Ac si purius occurrerit lenimentum, & neque  
eger fuerit uiribus præuexatus, tunc hominum ma-  
nibus, aut animalium actu \* uehiculum adhibemus,  
equali uidelicet motu, sed \*perfecto, atque equabi-  
li, lucido, & mediocriter calido loco. Ac si tem-  
perata, & sine flatu aëris fuerit qualitas, tunc etiam  
sub cælo erit adhibenda gestatio. Sed necessariò lon-  
gitudinem loci curanda, ne frequenti reuersione uehi-  
culi circulatus gressus uertiginem ingerat ægrotan-  
ti. Tunc etiam deambulatio adhibenda, sed primo  
tarda, dehinc medio tempore fortior, atque paulo


erect

\* erectior \* extentis cruribus. Iis uero quibus caput fuerit plurimum releuatum, etiam <sup>a</sup> lectio ante deambulationem erit adhibenda, si studiosi fuerint egrotantes, sed \* leui exercenda uoce: tum exercitium, atque unctio, quæ æqualiter corpus moucant atque curent, ut uestitos faciamus currere, nudos uero cum defricatione perungi. Tunc manus suo motu \* exerere, uel certe luctationem iugem facere, adhibito \* doctore, cuius præceptis pareat, adhibitis \* sanè ijs rebus quæ implere atque commouere caput ualent, ut sunt ea quæ cum obiectione plurima corporis fieri iubentur: necnon etiam \* circulos ductus, atque \* retrogressus cum saltibus. Tunc ora lauanda, atque articuli fouendi, uel lauacrum per interualla dierum adhibendum. Deposita autem corporisurbatione erit aqua præpotandus egrotus. Tum cibum sumere succi facilioris debet, id est, mediæ materiæ, quam mesen hylen uocant Græci. Dandum etiam uinum tenue, paruum. Sed eo tempore quo cibamus, adhibenda quoque animi laxatio, quam diachysin uocant, quæ fiet aut ludicris rebus, aut ioculari facetia, quæ singula artibus moderatione adhibita, cyclorum ductu augeri atque minui debent, \* prædatio initio, cui perfectio consummata respondeat. Est autem resumptiui cycli ordinatio formanda hoc modo. Prima die paruo cibo atque aqua nutritus egrotans, uel si ferre ualuerit, ab omni nutrimento abstentus, alia die leui motu erit exercendus, atque oleo perungendus: tunc  cibo nutriendus \* id est, totam accipiat partem solitæ quantitatis, quam facile percipere

\* loco magis acclini.

\* extendendis.  
a Lectio quando adhibenda  
\* leni.

\* exercere.  
\* aut Pædote triba, aut gymnaste.

\* etiam.  
\* circuli  
\* gal. li. 2. tuenda valet. id genus exercitationis ικπλίσιν  vocat.

μίση ὕλη.

Θυμὸς διαχυσίς.

\* prædatio præscripto.

Prædationē cibi abstractionem vocat.

\* id est ut etiam panis accipiat.

Λάπαδες.

\* scari, aselli,  
iulides: vel aui-  
culus, ut sunt  
turdi, ficedu-  
le:

\* tum detracti  
panis

κύβλος μετα-  
συγκριτικός.

\* facile vene-  
tiunt.

atque digerere solebat. Sed panem dabimus limpi-  
dum, fermentatum: pulmentum autem oua, uel holerum betas, aut cucurbitas, uel maluas, aut lapathos, aut bulbos, uel pisces tencros, ut sunt \* scari: & aui-  
culas, ut sunt turdi, aselli, iulide, ficedule: uel cerebrum porcinum aut hoedinum, in hac perseuerantes qualitate, atque quantitate, duobus uel tribus diebus, iuxta uirium possibilitatem, quo neque parua dando debilitentur, neque adiectionibus perturbati opprimantur. \* Tunc detractæ partis partem tertiam adijcientes, pulmentum damus turdorum, ficedularum, aut ex pullis columbarum, uel gallinarum. Tum rursum post tres uel quatuor dies aliam tertiam partem panis adijciemus, & agrestia dabimus pulmenta, ut leporis, aut capræ: atque ita æquali numero dierum peracto, ultimam partem panis addemus. Pulmentum dabimus porcinum, tenerum, ex aqua, uel non curiose conditum ex anetho, & sale. Præterea simili modo erit etiam uini facienda partitio, atque per singulas pulmentorum mutationes adiectio: ac si plus ægrotans bibere, quàm damus, uoluerit, aquam sumat. Simili modo etiam gestatio, atque exercitium, siue motus erit augendus aut minuendus, ad comparationem quantitatis ciborum. Perfecto re-  
sumptiuo cyclo erit metasyncriticus adhibendus, primo ex parte, dehinc perfectus. Est enim passio facilis in \* motu, & natura caput iniurijs aptissimum: siquidem non facile rerum repentinas perferat mutationes. Prima igitur die erit cibo abstinendus ægrotans: tum alia die parua adhibita gestatione, atque unctione corporis, uel si passio perm

permiscrit, lauacro, rursus panis dabimus tertiā partem solitæ quantitatis, quam ante initium curæ facile accipere atque \* perferre solebat. Pulmentum dabimus falsum, assum, uel \* coctum: dabimus etiam cappares sinapi madidatas, atque oliuas ex uiridi \* nouitate messas, quas \* colimbadas uocant, præcauentes ea quæ facile caput implent atque grauant, ut est porrum, allium, cepe. \* Potum dabimus uinum, & si perferre uoluerit æger, in iisdem duobus uel tribus perseuerabimus diebus: sin minus, secunda die salsamenti admiscemus \* cerebrum, uel \* piscem. Tunc sequenti die panis detracti partem tertiā \* addemus: pulmentū damus, holus, cerebrum, piscem tenerum, hoc tribus uel quatuor seruātes diebus. Tum rursus aliam tertiā partem panis addētes, transimus ex mediæ qualitatis materia ad uolantum qualitatem, atque in eadem similidierum numero perseuerantes, ultimam partem panis addemus: pulmentum dabimus porcine carnis. Sed si multas mutationes facere uoluerimus, in quatuor partes medietatem panis diuidimus, ut singulas singulis \* mutationum pulmentis adiiciamus: hoc est, unam mediæ qualitatis materiæ applicantes, aliam uolantum, aliam agrestium, aliam porcine carnis. Sed ne quid odiosum è quantitate multorum dierum fiat ægrotanti, hoc est, pulmentorum similis oblatio, erit in communi qualitate specierum diuersitas uarianda, ut quibus diebus \* falsum \* damus, Græci drimphagian appellant, eiusdem speciem uariemus: nunc, exempli causa, \* dantes piscem, nunc † sardam, nunc cordulam: atque ita in \* usu mediæ materiæ, quam mesen helen appellant, nunc turdos, nunc ficedulas, siue quas \* miliacas uocat, quod mirum in modum & pinguescant, & delectentur milio.

nunc

\* digerere, ut  
supra.  
\* tostum  
\* oliuitate  
\* Colymbades  
\* Potui  
\* suillum, aut  
hædinum: ut  
supra.  
\* tenerum: ut  
supra.  
\* addimus  
\* pulmētorum  
mutationibus.  
\* salsamētum  
\* ad eius mo-  
dum & ordi-  
nem. Vide lib.  
3. cap. 2.  
\* cum piscem  
damus, sardā  
† scharum  
\* usu  
\* Cordyla,  
ihynnorū par-  
tus, qui sætas  
in mare autū-  
no redeuntes  
comitatur.  
\* vel milio pa-  
stas & sagina-  
tus; vel cēchri-  
das à milio di-  
ctas, auiū pe-  
culiare genus.  
Aues quidam  
esse uolunt,  
quas ortolanos  
Itali uocant,

nunc columbarum pullos, ac gallinarum. Hoc denique etiam in alijs qualitibus pulmentorum, siue materialiarum erit seruandum, ut eiusdem uirtutis pulmenta specierum mutatione uariantur. Erit præterea pomorum quiddam adiungendum, quod inflare non ualeat. Sed tempore quo porcina utemur, erunt etiam olera offerenda: solumq; id seruandū, ne modū quantitatis excedamus, siue qualitatem rerum datarum. Auge-

† *anteriorum* tur enim oblatio non solum si plurima fuerint † diuersarum specierum, sed etiam si plus nutrire ualuerint. In omni igitur mutatione, hoc est transitu ex

\* *qualitatem.* qualitate ad \* *quantitatem*, prima die oportet curandum \* *aquā bibere* aqua uiuere, adhibita perūctio. In alijs uero diebus etiam uinum accipere, & lauacro corpus re-

\* *renocatur*

\* *post lenis*  
*deambulationis*

† *intra libra-*  
*pondus*

\* *cas que tegi*  
*infuso.*

\* *Scyllino.*

quod haurien-  
dū radices mā-  
denti agro da-  
re oportet.

o' fss.

Scyllinos.

\* *soleret*

† *Videtur de-*  
*esse: admonen-*  
*dus est.*

\* *digestione co*  
*quat.*

curare, sed non omnibus necessario diebus: siquidem facile caput iugi lauatione ad passionis uestigia \* reuocetur. Similiter autem oportet etiam motus cor-

poris augeri atque minui. Tunc isto cyclo perfecto erit alius adhibendus solo ex uomitu, detracta drimphagia: In quo oportet prima die in paruo cibo, &

aquæ potu ægrotātem seruare: Tum alia die \* *leui* de

ambulatione motum uomitum exagitari, ex radicibus

raphani, uel ijs similibus speciebus, si loci aut tempo-

ris causa defecerit radicū copia. Oportet igitur radi-

cis cortices in frusta minui paruissima † ad libra pon-

dus, quod excedere fas non est, ex infuso mulso, \* &

aceto cōfecto simplici, uel \* *scyllino* hauriendum, atq;

medendo dare ægrotanti, sed paulo prius quā cibum

libero tempore accipere \* *solet*, † ut neq; supinus ad-

huc stomachus, hoc est, cibi adpetitu non admonitus,

sine ulla commotione reuomat: neque rursus appe-

tentia soliti temporis excitus \* *digestioni* incitet

accep



accepta. Tum tenuiter \* masticans, & iugiter ex illo \* radicem in  
 mulso ex aceto confecto sorbens, transuoret, atq; cum frusta coccisam.  
 omnem modum sumpserit, \* leui deambulans motu, re- \* leni  
 quiescat, donec ructante stomacho \* è retento spiritu \* erumpente  
 mordicatione quadam, siue feruoris sensu sentiat al-  
 tiora pulsari, quod quidem interposita hora occurre-  
 re probamus. Tum aquæ tepidæ sumens cyathos duos,  
 ne plurimo potu acrimoniam radicis obtundat, immis-  
 sis digitis uomitum prouocet, atque cum omnia reddi-  
 derit accepta, aquam superbibat plurimam, ut & sto-  
 machum lauet, & reliquias feruoris extinguat: atque  
 ita prouocato uomitu reiecto potu rursus bibat. Hoc  
 cum tertio aut quarto fecerit, & potum \* liquore \* liquore lim-  
 limpido reddiderit, capiti leuis fctus est adhibendus, pidum  
 atque ora aqua calida fouenda. Tum leui deambula-  
 tione mouendus est, ob tranquillitatem \* capitis faci-  
 dam, nisi sit soluendi \* torporis ex nocumento uomi-  
 tus illati causa, perungendus, \* hoc est, ex superioribus  
 ad inferiora membratim deductis manibus defricandus. pitis  
 Sic enim capitis densitas quæ uidebatur illata, solue- \* & ex  
 tur, cum inspiratio facilis totum per corpus fuerit ef-  
 fecta. Tum epotis duobus cyathis aquæ calidæ lecto re-  
 collocandus, & ab omni cibo uel potu abstinentus sum-  
 ma cum requie animi atque corporis. Dehinc laxata  
 capitis strictura \* solo dimittendus: quoniam prius \* somno  
 quàm densitas ex adiutorij commotione illata soluta  
 est, qui in somnum facile deuenerunt, non solum \* siue \* sine  
 causa capitis grauationem seruauerunt, sed etiam ma-  
 iorem fecerunt, cum nullo spatio interiecto somnum  
 adiutorio iuugentes densitatem corporis \* iunxerunt.  
 Est igitur, ut dicimus, cibo abstinentus, ne sumpta cor-  
 rumpat ex corporis remanente torpore, post agita-  
 tionem

tionem uomitus, atque feruorem. Quippe cum saepe manentibus in stomacho squamulis uel folliculis radicibus, requie superaddita, atque cibo nouo commixto, eius necessario faciant corruptionem, ex qua consequenter caput impletum, etiamsi sua passione praeuexatum non fuerit, necessario constrictum grauescit, cum

\* corruptæ ex illa putredine \* corruptionis exhalationes ascensu

\* obsident. quodam caput \* obsidunt. Sicut enim Themison ait,

Pauperum dixit pro carens duris cutibus & capillis obiectum, & spiramentis diff-

\* foratum ficilibus natura: tum sensibus quoque uniuersis \* formatum, insidens corporibus, atque accipiens eorum cunctas exhalationes, cum spiritus naturaliter super-

\* vapores eos na petens ex inferioribus trahit \* corpora ea per arteriam atque stomachum, quæ sunt corporis ueluti maiora fumaria. Dehinc alia die lauacro utemur, atque pulnēto mediæ qualitatis. Tum post duos uel tres dies cæteras cycli partes adhibemus. Ac si radices loci aut temporis causa defuerint, adseclandus ordine supradictio uomitus ex granis sinapis madidati, uel ex liquido sinapi poto, aut mulso ex aceto & pipere confecto, uel \* cardamomo, aut cruce semine, aut decoctione thymi, uel origani, aut hyssopi, aut \* salsamenti, &

\* cardami, nasturtij

\* salsamenti, multis ofis

\* resumpto e. festu cedente, atq; limpido linimento perspecto, \* præ-

tiam egrotante, sumpto etiam egrotanti ingrauescentem perferre nunc uomitum possit, nunc drimyphagian, audemus integrum atque perfectum cyclum metasyncriticum adhibere, ut initium à uomitu sumentes, drimyphagian iungamus, ac deinde per cæteras cycli materias decurramus.

\* ordinamus. \* Ordinantes præterea etiam localia adiutoria, quorum prima sunt adhibenda leuiora, & quæ longè

remotis

remotis partibus admota \* transmissa patientibus in- \* transmissio  
gerunt curationem: tum etiam uehementiora. Erit igitur  
radendum caput, nunc \* pro capillatura, nunc con \* eodē genere  
tra capillaturam, donec cutis rubore adficiatur: ac locutionis uti-  
deinde in balneo nitri puluere \* aspergi, & confrica- tur infra ca. 4.  
ri paulo antequam in solum descendat agrotās. Tum \* aspergendū,  
etiam paroptesis adhibenda erit ex carbonibus equa- & confican-  
li \* uapore medentibus. Alia etiam die cucurbitæ in- dum  
figendæ \* plurimæ cum flamma: & primò, dorso atq; παρὸν τῶν π.  
cervi, uel cæteris neruis, quos tenontas appellāt, tum \* calore ardē-  
capiti, quæ quidem capiti erunt magno raptu detra- tibus.  
hendæ. Dehinc dropax adhibendus, primò cruribus, \* plurima  
tum thoraci, & dorso, \* ex primo cervicis sphondylo ΤΙΝΟΥΤΙΣ.  
usque ad clunes, uel earum ultimum sphondylum. ΔΡΩΠΑΞ.  
Plurimi etenim nerui inferiora quæque communi natura \* à capite.  
\* cōplexi iisdem paria faciunt superiora. Tunc \* par- Eas vocat re-  
tium propungentibus pilis capitis, atque buccarum, uel corporationes  
temporum musculis, quos siagonas appellant, collo, & cap. 4. infra.  
mento, cum subiectis gutturis, quæ \* ante rumam uo- ΣΤΕΡΝΟΥΛΟΙ.  
cant, dropacem apponemus. Sed ne cæteri corporis \* à  
partes nudæ interea perfrigescant, erunt à duobus mi- \* in eas partes  
nistris mediocri unctione fricandæ, atque ita cum dro- dispersi, veluti  
pacem detraxerimus, totum perungi corpus oportet nexu quodam  
bit, ipso quoque capite manu leuiter pertractato, & illas cum supe-  
lauacro dabimus agrotantem. His itaque adiutoriis rioribus vin-  
relaxatis, atque lentescantibus capitis partibus, uocis ciunt, ac mu-  
quoq; exercitium adhibemus, quod Græci anaphone- tuum illarum  
sin uocant: tum frequentior sinapismus, ac deinde ptar- consensum ef-  
micum utile est. Plurimum denique prodest post deam- ficiunt.  
bulationem sinapi adhibitum in gargarismum, madi- \* præfasis pro-  
datum, prius quàm lauacro eger utatur, uel aridum, minētibus pi-  
ac masticatum: deinde aqua calida sumpta, & in ore lis, capiti.  
paulisper \* anthereuna,  
sive rumam,  
ut pag. 265.  
ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.  
ΣΙΝΑΠΙΣΜΟΣ.  
ΠΤΑΡΜΙΚΟΣ.  
ΓΑΓΓΑΡΙΣΜΟΣ.

paulisper

paulisper retenta : uel piper cum melle. Non quidem  
*\* in Apophlegmatismi vsu* hæc humoris, siue *\* phlegmatis* trahēdi causa metho-  
 dus ordinauit, sed ut etiam oris interiora adiutorio-  
*\* afficiat* rum agitatione capiti beneficium tradant: quippe cum  
 dolor sæpe ipsas quoque partes *\* afficit*. Ista igitur re-  
 gula consequenter etiam betæ nigræ, uel cyclamini  
*\* dilatavis* herbæ succo, in cochlearis quantitate, reclinato capite  
*\* muccilenti* ægrotantis, pollicis sinistræ manus impressione *\* infla-*  
*\* releuatur* tis nariū cauernis infuso uti possumus. Etenim fit *\* mu-*  
*\* adiuutorii cor* cileta humoris excussio, qua ægrotans *\* releuetur*,  
*porum vsus a-* non ob detractiōem, ut suprà diximus, materiæ, sed  
*criorum* quòd adiuncta agitationis utilitas capiti beneficium  
*\* murrha* tradat. Est etiam ex localibus *\* adiutoriis* usura cor-  
 porum, ut sunt ea quæ conficiuntur ex euphorbio, uel  
 adarce, opobalsamo, aphronitro, *\* murrha*, uel aliis si-  
 milibus uirtute rebus. Utendum etiam malagmatibus,  
*\* oblatione:* quæ ualeant ex alto causas *\* inductione* propria de-  
*nempe veluti* tergere, quæ Græci Minythica uocauerunt. Memine-  
*delendo extir-* rimus tamen nō prius esse ab adiutorio locali ad aliud  
*pare.* transeundum, quàm turbatio corporis fuerit delinita,  
*Μαλάγματα* atque patientes partes aliam rectè poscere commo-  
*μινυτικά.* tionem adiutoriorū fuerint uisæ. Quapropter si pluri-  
 mum uexata corpora uiderimus, sufficere intelligimus  
*\* alij nihil mu-* uno in cyclo unum locale adiutorium. In iis uerò quæ  
*iat, et viribus* minus uexata noscuntur, uel uiribus medicamentorum  
*depurgata, de-* *\* depurgata* etiam secūdò uti licet. Singuli igitur ad-  
*stitutæ, et pri-* iutoria adhibēda esse meminerimus sequenti die quàm  
*uata exponit.* mutatio facta fuerit materiārū, hoc est, qualitatis pul-  
*\* afflicta, de-* mentorum in aliam transitus qualitatem, ut ex ante-  
*iecta* cedenti abstinentia ductile atque aptum corpus adiu-  
 toriū fiat. Specialiter autem erit dropax adhibendus  
 tempore quo mediæ qualitatis utimur materia. Paro-  
 ptesis

ptes uero & sinapismus, & ptarmicum, quod \* ster-  
 nutamentum dicere poterimus, tempore quo uolan-  
 tum utimur pulmentis. Etenim neque adhuc corpus  
 post usum falsamenti debile, neque rursum plurimum  
 nutritibili qualitate uidetur esse \* confertū. Cauēda ete-  
 nim uehementer est capitis commotio, quæ \* sæpe cor-  
 poris plenitudine fit, quippe cum sanos homines ple-  
 rumque uimolentia, uel indigestione \* confusos, capitis  
 motu uexatos in catarrhum, atque coryzam uenire  
 uideamus. Solo igitur tempore, quo drimyphagia ute-  
 mur, omne erit locale adiutorium prohibendum: uel  
 si quisquam omni ex parte fuerit uiribus plenus leue  
 quiddam \* addiderit. \* Sufficiens quippe cum drimy-  
 phagiæ uehementia atque recorporatio altiorum eo  
 tempore totum penè habitum mutare uideatur, & sit  
 timoris ita corpus adiutorius exercere, ut eodem tem-  
 pore superficies cum altioribus agitetur. Utendum  
 etiam fomentis, siue uehementioribus illisionibus a-  
 quarum, Græci cataclysmos appellant. *¶* primo cali  
 darum, deinde frigidarum. Ordinandæ etiam muta-  
 tiones earum ad usus naturalium aquarum, scilicet  
 earum quæ non odore percutiunt. Natationes uero  
 sub diuo fieri reprobamus. Cæteris enim corporis  
 partibus aqua \* complexis, solum \* supernatans re-  
 manet caput, quod necessariò perfrigesceat, \* inæqua-  
 litatem corporis facit. \* Ac si minus cedere passionem  
 uiderimus & post frequentiam eiusdem, iteratâque  
 curatione, & fortificato corpore, ægotantis que-  
 rimonia permanserit, hellebori usus adhibendus: sed  
 primo ex eius insertatione radicibus penetratis,  
 \* uel mulso ex aceto confecto infusis. Dehinc etiam \* ac

\* Sternutato-  
 rium, quamuis  
 sic passim in  
 hoc opere lega-  
 tur,

\* immodice ple-  
 num, & san-  
 guine abun-  
 dans,

\* super  
 offusos  
 καταρρεσ.  
 κορυζα.

\* dandum erit  
 \* quippe cum  
 sufficiens

κατακλυσμός

\* operis, con-  
 teclis, demer-  
 sis.

\* superextans  
 \* horrorem.  
 At

coquis utendum est, atque diuersis ciborum palmen-  
 Libri respon- tis, quod quidem latius tertio Responſionum libro iam-  
 sionum Celi. dudum docuimus. Vehementi enim motu corpus aper-  
 \* depellit tum \* deſpuit, ut ita dixerim, \* paſſionis carnem, qua  
 \* quæ morbu- depulſa, naturalis atque noua ſuccedit. Dehinc ſi etiã  
 alis, & fouet: his geſtis paſſio permanens crit, ſecundo uel tertio  
 \* reſumptis utendum helleboro, ſed \* præſumptis uiribus ex cor-  
 poris reſeſtione. Tunc etiam naturalibus aquis, uten-  
 dum, uel ſiccis uaporationibus, & longa per maria  
 nauigatione. Etenim fluminales uel portuoſæ, atque  
 ſtagni nauigationes incongruæ iudicantur, quoniam  
 humectantes caput inſrigidant exhalatione terrena:  
 Maritima na- maritime uero latenter atque ſenſim corpus ape-  
 nigatio. riunt, & falſæ proprietatis cauſa corpus adurunt,  
 atque eius habitum quadam mutatione reſcitiunt. Af-  
 feſtandus etiam in aeres teneros atque aquilonios  
 tranſitus, uel contrarios iis qui paſſionem aſperare  
 \* ſupra pag. ualent. Adhibenda præterea animi \* laxatio, & ma-  
 249. Αἰάχους gis poſt cibum. Omnis enim mentis intentio caput im-  
 plet. Hæc eſt ſecũdum Methodicos ordinata curatio.  
 Plurimi autem diuerſarum ſeſtarum principes ſo-  
 menta probauerunt ex oleo roſaceo, atque aceto, &  
 ruta, & herpyllo, peucedano, caſtoreo, ſylphio, atq;  
 \* zeyro. ſemine herbe quam agnon appellant, \* ſamſuco, he-  
 \* ſamſuco: derarum coma: ex quibus in acceſſione caput imple-  
 quãuis in hoc tum augmentis aſperrinis agitatum, atque grau-  
 toto opere ſic le- tum, totius paſſionis duplicat modum. Eſt enim ſupra-  
 gatur. dictarum materiarum \* repercubiſibilis uſus, eo adhi-  
 \* reprehendi- bitus tempore, quo mitigatio conuenire perſpicitur.  
 lis.  
 Καταρκά. Utuntur etiam purgatiuis medicaminibus, quæ ca-  
 thartica uocauerunt, hoc eſt, uentrem deducenſibus,

ex quibus stomachus \* inficitur, & omnis nervositas  
 \* uitatur. Item arteriotomiam probant, & usturam  
 \* ex cauteriis \* ferratis duorum digitorum spatio su-  
 per ipsas uenulas effectam. Tunc longo tempore \* uul-  
 nerationis seruata qua ferri materia purulenta ex  
 alto \* atque superficie passionem \* releuare promit-  
 tunt, quod nos in acceſſione noxium atque exitiale  
 iudicamus, ob uehementiam motus: in lenimento uero  
 inutile, atq; adiutoriorum medele contrarium, siqui-  
 dem prohibet eorum beneficia penetrare. Non enim  
 fricationes, uel cucurbitæ, uel dropaces, aut sinapismi,  
 aut ptarmica, aut cataclysmi, quos nos aquarum illi-  
 siones appellamus, uulneratis locis adhiberi, aut \* per-  
 ferri aptissime possunt. Utuntur etiam frigido laua-  
 cro, Græci psychrolusian appellant, quod necessario  
 nervos indurat, ac congelare consuevit, ob densatio-  
 nem cutis, ac totius corporis. Utuntur etiam locali ue-  
 narum diuifura, ex qua patientes partes implentur.  
 Dant quoque mastichen masticandam, ex quo in pas-  
 sione \* constituta densatus conſtrictiue uirtutis cassa-  
 tur. \* Themison primo libro tardarum passionum, quas  
 chronias uocant, phlebotomat, atque conſtrictiuis fo-  
 mentis utitur \* ad laxamentum phlebotomiæ, frustra-  
 tus, errore sequenti ex fomentis incongruis. Item im-  
 minente augmento, duas præcauens horas, unctiões  
 adhibet acerrimas, & durissimam fricationem, atque  
 conſtrictionē articulorum, & tum sinapismū adhibet  
 ultimis membrorum partibus, siue summitatibus arti-  
 culorū, ob auertendam materiam: plurimas etiā fronti  
 sanguisugas apponit, atq; humeris, & temporibus ca-  
 pitis, quod est contra sectæ rigorem. Affectandam igitur

\* afficitur  
 \* uexatur.  
 Αἰθριοῦ·μῖα.  
 Καυτήρια.  
 \* cauteriorum  
 ferramenti.  
 \* ferratis  
 \* uulneratio-  
 ne  
 \* in superficie  
 possit  
 \* releuari

\* ab ægro

ψυχρολύσια.

\* constitutus  
 potentia cōstri-  
 ctive uirtutis  
 densatus gra-  
 uatur.  
 \* Themison  
 \* post

\* congruat

tur corporis laxationem, nō auersionem materiæ eius dicimus. Quippe cum non \* concurrat, neque conueniat quod faciendum putat, ut eodem tempore articulorum constrictione, & sanguisugarum appositione utamur, præseruatis horis duabus, antequam passionis implicent augmenta, cum illo tempore sit requies ad-

\* medicamen-  
tis supradictis  
detento

\* duarum ho-  
rarum quas The-  
mison præcave-  
bat.

\* perficilio

\* si venenata  
sunt

Μαλάρματα  
ἀνὸς Αὐρα.

hibenda, & sepe contingat, ut præueniens corpori iam \* occupato querela, & accessionem denuuntians, ipsum quoque \* tempus quod elegisse uideatur, turbare noscatur, sitq; nocens oppositio sanguisugarum, ex quibus \* perfricatio, atque commotio, uel ex earum

\* morsibus amentia, aut si aliquò sanguinem detrahūt grauis ægros uexatio consequitur. Probat etiam apponenda malagmata dolori contraria, quæ anodyna uocantur, uel castoreum, aut rutam, aut sphondylium herbam, cum cerotario ex oleo rosaceo, atque pice liquida confecto. Ex iisdem iugiter iubet odorem capere ægrotantem, omnifariam caput implens: atq; ita

\* aqua frigida  
imbuta

ἐμπροσθεν.

\* Escaroticis

\* vrere

si dolores, inquit, mitigati non fuerint ex calidis rebus, \* frigida spongiæ apponenda, ad empiricorum consilia deuolutus, qui ex contrariis ad contraria

transcundum, causis resistentibus, probauerunt. Vtitur etiam \* scaroticis, hoc est, quæ cutem \* extendere uel corrumpere ualeant: & cessante accessione imperat fricationem adhiberi, atque fomēta, quorum item

\* totum

\* æquissimè

\* rudioris se-  
culi ignorātia.

usus non declinantis est accessionis, sed in \* toto recedentis. Denique peccatis indulgendum methodicorum princeps Soranus \* dignissime iudicauit. Adhuc enim, inquit Themison, Asclepiadis erroribus, & \* rudimento temporis methodici fallebantur.

De



## De Scotomaticis.

## Cap. II.

Scotomatica passio ab accidenti nomen sumpsit, Σκωτωμα, καὶ  
 quod repentinas oculis ingerat tenebras. Afficit σκοτωμια, καὶ  
 frequenter uacuos homines, hoc est, sine aliquo exer- σκοτωματικὴν  
 citio uitam ducentes, & uinolentos, uel consuetos βάτος.  
 uentrem purgare medicaminibus potis, & ab eorum  
 usu repente desistentes: item \* hæmorrhoidis longo  
 tempore affectos, & post earum amputationem nulla  
 recorporatione curatos. Vehementescit autem hæc  
 passio hyeme, uel uerni temporis initio: præterea sæ-  
 pe futuram denuntiat epilepsiam. Veteres denique  
 paruam epilepsiam uocauerunt. Nam in passione con-  
 stitutos repentina uisus \* tenebratio, atq; nebula, cum  
 capitis \* uertigine consequitur, ut omnia secum mo-  
 ueri existiment. Item ante oculos quosdam sentiunt  
 marmorum maculis similes \* tractus, quos marmari-  
 gas Græci uocauerunt, cum tamen \* conuersis oculis  
 omni ex \* parte non deserant uisum: Item capitis atq;  
 oculorum grauatio, & sedere uolentibus timor: si-  
 quidem secum omnia putant impelli, uel cadere: au-  
 rium tinnitus: superiorum corporis sudor: aut repen-  
 tinus casus cum celerrima surrectione. Asperatur  
 præterea passio si ex alto aspexerint ægrotantes  
 meatum fluminis, aut rotæ uertiginem, siue ignis, item  
 si proni quicquam gesserint, uel maiorem uocem au-  
 ribus acceperint. Discernitur ab epilepsia hæc passio,  
 siquidem neque sensibus priuat ægrotantes, neque  
 spasmus, id est diuerso raptu adficit: item à capitis pas-  
 sione, quam cephalæan uocant discernitur, quod do-  
 lorem non faciat. Separare autem \* ab ista passione  
 uertiginem, \* siue obscuritatem necessarium non est.  
 Siquidem ex his ueluti partibus scotomatica passio

in hoc toto o-  
 pere Hæmor-  
 rhoidas prima  
 declinationis,  
 & hæmorrhoi-  
 darum legitur  
 επιληψία.

\* Hic affectus  
 σκοτωμα est.

\* Hic affectus  
 σκολιδινος vo-  
 catur

\* iactus  
 μαρμαρυγὰς, &  
 ἀμαρυγὰς, &  
 μαρμαρυγὰς le-  
 gendum.

\* obuersis  
 \* parte inserat  
 visum  
 intente aspi-  
 ciant.

Σωασις

\* in  
 \* ab obscuri-  
 tate

confecta esse uidetur. Est denique istius passionis affectio saluti innoxia, hoc est sine ullo periculo, nisi quis maretenus, aut ex alto cadens, ratione casus potius, quàm passionis uiolentia, perire uideatur. Curationem uero eandem adhiberi conuenit, quæ nuper passioni capitis est ordinata, non solum generali, sed etiam speciali ratione.

## De Incubone.

## Cap. III.

Incubus.

**I**ncubonem aliqui ab hominis forma uel similitudine nomen ducere dixerunt: aliqui à phantasia qua patientes afficiuntur: siquidem ueluti ascendere atque insidere suo pectori sentiunt quicquam. Themison secundo epistolarum libro Pnigaliona uocauit, siquidem præfocat egrotantes. Quidam ueteres ephialten uocauerunt, alij epibolen, quod \* utilis patientibus perhibeatur. Afficit crapula uel indigestione iugi uexatos. Accidens igitur semel, ita ut nullam uigilantibus querelam, aut displicentem sanitatem faciat, sed solius somni \* turbatio noscatur, minime passio dici potest, sicut neque semel effectus per somnum seminis lapsus, quem Græci onirogonon appellant, passio nuncupatur, nisi iugiter, atque cum corporis incommoditate fuerit effectus. Est autem supradicta passio epilepsie \* tentatio. Nam quod neque deus, neque semideus, neque Cupido sit, libris causarum quos ætiologumenos appellauit, plenissime Soranus explicauit. Ista igitur passione possessos sequitur corporis tardissimus motus, atque torpor, & magis per somnium grauedo, atque pressura, & ueluti præfocatio, qua sibi quenquam irruisse repente existimant

Πνιγλιών.

πρίαλτης.

Επιβολή.

\* hostilis

Ανσαρίσκισιν

significat, quā

alibi Displicen

tiam vertit.

cap. ult. lib. 5.

\* turbatione

Ονειργόνος.

\* prænuntius

quidē, &amp; qua

si principium.

Αιτιολογούμε

νοι libri Sora

ni.

stimant, qui sensibus oppressis corpus exanimet, neque clamare permittat. Quo fit ut sæpe erumpentes non articulata, sed confusa uoce exclament. Quidam denique ita inanibus adficiuntur uisis, ut & se uidere credant irruentem sibi, & usum turpissimæ libidinis persuadentem: cuius si digitos apprehendere nixi fuerint \* fugatū existiment. Tunc autem cum somno surrexerint, faciem atque transfigurationis \* partes unidas & humectas sentiunt, attestante grauedine ceruicis, cum tussicula \* leui, molli stimulatione commota. Plurimum autem possessis accidit pallor, & corporis tenuitas, quippe cum somnum, timendo, non capiant. Apparet igitur stricturæ passio ex † grauedine, tarda autem ex temporis tractu, & non semper sine periculo salutis. Cum enim uehementer impresserit præfocatio, quosdam interficit. Memorat denique Silimachus Hippocratis sectator, contagione quadam, plurimos ex ista passione, ueluti luc, apud urbem \* Romam confectos. Quapropter curandos oportet iacere loco lucido, atque mediocriter calido, adhibita requie animi, & corporis abstinentia, usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocauerunt. Tum colla tegenda, atque caput, stomacho lanis limpidis ex oleo calido præcincto: adhibenda etiam oris collutio ex potu aquæ calidæ. Ac si plurima stomachi, uel capitis, uel colli fuerit querela, adhibenda phlebotomia, & post detractionem perunctio ex oleo calido. Tum ora fouenda: cibus dandus simplex, succi facilioris, paruus, sorbilis: & si passio perseuerauerit, cataplasmata adhibenda: cucurbita quoque, nunc simplex, nunc adiuncta scarificatione, ex utraque parte gutturis, quam Græci anthereona uocant, nos

\* fugientem existimant

\* oculos: nares: aures: anum.

\* leni

† aliàs: ex grauedine tarda, aut

\* populari & pestilenti huic incubo sudor Anglicus nō dissimilis est.

Arb. p. p.

Ruma.  
Diurnis dixit  
pro continuis  
ut supra capi-  
te primo.

\* malim lege-  
re Dia Melilo-  
tr. Dia Sam-  
psuch. caterū  
toto opere no-  
minandi casu  
hæc leguntur.  
\* capitis adhi-  
benda, & den-  
so pectine.

\* admonens  
motibus.

\* ciborū quā-  
uis ijsdem uer-  
bis pag. 256. le-  
gitur corporū.

rumam. Tunc uaporatione utendum, & alternis die-  
bus cibus dandus. Illa uero adiutoria quæ adhibenda,  
diurnis erunt diebus adhibenda, sed longe remotius à  
nocturno tempore. Tunc etiam gestatio, atq; uarius  
cibus, & lauacrum, & aquatum uinum. Illis uero par-  
tibus quas curamus erunt primo cerotaria apponen-  
da: tum malagmata, ut Diachylon, aut \* Diamelilo-  
tum, aut Diamsucum. Fricatio etiam \* capitis, & dēsi  
pectinis capillorum decursio: suspiciones etiam siue  
metus imminentium somniorum auertendi procul, fabu-  
larum lenitate robore adiecto. Plerique enim sibi sin-  
gentes uel formantes futura, uoluntarios penē causa-  
rum motus efficiunt: ac si passio tardauerit leuioribus  
\* admonita monitis, conuenit etiam radicum uomitus,  
atq; drimyphagia: capitis quoque detonsio: ac \* cor-  
porum usus acriorum. Item dropax, sic enim aut ex  
supradictis adiutorijs ægritudo soluetur, aut si peiora  
uerit, epilepsia necessario sequetur.

## De Epilepsia.

## Cap. IIII.

Επιληψία.

\* ipsorum.

Morbus sacer

\* putatur im-  
mitti.

\* dominantis

Sacra magna  
dicta sunt.

**E**pilepsia uocabulum sumpsit, quod sensum atque  
mentem pariter apprehendat. Appellatur etiam  
puerilis passio, siquidē in \* ipsis abūdat ætatibus: & sa-  
cra, siue quod diuinitus \* putetur immiſſa, siue quod sa-  
cram contaminet animam siue quod in capite sit, quod  
multorum philosophorum iudicio sacrum templū est  
partis animæ in corpore \* natæ: siue ob magnitudinē  
passionis: maiora enim uulgus sacra uocauit. Inde sa-  
crum dictum mare & sacra domus, uelut tragicus  
poëta sacram noctem, hoc est magnam appellauit.  
Fit plerunque uel nascitur ex uinolentia, aut indige-  
stione,

stione, aut contusione, uelut Asclepiades, percussu atque diuisura \* membrorum quæ cerebrum tegunt, aut nimio timore. Sed eius passionis species due esse probantur: una quæ somno similis altissimo uidetur: alia quæ diuerso raptu corpus afficit. \* Quarum prima grauior iudicatur: siquidem est similis apoplexiæ. Earum quidem commixtio tertiam facere speciem potest. Plerique enim raptu atque contractu corporis adfecti, uel adprehensi, secundo in altissimum soporem deuenerunt. Sed horum differentia generaliter inutilis curationi inuenitur. Pronos autem seu decliues, aut uenturos in ipsam passionem sequuntur communia accidentia etiam cæterarum passionum quæ ex membrana cerebri oriuntur, ut grauedo, atque uertigo capitis, & interior sonitus, consensus etiam occipiti, oculorum \* intentio, auriû tinnitus, aut difficilis auditus, & cum uertigine uisus obtusio, uel quædam præ oculis quasi \* propendentia, macularum marmoris similia, quæ Græci \* amarygmata, siue marmarygas uocant, uel araneorum cassibus, aut nubibus tenuissimis similia, aut paruulis uolantum animalibus, ut sunt culices. Item uelut scintillarum micæ, aut circulos igneos circumferri præ oculis sentiunt egrotantes. Linguam quoque inflexibilem, cum saltu musculo rum, & dolorem à tergo inter scapulas. Sequitur etiam gutturis durities, atque præcordiorum iugis inflatio, cum oscitatione, sternutamento, & saliuarum fluore, & cibi fastidio, aut immodico appetitu: uigiliæ iuges, aut plurimus & \* inanis somnus, insomnia turbata, & ciborû difficilis egestio, uel nulla: & sine manifesta causa ueretri tentigo: & frequens Veneris delectatio. Aliquando etiam per somnum seminis lap-

\* membrarû

\* Harum

\* ueluti defixus uisus, rigētibus oculorum musculus.

\* prosplicētia  
\* Marmarygmata.Αμαρύγματα.  
μαρμαρυγαι.

\* qui ad ualētudinē nihil conferat.

οὐδ' ὅτι. *sus, quem Græci onirogonon uocauerunt: mens suspensa cum anxietate, & nullis ex maioribus causis facilis iracundia, atque paulo ante gestorum obliuio, & \* vaporū qui \* ascensus \* durante \* eorum quæ caliginem facere ualent facilis \* sensus, obtinente passione & iam occupato corpore: sensuum priuatio accessione \* dominante. Sequitur & quibusdam immobilitas perfecta, cum ore demisso, at testante pallore, cum aspiratione tarda, & pulsu magno, atque alti soporis simili oppressione. Alios uero raptos, diuersa membrorum diductio, atque saltus, & uultus contortio, uel oculorum, sequitur, quæ sæpe perscuerans, etiam post accessionem strabos fingit ægrotantes: at contrariò quibus \* tarda fuerit correctio, naturalis uisus simulat æquitatem. Sequitur etiā gutturis stridor, & singultus, cum rubore uultus, & uenarum inflatione: & aliquando pulsus atque spirationis cessatio: tum per interualla resumptio: palpebrarum quoque suspensa positio: & illisio dentium atque stridor, & linguæ prolaptio, quæ sæpe \* quassatione, sæpe incisura uexatur. Sequitur etiam præcordiorum ad superiora raptus, uel stercoreum & urinae inuoluntaria emissio, sudor roscidus rigenti corpore. Aliquibus etiam confusæ uocis emissio, & ante dimissionem per os atque nares spumarum fluor: accessione cessante omnium gestorum ignorantia, atque corporis dimissa uolutatio, cum mæstitia uultus ægrotantis. Sequitur tunc oscitatio & \* distictio corporis ueluti uoluntaria, & insolitus \* uisus. Piger motus & totius corporis marcor: oculorum etiam permanens turbatio, atque uenarum frontis extantia. Aliquibus etiā mentis alienatio, & nulla notorum agnitio. Alio autē tempore plurima ex antecedentibus consequuntur, quæ*

\* vaporū qui  
 \* ascensus  
 \* durante

\* parua fuerit  
 corruptio

\* quæ sæpe dentibus illisa conuulsiuntur: sæpe dentibus præcidiuntur.

\* pandiculatio  
 \* nixus,  
 pandiculandi  
 conatus

quæ supra memorauimus : hoc est , tenebratio , uel caligo , cum proni quicquam gesserint egrotantes , aut nauem , aut rotam figuli celeri motu ferri conspexerint : aut aquam fluentem , uel magnam loci altitudinem , aut rupem uiderint , aut strepitum uel clamorem audierint , aut uehementer refrikerint , uel igneis lacrimis usi fuerint , aut odoribus nimium bonis uel malis adfecti , ut \* storacis incensi , aut thuris , aut bdellij , aut \* styracis gagatis lapidis , uel bituminis , aut ceruini cornu . Præterea accessionum motus nunc ordinatos , nunc inordinatos egrotantes accipiunt : & nunc interuallis longioribus , ut mensium duodecim , nunc angustioribus plurimum , uel parum , ut eodem mense , uel die , frequenter agitentur . Noctibus \* quidem inquietati , an \* quidam antecedentibus signis accessionem fore denuntiant : quidam sine ullo denuntiatiuo motu corripuntur , quo fit ut magis periclitentur . Alij enim prænoscentes futura , motibus solitis admoniti , in domibus se continendo tutantur , accessionem præuenientes : quam cum sentiunt propinquare , eligunt locos , quibus tutò , ac sine ulla turpitudine iacentur . Alij uero istorum ignari publicis in locis cadendo foedantur , adiunctis etiam externis periculis , quæ passionis non esse uidentur , \* loci causa præcipites dati , aut in flumina uel mare \* ex aliis locis casu \* uentrem soluere . cadentes , aut in balneis \* uentris solutione coacti . Signa autem sunt post lenimentum futuræ rursus accessionis , ex quibus affici in passionem uenturos memorauimus , somnus turbatus , uel cibi corruptio sine ulla manifesta causa . Item ueretri sine ratione tentigo , & Veneris appetentia , uel seminis per somnum iactus , quem onirogonon Græci uocant : iracundia , mœstitudo , & cætera quæ nuper posuimus . Item segni

† manuum  
malarum

\* oculos intē-  
dere

\* vietas

\* pupillas

\* summitatis

\* quo tempore  
accessio redi-  
tura sit.

\* quoniam  
\* ut paucis di-  
cam.

\* Aphor. 25.  
lib. 3.

\* Hec ratio  
nō probat ma-  
gis affici pue-  
ros, sed gra-  
uius, & cum  
minore pericu-  
lo.

\* Aphor. 45.  
lib. 2. & 7. li. 5.

passione.

\* natura pu-  
gna

segnities cum pigro motu in officia solita, & grauatio cum quodam somnifico mœrore uultus, decolor atque † maior inflatio, oculorum quoque ueluti de-  
prauatio, cum deiecto quodam uisu. Nam suspicere  
difficile est ægrotanti, hoc est in aerem supernū \* at-  
tēdere. Quod si tentauerint, facile rursum abducti \* ui-  
cinas eousq; oculorū \* partes ad inferiora conuertūt:  
ac si repentino motu caput in alteram conuerterint  
partem, uertiginem sentiunt cum tremore atque tor-  
pore, cum digitorum contractu, uel dolore, aut cru-  
rum grauedine, & \* summitate manuum uel pedum.  
Ex quibus multis uel cunctis interrogatione acceptis  
passionem dicere poterimus, nisi præsentibus in ac-  
cessionem facilius nobis cognitio fuerit declarata, uel  
ætatis, aut aliquolibet causa æger sua narrare non po-  
terit accidentia, quæ supradicta ratione apprehende-  
re poterimus, & accessionem futuram prænoscere:  
coniicientes etiam temporum \* responsionem, \* quan-  
quam, \* summatim, accessionum ordo sæpe seruatur.  
Communiter autem hæc passio frequens est in pue-  
ris, & magis tempore quo dentium \* natiuitates ha-  
bentur. Accidit etiam primæuis, atque medijs ætati-  
bus: senibus uerò difficile: nam uehementius afficit  
proximos natiuitati infantes, quàm pueros, aut uer-  
genti ætate atque seniores: siquidem \* uiribus inuali-  
di passionum impetum tolerare non possunt. Solet de-  
nique hæc passio pubertatis \* tempore siue nouæ pur-  
gationis in fœminis, aut primi partus quadam natura-  
li nouitate facile detergeri corporis mutatione suffe-  
cta, quod si minimè uenerit, plerunque patienti conse-  
nescit, nisi aut longo tēpore \* natura pugnāte, aut me-  
dicinæ diligentia fuerit superata. Irruit autem omni

temp



tempore corporibus, sed magis \* uerno. Frequenter simile pati epilepticis, & à matrice præfocata \* mulieri inueniuntur: siquidem non aliter sensibus priuantur, sed discernuntur quod in ultima acceßionis parte, per os atque nares, spumarum fluore non afficiantur. Hæc est paßionis cuncta specialis significatio. Curationis autè adhibendæ causa erit necessariò \* adhibendum genus, quod sit paßio stricturæ, atque uehemens, & \* difficulter frequentans, tarda, superpositionibus atque lenimentis uariata: \* cuius quidem superpositiones nunc plurimis tempora temporibus acceßionis generalia superpositionis occurrerunt. Sed quæ fortè superpositiones plurimis ex acceßionibus fuerint cofectæ, nunc quotidianos, nunc tertianos, nunc hemitritaicos faciunt typos. Difficile est enim hanc paßionem in continuationem uenire: siquidem præuentu mortis interueniente minimè continuatio intelligi potest, & est impossibile, iugibus diebus aut sensibus priuatum, aut motu carentem, aut diuerso raptu affectum in uita manere. Item lenimentorum aliqua pura ac limpida, aliqua turbata concurrunt: & aliqua latiora, aliqua angusta, aliqua horum mediocria. Patitur enim communiter omnis neruofitas, sed principaliter caput, sicut ex antecedentibus conicere poterimus, & ex iis quæ post acceßionem remanere uidentur. Curandum autem oportet, primò, cum tenebricositate uel uertigine uexatur, iacere loco lucido, atque mediocriter calido, altioribus stramentis capite subleuato: & si raptus fuerit consecutus, digitis erunt palpebræ \* differendæ, atque iugiter ab omni motu seruandus ob spasmî paßionem. Iubendum etiam ministris manibus calidis nunc caput atque frontem

\* Aphor. 20.  
lib. 3.  
\* mulieres

\* considerandum

\* cum maxima molestia frequenter reuertens.

\* cuius superpositione, acceßionis temporibus, plurimis, superpositionis aliis tempora occurrerunt. i. priusquam desierit paroxysmus, innadit alter.

\* disparanda

tem cum blanda fricatione, nunc collum atque gutturis  
 Ἀνθέρωνα. partem, quam anthereona uocant, contingere: alius  
 etiam manuum summitatem, atque pedum tenere iube-  
 mus. Præterea frigescencia corporis uaporari, corri-  
 gi etiam ea quæ forti raptu torquentur: ac si minimè  
 consenserint, erunt in eodem schemate seruanda, ne  
 ulterius torqueantur. Tum quodam laxamento ca-  
 \* resistentia ptato corrigenda, ne nimio \* occurrentia certamine  
 superare cupientes, neruorum quassationes faciamus.

\* exertam in Linguam quoque \* relocare curabimus, aut mentum  
 os ultra dentes reducere. corrigere, uel coequare: tum calidis pannis thoracem  
 Μιτάφφισον. uaporare, atque inter scapulas, quod Græci meta-  
 Διάφφισμα. phrenon uocant. Laxatis enim diaphragmatis parti-  
 bus, quod nos thoracis atque uentris discrimen dixe-  
 Υπίδυμα. rimus, laxato etiam hypodymate, siue membrana quæ  
 latera ex interioribus contegit, sine ullo periculo po-  
 terit collectus spiritus exhalari. Apponenda etiam  
 uesica oleo calido semiplena pubetenus, atque uesicæ  
 partibus, ut ipsæ quoque mitigatæ conquiescant: ac si

\* coinciderint dentes \* conciderint, ut præfocationis excitent me-  
 \* alterutram tum, immiissione digitorum \* sinistram compaginein,  
 Χαλινός. quam Græci chalinon uocant, \* hiscentes dimittemus,  
 \* ut hiscât di- ne spumarum emissio tardetur. Tum per interualla  
 ducemus egrotantem inclamantes excitamus, & eius ora spon-  
 gia ex aqua calida expressa detergemus, dehinc caput  
 fouemus iugiter. Cum statum sumpserit accessio, plu-  
 rimo atque dulci oleo calido, & lanis mollioribus \* in-  
 fusso omnia contegimus: magis autem occipitium, &  
 Τίροντας. maiores neruos, quos tenontas appellant: tum guttu-  
 Ρύμα. ris atque rumæ partes, quas anthereona appellant,  
 Σιγώρ. cum temporibus, & buccarum musculis, quos siago-  
 nas appellant. Sudores etiam si fuerint ingruentes,

raptim

raptim detergemus, ne corpora perfrigescant: tum  
 collectum \* humorem detrahimus appositione digiti, \* in ore &  
 aut lanæ, aut spongiæ \* melotæ inuolutæ. Perseuerans \* faucibus  
 enim longioris temporis facit accessionem: ac si mini- \* Melota  
 mē se resumentem uiderimus, erunt cucurbitæ leues \* auerso spe-  
 apponendæ, quas Græci sicyas appellant, stomacho cillo. Meluti-  
 atque thoraci, & interscapulis, atque præcordiis. Sed dem aliq vocāt  
 si infans ætas fuerit patientis, erunt maiora prohiben- Σιννα.  
 da ob debilitatem uirium: sed cum nutrix amictu con-  
 tegens, oleo fouens, conclusu corporis corrigere me-  
 ditetur: aut si spumarum quicquam comparuerit, quod  
 in ore teneatur, mulsum tenue destillet paulatim, &  
 neque iugiter, quo \* commorationem faciat spirandi: \* commodita-  
 \* Tunc lac caprimū offerat dimissione perfecta, siqui- tem  
 dem est crassius, atq; maioris nutrimenti. Dehinc cū  
 forte potuerit post accessionem mammam sumere, erit  
 melle papilla linienda, quo facilior sumptio fiat, atque  
 \* neruorum laxatio celebretur: corpus quoque ali- \* Nam ob re-  
 mento necessario nutriatur: \* tenuatur præterea etiā cētē conuul-  
 liquidorum crassitudo, & uenter \* mollietur, cōiicien- sionem muscu-  
 tes etiam singula \* passioni accidentia, quæ ita corri- lis buccarū &  
 gere debemus, ut à generali regula nihil dissentire ui- linguae adhuc  
 deamur. Tunc etiam curationis diligentiam per nutri- fessū, infans ex  
 cem egrotanti præstare tentabimus, iubentes \* & à ubere nutricis  
 lauacro \* abstinendum, atque sine uino atq; carnis esu lac sugere non  
 perseuerare, tum deambulationibus atque exercitio potest.  
 \* leui gestari, quo humeros magis exerceat, ut est \* distentione  
 sphaera ludus, uel exultationis cuiuspiam. Item iuben- & raptu ad-  
 dum cibum sumere succi facilioris, uel interea mulsum. huc rigentium  
 Ac si fortē ipsam quoque hac passione nexari uideri- \* tenuetur  
 mus, erit ab officio remouenda: non aliter etiam si \* molliatur,  
 qualibet passionē affecta malo succo atque corpore coniciendo  
 habituari \* passionis  
 \* eam  
 \* abstinere  
 \* leni agitari  
 Sphaera ludus

Καχξία. habituari uideatur: hoc Græci sachexian uocauerunt. Erunt igitur his præfectis aliæ nutrices exhibendæ, ex quorum sano lacte infans nutriatur. Quomodo autem sanum lac, uel communiter nutrices bonæ probentur, muliebribus libris, quos Græci gynecion uocant, docebimus. Interea ipse quoque infans erit à lauacro seruandus: tum post tertium diem in domo lucida, & mediocriter calida locandus, & primo oleo calido, tum oleo & aqua calida fouendus. Vitanda præterea quorum timore infantes afficiuntur, ut sæpe fiæ formidines. In ætatibus uerò quæ ferre maiora adiutoria possint, acceßione transacta erit phlebotomia adhibenda. Aliqui enim Medici statim phlebotomandos probant, sicut etiam Thessalus se uelle demonstrat. Aliqui \* prima diatrìto seruandum existimant, quo speculentur utrum post unam acceßionem passio soluta receßisse uideatur, \* sit præterea non solum inane, uerumetiam noxium phlebotomiam adhibere. Quippe cum prædicendum probent ex acceßione secunda, utrum passio augeatur, & hoc phlebotomiæ exigat adiutorium, & phlebotomatus cibi refectione \* toleretur. Alij uerò \* discernenter aiunt hoc adiutorij genus sic adhibendum, ut qui fortè iam consueti passionem afficiuntur, seruato ordine lenimentorum, statim acceßione facta phlebotomentur: ij autem qui in prima incurfione passionem accipiunt, in tertium diem, siue ut Græci uocant, diatrìton differantur, siquidem \* sit incerta acceßionis recursio. Nos uerò, ut Soranus docuit, neque omnes intra diatrìton phlebotomamus, & magis eos \* qui primo incurfui passionis afficiuntur. Plurimi ægotantes corrupto cibo admonentur, & est præcauendum \* indigestione sauciatos phlebotomare:

τυραννίδος  
Celij libri.

Thessalus.

\* primam diatrìton seruandam

\* an sit

\* sustineatur

\* discernentes

\* est  
\* non phlebotomamus, sub. qui huius morbi acceßione et insultu vexantur.

\* ob indigestionem sauciatos

marc:

mare: Neque rursus omnes in tertium diem probamus reseruandos. Cogēte enim passione, nullo \* subie-<sup>obieto: Alij.</sup>cto indigestionis obstaculo, erit arripienda phlebotomia commoditas, non solum in iis qui iam sepe admoniti passione uidentur, sed etiam in illis qui primo inuasus afficiuntur. Cessante etenim acceffione inesse \* passionem coniiicimus, siquidem generaliter est maligna, & frequentius tarda quam celer, nisi adiutoris medicinalibus destructa à corpore depellatur, aut ullo naturæ, aut \* fortunæ beneficio, nisi tardando sic corpus \* tenuerit ut solius medicinae diligentiam poscat. ludicare etiam est incertum, utrum passio post acceffionem primam inesse corpori, an soluta uideatur, siquidem ex occulta uenit apprehensione causarum, & oportet methodicum sine ulla falsitate regulas intendere curationum. Videmus denique \* phlebotomiam conuenire. Nam passionales \* cœnotetes argui uidebuntur, si utrum passioni cōueniat fuerit \* dubitatum. Sed quia sola temporum questio flagitari præspicitur, erit coniiiciendum ante secundam passionem adhiberi posse phlebotomiam, \* siquidem initium, uehementiæ atque magnitudinis causa, passio transcendat, ut sepe contusio corporis, aut ossium fractura, uel ignis ustura phlebotomiam poscunt stare autem, \* nec declinare \* poterit passio. Horum enim difficile morborum proprium est sine ullo destructiuo adiutorio non communes stricturae, & solutionis.

\* de hac questione sic statuebant Methodici, sanguinis missionem commode fieri principio & augmento morborum, in quibus conuenit: minus commode, sed tamē utiliter, in statu: superuacuum esse in declinatione. Cum ergo, ut morbus comitalis futurus sit breuissimus, vix ad statum secundo paroxysmo veniat, nunquam vero ad declinationem, à prima statim acceffione venam secari oportere.

\* si quidem \* sed non \* primi paroxysmi circuitu, & insulu.

\* obieto: Alij.  
suggestio.

\* eius causam  
in corpore deli-  
tescentem, quæ  
vno paroxys-  
mo exhausta  
non sit.

\* vbi loci muta-  
tione, cum inui-  
tus ager in lo-  
cum sicciorem  
& salubriorem  
abducitur.

Aphorif. 45.  
lib. 2.

\* Nam passio  
hac diuturna,  
& obfirmata,  
nec fortuito ca-  
su, nec solius  
naturæ benefi-  
cio curatur, sed  
medicinae remo-  
diis tantum ce-  
dit.

\* phlebotomia  
κοινωτέτις  
morborum.  
\* indicationes

\* nequitiam celeriter temporum\* nequitia transire, hoc est accessi-  
 sionis augmentum. Sed neque propter abstinentiam  
 cibi, quam necesse est post phlebotomiam adhibere,  
 erit hoc adiutorium declinandum, quando corporis  
 vires ferre ualuerint, hoc est, ut & sanguinis detra-  
 ctionem, & \* abstinentiæ tolerant. Denique etiam a-  
 liis passionibus affectos, ut exempli causa, synanchi-  
 cos sine ulla\* ratione phlebotomamus. Quare sicut su-  
 perius diximus, post casum \* rectos epilepticos, ces-  
 sante accessione, paruo tempore phlebotomiam disse-  
 rimus, quo turbore spiritus, atque liquidarum mate-  
 riarum deposito tranquillentur. Erit \* enim specu-  
 landum, ne qua indigestio siue corruptio cibi subesse  
 uideatur, quod ita intelligere poterimus, si nauseatens  
 uel ructantem fumosas exhalationes egrum uiderimus,  
 attestante mordicatione, atq; tormētis, intestinorumq;  
 inflatione: quæ si non fuerint, perfecte digestum cibum  
 iudicabimus, quippe cum forsitan præoccupato corpo-  
 re iam dudum futuræ accessiōis causa aut paruum sum-  
 pserit cibum, aut in totum abstinerit. Sed si, ut supra  
 dictū est, corruptus extiterit cibum, erit phlebotomia  
 in tertium diem differenda, fouendumq; caput, cum cæ-  
 teris partibus, oris adhibita collutione, cum uini absti-  
 nentia. Tum erunt somno dimittendi, atq; à cibo ser-  
 uandi usq; ad primum diem. Sed si quicquam corru-  
 ptionis ex indigestione superare uiderimus, erit per-  
 uomitum depurgandum, \* ac si nulla fuerit corruptio-  
 nis uel indigestionis suspicio, erit statim adhibenda  
 phlebotomia, moderata detractione, ex brachio scili-  
 cet, sed cum præcautione animi defectus, quem Græci  
 lypothymiam uocant, siquidem facile passionis acces-  
 sionem\* imitetur. Tunc post phlebotomiam erit adhi-  
 bendus

\* abstinentiam  
 necessariā in-  
 stituendū Cy-  
 cli, & Resum-  
 ptiuū, & recor-  
 poratiuū, pag.  
 250. & 251.  
 \* dubitatione  
 \* erectis epile-  
 pticis  
 etiam

\* et

Λεποθυμία  
 \* imitatur

bendus\* potus, atq; oris collutio, cum paruissimo potu, & \* somno abstinendus. \* Ac si accessio in secundū diem durauerit, prædicto periculo eius propinquis, uel ministris, atq; adiutoriorū ex ratione uenientium \* exitum incertum, ne nobis quicquā male gestum imputetur, si forsitan uī passionis superatus egrotans uitam finierit, & intemporaliter nos quisquam adiutorium adhibuisse arguat, phlebotomiam adhibemus, tanquam in continuationibus paruam indulgentiam pro dimissione accipientes, ut si exempli causa parum requieuisse agitatione seposita egrum uiderimus, \* ut nullo raptu\* tentetur, uel contrariò, si forte oppressis sensibus cum motu caruerit, aliquas partes corporis mouere uideatur, ut palpebras, quæ iam dudum \* motus similitudine possesse siluerant. Dehinc post de: actionem sanguinis \* procurata facie, ex spongia calida erit \* mulsum in os egrotantis \* distillandum: \* tunc secūda die dandi mulsi cyathi duo, uel tres: Tertia uero die ante horam solitam erit perungendus oleo calido, atq; dulci, \* toto corpore sub \* stramentis. Tunc detectus aqua calida ora foueat, & post æquatū corpus accipiat \* succum paruum, luculentum, mollem, lenem, calidum, digestibilem, ut est panis, uel alica ex aqua confecta, aut pulicula ex pane, quam \* torfinitō uocant, ex oleo, aqua, sale, uel mellē condita, ex prima diatrīto usq; ad declinationis tempus: quod probare poterimus ex minutione accessionum, siue accidentium. Alternis diebus cibū sumat, ne passione affecta \* neruositās etiā illatione cibi grauata digestionis officiū uix sustineat, sed magis laxamentū ex abstinentia consequatur. Tum si uenter non fecerit suum officium aut nō impleuerit, ob detractionem grauatum corpus quo releuetur, erit

\* fortis

\* cibo

\* At

\* exitu incerto

\* &amp;

\* tentatum

\* mortis simili

tudine, oppres-

sa

directu, com-

positu, &amp; con-

formatis parti-

bus, quas in ea

morbi vis di-

storserat.

\* mulsa. Nam

paulo antea vi-

no interdixit.

\* distillanda

\* tum

\* totū corpus

\* stragulis

\* cremorē ali-

quē τὸν χόλαρ

tornyton, vi-

de supra pag.

246.

\* neruicū vē

triculari corpus,

cuius morbos

facile nerui sen-

tiunt



\* initienda ca  
lida cum  
\* tondendum  
caput  
\* Item

\* initiendus calidæ & oleo per clysterem. Tunc præ-  
sentato ventris officio orit \* tondendus, atq; nouacula  
omnis capillatura radenda. \* Ita in alia diatrito cucur-  
bita occipitio apponenda collo, uertici, & tempori-  
bus capitis, cum scarificatione: & communibus cata-  
plasmatis utendum, quibus omne caput cum neruis  
maioribus, quos tenontas appellant, contegamus, tum  
buccarum musculos, quos siagonas appellant, atq; om-  
nes inter scapulas partes, cum stomacho, usq; ad locū  
quo discernitur uenter, quem diaphragma uocant: ac  
deinde præcordia, atq; uesicam simili curatione laxa-  
mus. Singula etenim passione raptus uexata accessio-  
nis tempore accipimus: ac si aliqua in parte corporis  
querela extiterit, cucurbita imponenda. Sed neq; coad-  
ceruatim, neq; uno tempore omnes erunt partes cu-  
randæ, sed partiliter, atq; diuersò, ut nunc stomachus,  
nunc uesica, nunc \* inter scapulam relcuetur, quo ne-  
cessario caput relaxatum adquiescat. Tunc spongiæ  
euaporationibus, \* qui curationem labori sustinuerunt  
recuramus, atq; \* ungentes oleo cōmuni. Siue quia iam  
licitum est, cyprino, uel irino, tum cerotariis molli-  
bus, ac deinde scarificatis locis inducta apponimus ce-  
rotaria. Conuenit etiā \* enuasin adhibere, de qua Ad-  
iutoriorum libris docuimus. Dabimus etiā tum cibum  
plurimū atq; \* panosum. Si aliqua in parte capitis gra-  
uedo, uel dolor, aut punctio, aut torpor occurrerit,  
erunt sanguisugæ circulatim apponendæ: quæ si suf-  
ficientē fecerint detractionē, adiutoriorum modū da-  
bunt: sin minus, his detractis cucurbitas insigemus, ut  
per earū uulnera detractio procuretur. Tunc rursum  
cataplasmatibus utemur, atq; uaporationibus spōgiæ-  
rum, dehinc cerotariis partes \* contegimus. Profectu  
acced

\* inter scapu-  
læ releuentur.  
\* eos qui cura-  
tionis laborem  
\* uigimus

\* embasin  
Libri Adiu-  
toriorum Ca-  
lū.  
\* ex pane ari-  
do: uel succo a-  
liquo liquido  
cōdito: uel iu-  
re.

\* contegemus



accedente dabimus olera nō acriora, atq; ita gestationem \* adhibemus \* sellarem. Etenim uehiculi motus rotarum uertiginem caliginemq; facit egrotanti, quæ passionis imaginem \* ferat. Tunc deambulatione mouendus pro \* temporis aëre, atque loco lucido, & longo ductu, ne iugi conuersione uertiginem sentiat. Dehinc si ferre ualuerit, etiam uocis atq; corporis exercitio utemur, monentes ut neque spiritum retineat, neque pronus uel circumflexus, aut sepe conuersus aliquid gerat, sed pingui unctione defricatus \* stanti exercitio moueatur. Tunc, cum facilitas corporis fuerit accepta, lauacrum adhibemus, caput fouentes sine ullo \* percussu manibus subterpositis: implet enim \* sensum eius demersio. Tunc etiam in aqua calida, quam † pygolithon uocant, deponendi sunt egrotantes; ne percussu frigoris neruositas afficiatur. Post lauacrum uero † parum differentes, quo frigus ex capite releuetur, dabimus aquam præbibendam: Tum citum uarium, simplicem ex media qualitate confectum. Et post primam uel secundam diatribē dabimus quædam in cibo quæ uinosæ sint qualitatis, ut sunt poma, quo corpus, uinum daturi, prætendimus, ut tuto dare possimus. Atque ita seruandum, ne his gestis somnus suspensus, uel concisus, aut adiuncta phantasia sequatur, & insomnia faciat turbulenta, quod ex relatione patientis discere poterimus. Item si grauedo uel torpor in aliqua parte corporis fuerit, \* ut dolor, aut punctio, uel saltus, erit in aqua calida perseuerandū, atq; illa prohibenda, quæ uinosæ qualitatis danda præcepimus. Sin uero ex his nulla fuerint prosecuta, dabimus lauacro remoto, mediocriter uinum lene, \* parū, ut exēpli causa, semuncia, uel uncia, medio scilicet cibo, aquatissime

\* adhibebimus  
\* in fertorio,  
aut sella portoria: ut supra  
pag. 248.

\* fert  
Caligo passionis imaginē fert.

\* tempore, & aëre

\* stans

\* aquæ collisus

\* sensus eius

percussio

† πυγὴν δυνάμιν

γιν.

Rhigolettron,

quasi rigoris ex-

citū, quod rigores & perfr-

ictiones corpo-

ris profliget, et

abigat. Alij

Rhigolyton

† rarum

\* aut

\* paruum.

temperatum: tum in alia diatritho lauacro uinū iunge-  
 mus. Sed præ cæteris erit animi laxatio procuranda,  
 quo corpus consentiens nullis obstantibus curis facile  
 sanitatis\*repetat qualitatem. Ac si resumptio\*recur-  
 rens nihil uiriū perficere permiserit, quo etiam\*car-  
 natum corpus ostendat, bono attestante colore, erit  
 consuetudini dimittendus ægotans. Eadem sanè cura  
 tione utendum etiam in iis qui cum nondum\* sunt epi-  
 leptici, eo tamen ferri uidentur. Hoc enim solum ser-  
 uabimus, quum signis passionem minātibus fuerint ab-  
 soluti ut eos\* consuetudini reuocemus. Facilius est  
 enim imminentium auersionem, quàm præsentium de-  
 pulsionem\*facere. Sin uero passio tardauerit, & pro-  
 pterea plurimis fuerit acceſsionibus uariata, erit par-  
 tienda curatio secundum superpositionem, & lenimē-  
 tum, ita ut superpositionis tēpore iisdem utamur ad-  
 iutoriis quibus acutas passionē curari perscripsimus.  
 Neq; enim\*phlebotomum reprobamus, permittenti-  
 bus uiribus,\*si quidem longo interstitio superpositio-  
 nes occurrere uideantur. In lenimento uerò resumen-  
 dos dicimus ægotantes & cum recorporatiua cura-  
 tione dirigēdos, iusta cyclorum regula, sicut latius, scū  
 de capitis passionē diceremus, \*scripsimus. Quapro-  
 pter ob resumēdum corpus adhibenda gestatio, sella,  
 uel cathedra, aut deambulatio, aut uocis exercitatio.  
 Item lectionem & perūctionem aliptarum præceptis  
 ordinatā, sine ulla capitis\*inflatione geramus, ne im-  
 modico labore affectū\*corpus uexare potius, quā re-  
 ficere uideamur. Tunc lauacrū langorum interuallis  
 adhibendū: uariis dādus cibus & panis limpidus, atq;  
 studiose elaboratus. Pulmentū uero ex mediæ qualita-  
 tis materia, ut oua, pultes, olera, quæ non sunt acerri-

\* recipiat

\* recurans ni-  
 hil vitij redire  
 permiserit, aut  
 etiam bene car-  
 natum\* ιωακην  
 \* sint\* ad consuetu-  
 dinem  
 \* credere\* phlebotomiā  
 \* si quidem

\* pag 252.

\* fricatione im-  
 peramus  
 \* caput.

*me virtutis. Item uolantum leuiora, & piscium tene-  
 riora. Dehinc post resumptium cyclum adhibendi re-  
 corporatiui, & primo ex parte, tum perfecti, in qui-  
 bus esse uomitus ex radicibus debet, uel \* similibus ma-  
 teriarũ rebus, ut nuper \* docuimus: atq; ita drimypha-  
 gian, exinde \* contiguas sibi pulmentorum materias  
 ordinamus: item adiutoria localia, ut exempli causa,  
 primo capillos decurramus \* ex pectiõne, nunc pro  
 \* capillatura, nunc contra capillaturam: tum tõsuram  
 adhibentes, dehinc nouacula caput radentes, cucurbi-  
 tas alijs atque alijs capitis partibus \* re corporatiuas  
 imponimus: tum dropacis raptũ adhibemus, sed primo  
 longe remotis partibus, tum uicinis, dehinc patiẽtibus:  
 dãtes etiam mastigandum sinapi, uel piper, aut staphy-  
 sagriã. Item sternutamentum ex helleboro, uel \* astru-  
 tio, & pipere, & castoreo, uel his similibus adhibe-  
 mus naribus, apophlegmatissimum quoq; adiçiẽtes, atq;  
 \* fricatione balnearũ nitri pulueris, & \* cãteris sym-  
 psmatibus, quæ ruborem facere ualeant, ut sunt ex py-  
 retro, staphysagria, adarce, euphorbio, pipere, calcis  
 gleba, & pumice: tum cataplasma ex sinapi, atque ma-  
 lagmata, quæ detergere & \* pabulis afficere corpus  
 ualeant: item acopa acriora, sed quæ tetri odoris non  
 sint, toto corpore illiniẽda, magis tamẽ capiti, atq; ori,  
 conclusis palpebris: immittenda sunt etiam hæc auriũ  
 cauernis: gargarizandum sinapi: adhibẽda etiã aqua-  
 rum illisio, qua patientes partes percussæ mutari co-  
 gantur, quod Græci cataclysmum appellant. His dein-  
 de perfectis cyclis, resumpto corpore, helleborum, ad-  
 hibemus, sed longe superpositionis seruantes occursum  
 quod in omnibus quidẽ adiutorijs exercitioribus adhi-  
 bendis, tum magis in helleboro monemus præcauendũ.*

\*similium

\* pag. 255.

\* congruas

\* densio pectine

\* ut pag. 264.

\* eodem gene-

re locutionis u-

titur pag. 255.

\* re corporati-

uas vocat, cũ

plurima flam-

ma admotas,

\* ut ait pag.

255. detractas

magno raptu

\* Nasturtio.

ut pag. 286.

\* fricationem

in balneis

\* ceterorũ Sym

pasmatum

\* papulis

Acopa.

Hellebori su-  
 mendĩ cautio.

\* exercitantio

ribus rehemẽ-

tioribus. Alij

exercitatori-

bus

Denique si nullam accessionem denuntiauerint signa,  
 ijs qui ordine seruato admonentur, ante decem, uel  
 duodecim dies, uel generaliter pro longitudine leni-  
 menti; \* porrectius erit adiutoriorum regula diri-  
 genda. In ijs uero qui ordinate admonentur, eo tempo-  
 re adhibenda curatio, quo conijcere possumus mediū  
 præteritæ atque futuræ accessionis. Sic igitur hoc ge-  
 nus diligentie \* intuendum, ut cum æger somnum de-  
 cussit primo requiescat paululum iacens, non solum  
 suspicans indigestionem cibi uerumetiam donec \* per-  
 secutione quadam propria corporis fuerit facta \* dige-  
 stio, ne ex uigilatione sequenti, atque laxamento  
 membrorum, & \* tenuitate, uel purgatione humorū  
 spiritus iamdudum somno turbati crassi fiant, quo etiā  
 sepe officia impediri noscuntur, cum nondum \* totum  
 recurrens occupauerit corpus. Vnde sepe factum est,  
 ut \* experrectis hijs quæ illico intueantur fallant, nisi  
 \* perfrictis oculis intenderint. Neq; clamare uel cur-  
 rere facile possunt: siquidem uel quadam somni tunc ar-  
 teria, hoc est gutturis uia, asperatur, & raucus facit:  
 ac fatigata corpora \* densitate neruorum, \* irruente  
 spiritu crassiore, afficiat percussione uel quassatione  
 similes plagas ingerendo. Has igitur ob causas æger  
 plurimo tempore somno deposito tardare debet, præ-  
 cauens lucis \* auctoritatem quam mox discusso somno  
 intueri nunime potest, ne repentino eius occurso per-  
 cuitur uisus. Item disputationibus uehementibus ani-  
 mum exercere declinet. Tunc resumptus atque rele-  
 uatus somni plenitudine, sub stramentis leni unctione  
 tangatur semel secundum corporis singulas partes la-  
 xamēti mediocris causa, \* atq; frigoris cautione leuē  
 & delectabile gestationē adhibeat ut \* fertoria sella,  
 uel

\* porrectior

\* intendendū.

Alij institu-  
dum

\* perfectione

\* nam Metho-  
dici somnus  
adstringit: uigi-  
lie uero laxat,  
crassa tenuat,  
excrementa pur-  
gant.

\* tenuatione

\* integros recu-  
perauerit\* experrectas  
eos\* perfrictos o-  
culos\* que per som-  
num accidit\* irruens spiri-  
tus crassior affi-  
cit, percussioni

uel quassationi

\* claritatem

\* at cum

\* portatoria &  
pag. 248.

uel cathedra. Sed prohibenda erit exclamatio, si qui-  
 dem uehementer mouet partes patientes. Tunc depo-  
 sito turbore motus unctione olei fricetur, cōductis &  
 extētis brachijs, \* flexo atq; extēto motu releuās sin-  
 gula crura commoueat, quo fortioribus motibus faciat  
 aptiora. Fouenda etiam ora aqua calida: \* nunc enim  
 erit lauacrum prohibendum: atque ita post perunctio-  
 nem cibum accipiat paruum, succulentum, & leuem,  
 ut oua, pultes, \* piscis teneri, quæq; ex uolantibus par-  
 ue ætatis atq; formæ, ut ficedule, turdi: declinās omne  
 quod fuerit acrioris uirtutis siue inflare ualentis, aut  
 carnosæ, uel grauis. Quapropter etiā a uino erit absti-  
 nendus, ac per interualla ab omni cibo seruandus. Re-  
 leuatur enim hoc genere corpus ieiunitate \* reflatū.  
 Sin uero aliqua signa acceſſionis futuræ apparuerint,  
 ut somnus turbatus, uel cibi corruptio, uel iracundia  
 inanis, ac sine ratione, item mæſtitudo uel sternutamē-  
 tum, aut aurium tinnitus, uel præ oculis scintillarū sin-  
 gibilis uisus, aut inflatio præcordiorum, & per som-  
 num seminis inuoluntarius iactus, quem onirogonō uo-  
 cant, & horum similia, non solum ad hanc uitæ \* regu-  
 lam transeundum est, uerum etiam initium ex abstinē-  
 tia sumendum. Tunc leuis adhibendus motus, atq; per-  
 unctio, & cibus, quo corpus salutaribus officijs nō de-  
 seratur. Vt enim ijsdem ciborum regulis perseuerare  
 tutum non est, sic è contrario iugis mobilitas, atq; cibi  
 abstinentia uacuato corpore solitis nutrimentis, uires  
 extinguit futuris tēporibus necessarias. Quasiū etiā  
 \* contradicentibus signis, acceſſionem fore, an  
 præsentē siue factā iudicemus. Sed tunc erit acceſſio-  
 iudicāda, quoties ceciderint in ea ægrotātes: quo di-  
 scere poterimus, quo tēpore diatriiti tēpus sit numerā-

\* flexumque  
 ac extētum po-  
 pitem  
 \* nec etiam

\* pisces teneros

\* ab inflationi-  
 bus liberatū:  
 plenitudine e-  
 xoneratum.

\* resumptiuā  
 \* ex præceden-  
 tibus huius signis  
 Alij ex præ-  
 dicentibus.

An statim  
 atque uisa fue-  
 rint hæc signa  
 quæ paroxys-  
 mū minantur,  
 de illo tanquā  
 præsentefaciū  
 dū sit iudiciū,  
 ut tum inedia  
 diatriitos præ-  
 scribatur, an  
 expectādū, do-  
 nec paroxys-  
 mus inuadat.

dum, ut recte possint curationes suis reddi temporibus:

\* denuntiata  
signa presen-  
tia accessionis  
ostendunt. De-  
nuntiata uo-  
cat presentem  
morbum indi-  
cantia: Prece-  
dentia uero, si  
ne praedicta,  
qua futurum:  
haec Gal. in  
Definit. uocat  
Prognostica:  
illa Pathogno-  
monica.  
\* praelucere  
\* regendus  
\* foret  
\* leni  
\* cessauerint  
erit

Nam\* denuntiata signa iam praesentia accessionis esse contendit. Nos uero praetangi nervositatem, atque in accessionem urgeri recte probamus, ut augmenti indicia tanquam\* praeludere uideantur, ut sunt in hemitritaeis febribus frequenter accessione imminente corpora praecipua, cum noctis anxietate pulsata, diei fore asperitatem significant. Ita igitur, uel simili ratione, praemonitus epilepticus, tanquam si accessione uexaretur, erit usque ad primam diem abstinendus, & neque similiter\* agendus, ut pridie, cum\* fuisset in lenimento purissimo. Quapropter abstentus uel die, sequentibus\* leui motu agitetur antecedente unctione, atque paruo cibo nutriatur: aquam bibat. Tunc si rectius habuerit, ut laudabilior sanitas appareat, augenda oblatio cibi, alternis scilicet diebus, nunc qualitate, nunc quantitate. Tunc nisi ex omni parte signa supradicta\* erit rursus abstinendus una die. Sin uero fuerint expulsa, uel depugnata, non erit illico reddenda agrotati consuetudo, tamquam nihil sit quod sollicitudini remansisse uideatur: neque rursus inani suspitione, tamquam iam imminuentis superpositionis metuentes aduentum, in tenui uita regula retinere debemus patientem. Vt enim oportunitas adhibita abstinentiae futuras amputat superpositiones, atque earum occasiones detrahit, sic impotentem adhibita corpus uexat, atque fatigatione affectum tarde surgere facit insolitas uires. Quapropter cum summa cautione, & sine ulla nimietate seruati, blanda regula resumendi sunt agrotantes, quo asperatas accessiones fore non metuamus. Tutius autem esse probamus, ut

\* pagina 179. \* supradictum est, longe ante futuram accessionem ad hellebori usum accedere: quo accepto si irruerit accessio, erunt omnia

omnia mitigatiua adhibenda, quæ acceſſionem ualeant temperare. In ſtrictura enim conſtitutis \* altioribus, hoc eſt ſtomacho & uentre, mitigatiua laxatio adhibita etiam medicamini excludendo præparat uiam, & præſocationis amputat metum. Sin uerò nullum periculum ſubierit præſocationis poſt purgationem cauſa reſectionis adhibenda reſumptio eſt, cum iis quæ ualeant acceſſionem temperare, ut odoramenta ſine ullo \* percuffu medentia: atque nutritilia, ut eſt panis calidus, melo, cucumis, & his ſimilia. \* Deſtillandus etiã \* helleboriſmus, ſed ex melle decocto. Ac ſi initio uomitus ex acceſſione emerſerit, cucurbita multa cum ſuppoſita ori uentri inſigenda, tunc ſequenti parti ſecundum quod medicamen ad inferiora \* teneatur, donec acceſſio leuigetur temperamentis ſupradictæ rationis, ne concurſus paſſionis & adiutorij præſocet ægrotantem. Erit igitur ſuſtollendus ægrotans ſubiectione manuum ex utraque alarum parte, cum capitis ſuſtentatione, atque leuiter inclinandus. Tunc ſi medicamen ad ſuperiora cucurrerit, & \* tranſuorationis ceperit partes, quo \* ſpiramenta obſtruere uideatur, illiſis dentibus, atque ore clauſo, uel erumpens per naturales uias, quæ ad faucibus de capite feruntur, in nares deſluxerit, ac ruruſum decurrens gutturis meatum clauſerit, præſens præſocatio metuenda. Quapropter immiſſis digitis, ex utraq; parte buccarum circa \* maiores dentes, oris facienda diſtantia. Tunc imponenda \* ptygmata multiplicia, quæ ſi fortè deſuerint, cuneos ex ſerulis ſciſſis mittere poterimus, quo \* ſcientes ægrotantem ſeruemus, atq; medicamen ad faucium par-

\* occultis, & in profundo ſit in uisceribus

\* quæ caput nec implet, nec grauatur.

\* At ſi initio uomitus ex purgatione periculum ſuffocationis emerſerit, inſtillandus etiam helleboriſmus, ſed ex melle decocto. cucurbita cum ſuppoſita multa flamma ori ventris inſigenda: tum ſequenti

\* helleboriſmũ ex decocto melle Actius vocat hellebori decoctũ, eiusq; compositionem docet pag. 155. ac ſi helleboro ſumpto vrgeat ſuffocatio, cremoris bibendos

tres cyathos ait, qui utique à decocto diuerſus eſt. \* trahitur \* reſpirationis \* guttur & laryngem \* maxillares \* cõplicati panniculi \* ſuccurrẽtes

tes



tes ueniens: spatio quodam exceptum facilius exclu-  
 datur. \* Seruanda etiam tempora, quibus medicamen-  
 faucibus occurrit; adiuuantes eius exclusionem, in fa-  
 ciem inclinantes aegrotantem, atque eius ora calida

\* Mulsio e-  
 num imbecillas  
 vires reficit,  
 spiritus instau-  
 rat, inflatione  
 defecit, pitui-  
 tam letore ad-  
 herescente ab-  
 sterget, & filu-  
 cit.

spongia detergentes, distillantes etiam in os \* mulsio.  
 Sic enim ueluti despumans \* resumit, aut deponit ac-  
 cessionis pressuram releuatus aegrotans. At si non suf-  
 ficiens hellebori fuerit agitatio, quam Graeci sparag-  
 mon uocant, & \* paruo euentu successerit, perseue-  
 rante passione, erit etiam secundo, uel tertio hellebo-  
 ri usus adhibendus, sed \* praesumpto uiribus aegro:  
 quippe cum non iisdem uti omnibus necesse sit, & de-

\* resumitur,  
 ac  
 enagaydes.  
 \* paruo eue-  
 tus  
 \* resumpto  
 \* persanans  
 \* in aqua me-  
 dicata & na-  
 turalibus  
 \* Heliosin

stituendae passionis causa una sola sufficiens & \* per-  
 seuerans exhibitio non approbetur. Utendum etiam  
 aquis naturalibus, hoc est, naturali uirtute medenti-  
 bus, sed quae nulla odoris uexatione adficiant aegro-  
 tantem. Adhibenda igitur \* natatio, & sole corpus  
 torrendum, quod Graeci \* heliasin uocant, sed praetesto  
 capite. Utendum etiam potabilibus medicaminibus,  
 uel electariis ex hyssopo, & origano, & thymo con-  
 fectis. Principaliter enim corpus mutant, recorpora-  
 tionem faciendo ob acrimoniam: dehinc etiam corpus,  
 & succorum naturalium \* tenuant qualitate. Emol-  
 liendus nanque uenter, & peregrinatio imperanda  
 terrena, atque maritima, si ferre nauigationem potue-  
 rint patientes. Tunc etiam exercitia uehementiora,  
 quae labore corpus afficiant, affectanda, quo magis for-  
 titudo, \* quam corporis robur augeatur. Est enim sem-  
 \* obesitas, & per grauabilis \* carnatio, & magis si tenuibus fuerit  
 carnosior ha-  
 bitus  
 Non fidedum  
 subita sanitati effectus, quo depulsam passionem iudicemus, nisi legi-  
 tima



tima accessiōum tempora soliti concursus, sine ulla  
 inquietudine, atque plurima, transierint egrotantes:  
 somnos quoque sine ullo impedimēto duxerint, & ui-  
 giliās placidas, ac liquida sanitate moderatas, nulla e-  
 tiam difficultate officiorum animæ uel corporis impe-  
 ditās, attestante cibi sufficienti appetitu, cum digestio-  
 ne congrua, & corporis nutrimento mediocri, uel e-  
 gestiōum naturalium moderato exitu, bono attestan-  
 te, \* uel immutato colore. \* Seruanda præterea mul-  
 to tempore omnis nīmetas; ut frigus, uisio, indigestio,  
 uinolentia, libido, lauatio, & magis ea quæ specialiter  
 passiōem in commemorationem ducunt, ut odores  
 percussibiles aut splendor nimie lucis, aut \* resultan-  
 tium materiarum: item strepitus, clamatio, circulatus  
 cursus, \* extensio, aut ex alto despectio, siue fluminum  
 celerrimus fluor. Vt enim ulcerum recentes cicatri-  
 ces facili occasione soluantur, non aliter hæc passiō,  
 uel alia quæque similis \* nequitia, paruo impulsa re-  
 petit corpus, quod proxime dimisisse uidebatur. Ac si  
 fortè neque ita fuerit eger ab epilepsia liberatus, ni-  
 hil minus adhibendum, sed magis perseuerandum in cu-  
 ratione probamus. Dabit enim hæc diligentia uel ex  
 parte beneficium, quo neque frequentius admoneatur  
 egrotans, neque longioribus accessiōibus opprima-  
 tur, neque turpiter in \* furorē, uel publicis locis ap-  
 prehensus, etiā post passiōis impetū animi \* luctatione  
 uexetur: Quibus enim prima \* uel optata non proue-  
 niūt, \* erit secūda mitigationis causa capiēda. Hæc est  
 secundum ordinem methodica epilepticorum curatio.  
 Aliarum uerò sectarum \* principes uaria rerum \* tem-  
 peratione, siue \* experimento curationis adiutoria  
 cumularunt; caput fouentes aceto atque oleo rosaceo  
 puro

\* Cauenda,  
 vitanda

\* scintillantū,  
 nitentū, splen-  
 dentium

\* visus inten-  
 sitas: Nam ut ait

pag. 267. suspē-  
 cere ægrotanti

difficile est

\* Tñ uandū

\* maligni-  
 tas

\* foro

\* dolore, mo-  
 lestia

\* &

\* erunt

\* logici

\* consideratio-  
 ne

\* Empirici

puro, uel immixto castoreo, in acceſſione frigidis uten-  
 tes: articulos quoque omnes ligatione conſtringentes,  
 ſternutamento commoto ex aceto, naribus interius  
 flato, cum ſinapi: uel caſtoreo oleo irino inſuſo, cum  
 calchanto: uel ſulphure \* uino, aut aſtrutio incenſo,  
 uel iis quæ ad matricis præſecutiones incendenda po-  
 ſuerunt: item hyſſopo & origano, & thymo: uel i-  
 gnis flammam oculis offerentes, cum titillatu quodam,  
 & \* oppreſſione præcordiorum ad inferiores partes.  
 Iubent præterea motum corporis \* adhibere, geſtatio-  
 ne uel deambulatione, aut ſupra ſindonem uolutari: ſi-  
 napiſandas etiam manus ægotantium, atque pedes:  
 & ante acceſſionem perungi thapſia caput, & ſpiri-  
 tum \* continere. Alio uerò tempore, hoc eſt dimiſſio-  
 nis, uini atque carnis imperant abſtinentiam, & magis  
 porcine, uel bubule, & caprine. Prohibent præterea  
 ſupra pellem caprinam dormire, ſiue iacere ægotan-  
 tem: ſiquidem paſſionis facit motum. Adhibent etiam  
 clyſterem iugem atque accerrimæ uirtutis, & medica-  
 mina urinalia, quæ diuretica uocant, atque purgatiua  
 per uentrem, quæ cathartica uocant, & horum magis  
 cui nomen eſt hiera, quæ non erunt, inquiunt, \* tertio  
 minus ſingulis menſibus offerenda: tum capitis diuiſu-  
 ram \* accuratam, quæ chiaſmum uocant: dehinc \* ſca-  
 roſin medicamine, ſiue ignis uſtura: item terebratio  
 nem teſtæ, uel arteriotomiam, uel uſum uenereum, aut  
 è contrariò eunuchiſmum faciendum probantes. Dant  
 etiam bibendum lac aſininum, cum ſale, uel ſanguinem  
 teſtudinis \* marine, uel \* humanum, aut uituli marini,  
 & non ſolum ſanguinem, uerum etiam coagula quæ la-  
 ſſi miſcentur. Item mandendam \* muſtelam, ſed longo  
 deſiccata tempore: & tunc \* corda hominum atque  
 equorum

\* uino incen-  
 ſo, aut naſtur-  
 tio,

\* compreſſione  
 \* adhiberi  
 \* contineri.  
 Διαſπινά,  
 Καταſπινά.  
 1. 19. a.

\* decimo quo-  
 que die  
 \* ad x. litera  
 figuram

\* Eſcharuſin,  
 ſiue  
 Χιαſμῖς.  
 Σκάρωτις.

ἀπὸ τριτοῦ αἵματος.  
 Εὐρυχιαμῖς.  
 \* Ad id pro-  
 deſſe terreſtris  
 ſanguinē Dio-  
 ſcorides ait.

\* Plin. cap. 1.  
 lib. 28.

\* Sanguinem  
 muſtela com-  
 mēdat Dioſc.

& eius uerit-  
 culum corian-  
 dro ſartū, &  
 inueteratum.

\* carnem, ut  
 p. 19.

equorum, quorū crura quasi \* impetigines habent, si-  
ue asinorum, uel mulorum. Item testes uel ueretrum  
marini siue fluminalis \* cancri, & porcelliones, hoc  
est, animalia quæ humectis & aquosis locis sepe na-  
scuntur, à Græcis appellata onisci : \* dehinc squamu-  
las fieri, cum aqua in qua fuerit candens ferrum \* præ-  
tinctum. Dant etiam cameli cerebrum fumo siccatum  
atque concisum, sed infantibus uel pueris odorandum:  
perfectis autem ætatibus bibendum, ad modum cyathi,  
cum \* mulso & aceto tribus cyathis : similiter etiam  
leporis cor, & cerebrum gauræ. Alij uerò etiam \* li-  
gamenta probauerunt, & magos adhibendos, atque  
eorum incantationes, quæ quantis sint uexationibus  
\* confertæ, etiam per se probatur, sicut latius Adiuto-  
riorum libris docuimus, nunc tamen paucis \* memora-  
uimus. Constringens igitur fomentum, atque tetri odo-  
ris, \* uel aceto, & oleo rosaceo, & castoreo, percu-  
tit, & grauat, & tumores constringit: & si, ut putat,  
materiā \* redarguit, abactum tamen cutibus ad cere-  
brum, & eius membranas reuocat. Et sunt hæc exte-  
riorum comparatione magis salutaria. Præterea est  
uehementer noxium, \* frigidat caput accessionis tem-  
pore fouere. Quæ enim \* dimissione releuata mitescunt,  
eadem \* frigida densatione magis grauantur. Item li-  
gationes nervos densant, atque corporis \* oppressio,  
quam fieri iubent. Defricatio intemporalis, hoc est  
accessionis tempore facta, geminat passionem. \* Acci-  
dentia enim \* si temporaliter quidem uidetur lacebitis  
sensibus in \* resumptionem ueniret, totam tamē passio-  
nem peiorat, non aliter quàm si quisquam turbatos  
oculos manutigio, quod Græci chirapsiam uocant, tem-  
poraliter, fricando, releuare uideatur : non aliter &

sternuta

\* nascentes in  
cruribus impe-  
tigines, ut pag.  
290. Pl. cap.  
11. lib. 28. re-  
cat lichenas.  
\* canis: ut pag.  
290. i. libri:  
nēpe castoreū.  
Ovis non  
\* dehinc aquā  
ē squamulis  
ferri, aut im-  
qua, ut pag.  
290. A.  
\* extinctum  
\* mulsi ex  
\* non vincula  
manuum, sed  
alligata & su-  
spensa amule-  
ta, tā wigia-  
n/æ.  
\* conferta  
\* memorabi-  
mus  
\* ex  
\* repellit, ab-  
actam  
\* frigida  
\* rinatione  
relaxata  
\* frigidorum  
\* compressio  
\* Accessio-  
nis enim  
\* tamesi  
\* vexationem  
lenire  
Manutigium.  
Χαγὰν.

sternutamenta medicaminibus commota accessioni non  
conuenire probamus. Quippe cum neque in linimento  
passionis constitutos hoc adiutorio facile inquietare  
liceat; nisi certo regule ductu preparados, quo caput  
\* Nam si releuetur gestatione tenui, ac deambulatione. \* Siqui-  
dem hoc adiutorij genus initio impleat caput, dehinc  
medeatur: quid sperandum in iis qui accessione agita-  
ti, earum partium plenitudine uexantur, si etiam sternu-  
\* concitati tamento fuerint \* conuitiati, cum magis oporteat pas-  
sionis illam soluere turbationem? Est praeterea acetum  
molestum naribus insufflare, siue solum, siue cum alia qua-  
libet percussibili materia. Constringit enim, atque den-  
\* spissari, cois- sat tumentia, et turbata perturbat, et ea \* concurre-  
re compellit, quae accessionis uolentia excludi cogun-  
\* inutiles tur. Non aliter \* mutiles atque \* satiabiles sunt in-  
\* grauabiles censionibus, siue fumigationibus, et odoramenta ex pice,  
\* spondylis bitumine, \* spondilio, castoreo, galbano, acerrimae at-  
que grauabilis uirtutis causa, et iniucundioris, adeo ut  
etiam recte ualentium impleant caput, et eorum qui  
nunquam, aut difficile earum partium querelam pro-  
diderint: tunc tamen iis odoramentis acceptis, aertigi-  
ne atque grauedine urgentur: et non aliter tumentes  
oculos fumigatio adficit, quam etiam tumentes cere-  
bri membranas. Necessario enim cogit in similem ue-  
nire passionem: Percutit etiam ignis flamma, siue eius  
affectatus splendor multos. Denique etiam in lenimento  
\* cominus epilepticos constitutos, lucis importunitas, atque \* emi-  
nens percussio, in commemorationem facit accessionis  
uenire. Noxia etiam praecordiorum pressura, quam  
adhibendam probant, iudicatur. Mitiganda enim sunt  
accessione commota, et non uolenter atque contra-  
rio conatu reprimenda. Grauis etiam sine dubio uide-  
tur

tur supra sindonem iussa uolutatio, quippe cum leui  
 conuersione corpus affectum, nō solum lenimenti tem-  
 pore epilepticos in uertiginem mittat, uerumetiam  
 recte ualentes similiter afficere uideatur. Articulorū  
 quoq; sinapismus accessionis tempore tumorem gemi-  
 nans, etiam passionem necessario peiorem facit. Est  
 item \*intemperabilis ante accessionem \*punctio ser- <sup>\*intemporalis</sup>  
 laginis, quam Græci taphian uocant, cum opoteat mo- <sup>\*perunclio: ut</sup>  
 tam passionem atq; in peius coactam mitigare potius <sup>pag. 286.</sup>  
 quā prouocare: & quoties eius necessarius est usus,  
 toties, atq; melius lenimenti tempore suæ uirtutis im-  
 plectat beneficium, cum importune adhibitus partes fa-  
 ciat \*emori, has quod Græci \*necroses uocant. Item \*excitata gan-  
 spiritus retentio, quam faciendam probant accessionis <sup>grana</sup>  
 initio, sensus implet, nō, ut quidam uolunt, percussio <sup>Nixuris</sup>  
 spiritu futuram prohibet accessionem. Premittit enim <sup>\*Necrosis</sup>  
 potius quā discutit ea quæ iam suo motu densari ui-  
 dentur. Abstinētia uero uini atq; carnis, quam iugiter  
 fieri iubent, uel unius anni spatium, impedit recorpora-  
 tionis faciundæ profectum, quem augere necessario mu- <sup>\*mutatione</sup>  
 tationum uarietas potest, quod facile ignaris notū fiet <sup>\*donum</sup>  
 ex uitæ consuetudine, quæ si eadem non fuerit, procul <sup>Caprina pellis</sup>  
 dubio corpus infirmat. Quippe cū iugis potatio aquæ <sup>\*Hippocrat.</sup>  
 demissum faciat corpus, & neq; numero dierum, uel <sup>libro de Sacro</sup>  
 mensium curandi regula sit constituenda, sed passionis <sup>mobo oues &</sup>  
 temporibus, quorum \*mutatæ regulæ commutantur, <sup>capras huic e-</sup>  
 ut sub eorum rigore \*damnum aquæ uel uini ministe- <sup>gritudine val-</sup>  
 tur, quod etiam de carnis usu erit coniiciendum. \*Ca- <sup>de obnoxias es</sup>  
 prima uero pellis odoris tetri causa noxia capiti iudi- <sup>se tradit, quæ</sup>  
 catur, non speciali atque priuata ratione. Item iugis <sup>caussa fortassis</sup>  
 atque acerrima clysteris iniectio intestina conradit, <sup>est cur substra-</sup>  
 atque neruos uitiat. Vrinaria quoq; medicamina, quæ <sup>ta caprae pellis</sup>  
 camenta.

diuretica uocant, uesicae infectione capitis membranas  
*Purgatiua* commouent. Item purgatiua medicamina, quae cathar  
 \* dissipatione, tica uocant, \* defluxionem corporis facient, atque sto  
 ac dissolutione machum euertunt: capitis etiam \* acuratam diuisura,  
 \* in chi figurā quam chiasmum uocant, & testae persoratio, & ustu-  
 \* Escharotica ra cutis medicamine uel igne suffecta, quam \* scaroti-  
 cam uocant, & arteriotomia patientes partes insu-  
 \* uilia & cō mit, & utilibus renititur rebus. Siquidē nulla te \* com  
 moda paratiua adiutoria iisdem locis adhibere permittit.  
*Venus parua* At uero concubitus, siue Venus, quam adhibendam  
 epilepsia probant, ab aliquibus parua epilepsia nuncupata est.  
 Siquidem similem facit membrorum motum, diuerso  
 contractu, anhelatione & sudore attestante, & ocu-  
 lorum conuersione, cum rubore uultus, ac deinde post  
 effectum displicere facit sibi met corpus, cum pallore,  
 & quadam debilitate, uel inconstitutine, & adeo ner-  
 uos afficere male uidetur, ut saepe imminente accessio-  
 ne per somnum iactu seminis aegri praeputgetur, quod  
 Graeci onirogonon uocauerunt. Item eunuchismus ui-  
 res amputat, con epilepsiam soluit. Lac quoque sum-  
 ptum facile acescit, & propterea grauens epilepticos  
 male probatum uidetur. Non aliter etiam potius san-  
 guis testitudinis, siue hominis, atque uituli marini, &  
 putuā. sumptio coaguli, quod Graeci pityan uocant. Mustelae  
 quoque, siue hominum caro siccata, & equorum impe-  
 tiginis, uel ueretrum, atque testes canis aquarij, uel por-  
 celliones supra memorati, quo oniscos appellant, &  
 drionoi. aqua de squamulis siue tinctionibus ferri, & cor lepo-  
 poris, & cameli, siue gaurae cerebrū male probatur.  
 Etenim neque ex occultis causis, quas Graeci ad n-  
 \* cognitioe λους αἰτίαι uocant, rationes ducunt, neque ex aliqua  
 Εμπειρικοί. contagione siue tentatione, ut empirici uolunt, ap-  
 prob

probata in usum uenerunt medicina. Quippe cum intelligi, uel apprehēdi naturali aut fortuita rerum dominatione minime \* possit, uti hiis, maxime ita insuetis, atq; nouis, & odiosis generibus materiarum, quarum nihil usu grauius esse uidetur, ipsius quoq; compa-  
 ratione passionis, sit admirandum, quod de aere atque uigiliis, uel somno, & potu, & cibo, uel iis quæ necessario sumuntur, nihil \* experimenti utile collegerint, de iis uero ita execrandis, & crudelibus, atq; inhumanis, plerunque etiam periculosis, curationes ordinare uoluerint. Non enim sanguinem tauri potum interficere, ut Themistoclem, aut lac coagulatum, & caseum \* coctum, aut oratorem, & imaginem recte reprobauerunt, si quisquam humanum sanguinem id facere minime crediderit, quò falsò memorata à ueteribus cætera uideantur. Accusatis igitur, siue nudatis summam ueterum curationibus, non est absurdum etiam cū nominibus errores arguere singulorum. \* Hippocrates de epilepsia scribens communiter ait: Quisquis in humano corpore agnouerit siccandi uel humectandi, aut frigidandi, uel calefaciēdi causas, idem etiam istius \* passionis poterit \* uidere rationem: & neq; quomodo, neq; ex quibus, neq; quando, uel quousq; hæc fieri debeant tradere \* curabit. Diocles libro quo de passionibus scripsit, in iis qui ex uinolentia, uel carnali cibo istam passionem conceperint, phlebotomiam probat, antecedentes potius quàm præsentēs intuens causas, In iis uero qui ex corporis habitudine in istam uenerint passionem, humoris crassi detractionem probat adhibendam, quem appellauit phlegma. Vtitur etiam urinalibus medicamentis, quæ diuretica uocant, item deambulatione, ac gestatione. Quæ si etiā uera essent

\* possint, ut in  
 his, n. x.

\* experimento

Themistocles  
 potu sanguine  
 taurino mor-  
 tuus est.

\* coactum ma-  
 gni autores re-  
 cte

\* Hippocrates  
 ad libri cal-  
 cem quem de  
 Sacro m. rbo  
 scripsit.

\* passionis  
 \* sacre cura-  
 tionem

\* curauit

Diocles

Urinalia med.  
 camina  
 diuretica.



adiutoria, ob paruitatem tamen numeri & magnitudinis suæ, magnæ passioni difficile possent paria pronuntiari, aut eius destructioni sufficere. \* Itē libro Cu

\* Idem

ΚΑΤΑΠΟΤΙΟΝ.

rationū phlebotomans utitur medicamine catapotio, quod stomachum euertit, atq; post cœnam uomitum facit, exhalationibus implens caput. Potat etiam aceto, & sternutamentū commouens prius quàm in somnum ueniant ægrotantes, profecto intemporaliter commouet sensuales uias. Dat etiam absinthium, centaurion, & lac asinum, & equorū impetigines, uel mulorū, neq; tempus adiiciens factis, & odiosis ægrotātes afficiens rebus. Praxagoras uero secundo libro Curatio- num caput imperat radendū, adhibens fricationes, &

Praxagoras

\* ac farina mor-  
dentibus spe-  
ciebus

cataplasma ex aceto \* sine Venere, dolentibus speciebus etiam sternutamentum cōmouens, & ieiunum uomitum per singulos dies : utens etiam poto lacte cum mulso atq; sale, item deambulationibus plurimis atq; uehemēti motu \* celebratis, & potionibus urinalibus, & cibis uariis, & agninae carnis, siue hœdinae, atque porcinae, & catulorū, dans acetū bibendum, atq; uinū, & post uomitum sternutamenta & odoramenta probans, & spiritus retentionē : item usturam, atq; incisuram \* partibus adhibens etiā uentrisflua medicamina :

\* celeratis  
\* capitis  
\* comprimit,  
ut constat ex  
eo quod paulo  
post sequitur.  
Conuenit hoc  
remedium, cū  
vapore retro  
ac venenato,  
ex aliqua par-  
te corporis au-  
re frigide spe-  
cie in caput  
subiecto, per cō-  
sensum hic mor-  
bus gignitur.  
Sternutamen-  
ta.

& cum acceſſionē uiderit \* cōmoueri, deprimit par- tes quæ fuerint in querela, atq; defricat castoreo, & uituli marini ueretro, siue uirilibus hippopotami, aut testudinis sanguine, uel rhōbi marini, omnia confun- dens. Non enim initio rasio capitis est adhibenda, nec aceto densandū corpus, neq; diurno uomitu uexādum, siquidem fortitudinem tollunt : neq; plurimo sternuta- mento, implet enim sensus : neq; urinalibus medicamini- bus, siquidem corpus nimium laxant : neq; purgatiuis, siquidem



siquidem non aliter uexant: neq; catulorum carnibus,  
 propter suæ qualitatis horrorem: neq; detentione spi-  
 ritus accessione imminēte, tunc enim tēpus est requie-  
 scendi: neq; compressionibus, asperant enim tumores:  
 neq; curiosis odoramētis, siquidem caput implent: neq;  
 incisura, ob inutilem dolorem: neq; unctionibus, superpo-  
 sitionis enim tempore asperant ob tumore passionem,  
 in lenimento uero resumendos uexatione doloris fa-  
 tignant, & usui recorporatiuorū adiutoriorum obsi-  
 stunt: neq; coagulo uituli marini, uel ueretro, aut testi-  
 bus hippopotami, uel testudinis sanguine, aut rhombi  
 marini. Hæc omnia experta neq; ratione, neq; regula,  
 sed tentatione probātur. Asclepiades primo libro Ce-  
 lerum uel acutarum passionū, eos qui corporis raptu  
 afficiuntur, solos imperat phlebotomari, non aduer-  
 tens, quia ex eadem adstrictione generales quæq; spe-  
 cies epilepsiæ formantur, sed accessione grauior alte-  
 ra quam altera cōparatur. Quapropter magis exigit  
 phlebotomiæ beneficium. Item\* phlebotomatos iniici  
 iubet\* clysteri, uel\* collyrio, quod balanon appellant, \* phlebotoma-  
 tis  
 odoribus tetrīs adhibitis, & fumationibus, & naribus \* clysterem  
 aceti insufflatione, atq; uolutatione in syndone\* præ- κλυσις.  
 stita. Prohibet sanè carnales cibos, & uinum, sed im- κολλυσιον.  
 perat Venerē, quorū accusationem atq; improbationē Βάλανος.  
 ex ante scriptis accipere poterimus. At Serapion pri- \* supra pag.  
 mo libro Curationū multis ex rebus diligentia cūran- 286.  
 di confundit. Vngit enim residuum corpus oleo, colla  
 uero aceto cū oleo rosaceo, cōstringens ea quæ laxa-  
 tione indigēt. Tum exercitio adhibito dat mulsum bi-  
 bendum ex aceto confectū, ac deinde nihil accipere iu-  
 bet ægrotantes, sed quiescere, Tum deambulare circa  
 uesperam, ac rursus conquiescere, & deambulationē

Asclepiades

\* phlebotoma-  
tis

\* clysterem

\* collyrium

κλυσις.

κολλυσιον.

Βάλανος.

\* supra pag.

286.

Serapion.

repetere, tum lauare, & adhibita requie bibere hyssopi decoctionem cum aceto, atq; mel in trium \* heminarum quantitatē, tum cibum sumere, erroribus mille stomachum uexans, ut semel cibo reficiat. Vtitur etiam ante unū uel duos dies, si ordine certo accessiones occurrerint, nunc sanguinis detractione, nunc purgatiuis medicaminibus: sed nunc per superiora, ut albo helleboro, nunc per inferiora, ut scamonia, uel nigro helleboro, & his similibus, perniciosis turbationibus corpus adficiens eo tempore quo requies adhibenda est, ne ullā occasione accepta accessio generetur. Ordinatur præterea quæ specialiter passioni congrua medicamina nuncupauit, ex castoreo, & equorum impetiginibus. Sunt autem squamule anteriorum crurum sub armorū partitus in ipsis animalibus natæ, has Græci lichenas uocant, sine chelidonas, nos uero, ut supradictū est, impetigines, uel hirundines. Dat etiam cameli cerebrum atque fella, & coagulum uituli marini. Item dat medicamē quod ex crocodili terreni stercore confectum probat, & leporis corde, & lumbis, & testudinis marinis sanguine, uel testibus apri, uel arietis, aut galli gallinacei. Adhibet etiam odoramenta, & iniectiones clysteris, non minus ab epilepticis in curationibus cadens. Heracrides Tarentinus secundo libro Interiorum curationum eadem medicamina conscripsit. Multi quoque uetustiores istam curationem ordinantes uarijs erroribus conciderunt, quos memorare superfluum est. Quippe cum eorum uires & proditiōe temporis expirasse uideantur, ex quibus est Menecrates zeophletensis: item Tryphon, Philotinus, Chrysippus, Demarchus, & horū plurimi, quod est nudū, atq; probabile, ex cōscriptione curationum Apollonij Citienensis.

\* decocti Hyssopi  
fopi

Impetigines  
equorum.  
λχχvvs.  
Xvduōvvs.

crocodili

leporis

testudinis

galli gallinacei

odoramenta

injectiones

clysteris

Heracrides

Tarentinus

\*proditiōe

Menecrates

zeophletensis

Tryphon

Philotinus

Chrysippus

Demarchus

Apollonius

Citienensis

tiensis secundo libro de epilepticis: item Nicandri ter  
 tio libro. Themison uero libro primo tardarum pas- Nicander.  
 sionum Asclepiadis erroribus nondum purgatus ante. Themison.  
 accessionem phlebotomandos, inquit, si ordo fuerit  
 augmentorum præservatus: sin uero errās fuerit per-  
 spectus, post accessionem imperat phlebotomiam adhi-  
 bendam: modum autem detrahendi sanguinis eius ap-  
 probat mutatione, quæ sunt uanissimæ inuentiones, si-  
 cut libris Specialium adiutoriorum docuimus. Tum si  
 in brachijs, uel in cruribus, aliqua querela extiterit,  
 earundem partium uenas inquit diuidēdas: Sin manus,  
 interiorem uenam \* distringendā lino, coniiciens me- \*scalpello diuīdendā  
 lius esse ex partibus non patientibus sanguinis coad-  
 ceruatam facere detractionem: siquidem patientes ma-  
 gis grauantur ob irruentem materiæ lapsum, qui\* de- \*ea detracta non superat  
 tractæ superet modū. Tū post phlebotomiā deambula-  
 tione utitur, & defricatione alienis manibus adhibē-  
 ta, quo corporis motus cōquiescat. Dat etiā cibum ex  
 mediæ qualitatis materia, & nulla cogēte ratione rur-  
 sum sanguinem detrahit.\* Sed si ordinem seruauerint \*ac si  
 accessiones, intra quinque dies secūdo uel tertio detra-  
 ctionē facit. De alijs quoque multis, atque omnibus corpo-  
 ris partibus, & talis & brachijs, nil metuēs defectio-  
 nē, sanguinē detrahit. In lenimēto uero, ut exēpli causa  
 xxx. dierū, post accessionē helleboro utitur, post qua-  
 tuor uel quinque dies.\* Tunc sequēti initiet, atque alia \*quā accessio praterijt.  
 die adhibet lauacrū, & trib. uel quatuor diebus, cate- \*tum sequen- tis initio. sequē tis sub lenimē ti  
 ris cursibus, cyclū cōplet, ac deinde rursum adhibet hel-  
 leborū post accessionē trāfactā, uel certe\* radiciū adhi-  
 bet phlebotomū diffecans corpus, quod erat melius or-  
 dinare ante usum hellebori, quo leniora maioribus præ-  
 ponerentur: quippe in recorporatiuis curationibus. \*radices: & phlebotomodiffecans

Adhibet præterea clysterem, qui vires detrahit ægro-  
tantis, & propterea sequi non debuit supra dicta: uti-  
tur etiam localibus adiutorijs, & quidem multis, pro  
morbi differentia, & quibusdam falsissimis, ut est sub  
occipitio \* accurata diuisura, quam chiasmum vocari  
diximus: & ferro circumscripita in capite cutis ustu-  
ra, qua testa \* squamulis despumatur, Item medium te-  
stæ, quod Græci bregma appellant, terebri perforatio  
ne, & in accessione constrictione articularum, & odo-  
ribus tetrīs atq; male olētibus, ex pice, atq; ex \* spon-  
dylīo, castoreo, galbano, sinapi cum aceto, quæ ex an-  
te dictis erunt protinus resellenda.

De furore siue insania, quam Græci  
manian vocant. Cap. V.

\* Plato.

**P**Lato in Phædro duplicem furorem dixit: Vnum  
fieri mentis intentione, ex corporis causa uel ori-  
gine: Alterum diuinum siue immissum, eiusq; Apollinē  
inspiratorem esse, atq; \* nunc vocari diuinationem: ab  
antiquis uero appellatum furorem. Magna Græcorū  
uetusitas manian appellabat, quæ nūc mantice dicta est.  
\* Item alium inquit ex Libero fieri patre, alium ex  
amore, & appellauit eroticon: Aliū ex Musis, quem  
appellauit protrepticon, quod ad carmen \* instruere  
uideatur. Stoici duplicem furorem dixerunt, aliū insi-  
pientiæ genus, quo omnem imprudētem insanire pro-  
bant; alium ex alienatione mentis, & corporis cōpas-  
sione. Empedoclem sequentes alium dicunt ex animi  
purgamento fieri, alium alienatione mentis, ex corpo-  
ris causa siue iniquitate, de quo nunc scripturi sumus:  
quem Græci \* siquidē magnā faciat anxietatē, quam  
appellant manian, uel quod animum siue mētē ultra  
modum

\* hunc

Μανικός.

\* Idem

Ερωτικός.

Προπρεπτικός.

\* infligare

Stoici.

Empedocles

\* sic uocane-  
runt, uel quod  
magnum

modum laxet: manon enim dimissum siue mollem appellat: uel certe quod polluat ægrotantes: nam pollui Græci *lymenim* uocant: uel certe quod deserta, siue solitudinem cupientes faciat ægrotos: nam Græci destitui, atq; solitudinem petere *monusthæ* dicunt: uel quod perseverantius corpus teneat, & difficile pellatur, ob id Græci ueluti *moniam* dixerunt: uel certe quod du-  
 ros atque perferentes faciat ægrotantes, quod Græci \* *hypometicos* uocant. Est autem alienatio tardans sine febribus, quo à phreneticis discernitur. Siquidem neque celer, neq; cum febricula esse uidetur, uel si quis quam furiosus febricitauerit discernitur à phrenetico temporis consideratione. Nam præcedit in furiosis furor sequenti febricula, & non ita paruo pulsu afficiuntur, quæ utraq; necessariò phreneticos sequuntur. Generatur autem frequentius in iuuenibus, ac medijs ætatibus, difficile in senibus, atque difficilius in pueris, uel mulieribus: nunc repente inuadens, nunc paulatim crescens: nunc ex occultis, nunc ex manifestis causis, ut est ustio, perfrictio, indigestio, uinolentia frequens atque immodica, quam Græci *cræpalen* uocant: item uigiliæ iuges, & amor, uel iracundia, aut mœstitudo, uel timor, uel superstitio nimia. Item concussio, siue percussio capitis & intentio nimia sensuum & intellectus ob cupiditatem disciplinarum, uel quæstum pecuniam, aut gloriam. Item pota medicamina, & magis ea quæ amorem facere uidentur, à Græcis *philtropota* appellata: item detractio hæmorrhoidarum ueterum, siue uaricum, aut abstinentia in fœminis solitæ purgationis. Sequuntur autem eos qui non repenti hac passione afficiuntur, priusquam morbus enitescat, ea quæ etiam epilepticos

Μανίε.

Λυμαινίον.

Μονιάδω.

Μονία.

Υπομενίται.

\* Hypomeniti

cos: aut Hypo

menicos.

Phrenetici

Κραπέλη.

Φιλτροπότη.

futuros afficiunt, & apoplectos. Signa deniq; ex ante dictis sumenda memorauimus, Sed hæc quidam discernunt, ut communibus propria iungentes: graues etenim inquirunt, somni magis epilepsiam fore significandam, atq; e contrario leues atque parui, furorem. Sic etiam in \* iracundia constitutos capitis implemento affici, atq; aestimare se in furorē deuenisse, & rursum silentio opprimi ex inani timore. Item mæstitudo, uel animi anxietas, & iactatio, uel plurima ciborū appetentia, & oculorum frequens palpebratio, cordis saltus, & somni cū timore terribili uel turbato effecti. Item uentris \* extantia, & frequens descensus uenti per podicem, pulsus paruus atq; creber, & uehementis. Etenim in epilepsiam decliues ac pronos maior atq; rarus pulsus sequitur, & imbecillus. Intuendam etiā, inquirunt qualitatem aduenientium morborum. Sæpe enim quadam contagione ingeruntur: quæ uniuersa secundum nos \* non tutissima atq; certam faciunt discretionem supradictarum passionum. Etenim futuris epilepticis, uel in passionē pronis uigilie irruunt, & anxietates, & cætera. Itē in aduētitij morbis aliqua ex ijs eueniunt nō necessario omnia uel certe non aliqua quæ enumerauerint signa. Emergēte enim siue \* prodita passione, alienatio mētis fit siue febribus, & quibusdam uehementis, quibusdā leuis, & alijs alia specie atq; uisu differens, uirtute tamen atq; genere uno cōfecta. Nam furor nunc iracundiā, nunc bilaritate, nunc mæstitudine, siue uanitate occupat mentem, nunc timore comminante inanum rerum, sicut quidam memorauerunt, ut nunc spelūcas timeāt, nunc lacunas, ne in easdē concidant, uel alia quæ terrori esse possunt. Item esse furorem cum quadam uaticinatione ueteres posuerūt.

Demet

\* Mania

\* flatuosus tumor

\* nō tuta sunt, nec

\* prodente

Demetrius etiam parui temporis mentis† extensio-  
nem furorem appellat. \* Item turbine repentino ex-  
pauescences atque percussos quosdam sic ait, ut etiam  
obliuione prægestorum afficiantur. Sic denique Arte-  
midorum grammaticum Apollonius memorat \* niten-  
te gressu crocodilum in harena iacentem expauisse,  
atque eius motu percussa mente, credidisse sibi sini-  
strum crus atque manum à serpente comestam, & li-  
terarum memoria caruisse obliuione possessum. \* Item  
melancholiam inquit speciem furoris esse nuncupan-  
dam. Nos uerò ipsam quoque discernimus à furore.  
Est autem insania siue furor nunc iugis, nunc temporis  
interiecti requie leuigatus, efficiens ut ægri nunc non  
meminerint sui laboris, nunc obliuionem sciant suam,  
& nunc omnium sensuum alienatione uexentur falsi-  
tate possessi, \* nec aliarum specierum errore fallan-  
tur. Sic denique furens alius se passerem existimauit,  
alius gallum gallinaceum, alius fictile, alius laterem,  
alius deum, alius oratorem, alius tragædum, uel co-  
mædum, alius stipulam ferens mundi se \* censum tene-  
re, alius se sustentandum manu poscebat, uagians ut in-  
fans. Horum plurimis accessions tempore oculi san-  
guinolenti fiunt atque attenti. Accidunt etiam uigiliæ  
iuges, uenarum extensio, genarum rubor, corporis du-  
rities, atque aliena fortitudo. Patitur autem omnis  
neruositas, ut ex iis quæ sequuntur uel accidunt conii-  
cere poterimus: magis tamen caput. Etenim antece-  
dentes plurimæ querelæ eius partis existunt, cum gra-  
uedine atque dolore \* afficiuntur, singulis quoque sen-  
sibus patientibus, quos in capite nouimus constitutos.  
\* Et præterea passio magna atque tardissima superpo-  
sitionibus ac linimentis uariata, ex constrictione con-  
fecta.

Demetrius.

† excessionem

\* Idem

Artemidorus  
grammaticus.

\* nitentem

\* Idem

Μελαγχολία.

\* & in illorū  
speciebus

\* centrum

\* afficiuntur

\* Est



Mnaseas.  
\* aliam

Διάχυσις.  
\* diachisis

\* capite

\* ab ingressu

secta. Etenim ijs qui Mnaseam sectantes \* alium putant, adquiescendum non est, suspicantibus eum furorē, qui hilaritate affecerit egrotantes nomine solutionis appellandum. Falluntur etenim nominis uoce: siquidē Græci \* diachisin animi laxationem dixerunt, sine diffusionem, cum hoc animi, non corporis ostendat qualitatem. Nam quod omnis furens strictura afficiatur manifestum, atq; probabile est, ex oculis sanguinolentis, qui \* inlato constitutam stricturam denuntiant: item quod ipsos oculos atq; uenas in uultu extantiores æger habeat, totius corporis attestante duritia, cum fortitudine præter naturam adueniente ob stricturæ consensum. Deniq; lenimenti tempore fatigatos se sentiunt egrotantes. Est item cōiectura facienda ex ijs quæ mentis alienationem præcedunt, ut capitis grauedo, ac dolor, & spinæ uel scapularū & tardus membrorum motus, & uentris inflatio. Peccāt deniq; etiā ij qui animæ passionem principaliter, ac hinc corporis esse concipiunt, cum neque quisquam philosophorum eius tradiderit curationem, & antequam mente falluntur, accidentia substantia corporis habere uideatur. Hæc sunt quæ ad apprehendendum uel discernendum morbum methodus ordinauit. Curationem uero sinulem epilepticis accipimus adhibendam. Etenim principio conuenit iacere loco mediocriter lucido, atque calido, & nullo turbore pulsato: nulla quoque picturæ distinctione, neque fenestris humilibus luminato: neque in superioribus potius quàm in solo: pleriq; enim furore correpti sese præcipites dederunt. Est etiam lectus firmissime, atq; auersus \* ingressum cubi-  
culi locandus, quo ingredientibus minime uideant egrotantes, ne uultus uarietate laceßiti furoris augeant

uanita



nanitatem. Stramina præterea mollia sunt approban-  
 da cum defricatione, ac retentione articulorum, blan-  
 do scilicet tactu. Et si qua pars corporis \* saltu fuerit \* palpitatio-  
 agitata, tepidis uaporationibus erit mitiganda, appo-  
 sitis lanis mollibus ac limpidis capiti, collo, & thoraci  
 circulatim. Fotus quoque adhibendus olei calidi, ad-  
 mixto aliquando mitigatiuæ uirtutis causa fœnigræci  
 liquore, \* & eius decoctione confecto, sed minimè \* ex eius  
 pingui, uel certè hibisci infusione, aut lini seminis.  
 Tum oris collutio atque potus ex aqua calida. Erunt  
 præterea multorum ingressus prohibendi, & maximè  
 ignotorum. Mandandum quoque ministris, ut eorum  
 errores quodam consensu accipientes corrigant, ne  
 aut omnibus consentiendo augeant furorem, eorum  
 uisa confirmantes, aut rursus repugnando asperent  
 passionis augmentum, sed \* inductiuè nunc indulgeant \* obsequenter  
 consentientes, nunc insinuando corrigant uana, recta  
 demonstrantes. <sup>2</sup> Ac si exilire cœperint, ut difficile te-  
 neantur, uel solitudine potius exasperentur, oportebit  
 plurimis uti ministris, & præcipere ægros latenter  
 retineri, ad articulorum \* fricationem, quo minimè \* plicationem  
 prouocentur: si etiam uisu hominum fuerint commoti,  
 erit adhibenda ligatio sine ulla quassatione, præteritis  
 articulis ex lana, tum fasciola \* ligatur: ac si \* quicquã \* ligati-  
 timere uel reuereri consueuerint, nõ erit itidem ac fre-  
 quenter \* inducendum. Continuatio enim cõtemptibi-  
 litatem parit, \* uel cùm causæ coegerint, uel adiutorio \* inducendus  
 adhibendo non \* succubuerint ægrotantes, tunc erit \* sed  
 necessariò inducendus, quo ægri terrore uel reueren-  
 tia \* opprimantur. Ac si etiam lucem animo contraria \* compriman-  
 commouentem uiderimus, erunt eorum oculi adum-  
 brandi, quo cæterum corpus luce tangatur. Adhiben-  
 da

tur: Alij re-  
 primantur

da cibi abſtinentia uſque ad primam diatriton, ac per-  
mittentibus uiribus phlebotomia, ſi paſſio coegerit,  
intra diatritum: & ſi ulla obſtiterit cauſa detracti-  
onis congruæ ſemel faciendæ, aliquoties adhibita detra-  
ctione modus implendus. Si horum nihil obſtiterit, in  
ipſa diatrito erit phlebotomia adhibenda: tum perun-  
ctio: ora fouenda: dandus cibus leuis, paruus, digeſtibi-  
lis, ut panis ex aqua calida, uel alica ex melle leuiter  
decocto conſecta, uel ſorbile quicquam, aut tenerum.  
Exinde uſque ad paſſionis declinationem alternis die-  
bus æger nutriendus, ſi uires eius permiferint. Pro-  
luendus denique etiam clyſtere ſimplici, ſi paſſio po-  
poſcerit. Tum etiam præcordia cataplaſmatibus re-  
laxanda, ob \* digeſtionis qualitatem, quo nulla con-  
ſtrictio ſpirituum abſtentum capiti tranſmittatur. At-  
tendendæ etiam ſpecies alienationis, cuius accidentia  
contrariorum coniectura erunt mitiganda, ut cum hi-  
laritate relaxent, nuntiantes quicquam quod animum  
reſoluat. Dehinc cū \* ſtatus paſſionis apparuerit, de-  
tonſo capite, atq; raſo, cucurbitam inſigimus, adiuncta  
ſcarificatione, primò præcordiis, tunc \* inter ſcupu-  
las, quas Græci metaphrenū uocant. Conſentiunt enim  
facilius iſtis ſuperiora: dehinc etiam occipitio, ac uer-  
tici, & temporibus capitis: ac ſi uultus uel ora fue-  
rint affecta plurimum, totum corpus erit ſanguisugis  
releuandum, quas hiruſines appellamus. Tum cata-  
plaſmandum ex \* pani ceteri laxatiuæ uirtutis: de-  
hinc ſpongiis uaporandum, & ſi paſſio permanserit;  
ſecundo uel tertio iſdem perſeuerabimus adiutoriis.  
Si uigiliæ fuerint conſecutæ, adhibenda geſtatio, pri-  
mò ex lectulo pendenti, tum etiam \* fertoria ſella.  
Adhibenda etiam aquæ diſtillatio \* crebra, cuius ſo-  
nitū

\* ut interea  
dum cibū vētri-  
culus coquit,  
nullus vapor  
ſurſum in ca-  
put efferatur.

\* Nam ante  
ſtatum morbi  
hæc remedia  
Metaſyncriti-  
ca Aſethodici  
nō uſurpabāt.  
\* inter ſcapulis  
Μεταφρενῶν.

\* pane & ce-  
teris  
\* fertoriū neu-  
tro genere ſu-  
prà duxit.

\* per tubulos,  
aut ut ait Cel-  
ſius, per Sylla-  
nos

nitu sepe egrotantes inducti somnos capiunt. Tunc  
 etiam spongiis calidis oculi uaporandi, atque palpe-  
 brarum duritia relaxanda, quo etiam per oculos usq;  
 ad cerebri membranas beneficium perueniat curatio-  
 nis: ac si passio declinauerit, & propterea \* *minimè* \* *minimum*  
 uigilare, atque alienari cœperint egrotantes, dabi-  
 mus uarium cibum ex mediæ materiæ qualitate. Tunc  
 si doloris sensum egrotantes acceperint, adhibenda em-  
 basis ex oleo, uel admixto aliquanto liquore, quo fue-  
 rit hibiscus præcocta. Tum capiti atque scarificatis  
 locis cerotaria apponenda, & ex eis \* *liquefactum* \* *liquefactis*.  
 corpus omne perungendum cum nuti defricatione, tum  
 acopis, atque malagmatibus ueterum, quæ nulla nimie-  
 tate percutiant, motum quoque gestationis adhiben-  
 do: & primò gestatoria sella, tum uehiculo manibus  
 acto: at toto fortificato corpore erunt in deambula-  
 tionem cogendi, & uocis exercitium quod cuique cō-  
 uenerit. Nam literalis etiam lectio adhibenda est, quæ  
 sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem exer-  
 ceant egrotantes. Quapropter interrogationibus quo-  
 que erunt fatigandi, ut nunc mendacij causa, nunc pro-  
 mendij quod quærimus exerceri uideantur: tum sibi  
 dimittendi, data lectione quæ non sit intellectu diffi-  
 cilis, ne plurimo labore uexentur. Hæc enim si supra  
 uires fuerint, non minus afficiunt quàm corporis im-  
 modicæ gestationes. Item post lectionem aliqua com-  
 posita uel mimica sunt offerenda, si moestitudine furen-  
 tes laborent, aut rursum tristitiam uel tragicum timo-  
 rem habentia, si puerili luxu furentes afficiantur. O-  
 portet enim cōtrarietate quadam alienationis corri-  
 gere qualitatem, quo animi quoque habitus sanitatis  
 mediocritatem agnoscat. Tunc proficiente curatione  
 erunt

*Lectioes pu-  
 uat.*

erunt pro possibilitate meditationes adhibēdæ, uel disputationes: sed tunc quoque \* similiter ordinatæ, ut principia \* leui uoce promātur: narratio uero & demonstrationes extenta atque maiore: tum epilogus dimissa, & indulgenti, sicut ij uolunt, qui de exercenda uoce, quam Græci anaphonesin uocant, tradiderunt. Adhibendi deniq; auditores sunt ægrotanti consueti, qui fauore quodam atque laude dicta prosequentes dicentis animum laxent. Etenim iucunda exercitamenta corporis adiuuant sanitatem. Tunc post meditationem, uel disputationem † deducendus mox est, atque perungendus leuiter ægrotans, & deambulatione \* leui mouendus. Ei autem qui literas nescit immittendæ quæstiones erunt, quæ sint eius artis propriæ, ut rustico rusticationis, gubernatori nauigationis: ac si ex omni parte iners fuerit curandus, erunt uulgaria quædam quæstionibus tradenda, uel calculorum ludus. Habet enim quiddam quod animum exerceat, & magis si peritior ægrotanti colludat. Tunc post requiem, adhibita deambulatione, erunt diligentius perungendi: & primò parua atque simplici defricatione mulcendi: dehinc profectu apparente, etiam de uexo ductu, post humeros, atque colla, defricatione \* potiore, & leui deductione, quam Græci catapasmon uocant: ultimò fricandum etiam caput, quod ubi fuerit releuatum, lauacrum etiam erit adhibendum: & sicut de epilepticis dictum est, uariis dandus cibus, inhibito uino: tum addendum quicquam pomorum, quo corpus prætentenus: dehinc uinum dandum tenue, \* leue atque paruum, medio cibi tēpore: & primò inter quinque dies, tum inter quatuor: dehinc inter tres atque duos: item alternis diebus. Ita quotidie interiecta, uel uariata  
aque

\* utiliter

\* leni

Αναφώνησις.

† deducenda  
vox est,  
reducendus  
\* leni

Ludus calculorum.

\* mitiore &  
leni  
Καταπάσις.

\* leue

aque potatione, eodem contrario ductu uinum uaria-  
 mus. Tunc cum nulla ceperit æger nouitate\* seruari, \* vexari  
 & perferre singula didicerit, erūt addendæ aeris mu-  
 tationes. Et, si quidem philosophorum disputationes  
 audire uoluerit, erūt adhibendæ. Etenim timorem, uel  
 morositudinem, aut iracundiam suis amputant dictis, ex  
 quibus non paruus profectus corpori commodatur: ac  
 si passio permanserit, & corpus tarditate possederit,  
 superpositionibus ac lenimentis\* uarianda erunt & \* variata  
 superpositiones mitigandæ eisdem adiutoris, quæ ini-  
 tio furentibus sunt ordinata. In lenimento uero prius  
 adhibendus resumptiuus cyclus per uariam gestatio-  
 nem, atq; uocis exercitium, musico\* monitore compo- \* Phonaſco  
 situm, tum deambulatio, atq; gestatio, & cibus uarius,  
 & his similia: secundo\* re corporatiuus, sicut superius \* adhibitis cū  
 docuimus. Vt edum etiam localibus adiutoris, hoc est, multa flamma,  
 cucurbitis re corporatiuis, & rasiōne capillorū, item & ualido ra-  
 sternutamento, & dropace communi, atq; \* composito \* compositio  
 ex nitro, galbano, manna, pyretro, euphorbio & pi- παρίης.  
 pere: tūc paroptesi atq; cataclysmo, & aspergine pul- Καλαυρούς  
 ueris nitri. Torrendū etiam corpus seruire solis, præ-  
 teſto capite: dehinc sinapismo utendum & exercitio \* partes longe  
 uario, ac uehementi. Sed hæc omnia cum adhibentur, remota  
 etiam localibus adiutoris prius erunt prætagendæ ac \* hæc ratio cō-  
 renouandæ\* longe remouendæ à patientibus, tum se- citandi vom-  
 cundæ ac uicinæ, dehinc ipsæ: etenim quoties lōgæ re- tus aperiens de-  
 mota præmouentur, transmissa cōmoditas sine partiū cluratur pag.  
 curandarum commotione latenter aduenit, & nullam 323.  
 facit capitis inflationē. Dehinc adhibendus uomitus ex \* Supra pag.  
 albo helleboro\* radicibus inserto, & magis si quisquā 252. modus u  
 ex\* radice pura noluerit digitis uomitum prouocare. vomitionis pro-  
 Fit enim ut incerto helleboro spōte uomitus nascatur. radice purā uocandæ per  
 explicatur.

Tunc etiam ipsum helleborum dabimus, & si oportue-  
rit, non semel, sed sepius per interualla temporū. Item  
aurum cauernis iniicere debemus aquam nitro asper-  
sam, uel mulsum cum semine urticae, uel sinapi liquido,  
quo etiam per sensuales uias ad membranas cerebri  
recorporatiua uirtus adueniat. Quippe cum etiam au-  
rium tinnitus sepiissime egrotantes afficiat. Dehinc  
 \* Redundantior erunt rursus resumendi\* aliptarum diligentia. Vtendū quoq;  
 Αλειπιδου. naturalibus aquis, ut sunt nitrosae, & ma-  
gis si odoris non fuerint tetri, quo membranae capitis  
quatiantur. Vtendum etiam peregrinatione terrena,  
atq; maritima, & animi auocamentis, quibus mentis  
laxatio fiat. Erit etiam coniiciendum ex mœstitudine  
 \* eorum punctioni quantum permaneat passionis, quanquam soluta uideatur,  
 Τετραπύλον. non aliter quā si\* terebratis oculis, quod Græci  
paracente sin uocant, ob tardam suffusionem, quanquā  
sit perfecta curatio, uisus impedimenta perseuerant,  
quæ quadam consuetudine potius, quā passionis præ-  
sentia fieri uidentur. Solutam uero uel conuictam pas-  
sionem intelligere poterimus ex iis quæ de epileptica  
curatione memorantes docuimus. Hæc est secundum  
methodum furiosorum, siue insanorum curatio. Alia-  
rum sectarum & ueterū methodicorū plurimi, obscu-  
ris in locis habendos inquirunt egrotantes, neq; acci-  
dentia passionis coniicientes, siquidem sepe quidam  
obscuritatem odisse uidentur, neq; ipsam passionem,  
quod sit ex strictura effecta. Etenim densata corpora  
aeris obscuritas minime reflari permittit, abstētis de-  
niq; naturalibus officiis, impletum caput magis graua-  
tur: Adhibendam etiam immodicam abstinentiam, quā  
 Απειρηχία. Græci lemanchian uocant, non aduertentes, quia im-  
moderata cibi abstinentia uires corporis uexat, &  
 egro

egrotantem naturali fortitudine desertum adiutoria  
 ferre non patitur, perdit etiā cibandi tēpora, ex \*quo <sup>\* quibus con-</sup>  
 densata corpora sæpe laxātur. Non enim \* uere admit <sup>gruis cibi tem-</sup>  
 tenda aut credenda sunt ea quæ suspiciātur, quibus ipsi <sup>poribus</sup>  
 insanire potius, quā curare uidentur. Aiunt enim fra- <sup>\* pro veri</sup>  
 rum similitudinem intuemdam, quæ deductione cibi, po-  
 sita ferocitate mansuescunt, non aliter etiam furentes  
 posse iugi abstinētia mitigari, quippe cum inter sanos  
 homines, facile sapere ieiuni uideantur, post cibū ue-  
 ro affici hilaritate facilius, aut furore. Iubēt præterea  
 uinculis egrotātes coerceri, sine ulla discretionē, cum  
 necessario deuiuctæ partes quatiantur, & facilius sit  
 egros ministrantiū manibus, quā inertibus uinculis  
 retinere. Cupiūt etiam certis medicaminibus somnos  
 altos efficere, papauere fouentes, & pressuram potius  
 atq; grauationē capitis, non somnum ingerentes. Fo-  
 uent etiā oleo rosaceo aceto admixto: serpyllo & ca-  
 storeo, & ceteris simillimæ uirtutis caput \* obsidunt, <sup>\* obsidentes, &</sup>  
 constringētes ea quæ laxatione indigent. Alij frigidis  
 usi sunt rebus, passionis causam ex seruore uenire su-  
 spiciātes, ut Aristoteles, & Diocles, nescij quoniā ser- <sup>Aristoteles.</sup>  
 uor \* innatus sine dubio tumoris est signum, & non ut <sup>Diocles.</sup>  
 existimant, passionis causa. Quare peiorare necesse <sup>\* ingens</sup>  
 est, & maiorē furorē fieri cū frigida curatione cor-  
 pora densantur. Alij phlebotomiā adhibendam pro-  
 bant ex duobus brachiis usq; ad animæ defectionē, ut  
 sæpe faciant mori, \* cupientes. Etenim defectio, aut ui- <sup>\* sæpe nanque</sup>  
 rium amputatio sequuntur immodicā sanguinis detra- <sup>furioli mortem</sup>  
 ctionem, \* quā non oportebit ex utroq; brachio fieri. <sup>opt. uni.</sup>  
 Dicunt præterea usum esse clysteris addendū, ex acer <sup>\* Quare non</sup>  
 rimæ uirtutis liquoribus, & iniectione frequenti, Ex <sup>oportet</sup>  
 \* quibus nihil utile, sed potius dysenteria sequitur. <sup>\* quo</sup>



*Medicamina  
αἰσθητικά.*

\* verberibus,  
et flagrorum  
plagis.

Φόβου.

\* est

\* furere

\* durā, et quae  
etiā occupata

\* animo ad cō-  
stantiam et fir-  
mitatem redū-

cto, et cōuerso

\* vtilem

Αἰσθη.

\* petiit

\* Amphitrites  
desyderio irre-

titus sese in  
mare

\* regiae prolis  
fœminam Ia-

sonis excitatā  
factis, Medea

intelligit, quae à  
Iasone Creuse

Creontis filiae  
amore capto re-

pudiata, filios  
quos ex eo su-

scieperat, inter-

fecit.

\* iactat

Dant etiam urinalia atq; uentrisflua medicamina po-  
tanda, quæ diuretica uel cœliotica Græci uocauerūt.  
Auertēdam enim ē superioribus ad inferiora materiā  
dicunt, ex quibus corpora tabescunt et neruositas ui-  
tiatur. Item alij inebriādos aiunt ægrotantes cum se-  
pe ex uinolentia furor atque insania generetur. Alij  
flagellis aiunt coercendos, ut quasi iudicio mētis pulso  
resipiant, cum magis, tumentia\* cæde laceffendo, faciāt  
asperiora, et adueniente lenimento passiōis, cū sen-  
sum recipiunt, plagarum dolore uexentur: Ac certe, si  
ut ratio poscit, uicinis magis ac patientibus locis adiu-  
toria sunt adhibenda, coguntur ut ori uel capiti pla-  
gas imponant. Utuntur etiam cationibus tibiārū ua-  
ria modulatione: quarum alteram phrygiam uocant,  
quæ\* sit iucunda atq; excitabilis eorum qui ex mœsti-  
tudine\* in furore noscuntur: aliam\* diram, uel quæ oc-  
cupata mente pudorem suadeat, iniecto\* rigore, \* ut  
in bello, quam dorion appellant, in iis qui risu, uel pue-  
rilibus cachinnis afficiuntur, cum cantilenæ sonus ca-  
put impleat, ut etiam recte ualentibus apertissime ui-  
detur, uel certe, ut pleriq; memorant, accēdat aliquos  
in furem, quo sæpe uaticinantes deum accepisse ui-  
dentur. Alij amorem furentibus aiunt procurandum,  
quo mentis intentio, conuersa furoris asperitate pur-  
getur, non intuentes nudissimam ueritatem, quod ple-  
risq; furoris amor fuerit causa. Sic deniq; alius amore  
Proserpinæ\* petit inferna, et sibi licitas alienæ ac di-  
uæ coniugis credidit nuptias: Alius nymphæ\* ob desi-  
rium Amphitritis sese deditum mari proiecit. Ferunt  
Græcorum commenta loquacia et \* hieropolis fœ-  
minam humanis exercitatā fatis, et sœuo pœnitudi-  
dinis dolore cōmotam, sua manu suos extinxisse \* suc-  
cessus



cessus. Neque aspernandos ceteros accipiamus, qui ipsum quoque amorē generaliter furorem uocauerunt, ob similitudinem accidentium, quibus ægrotantes afficiuntur. \* Et est impium atque absurdū passioni \* adiuto. \* Est autem adiutorium ipsi quā curas simile probare possunt. riorum in idipsum probare quod curas, omitto quod sit impossibile amorem furentibus persuadere, siquidē iudicio carentes pulchritudinē probare non \* possint. Nam sæpe homines feras existimant, uel ea quæ uiderint fingēdo præsētia putant. Dehinc etiam si amor fuerit acquisitus, quid magis probemus erit incertum, utrumne prohibendus sit usus uenerēus, an admittendus. Sed prohibitus indignari magis cogit ægrotātes, cum desiderata producuntur. \* Item permissus uexat, \* Ast cum corpore eurato animæ quoque substantia \* turbatur. Alij arteriotomiam probauerunt, inutili uexatione caput afficientes. His igitur omnibus experimentis inanibus conferta est furiosorum curatio, quæ ne falsa putentur erūt denuntiandæ personæ, atque librorū nomina designanda. Asclepiades secundo libro adhibendam præcepit cantilenam, quō etiā eius discipulus Titus adductus, secundo libro de anima, memorat flagellandos. Sed idem etiā officiis solitis amoueri iubet ægrotantes, et uinculis constringi, et abstinentia ciborum nimia coerceri, et siti affici, tum uino corrumpi, uel in amorē induci: cetera primo libro tardarū passionū supradicta cōpleuit. Themison phlebotomatos \* constrictius curat fōmentis, qui se sua lege tenere nō potuit, adhibens etiā lauacrū, atque uinum plurimū, et amorem suadens, adiuncta ciborum copia, aliis quoque incongruis utens rebus, quæ magis Asclepiadi, quā Themisoni sunt adscribenda, nondum enim sese eius liberauerat secta cum sic hæc ordinasse perspicitur.

\* Ast  
\* turbetur

Asclepiades.  
Titus

Themison.  
\* constrictius

## De Melancholia. Cap. VI.

Μελαγχολία.  
Μίλαυ.  
Χολία.

\* sint

\* Eam

3i Aenci.

\* eam

Μετάρρενον.  
ὀχρὸς. luridus.  
subluteus.

\* cæni ac luti  
virus olentis

**M**elancholia dicta, quod nigra fella egrotantibus sæpe per uomitum ueniant: Græci enim nigrum melan uocauerunt, fel autē cholen appellant: & non ut pleriq; existimant, q; passionis causa uel generatio nigra\* sit fella, hoc enim est æstimantium magis quàm uidentium ueritatem, uel potius falsum, sicut in aliis ostēdimus.\* Nam Tullius atrā bilem dixit, ueluti altam iracundiā. Item Vergilius de Hercule alta iracundia moto, Hic uero, inquit, Alcide furis exarserrat atro Felle dolor. Siquidem melancholici semper iracundi, tristes, a nulla penē hilaritate laxati esse uideantur. Frequētat autem in masculis magis, & mediis ætatibus: difficile uero in fæminis, uel aliis ætatibus. Eius antecedentes causæ sunt hæc, indigestio, iugis uomitus, post cibum medicamina pota, acres cibi, mæstitudo, timor, & cætera quæ\* etiā ualent sufficere. Sequuntur autem in ipsam pronos uel uenturos ea quæ etiam insanos fore denuntiant. Eos uero qui iam passionē possēsi sunt, animi anxietas atq; difficultas tenet, attestante mæstitudine, cum silentio, & odio conuiuentiū. Sequitur etiam nunc uiuendi, nunc moriendi cupido, cum suspicionibus uelut insidiarum sibi paratarū: item inanes fletus, atq; murmura uacua, & rursum hilaritas, magis post cibum, cū inflatione præcordiorum, & articulorum frigore, & leui sudore, atq; stomachi mordicatione, uel oris uentris usq; ad interseapulas, quas Græci metaphrenum uocauerunt: item capitis grauedo, color\* uiridis cum nigrore, aut subliuidus, corporis tenuitas, uirium debilitas, & accepti cibi corruptio cum ructationibus odoris tetri, hoc est fumosi, uel\* bromosi, uel piscosi: item intestino-

rum tormenta, uomitus, nunc inanis, nunc fellofus, uel ferrugineus, aut niger, & eiusdem qualitatis per podicem egestio. In lenimēto uero eorum mitigatio, uel multorum depurgatio. Sed hanc passionem furoris speciem alij plurimi, atque Themisonis sectatores uocauerunt. Differt autem, siquidem in ista \* principaliter stomachus patitur, in furiosis uero caput. Et est communiter stricturae passio magna: aliquando etiā \* complexa, ob plurimas egestionem. Præterea est ex numero tardarum passionum, quas Græci chronias appellant. Curatio autem adhibenda est, quam furiosis ordinauimus. Non enim phlebotomiam probandam attestante dolore, aut hellebori purgationem, attestante passione, approbamus, sed exterius localia adiutoria, atque mitigatiua, siue \* corporatina, magis ori uentris, atque \* inter scapulas sunt adhibenda. \* Ac si forte aut uomitus immodicus, aut egestio uentris coegerit, constrictiua sunt cataplasmata apponenda, uentri atque stomacho, ut ex palmulis thebaicis, infusis uino, uel pusca, admixtis etiā malis punicis, uel cydonijs, & ænanthe, & alumine scisso, aut hypocystide, uel acacia, siue galla, & his similibus. Dandi etiam cibi constrictiui, atque apponēde eius uirtutis cucurbitæ: alia uero medicarum sectarum præfectis relinquamus, & ijs qui de furiosis scripserunt. \* Adhibent etiam bibenda medicamina, hoc est, aloën & absinthium iugiter, quæ propter uim suam, quam habent plurimam, excludenda probamus: quippe cum sit possibile ex consuetis perficere sanitatem.

\* Hinc liquet Methodien uocatam peculiariter Melancholiā fuisse Hypochondriacā. \* ex solutione

\* recuperatiua \* inter scapulis esse \* Al

\* Prebēs etiā quidam.

# CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER SECVNDVS.

De Paralyfi.

Cap. I.



\* frequenter  
exercitata.

παράλυσις  
\* manifeste in  
egro & ille  
\* vocat

\* Paralyfis cō  
ductione, i. mē-  
bro contracto  
fit, in ijs, qui-  
bus nervis trās-  
uersim omni-  
nopracifis, post  
uulnus cicatri-  
ce dura & ma-  
gna obductū,  
mēbrū resolu-  
tur, & sic con-  
trahitur, ut di-  
stēdi nō possit:  
ἀγκύλωσις ἢ gra-

ci vocant. Fit autem extensione, cum laxatis nervis, membrum sensu ac motu pri-  
uatum, flaccidum, languidum, extentum, propendet, aut trahitur, infra pag. 317.  
crus paralyfi utiatum, conductione fieri breuius ait, extensione, longius, ut luxa-  
tionem faciā quidam putent. \* nondum \* apoplexia correpti.

IN senibus atq; hyemis tempore frequen-  
tat hæc passio: difficile autem in calidis  
ætatibus. Ea generatur nūc ex occultis,  
nunc ex manifestis anteceditibus causis,  
ut quassatione, uulneratione, uel alia qualibet passio-  
ne: item frigore profundo, uimolentia, indigestione, lu-  
xuria, atque libidine & frequenti extenta: item medi-  
caminibus potis. Sed est uel fit paralyfis nunc sensus,  
nunc motus, nunc utriusq;. Et intelligitur sensus para-  
lysis, quoties seruens atque frigidū non sentiunt ægro-  
tantes, \* manifeste partium naturalium motu: motus  
autem, quoties seruens atque frigidum sentiunt, motu  
partium carentes: utriusque uero paralyfin faciā ac-  
cipimus, quoties motu atque sensu caruerint. Item  
hæc passio nunc partis est, nunc partium, nunc totius  
corporis, cum apprehensione mentis, quam apople-  
xiam & uocantes. Acutarum passionum libris tradi-  
dimus. Sed plurimis species duæ paralyseos uisæ  
sunt: \* alia conductione effecta: alia extensione.  
Sequuntur autem pronos & decliues in passionem,  
hoc est, qui \* non repente fuerint \* percussi, si to-

tunc

tum corpus passurum denuntietur, ea quæ epilepsiam  
 uel furorem denuntiant: si uero ex parte, grauedo  
 partis passuræ \* sequetur, ut tardus motus, cum stupo  
 re, & pallore, & torpido cum sensuum debilitate,  
 quæ nunc perseverantia, nunc sine ratione recedētia  
 \* intelligūtur, ac rursus recurrētia. Dehinc effecta  
 passione torpor atq; stupor gelidus partiū fit, \* pluri  
 mus & paruus, & nunc uoluntario motu cessante,  
 nunc ex parte manente: & nunc sensu amisso, nūc par  
 uo remanente: nunc etiam dolore attestante, obscura  
 to pulsu, & per profectum cessante cū pallore, & te  
 nuatone partis uitiatæ, nutrimēto cessante, quod Græ  
 ci atrophīā uocāt. \* Sequēte etiā rugatio cū adductio  
 ne partiū, uel extensione. Aliqui præterea paralipsin  
 uocauerūt eā quæ ex omni parte naturalē motū abstu  
 lit, paralysin eā quæ ex plurima parte uitiauit motū,  
 quibus minime cōsentire maiorū autoritas iubet. Non  
 enim passionū differētiā ostēdūt, sed magnitudinē ge  
 neraliter passionis, ut sunt quædam partes duobus uel  
 plurimis officijs aptatæ, quæ nūc omniū, nunc certorū  
 amputatione uexantur. Lingua etenim transuoratio  
 nis officiū sustinēs, uerba distinguere nō ualebit. Hæc  
 sunt cōmunes paralysios significationes: sed ob singu  
 larē partiū atq; particularū, quas supradiximus, com  
 muniter adprehensionē, specialiter locorū impedimēta  
 tractabimus. Superciliū igitur paralysi uitiatū laxius  
 propēdebit circa superius palpebrū, uel certe \* sustol  
 litur, ut etiā ipsum suspendat. Itē palpebrum superius  
 paralysi uitiatum laxius fit, atq; motu caret, & oculi  
 pupulā cōtegīt, \* uel è cōtrario extētū sustollitur, &  
 oculorū pupulam nudat. Item \* interius palpebrum  
 paralysi uitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in

\*sequitur, &amp;

\*perspiciuntur

\* plurimū par  
nus

Ατροφία.

\* Sequitur

Παράληψις.

Παράλυσις.

\*sustollitur

\*id fit, cum al  
 terū superciliū  
 quod sanū est,  
 agrū ad se tra  
 hit. Nā in Pa  
 ralyfi sana pars  
 agrā trahit, ut  
 in Spasmo, &  
 gra sanam.

\*inferius

semet uel exterius refunditur, & motu caret, atq; oculum non contegit. Sequitur etiā inuoluntarius lachrimarum fluor, quod est utrique palpebrorum uitio commune: Et si in risum uenerint egrotantes, contortum uel conductum simulant uultum. Oculorum uero tunice, siue \* membrana paralyti \* uitiata uisum impediunt latitudine facta pupularum, quæ passio uocatur mydriasis. \* Ac si conductione fuerit paralytis facta, angustior pupula fiet, cessante nutrimento, quæ passio appellatur phthisis. Lingua paralyti uitiata uocem non \* differit, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis uocem reddit, nunc amputatione facta, medio tempore, oppressis conatibus conticescit, demonstrata tamen uerbi intelligibili prolatione, nunc \* imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed \* discernantur ab ista passione qui forte ex alia causa uocem amiserint, cum neque colorem \* superficiē linguæ mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suæ mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti uitiata. Item odoramenti \* officium paralyti uitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab ijs, qui nariū uitio officiū odoris amiserunt, quod appellant oxenan: quod neque \* torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian uocant. Labium superius paralyti uitiatū inuertitur forinsecus, proditum magis cum risus aduenerit, aut locutio: conducitur enim cū sano inferiori. Itē \* potu sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidā caninum raptū esse dixerunt, nescij, sicut principaliter futuro docebimus schemate. Itē siagon paralyti \* uitiatū, siquidem nos musculum qui buccas colligat, dicere poterimus, condu

\*membrana

\*uitiata

Mydriasis.

\*At

\*dicit.

\*Auctor uide  
tur hic Para-  
lysin ex condu-  
ctione factam  
uocare, amif-  
sum mēbris sen-  
sum, ac motū,  
alimenti dese-  
ctu, quē paulo  
post nutrimen-  
ti desertionem  
appellat.

\* non articula-  
tam profert.

\* in oxena

Oxena.

\* imperfecto  
motu

\* discernuntur

\* \*superficies  
lingue

\* instrumentū

\* potu

Sicet.

\* uitiatus, sic  
quidem

conducitur aut laxatur. Vicinus deniq; oculus non ua-  
lebit perfectā facere reclusionē cōducto inferiore pal-  
pebro. Mentū paralyſi uitiatū amiſſo motu laxatur,  
aut uehementer ſuſtollitur. Fauces paralyſi uitiatæ  
trāſuorationis difficultatē faciunt. Gutturis ſummitas  
paralyſi uitiata, \* ſiue ut reuma, ſiue ut Græci bron-  
chos, mortem facit, & paruam tranſuorationis tuſſicu-  
lam: ſiquidem non perfectam eo tempore faciat indu-  
ctionem, ne ſuperet radicē linguæ, quā Græci epiglot-  
tida uocant: quo perfectō accepta\* cōuiuantur. Vide-  
bitur denique eius extantia plurimum relaxata. Sto-  
machum paralyſi uitiatum difficultas tranſuorandi\* ſe-  
quetur, uel omnino impoſſibilitas, unde etiam præſens  
periculū. Videbūtur etiā difficilia tranſuorantibus ac-  
cepta, ueluti acriora, aut immaturo tēpore\* comēſta:  
itē ſequitur præſocationis ſenſus cū frigore, in quacū-  
que eius parte fuerit paralyſis: illic nanq; etiā trāſuo-  
rata ſiſtūtur. Sed diſcernūtur ab ijs qui \* facilē para-  
lyſin ex difficultate tranſuorandi patiuntur. Siquidē  
etiā decoloratio nutrimentō ceſſante, ac frigus, etiā im-  
mobilitas faucium neceſſariō cōcurrunt. \* Itē hijs qui ex  
ſtomacho ſunt humores ſupradictis querelis ſi fuerint  
adfecti diſcernūtur, quod etiā dolore atq; feruore par-  
tiū uexantur. Si \* cœnū, uel eius ſummitas, paralyſi ui-  
tiatū, quod nos cōmune dicere poterimus, quod arte-  
riæ atq; ſtomacho interpoſitū uideatur, locorum gra-  
uedinem faciet, atque \* ſumpto cibo uel potu in præ-  
cordijs permanebunt, cum torpore ſenſuum, ac tumo-  
re manū, aliquando & crurū, atteſtante ſingultu &

Πύμα.

Βρίχαι.

\* quod uel arte-  
riam aſperam,  
uel Bronchos  
Græci uocant,  
forſē facit aut  
paruā cū diffi-  
cultate trāſpi-  
rationis tuſſi-  
culā: ſi quidem  
nō perfectā eo  
tēpore facit in-  
ductionē oper-  
culū ligulæ ſu-  
perpoſitum, ad  
radicē linguæ  
iacens, quod  
Græci

Επιγλωττις.

\* deglutient.

Κοινίον.

\* ſequi

\* colleſta

\* paralyſi ſimi-  
lem affectū ex

\* Item ab ijs qui ſupradictis querelis afficiuntur, ſi in ſtomacho humores fue-  
rint, diſcernuntur. \* Sic uocat muſculos laryngi & gula communes. \* Sum-  
pti cibi & potus in uia primordijs

inani



\* Alij tumo-  
 re, qui subito  
 eminet, & cō-  
 fidit: si timorē  
 legimus, absq;  
 ratione conce-  
 ptum intelligen-  
 mus, & in me-  
 lancholicis.  
 \* Pyloro  
 πύλωρ.  
 Νύστις.  
 \* uitiata  
 \* typhi locntero  
 τυφλίωτις.  
 \* possimus  
 \* nejis  
 Νυσίτις.  
 \* alimenti plu-  
 rimū accipere,  
 & parū excre-  
 mentorū facere.  
 Κώληρ.  
 Longano.  
 \* τῇ περιτομῇ,  
 & cum hamor-  
 rhoides, cōdy-  
 lumata, thymia, callosæ fis-  
 suræ, & id ge-  
 nus morbi scal-  
 pro tolluntur.  
 \* affectū pro-  
 ceedit rationa-  
 bilis pausa  
 \* Sed si  
 \* thrombos  
 Τρομβήσ.  
 \* compresso  
 Erasistratus.

inani \* timore. Aliqui etiam reuomunt accepta nulla  
 corruptione mutata. \* Perulo paralyti uitiato cibus  
 nulla digestionē mutatur, sed tanquam per insundibu-  
 lum ad inferiora descendit, & circum uentrem laxior  
 locus efficitur inferius, inflatiōq;: quæ per uentrem  
 egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque flui-  
 da. Nestide paralyti \* uitiato & \* typhlotero, quod  
 nos cæcum intestinum dicere \* poterimus, erunt ea  
 quæ per uentrem excluduntur plurima, & minus flui-  
 da. Videtur enim \* nesteuin cum naturam seruauerit,  
 & nullo fuerit morbo tentata, tunc \* plurimum ex-  
 crementorum acceptorum facere. Colo paralyti uitia-  
 to, inordinato motu, atque inuoluntario, stercora de-  
 scendūt, sine ulla humedatione, & cum fæctore maxi-  
 mo eorum fit egestio, sine ullo dolore. Longano cum  
 sphinctere atque podice paralyti uitiato, erit inuo-  
 luntaria egestio stercorum, nisi ex aliqua hoc fuerit  
 \* circumincisione \* confectum. Aliquando etiam præ-  
 cedit, uel certē egestionem stercorum sine tumore, &  
 aliqua simili causa fieri permittit. Vesica paralyti ui-  
 tiata inuoluntarius urinae exitus fit sine ullo dolore,  
 neque incisura, neque circuncisione antecedente: ali-  
 quando etiam per interualla prohibitus, uel paulatim  
 retardatus, aut omnino negatus: & sæpe etiam pube-  
 tenus extantia partium fit, extenta uesica. \* Sed ex  
 tumore, uel sanguinis gelati corpusculis, quæ Græci  
 \* trombos appellant, aut lapide, uel uulnere, difficultas  
 fuerit mictus, aut in toto negatio, discernitur, quod si-  
 ne dolore atque partium liuore, atque sanguinis mi-  
 ctu, apposita manu \* oppressa pectine urina in para-  
 lyti excludatur. Præterea etiam peritoneo paralyti  
 uitiato, ut Erasistratus ait, urina abstinetur, & neque  
 exclud



excluditur nisi adhibito catetheri. Non enim uesticæ *καυτήρ.*  
amēitus naturali consuetudine peritoneo \* imbuate *\* incumbente*  
opprimitur, neque \* concluditur ad exprimendum li- *comprimatur,*  
quorem \* radix uirilis paralyti uitiatus, multo maior *\* similiter cō-*  
aut minor efficitur, & nulla tentigine prouocatur. *trahitur*  
\* Seminales uix, quas Græci spermaticos poros uo- *\* colis*  
cant, paralyti uitiatur, si \* laxatione fuerit paralytis *\* Seminalibus*  
effeeta, sine ulla tentigine inuoluntarius fit seminis la- *vis uitiatis*  
psus, & uocatur hæc passio gonorrhœa, quam nos se- *πόροι σπέρμα-*  
minis lapsum dicimus. \* Ac si \* conclusionem fuerit pa- *τινός.*  
ralysis effeeta, iugis tentigo egrotantis sequetur, sine *\* solutione*  
ullo dolore, atque seminis lapsu, & uocatur hæc passio *τορρόσιον.*  
priapismus. Cruris paralyti uitiatum, aut \* conclusio- *\* At*  
ne breuius fit, aut extensione longius, ut plerique pu- *\* strictura*  
tent articulorum \* de locationem hic factam. Sed dis- *παραπλισμός.*  
cernitur hoc: siquidem cōcauitas atque \* distantia à *\* conductione,*  
loco motos, aut eieetos articulos sequitur. Est autem *ut pag. 312.*  
ratione credibile, cæterorum quoque interiorum sin- *\* luxationem*  
gula paralyti uitiari ut pulmonem, cor, uel discrimen *\* extantia à*  
thoracis atque uentris, quod Græci diaphragma uo- *loco*  
cant, aut \* hypozygon, uel splenem, aut iecur, præue- *\* tunicâ suc-*  
niri adprehensione mortem patientis, quæ sepe la- *cingentem co-*  
tent facta, cum non propria possint \* apprehensione *stas: τοτόδουμα*  
signari. Herophilus denique repetinam mortem nulla *vocauit: medi-*  
ex manifesta causa uenientem, fieri inquit paralyti *ci τὸ τὸν ὄρα*  
cordis. Erasistratus memorat paralyseos genus, & *nominant.*  
paradoxon appellat, quo ambulantes \* repente sistun- *\* signis pro-*  
tur, ut ambulare non possint, & tum rursus ambulare *priis indicari,*  
sinuntur. Est autem passio generaliter grauis, atque *& cognosci.*  
difficilis, sed grauior curatio fit, quoties toto sensu ca- *Herophilus.*  
ruerint partes, atque motu, & in corporibus iamdu- *Erasistratus.*  
dum debilibus, uel senibus, aut ex alio morbo præui- *\* hoc accidit*  
tiatis, *statibus sic mu-*  
*sculos distendē-*  
*tibus, ut breui*  
*spatio temporis*  
*in uti nō liceat*

tiatis, ut epilepsia, febre: item si plurimas tenuerit corporis partes, uel uitæ necessarias. De nominibus autem

\* impositi &  
attributis

\* singulatim

specialiter \* elogiatis paralytica passionis, ut mydriasis, phthisis, priapismo, gonorrhœa, & his similibus \* singula præscribemus. De cæteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem multi sectæ nostræ principes stricturam dixerunt, ob duritiam uitiatarum partium, atque

Mnaseas. siccitatem, & grauedinem, & torporem. Mnaseas uerò conductione factam paralyptin uocat. fieri quoque etiam

\* ait cœclusio-  
ne, ut pag. 317.

aliquando \* extensione, aliquando solutione. Nos uerò iuxta Sorani sententiam illam uocamus \* solutionem, cum plurimæ egestionis corporis fuerint uisæ.

Soranus.

\* solutione factam

\* Atenim

\* paralyptin ex

tensione factam

stricturam.

\* solutioni siue

laxationi: &

stricturæ siue

conclusioni.

\* Etenim manuum, uel pedum, & horum similibus \* extensione facta, nulla egestionis attestante, & in ligni similitudinem duratis partibus, stricturæ dicimus esse passionem. Quippe cum frigescere, & quadam rugatione crispari corpora, commune contrariis \* passionibus esse uideatur. Est tamen passio generaliter tardata, & accessionibus atque dimissionibus uariata, & superpositionibus ac lenientis, cuius prædata atque demonstrata significatione necessario curationem ordinamus. Mox igitur effecta paralyti, lucido loco, atque mediocriter calido locandi sunt ægrotantes, &

\* negato omni  
cibo

usque ad tertiam diem, permittentibus uiribus, \* abstinendi. Tunc, nisi uino fuerint pleni, uel cibo, mox

\* constitutæ

partes

\* lana limpi-

da

\* limpida la-

na, & ue succi-

da non est.

\* expressa

phlebotomandi: si copia fuerit, ex brachio: sin minus, ex qualibet parte patienti contraria, quo laquei constrictione, & phlebotomi diuisura in passione \* constituti non afficiantur. Si autem pleni fuerint cibo, alia die erunt phlebotomandi. Sed partes paralyti uitiatæ fricatione atque calefactionibus recurandæ, &

\* lanæ limpida ex oleo dulci atque calido \* expresse circunte

circuntegende, & fomento relaxande. Tum oris collutio permittenda, atque \* potu aque calide. Præ- \* potus  
 terea acceſſionum ac dimiſſionum diligentius tempora obſeruanda, quæ adprehenduntur ex ægrotantium pallore, nunc aucto, nunc minuto: uel ſenſu \* earundem \* affectarum  
 partium, qui plus aut minus inefſe uidetur: item ex motu uel immobilitate, aut grauedine & leuitate, aut frigore & ſeruore. Tunc diatriti tempore adhibenda perunctio ex oleo calido. Ora quoque ſouenda ex aqua mediocriter calida, & dandus cibus paruus ſorbilis, ut alica lota ex aqua calida inſuſa, aut oua. Ac ſi tranſuorationis & faucium partes paralyſi fuerint uitiatæ, erunt cucurbitæ obliquis partibus gutturis atque ceruicis apponendæ: tum cibus offerendus. Etenim extenſæ tranſuorationis officio facile ſeruire coguntur. Exinde donec paſſio declinet, alternis diebus dabimus cibus. Sequenti denique die poſt diatritum, abſtento ægro, cataplaſmatibus utemur ex polline lini ſeminis, & ſœnigræci. Tum alia die, niſi paſſio creuerit, patientibus locis cucurbitas \* inſigentes, ſcariſficabimus: \* affigentes  
 ac ſi plurimæ fuerint partes paſſione uitiatæ, cogen-  
 tibus magis, atque urgentibus, ordine præponimus curationem, uel iis locis, quæ facile poterunt ægrotos in periculum deuocare, aut ex quibus cæteris partibus facile poſſit curationis beneficium dari. Sic denique ſtomacho laxato plurima certè conlaxantur. \* Vtpo- \* Nam per-  
 te è contrario oppreſſus principalibus partibus cæte- petuò  
 ræ neceſſariò \* comprimuntur. Tunc cæteris trinis die- \* opprimuntur  
 bus, quas diatriton Græci uocauerunt, alias quoque partes cucurbita releuamus. Si ſiagon, uel mentum Σιαγών,  
 paralyſi fuerit uitiatum, erunt cucurbitæ temporibus inſigende, atque muſculis buccarum, uel ſub aurium  
 \* lamnis

\* *laminis* \* *laminis*. Ac si fauces fuerint uitiatæ, uel transuoratio-  
nis partes, prædictis utemur adiutoriis. Item manibus  
paralyfi uitiatas, erunt humeris uel eorum summutati-  
bus atque palis, & brachiorum musculis, aut cubito-  
rum nodis hæc adhibenda. Item cruribus paralyfi ui-

\* *femoris arti-*  
culis, quæ ver-  
tebræ, i. caput  
os femoris in-  
feritur coxæ  
acetabulo

\* *At si -*  
\* *teneritatis*  
\* *generalibus*

tiatis, \* uertebis atque genibus cucurbitæ infigendæ,  
quarum quæ partes non accipiunt usum, ut supercilia,  
labia, digiti, sanguisugis erunt releuandæ. \* Item si ni-  
miæ \* tenuitatis causa, aut usus difficultate, neque san-  
guisugarum morsum tolerare potuerint, ut in palpe-  
bris, uel lingua, præfecta uaporatione scarificamus,  
& \* generaliter cataplasmatibus utimur. Tunc si exe-  
gerit passio, secundo scarificamus, & spongiarum ua-  
poratione utimur, ex aqua & oleo solo expressis, uel  
ex oleo & decoctione lini seminis, atque scænigræci,  
uel hibisci, aut maluæ communis, uel agrestis. Iis uerò  
qui secundum linguam, uel transuorationis partes pa-  
ralysi fuerint uitiatas, tempore cataplasmatum, atque  
uaporationum, iubemus in os dari oleum calidum con-  
tinendum, uel aquam calidam, \* & oleum, aut mulsum.

\* *vel hydre-*  
\* *læum calidum*

\* *utimur*

Simul enim atque eodem tempore ex utraque parte  
uaporata uehementius relaxantur. Si uenter fuerit  
retentus, clystere \* utemur prius quàm partes cucur-  
bita releuemus, & primo ex aqua mulsa. Tum si oport-  
uerit, etiam diurnis diebus ex oleo calido iniectiones  
adhibemus. Si intestina, uel eorum uicinitas paralyfi  
fuerint uitiatas, ac si etiam urina fuerit retenta, adhi-  
bitis cæteris adiutoriis atque perfectis, encathismata  
sunt adhibenda. Tunc \* catatherismus faciendus, quo  
urina detrahatur, ac post detractionem oleum cali-  
dum iniiciendum, adnexo folliculo \* catathere, ex ea  
parte quæ cystophilos à Græcis est appellata, uel

Εγκάθισμα.  
\* *catheteris-*  
\* *mus*  
Κατάθεσι-  
µός.  
\* *catheteri*  
Κυστίφιλος.

otico

neret altiora, atq; corrumpat, & ossa cōtere bret, & propterea copiam fluentis humoris efficiat. Oportet igitur \* actionis tempore discernere curationem & in lenimento communem magis, hoc est re corporatiuam, quam Græci metasyncriticam uocant, adprobare, ut cum dolor fuerit in initio, adhuc nouam passionem iudicantes, quicquā destillari faciamus in has cauernas, constrictiuum medicamen, uel \* ex lana \* limpida summentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum, uel \* roseum oleum, uel acetum, & his similia. Utendum etiam requie corporis atque abstinentia, & silentio \* suo. Etenim officio accepta uoce aures necessario commouentur, & propterea maiores dolores efficiuntur. \* Ac si passio fuerit augmentis asperata, erit immittendum oleum calidum ac dulce, ac mollibus lanis prætegenda exteriora, atq; uicina. Locandi præterea ægrotantes calido in loco, & si dolor coegerit, phlebotomandi, atq; tertia die leui atq; sorbili cibo reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius ad-mouenda uaporatio tepidi \* uaporis, uel saccelli ex polline tenero confecti: tum cataplasmata laxatiua, & cum dolor sumpserit statum, erunt ad-mouenda sanguisugæ, quas hirudines appellant, circa fines auriculæ, hoc est, circulatim auditoriam cauernam habentes, cartilagine prætermissa, uel certe eius posteriora cucurbita admota scarificanda, adhibita uaporatione spongiarū calidarū. ipsam quoq; cauernā inuoluta lana per melotida oleo calido tinctā paulatim penetramus, atq; illic lana decrelicta ferramentum detrahimus. Tum declināte passione cerotaria \* apponimus, dantes uarium cibum & uinum: ac si humoris fuerit fluor, quem rheumatismum uocāt, eadem adhi-

\* accessionis  
Curatio

μετασυνκρίτις  
καὶ

\* in

\* non succida

\* rosaceum

\* somno

\* Et

\* liquoris

\* apponimus

## De Melancholia.

## Cap. VI.

Μελαγχολία.  
Μίλαν.  
Χολά.

\* sine

\* Eam

3i. Aenei.

\* eam

Μεταφρενον.  
ὠχρὸς. Iuridus.  
sublutens.

\* cœni ac luti  
vires olentis

**M**elancholia dicta, quod nigra fella ægrotantibus sæpe per uomitum ueniant: Græci enim nigrum melan uocauerunt, fel autē cholen appellant: & non ut pleriq; existimant, q; passionis causa uel generatio nigra sit fella, hoc enim est æstimantium magis quàm uidentium ueritatem, uel potius falsum, sicut in aliis ostēdimus. \* Nam Tullius atrā bilem dixit, uel luti altam iracundiā. Item Vergilius de Hercule alta iracundia moto, Hic uero, inquit, Alcide furiis exarserrat atro Felle dolor. Siquidem melancholici semper iracundi, tristes, & nulla penē hilaritate laxati esse uideantur. Frequētat autem in masculis magis, & medijs ætatibus: difficile uero in fœminis, uel alijs ætatibus. Eius antecedentes causæ sunt hæc, indigestio, iugis uomitus, post cibum medicamina pota, acres cibi, mæstitudo, timor, & cætera quæ \* etiā ualent sufficere. Sequuntur autem in ipsam pronos uel uenturos ea quæ etiam insanos fore denuntiant. Eos uero qui iam passionē possēsi sunt, animi anxietas atq; difficultas tenet, attestante mæstitudine, cum silentio, & odio conuiuentiū. Sequitur etiam nunc uiuendi, nunc moriendi cupido, cum suspicionibus uelut insidiarum sibi paratarū: item inanes fletus, atq; murmura uacua, & rursum hilaritas, magis post cibum, cū inflatione præcordiorum, & articulorum frigore, & leui sudore, atq; stomachi mordicatione, uel oris uentris usq; ad interscapulas, quas Græci metaphrenum uocauerunt: item capitis grauedo, color \* uiridis cum nigrore, aut subliuidus, corporis tenuitas, uirium debilitas, & accepti cibi corruptio cum ructationibus odoris tetri, hoc est fumosi, uel \* bromosi, uel piscosi: item intestino-

TUM


rum tormenta, uomitus, nunc inanis, nunc fellosus, uel ferrugineus, aut niger, & eiusdem qualitatis per podicem egestio. In lenimento uero eorum mitigatio, uel multorum depurgatio. Sed hanc passionem furoris speciem alij plurimi, atque Themisonis sectatores uocauerunt. Differt autem, siquidem in ista \* principaliter stomachus patitur, in furiosis uero caput. Et est communiter stricturae passio magna: aliquando etiā \* complexa, ob plurimas egestionem. Præterea est ex numero tardarum passionum, quas Græci chronias appellant. Curatio autem adhibenda est, quam furiosi ordinauimus. Non enim phlebotomiam probandam attestante dolore, aut hellebori purgationem, attestante passione, approbamus, sed exterius localia adiutoria, atque mitigatiua, siue \* corporatiua, magis ori uentris, atque \* inter scapulas sunt adhibenda. \* Ac si forte aut uomitus immodicus, aut egestio uentris coegerit, constrictiua sunt cataplasmata apponenda, uentri atque stomacho, ut ex palmulis thebaicis, infusis uino, uel pusca, admixtis etiā malis punicis, uel cydonijs, & ænanthe, & alumine scisso, aut hypocistide, uel acacia, siue galla, & his similibus. Dandi etiam cibi constrictiui, atque apponende eius uirtutis cucurbitæ: alia uero medicarum sectarum præfectis relinquamus, & ijs qui de furiosis scripserunt. \* Adhibent etiam bibenda medicamina, hoc est, aloën & absinthium iugiter, quæ propter uim suam, quam habent plurimam, excludenda probamus: quippe cum sit possibile ex consuetis perficere sanitatem.

\* Hinc liquet  
Methodicū uo-  
catam peculia-  
riter Melācho-  
liā fuisse Hy-  
pochondriacā.  
\* ex solutione

\* re corporatiua  
\* inter scapulis  
esse  
\* At

\* Prebēs etiā  
quidam.





# CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER SECVNDVS.

De Paralyfi.

Cap. I.



IN senibus atq; hyemis tempore frequen-  
tat hæc passio: difficile autem in calidis  
ætatibus. Ea generatur nūc ex occultis,  
nunc ex manifestis antecedētibus causis,

\* frequenter  
exercitata.

παράλυσις  
\* manifeste in  
segro & illa  
\* vocat

\* Paralyfis cō-  
ductione, i. mē-  
bro contracto  
fit, in ijs, qui-  
bus nervis trās-  
uersim omni-  
no praeclis, post  
vulnus cicatri-  
ce dura & ma-  
gna obduclū,  
mēbrū resolu-  
tur, & sic con-  
trahitur, ut di-  
stēdi nō possit:  
ἀγυῖος ἢ γρά-  
ci vocant. Fit autem extensione, cum laxatis nervis, membrum sensu ac motu pri-  
uatum, flaccidum, languidum, extensum, propendet, aut trahitur, infra pag. 317.  
crus paralyfi utiatum, conductione fieri brevius ait, extensione, longius, ut luxa-  
tionem factam quidam putent. \* nondum \* apoplexia correpti.

et quassatione, uulneratione, uel alia qualibet passio-  
ne: item frigore profundo, uimolentia, indigestione, lu-  
xuria, atque libidine & frequenti extenta: item medi-  
caminibus potis. Sed est uel fit paralyfis nunc sensus,  
nunc motus, nunc utriusq;. Et intelligitur sensus para-  
lysis, quoties seruens atque frigidū non sentiunt egro-  
tantes, \* manifeste partium naturalium motu: motus  
autem, quoties seruens atque frigidum sentiunt, motu  
partium carentes: utriusque uero paralyfin factā ac-  
cipimus, quoties motu atque sensu caruerint. Item  
hæc passio nunc partis est, nunc partium, nunc totius  
corporis, cum apprehensione mentis, quam apople-  
xiam \* uocantes. Acutarum passionum libris tradi-  
dimus. Sed plurimis species duæ paralyseos uisæ  
sunt: \* alia conductione effecta: alia extensione.  
Sequuntur autem pronos & decliues in passionem,  
hoc est, qui \* non repente fuerint\* percussi, si to-



tum corpus passurum denuntietur, ea quæ epilepsiam  
 uel furorem denuntiant: si uero ex parte, grauedo  
 partis passuræ \* sequetur, ut tardus motus, cum stupo \* sequitur, &  
 re, & pallore, & torpedo cum sensuum debilitate,  
 quæ nunc perscuerantia, nunc sine ratione recedētia  
 \* intelligūtur, ac rursus recurrētia. Dehinc effecta \* perspiciuntur  
 passione torpor atq; stupor gelidus partiū fit, \* plurimū par  
 mus & paruus, & nunc uoluntario motu cessante, nus  
 nunc ex parte manente: & nunc sensu amisso, nūc par  
 uo remanente: nunc etiam dolore attestante, obscura  
 to pulsu, & per profectum cessante cū pallore, & te  
 nuatione partis uitiatæ, nutrimēto cessante, quod Græ  
 ci atrophîā uocāt. \* Sequēte etiā rugatio cū adductio  
 ne partiū, uel extensione. Aliqui præterea paralipsin  
 uocauerūt eā quæ ex omni parte naturalē motū abstu  
 lit, paralysin eā quæ ex plurima parte uitiauit motū, παράλειψις.  
 quibus minime cōsentire maiorū autoritas iubet. Non  
 enim passionū differētiā ostēdūt, sed magnitudinē ge  
 neraliter passionis, ut sunt quædam partes duobus uel  
 plurimis officijs aptatæ, quæ nūc omniū, nunc certorū  
 amputatione uexantur. Lingua etenim transuoratio  
 nis officiū sustinēs, uerba distinguere nō ualebit. Hæc  
 sunt cōmunes paralyscos significationes: sed ob singu  
 larē partiū atq; particularū, quas supradiximus, com  
 munitè adprehensionē, specialiter locorū impedimēta  
 tractabimus. Superciliū igitur paralysi uitiatū laxius  
 propēdebit circa superius palpebrū, uel certe \* sustol  
 litur, ut etiā ipsum suspendat. Itē palpebrum superius  
 paralysi uitiatum laxius fit, atq; motu caret, & oculi  
 pupulā cōtegit, \* uel è cōtrario extētū sustollitur, &  
 oculorū pupulam nudat. Item \* interius palpebrum  
 paralysi uitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in \* inferius

Ατροφία.

\* Sequitur

Παράλειψις.

Παράλυσις.

\* sustollitur

\* id fit, cum al

terū superciliū

quod sanū est,

egriū ad se tra

hit. Nā in Pa

ralysi sana pars

egriū trahit, ut

in Spasmo, &amp;

gra sanam.

\* inferius

semet uel exterius refunditur, & motu caret, atq; oculum non contegit. Sequitur etiā inuoluntarius lachrimarum fluor, quod est utrique palpebrorum uitio commune: Et si in risum uenerint egrotantes, contortum uel conductum simulant uultum. Oculorum uero tunicae, siue \* membrana paralyti \* uitiata uisum impediunt latitudine facta pupularum, quae passio uocatur mydriasis. \* Ac si conductione fuerit paralytis facta, angustior pupula fiet, cessante nutrimento, quae passio appellatur phthisis. Lingua paralyti uitiata uocem non \* differit, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis uocem reddit, nunc amputatione facta, medio tempore, oppressis conatibus conticescit, demonstrata tamen uerbi intelligibili prolatione, nunc \* imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed \* discernantur ab ista passione qui forte ex alia causa uocem amiserint, cum neque colorem \* superficiē linguā mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suae mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti uitiata. Item odoramenti \* officium paralyti uitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab ijs, qui nariū uitio officiū odoris amiserunt, quod appellant ozænan: quod neque \* torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian uocant. Labium superius paralyti uitiatū inuertitur forinsecus, proditum magis cum risus aduenerit, aut locutio: conducitur enim cū sano inferiori. Itē \* potio sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidā caninum raptū esse dixerunt, nescij, sicut principaliter futuro docebi mus schemate. Itē si agon paralyti \* uitiatū, siquidem nos musculum qui buccas colligat, dicere poterimus, condu

\* membrana

\* uitiata

Mydriasis.

\* Ac

\* dicitur.

\* Auctor uidetur hic Paralytin ex conductione factam uocare, amissum mēbri sensum, ac motū, alimenti desertu, quē paulo post nutritionem appellat.

\* non articulationem profert.

\* in ozæna

Ozæna.

\* imperfecto motu

\* discernuntur

\* superficies lingue

\* instrumentū

\* potio

Scævop.

\* uitiatus, sic quidem

conducitur aut laxatur. Vicinus deniq; oculus non ua-  
lebit perfectā facere reclusionē cōducto inferiore pal-  
pebro. Mentū paralyſi uitiatū amiſſo motu laxatur,  
aut uehementer ſuſtollitur. Fauces paralyſi uitiatæ  
trāſuorationis difficultatē faciunt. Gutturis ſummūtas  
paralyſi uitiatæ, \* ſiue ut reuma, ſiue ut Græci bron-  
chos, mortem facit, & paruam tranſuorationis tuſſicu-  
lam: ſiquidem non perfectam eo tempore faciat indu-  
ctionem, ne ſuperet radicē linguæ, quā Græci epiglot-  
tida uocant: quo perfectō accepta\* cōuiuantur. Vide-  
bitur denique eius extantia plurimum relaxata. Sto-  
machum paralyſi uitiatum difficultas tranſuorandi\* ſe-  
quetur, uel omnino impoſſibilitas, unde etiam præſens  
periculū. Videbūtur etiā difficilia tranſuorantibus ac-  
cepta, ueluti acriora, aut immaturo tēpore\* comēſta:  
itē ſequitur præſocationis ſenſus cū frigore, in quacū-  
que eius parte fuerit paralyſis: illic nanq; etiā trāſuo-  
rata ſiſtūtur. Sed diſcernūtur ab ijs qui \* facilē para-  
lyſin ex difficultate tranſuorandi patiuntur. Siquidē  
etiā decoloratio nutrimentō ceſſante, ac frigus, etiā im-  
mobilitas faucium neceſſariō cōcurrit. \* Itē hijs qui ex  
ſtomacho ſunt humores ſupradictis querelis ſi fuerint  
adfecti diſcernūtur, quod etiā dolore atq; ſeruore par-  
tiū uexantur. Si \* cœnū, uel eius ſummūtas, paralyſi ui-  
tiatū, quod nos cōmune dicere poterimus, quod arte-  
riæ atq; ſtomacho interpoſitū uideatur, locorum gra-  
uedinem faciet, atque \* ſumpto cibo uel potu in præ-  
cordijs permanebunt, cum torpore ſenſuum, ac tumo-  
re manūū, aliquando & crurū, atteſtante ſingultu &

Πύμα.

Βρίχας.

\* quod uel arte-  
riam aſperam,  
uel Bronchon  
Græci uocant,  
forſē facit aut  
paruā cū diffi-  
cultate trāſpi-  
rationis tuſſi-  
culā: ſi quidem  
nō perfectā eo  
tēpore facit in-  
ductionē oper-  
culū ligulæ ſu-  
perpoſitum, ad  
radicē linguæ  
iacens, quod  
Græci

Επιγλωττις.

\* deglutinnt.

καινίρ.

\* ſequi  
\* collecta

\* paralyſi ſimī-  
lem affectū ex

\* Item ab ijs qui ſupradictis querelis afficiuntur, ſi in ſtomacho humores fue-  
rint, diſcernuntur, \* Sic uocat muſculos laryngi & gula communes. \* Sum-  
pti cibi & potus in via primordijs

inani

\* Alij tumore, qui subito  
 eminet, & cō-  
 fidit: si timorē  
 legimus, absq;  
 ratione conce-  
 ptum intelligen-  
 timus, & in me-  
 lancholici.  
 \* Pyloro  
 Πύλωρ.  
 Nestis.  
 \* uitiata  
 \* typhloentero  
 Τυφλόεντερ.  
 \* possumus  
 \* nejlis  
 Νεσίου.  
 \* alimenti plu-  
 rimū accipere,  
 & parū excre-  
 mentorū facere.  
 Κώλωρ.  
 Longano.  
 \* τῆ περιτομῆ,  
 ut cum hamor-  
 rhoides, cōdy-  
 lemata, thymia, callosæ fis-  
 suræ, & id ge-  
 nus morbi scal-  
 pro tolluntur.  
 \* affectū pro-  
 cedat rationa-  
 bili pausa  
 \* Sed si  
 \* thrombos  
 Τρομβός.  
 \* compresso  
 Erasistratus.

inani \* timore. Aliqui etiam reuomunt accepta nulla  
 corruptione mutata. \* Perulo paralyti uitiato cibus  
 nulla digestionē mutatur, sed tanquam per infundibu-  
 lum ad inferiora descendit, & circum uentrem laxior  
 locus efficitur inferius, inflatiōq; : quæ per uentrem  
 egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque flui-  
 da. Nestide paralyti \* uitiato & \* typhlotero, quod  
 nos cæcum intestinum dicere \* poterimus, erunt ea  
 quæ per uentrem excluduntur plurima, & minus flui-  
 da. Videtur enim \* nestuin cum naturam seruauerit,  
 & nullo fuerit morbo tentata, tunc \* plurimum ex-  
 crementorum acceptorum facere. Colo paralyti uitia-  
 to, inordinato motu, atque inuoluntario, stercora de-  
 scendūt, sine ulla humectatione, & cum fœtore maxi-  
 mo eorum fit egestio, sine ullo dolore. Longanone cum  
 sphinctere atque podice paralyti uitiato, erit inuo-  
 luntaria egestio stercorum, nisi ex aliqua hoc fuerit  
 \* circumincisione \* confectum. Aliquando etiam præ-  
 cedit, uel certè egestionem stercorum sine tumore, &  
 aliqua simili causa fieri permittit. Vesica paralyti ui-  
 tiata inuoluntarius urinae exitus fit sine ullo dolore,  
 neque incisura, neque circuncisione antecedente: ali-  
 quando etiam per interualla prohibitus, uel paulatim  
 retardatus, aut omnino negatus: & sæpe etiam pube-  
 tenus extantia partium fit, extenta uesica. \* Sed ex  
 tumore, uel sanguinis gelati corpusculus, quæ Græci  
 \* trombos appellant, aut lapide, uel uulnere, difficultas  
 fuerit mictus, aut in toto negatio, discernitur, quod si-  
 ne dolore atque partium liuore, atque sanguinis mi-  
 ctu, apposita manu \* oppressa peccine urina in para-  
 lyti excludatur. Præterea etiam peritoneo paralyti  
 uitiato, ut Erasistratus ait, urina abstinetur, & neque  
 exclud

excluditur nisi adhibito catetheri. Non enim uesicæ  
 ambitus naturali consuetudine peritoneo \* imbiente  
 opprimitur, neque \* concluditur ad exprimendum li-  
 quorem \* radix uirilis paralyti uitiatus, multo maior  
 aut minor efficitur, & nulla tentigine prouocatur.  
 \* Seminales uix, quas Græci spermaticos poros uo-  
 cant, paralyti uitiatae, si \* laxatione fuerit paralytis  
 effecta, sine ulla tentigine inuoluntarius fit seminis la-  
 psus, & uocatur hæc passio gonorrhœa, quam nos se-  
 minis labsum dicimus. \* Ac si \* conclusionem fuerit pa-  
 ralytis effecta, iugis tentigo ægrotantis sequetur, sine  
 ullo dolore, atque seminis lapsu, & uocatur hæc passio  
 priapismus. Crus paralyti uitiatum, aut \* conclusio-  
 ne breuius fit, aut extensione longius, ut plerique pu-  
 tent articulorum \* delocationem hic factam. Sed dis-  
 cernitur hoc: siquidem cōcauitas atque \* distanti à lo-  
 co motos, aut eiektos articulos sequitur. Est autem  
 ratione credibile, cæterorum quoque interiorum sin-  
 gula paralyti uitiari. ut pulmonem, cor, uel discrimen  
 thoracis atque uentris, quod Græci diaphragma uo-  
 cant, aut \* hypozygon, uel splenem, aut iecur, præue-  
 niri adprehensione mortem patientis, quæ sepe la-  
 tent facta, cum non propria possint \* apprehensione  
 signari. Herophilus denique repetitam mortem nulla  
 ex manifesta causa uenientem, fieri inquit paralyti  
 cordis. Erasistratus memorat paralyseos genus, &  
 paradoxon appellat, quo ambulantes \* repente sistun-  
 tur, ut ambulare non possint, & tum rursus ambulare  
 sinuntur. Est autem passio generaliter grauis, atque  
 difficilis, sed grauior curatio fit, quoties toto sensu ca-  
 ruerint partes, atque motu, & in corporibus iamdu-  
 dum debilibus, uel senibus, aut ex alio morbo præui-  
 tiatis,

κατὰ τὴν  
 \* incumbente  
 comprimatur,  
 \* similiter cō-  
 trahitur  
 \* colis  
 \* Seminalibus  
 uix uitiatis  
 πῶς οὐκ ἐκ  
 τῶν  
 \* solutione  
 τὴν ἀπόρροαν.  
 \* At  
 \* strictura  
 πρὸς τὴν ἀπόρροαν.  
 \* conductione,  
 ut pag. 312.  
 \* luxationem  
 \* extantia à  
 loco  
 \* tunica suc-  
 cingentem co-  
 stat: τὸ ὀδόνιον  
 vocant: medi-  
 ci τὸν σπλῆνα  
 nominant.  
 \* signis pro-  
 priis indicari,  
 & cognosci.  
 Herophilus.  
 Erasistratus.  
 \* hoc accidit  
 statibus sic mu-  
 sculos distendē-  
 tibus, ut breui  
 spatio temporis  
 uti nō liceat

tiatis, ut epilepsia, febre: item si plurimas tenuerit corporis partes, uel uitæ necessarias. De nominibus autem

\* impositi  
attributis

\* singulatim

specialiter \* elogiatis paralytica passionis, ut mydrisi, phthisi, priapismo, gonorrhœa, & his similibus \* singula præscribemus. De cæteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem multi sectæ nostræ principes stricturam dixerunt, ob duritiam uitiatarum partium, atque

Mnaseas. siccitatem, & grauedinem, & torporem. Mnaseas uero

\* ait cœclusio- aliquando \* extensione, aliquando solutione. Nos uerò iuxta Sorani sententiam illam uocamus \* solutionem, cum plurimæ egestionēs corporis fuerint uisæ.

Soranus.

\* solutione factam

\* Atenim

\* paralytin ex

tensione factā

Strictura.

\* solutioni siue

laxationi: &

stricturæ siue

conclusioni.

\* Etenim manuum, uel pedum, & horū similitum \* extensione facta, nulla egestionē attestante, & in ligni similitudinem duratis partibus, strictura dicimus esse passionem. Quippe cum frigescere, & quadam rugatione crispari corpora, commune contrariis \* passionibus esse uideatur. Est tamen passio generaliter tarda, & accessionibus atque dimissionibus uariata, & superpositionibus ac lenientis, cuius prædata atque demonstrata significatione necessario curationem ordinamus. Mox igitur effecta paralyti, lucido loco, atque mediocriter calido locandi sunt egrotantes, &

\* negato omni cibo

usque ad tertiam diem, permittentibus uiribus, \* abstinendi. Tunc, nisi uino fuerint pleni, uel cibo, mox phlebotomandi: si copia fuerit, ex brachio: sin minus, ex qualibet parte patienti contraria, quo laquei con-

\* constitutæ partes

\* lana limpi-

da

\* limpida la-

na, quæ succi-

da non est.

\* expressa

strictione, & phlebotomi diuisura in passione \* constituti non afficiantur. Si autem pleni fuerint cibo, alia die erunt phlebotomandi. Sed partes paralyti uitiatæ fricatione atque calefactionibus recurandæ, &

\* lanæ limpide ex oleo dulci atque calido \* expresse circunte

circuntegende, & fomento relaxande. Tum oris collutio permittenda, atque \* potu aque calide. Præ- \* potus  
 terea accessionum ac dimissionum diligentius tempora obseruanda, quæ adprehenduntur ex ægrotantium pallore, nunc aucto, nunc minuto: uel sensu \* earundem \* affectuum  
 partium, qui plus aut minus inesse uidetur: item ex motu uel immobilitate, aut grauedine & leuitate, aut frigore & feruore. Tunc diatriti tempore adhibenda perunctio ex oleo calido. Ora quoque fouenda ex aqua mediocriter calida, & dandus cibus paruus sordibilis, ut alica lota ex aqua calida infusa, aut oua. Ac si transuorationis & faucium partes paralyti fuerint uitiatæ, erunt cucurbitæ obliquis partibus gutturis atque ceruicis apponendæ: tum cibus offerendus. Etenim extente transuorationis officio facile seruire coguntur. Exinde donec passio declinet, alternis diebus dabimus cibum. Sequenti denique die post diatritum, abstento ægro, cataplasmatibus utemur ex polline lini seminis, & scæni græci. Tum alia die, nisi passio creuerit, patientibus locis cucurbitas \* infigentes, scarificabimus: \* affigentes  
 ac si plurimæ fuerint partes passionis uitiatæ, cogen-  
 tibus magis, atque urgentibus, ordine præponimus curationem, uel iis locis, quæ facile poterunt ægrotos in periculum deuocare, aut ex quibus cæteris partibus facile possit curationis beneficium dari. Sic denique stomacho laxato plurima certè conlaxantur. \* Vtpote \* Nam per-  
 te è contrario oppressis principalibus partibus cæte-  
 re necessariò \* comprimuntur. Tunc cæteris trinis die- \* petuò  
 bus, quas diatriton Græci uocauerunt, alias quoque partes cucurbita releuamus. Si siagon, uel mentum *Σιαγών*  
 paralyti fuerit uitiatum, erunt cucurbitæ temporibus infigendæ, atque musculis buccarum, uel sub aurium  
 \* lamnis



\* *laminis* \* *lamnis*. Ac si fauces fuerint uitiatae, uel transuoratio-  
nis partes, praedictis utemur adiutoriis. Item manibus  
paralyti uitiatis, erunt humeris uel eorum summutati-  
bus atque palis, & brachiorum musculis, aut cubito-  
rum nodis haec adhibenda. Item cruribus paralyti ui-  
tiatis, \* uertebreis atque genibus cucurbitae infigendae,  
quarum quae partes non accipiunt usum, ut supercilia,  
labia, digiti, sanguisugis erunt releuandae. \* Item si ni-  
miæ \* tenuitatis causa, aut usus difficultate, neque san-  
guisugarum morsum tolerare potuerint, ut in palpe-  
bris, uel lingua, praefecta uaporatione scarificamus,  
\* At si -  
\* teneritatis  
\* generalibus  
& \* generaliter cataplasmatibus utimur. Tunc si exe-  
gerit passio, secundo scarificamus, & spongiarum ua-  
poratione utimur, ex aqua & oleo solo expressis, uel  
ex oleo & decoctione lini seminis, atque scenigræci,  
uel hibisci, aut maluae communis, uel agrestis. Iis uero  
qui secundum linguam, uel transuorationis partes pa-  
ralysi fuerint uitiati, tempore cataplasmatum, atque  
uaporationum, iubemus in os dari oleum calidum con-  
tinendum, uel aquam calidam, \* & oleum, aut mulsam.  
Simul enim atque eodem tempore ex utraque parte  
uaporata uehementius relaxantur. Si uenter fuerit  
retentus, chystere \* utemur prius quam partes cucur-  
bita releuemus, & primo ex aqua mulsam. Tum si oportuerit,  
etiam diurnis diebus ex oleo calido iniectiones  
adhibemus. Si intestina, uel eorum uicinitas paralyti  
fuerint uitiata, ac si etiam urina fuerit retenta, adhi-  
bitis cæteris adiutoriis atque perfectis, encathismata  
sunt adhibenda. Tunc \* catatherismus faciendus, quo  
urina detrahatur, ac post detractionem oleum cali-  
dum iniiciendum, adnexo folliculo \* catathere, ex ea  
parte quae cystophilos à Græcis est appellata, uel  
otico

Εγκάθισμα.  
\* catheteris-  
mus  
Καταθήκη-  
μῖς.  
\* catheteri  
Κυστίφιλον.



neret altiora, atq; corrumpat, & ossa cōtere bret, & propterea copiam fluentis humoris efficiat. Oportet igitur \* actionis tempore discernere curationem & in lenimento communem magis, hoc est recorporatiuam, quam Græci metasyncriticam uocant, adprobare, ut cum dolor fuerit in initio, adhuc nouam passionem iudicantes, quicquā destillari faciamus in has cauernas, constrictiuum medicamen, uel \* ex lana \* limpida sumentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum, uel \* roseum oleum, uel acetum, & his similia. Utendum etiam requie corporis atque abstinentia, & silentio \* suo. Etenim officio accepta uoce aures necessario commouentur, & propterea maiores dolores efficiuntur, \* Ac si passio fuerit augmentis asperata, erit immittendum oleum calidum ac dulce, ac mollibus lanis prætegenda exteriora, atq; uicina. Locandi præterea ægotantes calido in loco, & si dolor coegerit, phlebotomandi, atq; tertia die leui atq; sorbili cibo reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius ad-mouenda uaporatio tepidi \* uaporis, uel saccelli ex polline tenero confecti: tum cataplasmata laxatiua, & cum dolor sumpserit statum, erunt ad-mouendæ sanguisugæ, quas hirudines appellant, circa fines auriculæ, hoc est, circulatim auditoriam cauernam habentes, cartilagine prætermissa, uel certe eius posteriora cucurbita admota scarificanda, adhibita uaporatione spongiarū calidarū. ipsam quoq; cauernā inuoluta lana per melotida oleo calido tinctā paulatim penetramus, atq; illic lana derelicta ferramentum detrahimus. Tum declināte passione cerotaria \* apponemus, dantes uarium cibum & uinum: ac si humoris fuerit fluor, quem rheumatismum uocāt, eadem adhi-

\* accessionis  
Curatio

μῆτασυνκρίτις  
καὶ

\* in

\* non succida

\* rosaceum

\* somno

\* ut

\* liquoris

\* apponimus

## De Melancholia.

Cap. VI.

Μελαγχολία.  
Μίλαν.  
Μελί.

\* sint

\* Eam

Si Aenci.

\* eam

Μεταφρενον.  
Μεγες. Iuridus.  
sublutens.

\* cœni ac luti  
virus olentis

**M**ELANCHOLIA dicta, quod nigra fella egrotantibus sæpe per uomitum ueniant: Græci enim nigrum melan uocauerunt, fel autē cholen appellant: & non ut pleriq; existimant, q; passionis causa uel generatio nigra\* sit fella, hoc enim est æstimantium magis quàm uidentium ueritatem, uel potius falsum, sicut in aliis ostēdimus.\* Nam Tullius atrā bilem dixit, ueluti altam iracundiā. Item Vergilius de Hercule alta iracundia moto, Hic uero, inquit, Alcide furiis exarserrat atro Felle dolor. Siquidem melancholici semper iracundi, tristes, & nulla penè hilaritate laxati esse uideantur. Frequētat autem in masculis magis, & medijs ætatibus: difficile uero in fœminis, uel alijs ætatibus. Eius antecedentes causæ sunt hæc, indigestio, iugis uomitus, post cibum medicamina pota, acres cibi, mæstitudo, timor, & cætera quæ\* etiā ualent sufficere. Sequuntur autem in ipsam pronos uel uenturos ea quæ etiam insanos fore denuntiant. Eos uero qui iam passionē possesi sunt, animi anxietas atq; difficultas tenet, attestante mæstitudine, cum silentio, & odio conuiuentiū. Sequitur etiam nunc uiuendi, nunc moriendi cupido, cum suspicionibus uelut insidiarum sibi paratarū: item inanes fletus, atq; murmura uacua, & rursum hilaritas, magis post cibum, cū inflatione præcordiorum, & articulorum frigore, & leui sudore, atq; stomachi mordicatione, uel oris uentris usq; ad interseapulas, quas Græci metaphrenum uocauerunt: item capitis grauedo, color\* uiridis cum nigrore, aut subliuidus, corporis tenuitas, uirium debilitas, & accepti cibi corruptio cum ructationibus odoris tetri, hoc est fumosi, uel\* bromosi, uel piscosi: item intestino-

rum tormenta, uomitus, nunc inanis, nunc fellofus, uel ferrugineus, aut niger, & eiusdem qualitatis per podicem egestio. In lenimento uero eorum mitigatio, uel multorum depurgatio. Sed hanc passionem furoris speciem alij plurimi, atque Themisonis sectatores uocauerunt. Differt autem, siquidem in ista \* principaliter stomachus patitur, in furiosis uero caput. Et est communiter stricturae passio magna: aliquando etiā \* complexa, ob plurimas egestionem. Præterea est ex numero tardarum passionum, quas Græci chronias appellant. Curatio autem adhibenda est, quam furiosis ordinauimus. Non enim phlebotomiam probandam attestante dolore, aut hellebore purgationem, attestante passione, approbamus, sed exterius localia adiutoria, atque mitigatiua, siue \* corporatiua, magis ori uentris, atque \* inter scapulas sunt adhibenda. \* Ac si forte aut uomitus immodicus, aut egestio uentris coegerit, constrictiua sunt cataplasinata apponenda, uentri atque stomacho, ut ex palmulis thebaicis, infusis uino, uel pusca, admixtis etiā malis punicis, uel cydonijs, & ænanthe, & alumine scisso, aut hypocistide, uel acacia, siue galla, & his similibus. Dandi etiam cibi constrictiui, atque apponende eius uirtutis cucurbitæ: alia uero medicarum sectarum præfectis relinquamus, & ijs qui de furiosis scripserunt. \* Adhibent etiam bibenda medicamina, hoc est, aloën & absinthium iugiter, quæ propter uim suam, quam habent plurimam, excludenda probamus: quippe cum sit possibile ex consuetis perficere sanitatem.

\* Hinc liquet Methodicis uocatum peculiariter Melancholicam fuisse Hypochondriacam. \* ex solutione

\* recuperatiua \* inter scapulis esse \* Al

\* Prebent etiā quidam.

# CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER SECVNDVS.

De Paralyfi.

Cap. I.



\* frequenter exercitata.

παράλυσις

\* manifeste in

tegro & illa jo

\* νόσος

\* Paralysis cō

ductione, i. mē-

bro contracto

fit, in ijs, qui-

bus nervis trās-

uersim omni-

nopræcis, post

vulnus cicatri-

ce dura & ma-

gna obductū,

mēbrū resolu-

tur, & sic con-

trahitur, ut di-

stēdi nō possit:

ἀγυλῶσις gra-

ci vocant. Fit autem extensione, cum laxatis nervis, membrum sensu ac motu pri-

uatum, flaccidum, languidum, extensum, propendet, aut trahitur, infra pag. 317.

crus paralyfi utiatum, conductione fieri brevius ait, extensione, longius, ut luxa-

tionem faciā quidam putent. \* nondum \* apoplexia correpti.

N senibus atq; hyemis tempore frequen-  
tat hæc passio: difficile autem in calidis  
ætatibus. Ea generatur nūc ex occultis,  
nunc ex manifestis antecedētibus causis,

ut quassatione, uulneratione, uel alia qualibet passio-  
ne: item frigore profundo, uimolentia, indigestione, lu-

xuria, atque libidine \* frequenti extenta: item medi-

caminiibus potis. Sed est uel fit paralysis nunc sensus,

nunc motus, nunc utriusq;. Et intelligitur sensus para-

lysis, quoties seruens atque frigidū non sentiunt agro-

tantes, \* manifeste partium naturalium motu: motus

autem, quoties seruens atque frigidum sentiunt, motu

partium carentes: utriusque uero paralyfin factā ac-

cipimus, quoties motu atque sensu caruerint. Item

hæc passio nunc partis est, nunc partium, nunc totius

corporis, cum apprehensione mentis, quam apople-

xiam \* uocantes. Acutarum passionum libris tradi-

dimus. Sed plurimis species duæ paralyseos uise

sunt: \* alia conductione effecta: alia extensione.

Sequuntur autem pronos & decliues in passionem,

hoc est, qui \* non repente fuerint \* percussi, si to-

tius

tum

tum corpus passurum denuntietur, ea quæ epilepsiam  
 uel furorem denuntiant: si uero ex parte, grauedo  
 partis passuræ \* sequetur, ut tardus motus, cum stupore, & pallore, & torpedo cum sensuum debilitate,  
 quæ nunc perscuerantia, nunc sine ratione recedētia  
 \* intelliguntur, ac rursus recurrētia. Dehinc effecta  
 passione torpor atq; stupor gelidus partiū fit, \* plurimus  
 & paruus, & nunc uoluntario motu cessante,  
 nunc ex parte manente: & nunc sensu amisso, nūc par  
 uo remanente: nunc etiam dolore attestante, obscura-  
 to pulsu, & per proflutum cessante cū pallore, & te-  
 nuatione partis uitiatæ, nutrimento cessante, quod Gre-  
 ci atrophiam uocāt. \* Sequēte etiā rugatio cū adductio  
 ne partiū, uel extensione. Aliqui præterea paralipsin  
 uocauerūt eā quæ ex omni parte naturalē motū abstu-  
 lit, paralysin eā quæ ex plurima parte uitiauit motū,  
 quibus minime cōsentire maiorū autoritas iubet. Non  
 enim passionū differētiā ostēdūt, sed magnitudinē ge-  
 neraliter passionis, ut sunt quædam partes duobus uel  
 plurimis officijs aptatæ, quæ nūc omnium, nunc certorū  
 amputatione uexantur. Lingua etenim transuoratio-  
 nis officiū sustinēs, uerba distinguere nō ualebit. Hæc  
 sunt cōmunes paralysicos significationes: sed ob singu-  
 larē partiū atq; particularū, quas supradiximus, com-  
 munitè adprehensionē, specialiter locorū impedimēta  
 tractabimus. Superciliū igitur paralysi uitiatū laxius  
 propēdebit circa superius palpebrū, uel certe \* sustol-  
 litur, ut etiā ipsum suspendat. Itē palpebrum superius  
 paralysi uitiatum laxius fit, atq; motu caret, & oculi  
 pupulā cōtegit, \* uel è cōtrario extētū sustollitur, &  
 oculorum pupulam nudat. Item \* interius palpebrum  
 paralysi uitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in

\*sequitur. &amp;

\*perspiciuntur

\* plurimū par-  
uus

Ατροφία.

\* Sequitur

Παράληψις.

Παράλυσις.

\*sustollitur

\*id fit, cum al-  
terū superciliū  
quod sanū est,  
agrū ad se tra-  
hit. Nā in Pa-  
ralysi sana pars  
agrū trahit, ut  
in Spasmo, e-  
gra sanam.

\*inferius

semet uel exterius refunditur, & motu caret, atq; oculum non contegit. Sequitur etiā inuoluntarius lachrimarum fluor, quod est utrique palpebrarum uitio commune: Et si in risum uenerint egrotantes, contortum uel conductum simulant uultum. Oculorum uero tunica, siue \* membrana paralyti \* uitiata uisum impediunt latitudine facta pupularum, quæ passio uocatur mydriasis. \* Ac si conductione fuerit paralyti facta, angustior pupula fiet, cessante nutrimento, quæ passio appellatur phthisis. Lingua paralyti uitiata uocem non \* differit, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis uocem reddit, nunc amputatione facta, medio tempore, oppressis conatibus conticescit, demonstrata tamen uerbi intelligibili prolatione, nunc \* imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed \* discernantur ab ista passione qui forte ex alia causa uocem amiserint, cum neque colorem \* superficiē linguæ mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suæ mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti uitiata. Item odoramenti \* officium paralyti uitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab ijs, qui nariū uitio officiū odoris amiserunt, quod appellant ozænan: quod neque \* torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian uocant. Labium superius paralyti uitiatū inuertitur forinsecus, proditum magis cum risus aduenerit, aut locutio: conducitur enim cū sano inferiori. Itē \* poto sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidā caninum raptū esse dixerunt, nescij, sicut principaliter futuro docebimus schemate. Itē siagon paralyti \* uitiatū, siquidem nos musculum qui buccas colligat, dicere poterimus, condu

\*membrana

\*uitiata

Mydriasis.

\*Ac

\*diors.

\*Auctor uide  
tur hic Para-  
lysin ex condu-  
ctione factam  
uocare, amissi-  
sum membri sen-  
sum, ac motū,  
alimenti defe-  
ctu, quē paulo  
post nutrimen-  
ti desertionem  
appellat.

\* non articula-  
tam profert.

\* In ozæna

Ozæna.

\* imperfecto  
motu

\*discernuntur

\*superficies  
linguæ

\*instrumentū

\*poto

Saxony.

\* uitiatus, sic  
quidem

conducitur aut laxatur. Vicinus deniq; oculus non ua-  
lebit perfectā facere reclusionē cōducto inferiore pal-  
pebro. Mentū paralyſi uitiatū amiſſo motu laxatur,  
aut uehementer ſuſtollitur. Fauces paralyſi uitiatæ  
trāſuorationis difficultatē faciunt. Gutturis ſummitas  
paralyſi uitiata, \* ſiue ut reuma, ſiue ut Græci bron-  
chos, mortem facit, & paruam tranſuorationis tuſſicu-  
lam: ſiquidem non perfectam eo tempore faciat indu-  
ctionem, ne ſuperet radicē linguæ, quā Græci epiglot-  
tida uocant: quo perfectō accepta\* cōuiuantur. Vide-  
bitur denique eius extantia plurimum relaxata. Sto-  
machum paralyſi uitiatum difficultas tranſuorandi\* ſe-  
quetur, uel omnino impoſſibilitas, unde etiam præſens  
periculū. Videbūtur etiā difficilia tranſuorantibus ac-  
cepta, ueluti acriora, aut immaturo tēpore\* comesta:  
itē ſequitur præſocationis ſenſus cū frigore, in quacū-  
que eius parte fuerit paralyſis: illic nanq; etiā trāſuo-  
rata ſiſtūtur. Sed diſcernūtur ab ijs qui \* ſacile para-  
lyſin ex difficultate tranſuorandi patiuntur. Siquidē  
etiā decoloratio nutrimenti ceſſante, ac frigus, etiā im-  
mobilitas faucium neceſſariō cōcurrit. \* Itē hijs qui ex  
ſtomacho ſunt humores ſupradictis querelis ſi fuerint  
adfecti diſcernūtur, quod etiā dolore atq; ſeruore par-  
tiū uexantur. Si \* cœnū, uel eius ſummitas, paralyſi ui-  
tiatū, quod nos cōmune dicere poterimus, quod arte-  
riæ atq; ſtomacho interpoſitū uideatur, locorum gra-  
uedinem faciet, atque \* ſumpto cibo uel potu in præ-  
cordijs permanebunt, cum torpore ſenſuum, ac tūmo-  
re manuū, aliquando & crurū, atteſtante ſingultu &

Πύμα.

Ερίγχοι.

\* quod uel arte-  
riam aſperam,  
uel Bronchon  
Græci uocant,  
fortē facit aut  
paruā cū diffi-  
cultate trāſpi-  
rationis tuſſi-  
culā: ſi quidem  
nō perfectā eo  
tēpore facit in-  
ductionē oper-  
culū ligulæ ſu-  
perpoſitum, ad  
radicē linguæ  
iacens, quod  
Græci

Επίγλωττις.

\* deglutiant.

Καινίς.

\* ſequi

\* collecta

\* paralyſi ſimi-  
lem affectū ex

\* Item ab ijs qui ſupradictis querelis afficiuntur, ſi in ſtomacho humores fue-  
rint, diſcernuntur, \* Sic uocat muſculos laryngi & gula communes. \* Sum-  
pti cibi & potus in via primordijs

inani



• Alij tumore, qui subito eminet, & confidit: si timorē legimus, absque ratione conceptum intelligimus, ut in melancholici.  
 \* Pyloro  
 Πύλω.  
 Νέστις.  
 \* uitata  
 \* typhlotero  
 Τυφλότερον.  
 • possumus  
 \* nejis  
 Νέστις.  
 • alimenti plurimum accipere, & parum excrementorum facere.  
 Κώλον.  
 Longano.  
 \* τὴν περιτομήν, ut cum hamorrhoides, cœdylomata, thymia, callosae fistulae, & id genus morbi scalpro tolluntur.  
 \* affectum procedit rationali pausa  
 \* Sed si  
 \* thrombos  
 Τρομβός.  
 \* compresso  
 Ερασιστράτου.

inani \* timore. Aliqui etiam reuomunt accepta nulla corruptione mutata. \* Perulo paralyti uitato cibus nulla digestionem mutatur, sed tanquam per infundibulum ad inferiora descendit, & circum uentrem laxior locus efficitur inferius, inflatioque: quae per uentrem egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque fluida. Nestide paralyti \* uitato & \* typhlotero, quod nos caecum intestinum dicere \* poterimus, erunt ea quae per uentrem excluduntur plurima, & minus fluida. Videtur enim \* nesteuin cum naturam seruauerit, & nullo fuerit morbo tentata, tunc \* plurimum excrementorum acceptorum facere. Colo paralyti uitato, inordinato motu, atque inuoluntario, stercora descendunt, sine ulla humectatione, & cum faetore maximo eorum fit egestio, sine ullo dolore. Longanone cum sphinctere atque podice paralyti uitato, erit inuoluntaria egestio stercorum, nisi ex aliqua hoc fuerit \* circumcissione \* confectum. Aliquando etiam praecedat, uel certe egestionem stercorum sine tumore, & aliqua simili causa fieri permittit. Vesica paralyti uitata inuoluntarius urinae exitus fit sine ullo dolore, neque incisura, neque circumcissione antecedente: aliquando etiam per interualla prohibitus, uel paulatim retardatus, aut omnino negatus: & saepe etiam pubertus extantia partium fit, extenta uesica. \* Sed ex tumore, uel sanguinis gelati corpusculus, quae Graeci \* trombos appellant, aut lapide, uel uulnere, difficultas fuerit mixtus, aut in toto negatio, discernitur, quod si ne dolore atque partium liuore, atque sanguinis mixtu, apposita manu \* oppressa pectine urina in paralyti excludatur. Praeterea etiam peritoneo paralyti uitato, ut Erasistratus ait, urina abstinetur, & neque exclud

excluditur nisi adhibito catetheri. Non enim uestice  
 amōitus naturali consuetudine peritoneo \* imbuyente  
 opprimitur, neque \* concluditur ad exprimendum li-  
 quorem \* radix uirilis paralyſi uitiatus, multo maior  
 aut minor efficitur, & nulla tentigine prouocatur.  
 \* Seminales uix, quas Græci ſpermaticos poros uo-  
 cant, paralyſi uitiatæ, ſi \* laxatione fuerit paralyſis  
 effecta, ſine ulla tentigine inuoluntarius fit ſeminis la-  
 pſus, & uocatur hæc paſſio gonorrhœa, quam nos ſe-  
 minis lapſum dicimus. \* Ac ſi \* concluſione fuerit pa-  
 ralyſis effecta, iugis tentigo ægrotantis ſequetur, ſine  
 ullo dolore, atque ſeminis lapſu, & uocatur hæc paſſio  
 priapiſmus. Crus paralyſi uitiatum, aut \* concluſio-  
 ne breuius fit, aut extenſione longius, ut plerique pu-  
 tent articulorum \* delocationem hic factam. Sed diſ-  
 cernitur hoc: ſiquidem cōcauitas atque \* diſtanti à lo-  
 co motos, aut eiectos articulos ſequitur. Eſt autem  
 ratione credibile, cæterorum quoque interiorum ſin-  
 gula paralyſi uitiari ut pulmonem, cor, uel diſcrimen  
 thoracis atque uentris, quod Græci diaphragma uo-  
 cant, aut \* hypozygon, uel ſplenem, aut iecur, præue-  
 niri adprehensione mortem patientis, quæ ſepe la-  
 tent facta, cum non propria poſſint \* apprehensione  
 ſignari. Herophilus denique repetitam mortem nulla  
 ex manifeſta cauſa uenientem, fieri inquit paralyſi  
 cordis. Eraſiſtratus memorat paralyſeos genus, &  
 paradoxon appellat, quo ambulantes \* repente ſiſtun-  
 tur, ut ambulare non poſſint, & tum rurſum ambulare  
 ſiſuntur. Eſt autem paſſio generaliter grauis, atque  
 difficilis, ſed grauior curatio fit, quoties toto ſenſu ca-  
 ruerint partes, atque motu, & in corporibus iamdu-  
 dum debilibus, uel ſenibus, aut ex alio morbo præui-  
 tiatis,

κατὰ τὴν.  
 \* incumbente  
 comprimitur,  
 \* ſimiliter, cō-  
 trahitur  
 \* colis  
 \* Seminalibus  
 uix uitiatis  
 πῶς οὐκ ἀναγκα-  
 ρίον.  
 \* ſolutione  
 τὸν πῶς οὐκ.  
 \* Ac  
 \* ſtrictura  
 πῶς οὐκ ἀναγκα-  
 ρίον.  
 \* conduſione,  
 ut pag. 312.  
 \* luxationem  
 \* extantia à  
 loco  
 \* tunica ſuc-  
 cingentem co-  
 ſtat: τὸν πῶς οὐκ  
 vocant: medi-  
 ca τὸν πῶς οὐκ  
 nominant.  
 \* ſignis pro-  
 priis indicari,  
 & cognosci.  
 Herophilus.  
 Eraſiſtratus.  
 \* hoc accide-  
 ſtatibus ſic mu-  
 ſculos diſtendē-  
 tibus, ut breui  
 ſpatio temporis  
 ut nō liceat

tiatis, ut epilepsia, febre: item si plurimas tenuerit corporis partes, uel uitæ necessarias. De nominibus autem

\* impositi & attributis

\* singulati

\* specialiter \* elogiatis paralytica passionis, ut mydrisi, phthisi, priapismo, gonorrhœa, & his similibus \* singula præscribemus. De cæteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem multi sectæ nostræ principes stricturam dixerunt, ob duritiam uitiatarum partium, atque

*Mnaseas*. siccitatem, & grauedinem, & torporem. *Mnaseas* uero conductione factam paralyptin uocat. fieri q; etiam

\* ait cœclusio- ne, vi pag. 317.

\* aliquando \* extensione, aliquando solutione. Nos uero iuxta Sorani sententiam illam uocamus \* solutionem, cum plurimæ egestionis corporis fuerint uisæ.

*Soranus*.

\* solutione factam

\* Etenim manuum, uel pedum, & horum similitum \* extensione facta, nulla egestionis attestante, & in ligni

\* Atenim

\* paralyptin extensione facta

strictura.

similitudinem: duratis partibus, strictura dicimus esse passionem. Quippe cum frigescere, & quadam rugatione crispari corpora, commune contrariis \* passio-

\* solutioni siue

laxationi: & strictura siue

conclusioni.

nibus esse uideatur. Est tamen passio generaliter tarda, & accessionibus atque dimissionibus uariata, & superpositionibus ac lenimentis, cuius prædata atque

demonstrata significatione necessario curationem ordinamus. Mox igitur effecta paralypti, lucido loco, atque mediocriter calido locandi sunt ægrotantes, &

\* negato omni cibo

usque ad tertiam diem, permittentibus uiribus, \* abstinendi. Tunc, nisi uino fuerint pleni, uel cibo, mox

\* constitutæ partes

\* lana limpidâ

da

\* limpida lana, uae succi-

da non est.

\* expressa

phlebotomandi: si copia fuerit, ex brachio: sin minus, ex qualibet parte patienti contraria, quo laquei con-

strictione, & phlebotomi diuisura in passione \* constituti non afficiantur. Si autem pleni fuerint cibo,

alia die erunt phlebotomandi. Sed partes paralypti uitiatæ fricatione atque calefactionibus recurandæ, &

\* lanæ limpida ex oleo dulci atque calido \* expressæ

circunte

circuntegende, & fomento relaxande. Tum oris col-  
 lutio permittenda, atque \* potu aque calide. Præ- \* potus  
 terea acceſſionum ac dimiſſionum diligentius tempo-  
 ra obſeruanda, quæ adprehenduntur ex ægrotantium  
 pallore, nunc aucto, nunc minuto: uel ſenſu \* earundem \* affectuum  
 partium, qui plus aut minus ineſſe uidetur: item ex  
 motu uel immobilitate, aut grauedine & leuitate, aut  
 frigore & ſeruore. Tunc diatriti tempore adhiben-  
 da perunctio ex oleo calido. Ora quoque ſouenda ex  
 aqua mediocriter calida, & dandus cibus paruus ſor-  
 bilis, ut alica lota ex aqua calida infuſa, aut oua. Ac ſi  
 tranſuorationis & faucium partes paralyſi fuerint ui-  
 tiatæ, erunt cucurbitæ obliquis partibus gutturis atque  
 ceruicis apponendæ: tum cibus offerendus. Etenim ex-  
 tentæ tranſuorationis officio facile ſeruire coguntur.  
 Exinde donec paſſio declinet, alternis diebus dabimus  
 cibum. Sequenti denique die poſt diatritum, abſtento  
 ægro, cataplaſmatibus utemur ex polline lini ſeminis,  
 & ſcænigræci. Tum alia die, niſi paſſio creuerit, pa-  
 tientibus locis cucurbitas \* inſigentes, ſcariſficabimus: \* affigentes  
 ac ſi plurimæ fuerint partes paſſione uitiatæ, cogen-  
 tibus magis, atque urgentibus, ordine præponimus cu-  
 rationem, uel iis locis, quæ facile poterunt ægrotos in  
 periculum deuocare, aut ex quibus cæteris partibus  
 facile poſſit curationis beneficium dari. Sic denique  
 ſtomacho laxato plurima certè conlaxantur. \* Vtpo- \* Nam per-  
 te è contrario oppreſſis principalibus partibus cæte- petuò  
 ræ neceſſariò \* comprimuntur. Tunc cæteris trinis die- \* opprimuntur  
 bus, quas diatriton Græci uocauerunt, alias quoque  
 partes cucurbita releuamus. Si ſiagon, uel mentum *Σιγάρον*.  
 paralyſi fuerit uitiatum, erunt cucurbitæ temporibus  
 inſigende, atque muſculis buccarum, uel ſub aurium  
 \* lamnis

neret altiora, atq; corrumpat, & ossa cōtere bret, & propterea copiam fluentis humoris efficiat. Oportet igitur \* actionis tempore discernere curationem & in lenimento communem magis, hoc est recorporatiuam, quam Græci metasyncriticam uocant, adprobare, ut cum dolor fuerit in initio, adhuc nouam passionem iudicantes, quicquā destillari faciamus in has cauernas, constrictiuum medicamen, uel \* ex lana \* limpida sumentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum, uel \* roseum oleum, uel acetum, & his similia. Utendum etiam requie corporis atque abstinentia, & silentio \* suo. Etenim officio accepta uoce aures necessariò commouentur, & propterea maiores dolores efficiuntur. \* Ac si passio fuerit augmentis asperata, erit immittendum oleum calidum ac dulce, ac mollibus lanis prætegenda exteriora, atq; uicina. Locandi præterea ægotantes calido in loco, & si dolor coegerit, phlebotomandi, atq; tertia die leui atq; sorbili cibo reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius ad-mouenda uaporatio tepidi \* uaporis, uel saccelli ex polline tenero confecti: tum cataplasmata laxatiua, & cum dolor sumpserit statum, erunt ad-mouendæ sanguisugæ, quas hirudines appellant, circa fines auriculæ, hoc est, circulatim auditoriam cauernam habentes, cartilagine prætermissa, uel certe eius posteriora cucurbita admota scarificanda, adhibita uaporatione spongiarū calidarū. ipsam quoq; cauernā inuoluta lana per melotida oleo calido timētā paulatim penetramus, atq; illic lana derelicta ferramentum detrahimus. Tum declināte passionē cerotaria \* apponimus, dantes uarium cibum & uinum: ac si humoris fuerit fluor, quem rheumatismum uocāt, eadem adhi-

\* accessionis  
Curatio

μετασυνκρίσις  
καὶ

\* in

\* non succida

\* rosaceum

\* somno

\* &

\* liquoris

\* apponimus

*Diaglaucium.*  
*Heres medica*  
*men.*

\* quod appel-  
lāt Nerā He-  
re.

*Pastillum* enī  
describit Pau-  
lus. cēstat A-  
loes, croci, sin-  
gul. .3 viij.

*Alumnus Scis*  
filis. 3. c. exce.  
ptis aqua.

*Gal. lib. 4. lū*  
*rā rēnovs. pa*  
*ratur olum*

hoc medicamē  
tum ē Glau-

cio, croco, Myr-  
rha, Sarcocol-  
la, Memint

huius remediū  
Aetius in cu-  
ratione aēde-

mati.  
*Lixivium.*  
*lavia.*

*gorivus.*  
\* cataplasma-  
te

\* medicamine  
\* Diatema. j.  
ex salice descri-  
bitur Actio

bemus quæ initio doloris adhibenda probauimus. De-  
hinc eorum augemus potentiam, ut cauernæ ipsi facia-  
mus infundi collyrium, quod appellamus Diaglaucium  
ex uino solutum, uel aceto, uel illud medicamen\* quod  
appellant heren, uel mulsam ex uino factum, quod sit  
præcoctum in mali punici cortice, cum nardo, uel a-  
mygdalis amaris, & aceto, croco, & myrrha, & alu-  
mine, uel herbarum succis constrictiue uirtutis: tum  
auriculæ uicinantia circulatim\* cataplasmata ex cy-  
donio malo, ac simili medentium uirtute contegemus,  
uel\* medicamen quod appellatur\* diaiteo, quod est  
siccatiue uirtutis, uel icesio, aut diadictamno, & his  
similibus. Dehinc si passio coegerit, radendum est ca-  
put, & constrictiuis cataplasmatibus contegendum.  
Dandi etiam cibi constrictiui, & lenimenti tempori-  
bus, siue dolorum tardantium, siue humorum fluentium,  
resumptiuus adhibendus cyclus: \* tunc recorporatiuus.  
Et localiter ipsis cauernis per clysterem\* modicum  
iniicienda, nunc destillatio aquæ cineribus\* liquatæ,  
quam uulgo lixiuium uocant, Græci coniam, nunc si-  
napi\* liquido, atque etiam admixto fico erunt exte-  
riora cataplasmanda, donec rubor maximus fiat, quæ  
Græci phœnigmon appellant. \* Item eundem immis-  
sione medicaminum ex garo confectorum, quod uulgo  
liquamen appellant, uel his uirtute similium materia-  
rum: tum etiam totius capitis curationem ex illusione  
aquarum supercadentium, quam Græci cataclysmum  
appellant. Quibus etiam aurium uicina sunt maxime  
ex salice descri concurrenda. Dehinc\* acopibus & dropacis, & ma-  
bitur Actio

pag. 834. Icesium uero 833. Diictamnum. 836. \* tum \* oticum \* liquatis \* lique-  
facto ex aceto, ut pag. 325. \* Item tentandum

\* acopis, & dropacibus

lagmatibus acrioribus, & aquis naturalibus utendum. Sic enim intardata corporibus emoueri, atque excludi mutatione poterunt \* curationis.

De dolore dentium. Cap. IIII.

\* Resumptiua  
& Recorpo-  
ratiua

**F**unt dolores dentium nunc omnium, nunc aliquorum, nunc unius, cum sibi uicinantibus gingiuis, ut etiam contumescant, ac sepe ora faciant subinflari, uel eorum aliqua partes crescente passione \* terebrari. Nam sepe dentes & gingiue computrescunt, corruptis ossibus quibus natura inserti sunt, & recedentibus tumore cogente gingiuis. Sed etiam nunc erit curationis diligentia partienda, ut initio doloris, uel certe si ita passio recurrendo tardauerit, superpositionis, alia adhibeatur curatio, alia \* lenimenti. Quapropter adhuc \* recedentibus passionis motibus, uel in asperitate superpositionis doloris constitutis, conuenit abstinentia cibi, atque requies corporis, ut initio cause aqua que uirtute constringat collutioni oris adhibenda sit, ut est à plerisque conscripta decoctio in aqua & uino herbe syderitis, uel acacie, uel leuces, quam etiam polium uocant, aut mandragora, sed non sine cautione, ne quid ex ipso liquore transuorent agrotantes: item pentaphylli herbe, aut papaueris, necnon personatie, aut \* herba phlomo in pusca \* decocta: uel ex cornu ceruini drachmis quinque, & aceti hermina usque ad sui medietatem decocta, uel de \* pinguis cum aceto decocta, aut alterci radices cum uuae lupinae succo, & uino sufficienti simul cocta. Erunt præterea ex his aliqua, \* parte in doloribus \* constituta, apponenda, uel lenientia, uel simili uirtute \* medentium materialium. Tunc cum dolor uehementescere coeperit, lecto tradendus est æger, atque blando \* tempore cale-

\* abscedere sup-  
purare

\* lenimento,  
\* recentibus

\* herba Phlo-  
mi  
\* decocta  
\* carica pin-  
gues.

\* parti  
constituta  
\* medentes  
materia  
\* tepere



\* *calfaciendus*, facientibus\* supino capite collocandus, sed paulo prominentius à cætero corpore subleuato. Tum articuli fricatione calefaciendi, atque muscoli buccarum <sup>ana</sup> oleo calido infusa circumtegendendi, appositis saccellis ex pollinibus calidis confectis. Tum oris collutio ex oleo

\* *Prissana* alica\* ptisana, uel glycyrrhiza, aut lacte cū melle. Et si nimius fuerit dolor phlebotomia adhibenda. Tū tertia die quò sanguinis facta detractio est, sorbilibus atque calidis cibis ægri nutriendi, sed plus perungendi.

\* *perstiterit*  
\* *admouendus*  
*Aliq. mouendus* rit, & officium cessauerit uentris, erit \* amouendus ex simplici clystere, & loca in dolore constituta ferro laceranda, appositis cucurbitis secundum buccarum musculos, atque gingiuarum locos. Aliquando etiam ipsæ gingivæ scarificandæ, uel circunseparandæ à dentibus ferramento, quod pericharactera uocant. Est etiam mitigatiua ex oleo uaporatio, quæ fit ex feruenti oleo quo lanam melotidi inuolutam tingimus, \* tunc gingiuis\* altrinsecus imponemus, hoc est, interiori atque exteriori parti, & ipsis quoque dentibus, quantum æger ferre feruoris potuerit. Sed prætegenda uicina sunt, lana præmissa, ne facile pustulentur. Alià quoque uaporationum genera quæ sunt à ueteribus tradita erunt adhibenda: ut, thuris granum igne calefactum & tenui linteolo inuolutum dolentibus dentibus apponatur, & ita mordeat ægrotantes, ut ex \* ipso uapore resumantur. Item thuris triti puluerem singulatim linteolis pluribus illigamus: tunc eorum singula oleo calido prætincta ægrotantibus offerimus mordenda, dentibus scilicet in dolore constitutis. Aliqui etiam scyllæ paruum modum

aiunt

alunt oleo concoquendum, quod nos differendum probamus, ac lenitatis tempore adhibendum. Siquidem ob acrimoniam scyllæ recorporatiuam habent uirtutem. Oportet præterea etiam mentum uaporari exterius: & spongiis expressis ex aliqua coctione laxatiuæ uirtutis ad mitigandam materiam, \* ex ipsa adhibere \* ex ipsis fomentum. Tum cerotaria apponenda probamus ex oleo \* ciprino, uel irino: item malagmata sensim cale- \* cyprino facientia: tunc lauacro, atq; uino, & cibo uario utendum. \* Ac si tardi temporis dolor fuerit effectus, ut Al chronia passio uideatur, & nunc superpositionibus asperata, nunc lenientis emollita, oportebit superpositionis tempore in iisdem adiutoriis perseuerare: totum uero corpus resumere, sicut frequenter docuimus: Præterea tempore exercitij erit offerenda cæra, quam ægrtantes mordendo dentes exerceant, sicut nuper demonstrauius de paralyti \* scribentes. \* pag. 328. Vltimo autem tempore, gestatio erit adhibenda & fricatio capitis atque oris, sed ipsius manibus ægrtantis paruissima, plurima uero ex alienis, sed longitudo temporis potius quàm uehementia, ne caput nimietate moueatur. Tunc, ne partes refrigescant, uel impleantur etiam, à plurimis erit corpus confricandum, ut duobus ministris ab humeris latera, & aliis duobus ab inguinibus \* curata. Tunc à resumptione, \* cura paulo fortius erunt partes recorporatione curandæ, ut post frictionem strigili non obtuso, uel \* aspero \* asperis pannis buccarum musculos usque ad ruborem fricari faciamus, & nunc dropacem illiniri \* tunc etiam ipsos \* nunc dentes atq; gingiuas uehementius fricari, dentes præterea iugiter oleum calidum sorbendum, atque continendum, & despuendum, item aquam frigidam. Tum

interpositis duobus uel tribus diebus, ex humore in quo fuerit \* decocta mali punici cortex, adhibemus oris collutionem, uel in quo sit prætineta ignita galla, uel ex aquis sua \* uirtute medentibus. Item dentium confricamentis utendum, quæ constringere, atq; fortificare ualeant, sicuti libris medicaminum ordinauimus. Vomitus uero post cibum factus omnibus est contrarius, & maxime in ista constitutis passione: nec aliter Venus obesse probatur, & uinolentia. Multi autem ueterum medicorum accessionis tempore ea medicamina adhibenda iusserunt, quæ \* anodyna Græci uocauerunt, nos indoloria dicere poterimus, quæ aiunt nocturno tempore adhibenda, profecto sensum, non dolorem auferentia. Adhibent etiam fumigationem dentibus, ut bitumen cum simili pondere myrrhæ, uino consperse, mollibus prunis \* impositæ, iubentes ore aperto egrotantē fumum accipere, cum fuerit melius hæc propter inflationē capitis prohibere, & offerre mulsū calidum, uel quenquam mitigatiuum liquorem continendum, uel, ut aiunt, carbonibus infundendum, ut exinde exhalatione facta solatium capiant egrotantes. Item iubent circundandos atque inuoluendos dentes ex opio, galbano, pipere, uel lasere, & peucedano, & herba quam tithymalon uocant. Hæc quidem etiā corruptis dentibus adhibenda probauerunt, necnon tenue lintecolum apponendum, prælinitū oleo cocto uel sale, & cedria, uel ex croco, atq; pipere longo, & rosa recenti, & iride illyrica, galbano, cocco cnidio, styrace, nitro, cum melle medicamine confecto: quæ omnia ob acrimoniam lenimenti tempore locum \* potuerint inuenire, quanquam sit etiam fugienda satietas medicaminum plurima. Omitto quod tithymali succus appo

\* decoctus

\* ut aluminosis & falsis  
Libri medicaminum Celij.\* Narcotica intelligit.  
Medicamina indoloria ἀνδολυα.  
\* impositum

\* poterunt

appositus dentes infringit: non aliter etiam ferrei  
 \* altheres exhibiti, \* qui dentium dolores mitigent  
 locorum mortem faciunt, & ipsorum dentium la-  
 xitatem, qui aiunt ungendas gingivas accessionis  
 tempore amurca: \* cum simili modo infecta lana ex  
 oleo ueteri & myrrha, cum uino & oleo resolu-  
 ta, atque \* crassitudine mellis deducta, cum secun-  
 dum methodon aliud sit tempus medicaminum la-  
 cessentium. Alij presente dolore in \* contraria par-  
 tis auricula aiunt balsami succum mittendum: \* cum suc-  
 cis supradictis simili modo uel folio. Hijs omnibus re-  
 solutis, uel oleo decoctis, aut in quo decocta sint  
 ederae nigrae folia decem, & squille medium, in  
 oliuae magnitudinē, spe auocandae materiae \* depra-  
 uati, uel maioris doloris illati causam \* anterio-  
 rem auocantes, obscurantēque auocatis sensibus \* æ-  
 grotantes. Alij eius partis, quae dentis dolorem susti-  
 net, nari, ederae succū \* infundentes, cum olei parte di-  
 midia, ex ferramento quod rinenchyton uocant: Adhi-  
 bent etiam sternutamenta, & apophlegmatismos, &  
 \* odoris medicamina, quae iugiter aiunt apponenda,  
 & \* sint uirtutis lacescentis, quae stomatica uocant:  
 quorum singula, tanquam re corporatiua, non miti-  
 gatiua, in lenimento adhibere probamus. Alij statim  
 ad auferendos dentes dolore pulsatos accurrunt, nescij  
 quoniam detractio amissio partis est, non sanatio.  
 Quapropter sicut alias quoque partes in tumore  
 constitutas non detractio, sed mitigatione cura-  
 mus, sic etiam dentes curandos accipimus. Ete-  
 nim si quisquam dentium fuerit exesus, exigit pri-  
 mo mitigationem, tum sui detractioem faciendam.  
 Quippe cum non sit à periculo remotum doloris

Αλθέρη  
 ferreici  
 \* Pericharacte-  
 res.

\* Locorum ue-  
 ro mortem fa-  
 ciunt, & den-  
 tium laxitatē,  
 qui ut dentium  
 dolorem miti-  
 gent, aiunt

\* aut  
 \* in crassitudi-  
 nem  
 \* contrariae

\* aut siccis su-  
 pradiēctis omni-  
 bus utendum,  
 simili modo re-  
 solutis, uel oleo  
 decoctis, in quo  
 etiam decocta  
 \* decepti, &  
 \* interiorē e-  
 uocantes

\* ægrotantem  
 \* infundunt  
 Instrumentū  
 \* oris

ῥινίγχυτον.  
 ἀποφλεγματισ-  
 μός.  
 \* sunt

\*capitū & ce tempore dētes auferre, & maxime integros, hoc est,  
 rebri qui non fuerint exesi, uel corrupti, aut mobiles. Con-  
 Erophilus. sensus etenim superiorum \*partium necessariò sequi-  
 Heraclides tur & muscutorum, & oculorum. Herophilus de-  
 Tarentinus nique & Heraclides Tarentinus mori quosdam de-  
 Erasistratus. tractione dentis memorauerunt. Nam Erasistratus  
 ἰατρικὴν γένειον. trahebat. Nam Erasistratus  
 \*Grecorū qui plumbeum inquit \*odontagogum, quod nos dentidu-  
 dam vocāt & cum dicere poterimus, apud \*Delphum in Apollinis  
 ἰατρικὴν γένειον. templo ostentationis causa propositum, quo demon-  
 Dentiducum stratur, oportere eos dētes auferri, qui sint faciles, uel  
 plumbeum. stratur, oportere eos dētes auferri, qui sint faciles, uel  
 \*Delphos mobilitate laxati, uel quibus sufficiat plumbei ferra-  
 \*nocet sanis menti conamen ad summum. Sic autem putant, quod si  
 \*oporteat omnis dens dolore uexatus, & qui \*necet sanos, est  
 \*materiam detrahendus, \*oportet etiam omnes auferri, si omnes  
 \*aque fuerint dolore possēsti. Quomodo autem sint auferen-  
 \*Diamoron. di dentes exesi uel moti, nisi seruari potuerint, libris  
 describit Pau- medicinalium Responſionum docuimus. Ac si aliquan-  
 lus. do ex humore gingiuarum uisi fuerint commoueri, o-  
 \*Apud Gal. portet conſtrictiui uti collutionibus, quarum \*mate-  
 κ. τ. π. 3. pag. 715. due sunt portet conſtrictiui uti collutionibus, quarum \*mate-  
 descriptiones riæ ex parte superius diximus. Adhibendum etiam o-  
 Medicamenti leum lentiscinum, & \*aquas cœlestes, & lac asininū:  
 ē fructibus. est enim densabile: item decoctio mali punici, uel  
 \*Diaoporon: ut. c. 2. l. 3. tale gallæ, aut acatiæ, aut rosæ, aut murtæ nigræ, aut  
 fuerit Electua mali cydonij, uel platani baccae. Vngendæ præ-  
 rium de fructi bus Mesues: terea gingiuae medicamine, quod appellamus \*dia-  
 aut trochiscus maron, \*Item \*diaporos & Diaroos, & Diom-  
 Ramich. phacion, & \*œnanthio. Item si quædam emerſerit  
 œnanthinum gingiuarum sanguinatio, corallij tusi puluis cretus in-  
 \*œnanthinū tus ponendus, & alumen cum melle. Item cruca cum  
 unguentum aceto apponenda. Sed hæc sunt primo coquenda iugi  
 Diosco. descri- motu uersata.  
 bit.

De apprehensione, siue oppressione,  
quam Græci Catalepsin ap-  
pellant. Cap. V.

Κατάληψις.

**H**anc passionem ueteres tanquam specialem, uel  
propriam tradiderunt, quasi nullo ex genere ue-  
nientem, ut Chrysippus memorat: \* quod de ipsa Ni-  
ceratus conscripsit librum, probans scilicet etiam ue-  
teribus medicis cognitam, quod nos confirmamus. Sed  
quia nunc tarda, nunc celer à methodicis adprobatur,  
quanquam sit à nobis celerum passionum libris plenif-  
sime \* tradita, etiam nunc erit ordinanda. Quippe sæ-  
pe in tardum \* ueniens motum, & propterea chronia  
nuncupanda. Sequitur autem patientes febricula, &  
uocis amputatio cum oculis patentibus, atque impalpe-  
bratione, difficilior eo tempore quo statum sumpserit  
accessio: & \* omnis immobilitas, cum palpebrarum  
\* impossibili atque horrenti positione, quæ \* declina-  
tione facta aliqua ex parte accipiat motum. Etenim  
admota manu ac digitis, \* circumtractis oculis \* tenuis  
palpebra \* recognoscitur ægrotantis, atque \* obtutu  
inter nota translationem manus in quâlibet partem  
\* declinata sequetur conuerso scilicet uultu. Dehinc  
inclamati oculos intendunt, lachrymantes sine ulla re  
sponsione: & si odoramenta iucunda fuerint admota,  
\* declinatione quadam moueri intelliguntur, frequen-  
ter adducentes spiritum, hauriendæ exhalationis cau-  
sa. At si tetra odoramenta fuerint admota, recusare ui-  
dētur ac fugere. Item dulcia atque amara ori admota,  
labijs uel lingue illita, sentiunt: non aliter si ulla fue-  
rint punctione pulsati: \* ex nostro officio tentam ma-  
num \* suo replicant, uel colligunt. Item laceßiti col-  
lugent, ingemunt, attestante uultus rubore, cum pul-

Chrysippus.

Niceratus.

\* sed

Celij libri cele-  
rū passionum

\* cap. 10. li. 2.

\* venit

\* luminum

\* immobili at-

que herenti

\* paroxysmi

\* circumtractis

\* tensa

\* recolligitur

\* obtutus inter

mote

\* inclinantis se

quitur

\* delectatione

\* &

\* subito

sumagno, ex uehementibus atque fortioribus saltibus confecto. In declinatione uerò plurimus saepe sudor sequitur, ac seruens, & in dimissione limpida synceritati proximi efficiuntur. At rursum in accessionem si redeunt egrotantes, peiorante passione plurimus seruor accedit cutis, & spiratio celerrima, quam Græci tachypnoean uocant, oculorum conuersio, manuum contractio, sudoris ignei defluxio, maculis emergentibus in thoracem atque uultum, & primo \* rotundus in \* similitudine ulcerum, quæ \* iustus appellant. Ab apoplecticis hæc discernitur passio, quod in ipsis paruus atque creber pulsus inueniatur, & non ut in catalepticis maior atque percussibilis, & neque iucundum, siue tetrum odorem accipiant, neque dulcia & amara sapiant: Item ab ijs qui ex stomachi passione obmutescunt. Siquidem in his rursum paruus atque imbecillis pulsus inuenitur, attestante singultu, cum manifesto tumore in stomacho apparente. Hæc est discretio similium passionum, sed ei curatio adhibenda est, quæ epilepticis dicta est.

Ταχύπνοια.

\* rotundus

\* similitudine

\* iustus

φωνῆς ἀποκοπή.

De uocis amputatione, quam Græci phones apocopen vocant. Cap. VI.

**V**ocis amputatio fit ex clamore nimio, aut frigore, aut ardore, siue uistura, faucibus asperatis, uel etiam tumore nimio. Fit autem obtusio, sonitu emissæ per spiritum uocis \* hirta, uel aspirationis tractu grauata \* locutio. Recenti denique passioni, atque eius initio conuenit adhibita requies, cum abstinentia cibi: & spongiarum cū aqua frigida expressarū admotio gutturi per ambitum faucium, quæ anthereona uocant. Ac si passio uehementescere cœperit, ut maiora

\* hirta, rancida, aspero.

\* locutione

depo



deposcat adiutoria, adhibenda phlebotomia. Tunc sor-  
 bilibus cibis nutriendi, adhibitis etiam gargarisimis ex  
 oleo dulci atque calido, siue calida \* ex oleo: uel aqua \*  
 mulsæ: aut decoctione uuarum, cantabri, ficuum pin-  
 guium, palmularum, glycyrrhizæ, necnon etiam succo  
 alicæ, uel \* ptisanæ, ut ex eorum uaporatione, siue ex \* ptisana  
 halatione accensum spiritum rapiant egrotantes.  
 Tum etiam spongiarum adhibenda uaporatio, atque  
 usus electariorum ex melle decocto, & \* nucleis, & \* nucis Pineæ  
 lini semine, & ouorum uitellis, & \* draganto mulso fructu  
 \* & uino præmolito. Dehinc sorbili ex amygdalis \* tragacantho  
 medicamine utendum. In declinatione uerò lauacro,  
 atque uario cibo, & uino, deambulatione, uel gesta-  
 tione. Ac si querela tardauerit egrotantium, erit in  
 lenimento adhibenda drymyphagia, dropacismus, de-  
 fricatio: tum etiam uomitus ex radicibus, atque ua-  
 ria gestatio, & uocis exercitatio, quod Græci ana-  
 phonesin uocant, adhibito præceptore, sicuti iam \* du-  
 dum docuimus, temporum ordine seruato. Adhibenda  
 etiam & arteriaca medicamina, & quæ partes in  
 passione constitutæ exerceant, à Græcis \* amyctica  
 appellata. Quorum compositionem libris Medicami-  
 num conscriptam dedimus.

De influxione, quam Græci catarrhon  
 vocant. Cap. VII.

**F**it influxio nunc ad nares, quæ appellatur cory-  
 za: nunc ad fauces, quæ appellatur branchos: nunc  
 ad thoracem uel pulmonem, quæ appellatur ptysis. Se-  
 quitur autem eos qui coryza uexantur, grauedo na-  
 rium & frontis, cōstrictio fluorū oris: emūctio humo-  
 ris: tenuissimo primò, tum crassi atque uiridis: sternalio  
 iugis, cum lachrymatione oculorū, acrioris qua-  
 litatis

ἀναφώνισον.

\* pag. 304.

Medicamina

ἀρτηριακά.

\* Bechnica vo-

camus. Ea tus-

sim mouet, &

humorū in pe-

ctus labentiū,

uel lapsorum

expulsionē per

tussim irritat,

& adiuvant.

ἀμυκτικὰ.

Libri medica-

minum Galij.

καταρρῆξις.

νορῶσα.

βράγχε.

πῆξις.

\*impetus, aut  
\*recessionis

litatis uel mordentis. Aliquando etiam tussicula \*im-  
par atque obtusa apprehensio. Item consensus \*seßio-  
nis oculorum, cum capitis atque uultus inflatione.  
Eos autem qui faucium influxione uexantur, quod  
Græci branchos, nos raucitatem uocamus, sequitur  
pruritus quidam secundum fauces, atque titillatus,  
uox obtusa & grauis, & impedita locutio, ut se  
præfocari sentiant ægrotantes. Aliquando etiam tussi-  
cula, & transuoratio difficilis. At si ad pulmones fue-  
rit facta defluxio, thoracis grauedo sequitur, & tussi-  
cula uehemens, cum sputis spumosis, atque crassio-  
ribus, tum siccis, attestante difficultate spiritus;  
quam Græci dyspnœan uocant. Aliquando etiam fe-  
bricula, quæ noctis initio sumit exordium, cum uo-  
cis obtusione, & uomitu cibi. Sed hæc passio à peri-  
pleumonia discernitur. Siquidem \* sit una ex tardis  
passionibus, & neque celeri atque acuta febricula cor-  
pus afficit. Item \* discernitur à rheumatismo thora-  
cis, siue influxione, quod cæteris communibus signis se-  
quentibus dolor etiam inesse uideatur in ea parte tho-  
racis quæ \* pati perspicitur. Sunt autem causæ ante-  
cedentes, ex quibus influxiones supradictæ nascuntur,  
ut sæpe probatur \* perfricatio profunda, uel extensio  
uomitibus. Veterum igitur methodicorum alij stricturam  
hanc passionem uocauerunt, uelut expressis humoribus,  
atq; coactis, in alia \* uenire loca eam fieri asserentes:  
Alij solutionem, ut Thessalus manifestat, atq; eius \* de-  
cessores, ut Themison. Mnaseas uero & Soranus,  
cuius etiã nos amamus iudicium, \* cõplexam inquirunt  
esse passionem, nunc strictura superante, nunc solutione.  
Etenim constrictio atque dolor accidentia sunt stri-  
cturæ, quæ Græci symptomata uocant. Multorum uero  
liqui

ἀπνοια.

περιπνευ-  
μονία.

\* est

\* Peripneu-  
monia. sub.

πνευματισμός.

\* in Peripneu-  
monia uero nul-  
lus dolor sen-  
tiatur.

\* perfrictio

\* uenientibus  
Thessalus

\* qui etate illam  
præcesserunt.

Themison.

Mnaseas.

Soranus.

\* complicatam

συνπλεγμένα.

liquidorum egestio solutionis est signum. Quapropter obtinente strictura, conuenit ægrotos iacere loco lucido mediocriter, atque calido, adhibita abstinentia usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocant, cum requie corporis, atque animi, appositis lanis\* lim- \* non succida  
pidis, ac mollibus, oleo dulci atque calido præinectis, colla\* circundâtes, & thoracem: tum oris collutio ad \* cicundando  
hibenda, siue fôtus ex aqua calida. In ipsa autem dia- \* perungendi  
trito \* perungi ægrotantes oleo calido, atque dulci: \* confectus:  
fouenda facies ex aqua calida. Cibus dandus sorbilis vt pag. 342.  
ex alica uel farre, oleo & anetho, & paruo sale\* cõ- \* alica  
fecto, uel ex melle. aut\* alica ex mulso \* confecta sor- \* confecta  
bilis transupratio, non sine cautione atque coniectu- \* strictura &  
ra \* utriusque passionis, ne \* alteram faciat superio- \* solutionis  
rem. Ac si passio permanserit, alia die cataplasmata \* alterutram  
laxatiua adhibemus, iusscilicet partibus quæ fuerint  
in querela. Tunc cucurbitam insigentes scarificamus,  
ac deinde spongiis uaporantes loca relaxamus, aut  
calidis lanis contegimus narium partes: tum gargaris-  
mum damus calidum mulsum, aut decoctionem canta-  
bri, & palmularum pinguium, & \* noxarum, & \* myxarum  
glycyrrhizæ, uel eius \* succo resoluto ex aliquo li- \* succum re-  
quore laxatiuo. Item electarium damus ex lini semini- solutum  
bus & sesami frixi, acetabulis \* singulis, & oui elixi- Electarium.  
uitello, & nucleis numero uiginti, & amygdalis ama- \* singulorum  
ris \* expolitis decem \* ampli drachma una, \* traganti \* expolitis  
drachma una, passo cretico \* demollito, & mellis de- \* amyli  
cocti sufficienti: quod medicamen in auellanae modum \* tragacanthi  
sumptum sub lingua teneant ægrotantes: tum defluens \* emollita, &  
ac \* desiccatum sensim atque paulatim transuorent, melle decocto  
uel mel oleo concoctum. Multi autem\* sub fabam fra- \* eliquatum  
ctam, quod Græci etnos acton uocant, idq; linguae sup- \* subiiciunt.  
positum

\* leniatur  
\* amylo

positum ac defluens transuorant, quo asperitas arteriæ \* liniatur, uel ex \* amylo, & ex mentha, & amygdalis amaris confectum medicamen, quod habeat palmularum dulcium contritarum drachmas octo, & nucleorum drachmas quatuor, & amygdale purgatæ drachmas duas, glycyrrhizæ succi obolum unum,

\* tragacanti;  
\* in  
Vinum protropum.

\* πρίτροπον, πρίδρομος, ol. vor, πρίχυμα, vinum sponte defluens, antequam rursus calcentur. Mustū lixiuium, aut ut lego, mustū lixiuium Columella vocat. Magna ex parte id olim dulce fuit.  
\* Andrapha.  
xin  
\* abstinere  
\* vel astringentis vini parum dandum, cuius ἀνδραφάξιν.  
\* τῆ ἀνδραφάξιν : è virentibus oleis expresso.  
\* calycularis: ut pag. 369.

hoc est, drachmæ partem sextam, \* dracanti drachmam unam, collectis omnibus atque infusis \* ex uino \* protropo. Ac si uenter officiū non agnouerit, simplici uentris laxatiuo utendū. Et si fuerit caput grauātū, adhibenda detonsio, appositis deinde laxatiuis medicaminibus. Tunc cibus alternis diebus dādus. Cū autem passio mitescere cœperit, danda olera, ut malua, lapathum, atriplex, quā Græci \* andraphasin uocant, beta cū ptisanæ succo, uel alica, aut mulso, & pisces teneri, & uolantū teneriora. Ipsi etiam locis apponenda cerotaria ex meliloto coctio confecta, uel malagmata simplicia: tum lauacrū atq; uinum adhibendum. Ac si superans fuerit defluxio, quā Græci rheumatismum uocāt simili abstinentia utendū est frequēter. Sed frigido atq; obscuro mediocriter loco ægrotantes iacere iubemus, & \* abstinendos à potu, quo sitiendo siccentur: uel adstringentis uini parum dandum, cuius usus cū fuerit permīssus, oris collutio frigida ex aqua, paulatim, atq; parua probatur: tum appositio spongiarum ex aqua frigida expressarum, uel pusca, iisdem partibus quæ fluore uexantur, hoc est thoraci, atque gutturis summutati, quam Græci anthereona uocant, nos rumam, aut lanc limpidæ infusæ oleo \* uiridi conueniunt. Dehinc dabimus ore continendam, uel gargarizandam aquam frigidam, uel puscam, aut succum herbæ \* calicardis, quam Græci helxinen uocant, aut plantaginis, quam

quam iidem arnoglossum uocant, aut uuam lupinam, quam strychnon nominant, aut intybi, aut endiuia decoctionem, aut buxi, aut rosarum: item lenticule, palmarum thebaicarum, lentisci \* uirgultis, aut rubi, \* quam bathon appellant, singulis, uel in unum mixtis pro passionis magnitudine. Aliquando etiam diamorron, siue \* diasycaminon, cuius nota compositio, atque Medicaminum libris tradita comprobatur, ex \* aliqua supradictorum liquore soluta. Tunc etiam epithemata constrictiua adhibemus, ut est mel decoctum cum alumine schisto, æquis ponderibus: uel aceto, & aloë: aut ex palmulis, & malis cydoniis, & his similibus: item cucurbitam constrictiuam, & electaria, uel catapotia, ut est diacodion simplex, & uinum<sup>a</sup> sciuelliticum coctum, donec mellis habeat crassitudinem, solum, uel cum melle, admixto etiam cumino: item creticum uinum, uel passum similiter decoctum, aut tyrrenum, uel protropum, & omne quod adiuncta dulcedine constringit, ut arteriam leniat, atque desiccet humorem: item uel admixto modico cumino concoctum, uel persicæ \* lachrymo, uel plantaginis aride contusæ, atque cretæ puluere, uel rosarum aridarum, & aluminis. Item trochisci medicaminis \* trigoni appellati. Tum cibi ordinandi supradictis iamdudum temporibus convenientes, sed constrictiue qualitatibus, ut est oryza, uel alica ex pusca, uel aqua frigida confecta, aut decoctio palmarum thebaicarum: item oua hapala, uel pulres paruissimo atque uiridi oleo confecta, & oriza, uel milio, aut pulento frixo, aut alica, aut farre, aut ex amylo, uel ex ges \* asteros, & melle decocto admixto \* quiddam supradictis, quo coagula mie, crustosa, & cotin modo præsensa, \* quidem

lentur.

\* uirgultorum  
 \* quem baton  
 \* Mora Latini uocant,  
 ευνάμιν  
 Græci  
 \* aliquo  
 Alumen  
 οξύριον.  
 Alias, æthalo.  
 ardens.  
 Forte, squilliticum.  
 & a Sybeliticum  
 dulce, & omnis  
 mordacitatis  
 expers, ut &  
 Theræum, &  
 Caryinum, ca.  
 3. lib. 6. Meth.  
 \* lachryma,  
 gummi quod ex  
 arbore Persica  
 stillat.  
 \* Pastillus trigonus à Paulo  
 describitur. Cōstat  
 seminis apij, & hyoscyami,  
 sing. 3. ῥ-  
 opij 3. iij. amisa  
 3. x. tritu in  
 aqua.  
 Medicamen  
 Τριγόνον.  
 γῆς ἀστῆρος.  
 \* astere: aster  
 genus terra Sa

lentur, & uirtutem medendi maiorem sumant. Item thebanarum palmularum decoctarum admixtione in pulmentis uti possumus, uel ex aridis palmulis pane confecto, & oleo uiridi, atque \* rore syriaco, uel aceto, & galla. Ipsa quoque pulmenta, aut cibos aridos dare debemus: tum hapala oua, uel lac, decocta cum amylo ad modum cotylæ unius, uel duarum, quod est pondus unciarum decem, uel uiginti. Dehinc danda olera cōstringentia, ut intyba, plantago, cauliculi: sed hæc omnia cocta, atque aceto condita: tum pisces durioris corporis, atque uolantia non pingua, \* sed magis torrida, uel ex aceto & aqua cocta. Tunc declinante passione uinum dandum est asperioris naturæ. Dehinc adhibenda gestatio præfecto ore, quo spiratio nulla tangatur iniuria: dehinc lauacro utendum. Ac si passio tardauerit, superpositionibus ac lenimentis uariata, erit in lenimento adhibenda deambulatio, & uocis exercitium mite: tum leuis unctio, ac defricatio, & cibi ex media materia dandi, scilicet pro qualitate passionis, solutione aut strictura obtinente, qui erunt quodam profectu augendi, au minuendi, per regulam cycli, usque ad uolantum, atque agrestium, & porcine carnis percoctam partem tertiam: sicq; panem ante pulmenti oblationem, si obtinens fuerit fluor, cum aqua dabimus: etiam \* uuarum fabrilium, uel pensilium siccatarum acinos, uel intybi thyrsum aceto præinctum, adhibito lauacro longo dierum intervallo, tum drimyphagia. Dandum etiam \* lasar cum aceto atque \* liquamine: ac deinde locis patientibus adhibendæ cucurbitæ \* re corporatiuæ, quas Græci metasyncriticas uocāt, & maximè anthereoni, hoc est thoraci, uel gutturis circulo, quam rumam uocamus:

\* Rhoë: ut infra cap. 13.

Oua ἀπαλά.

\* & magis torrida

\* fumi uapores siccatarum, cap. 3. lib. 4.

\* lasar

\* Caro, pag. 237.

\* quales sint vide pag. 324.

otico clystere, quem nos articularem dicere poterimus, tenui\* ex abilisco formatum, quo possit cauernā, <sup>ὀτίνης κλυ-  
τῆς.</sup> inuadere\* directum catathere. Tunc cucurbitas præ- <sup>\* Alij: tubu-  
lo forato</sup> dictis adhibemus locis, atq; uaporationibus & cata- <sup>\* ex Hibisco  
formato, dire-  
ctus catheteris  
modo. Tum</sup> plasmatibus eas partes, cum podice & \* ueretris uici- <sup>\* ueretro vi-</sup> nis releuamus. Si stomachus fuerit paralyti uitiatus omnia sorbilia dābimus, quo facilius transuorentur. <sup>cino</sup> Ac si ea quæ sumuntur aliqua ex parte substituerint impedito meatu, ægrotantium manus in aquam calidā mittimus, uel parua uascula aqua calida plena tenenda offeremus: tū stomacho leuem cucurbitā infigemus sub ea parte quæ premi uel impediri uidetur, atq; ita <sup>\* detrahimus  
sensim, uel paulatim eam\* detrahimus, quō stomachi \* & per eas  
partes deferendo accipere, \* uel transire facilius il-  
transire</sup> lata, uel uacuum officium in memoriam reducamus: ac si uomitus irruerit, paralyti facta ore aperto nihil dentibus interponimus: Si uero\* conducti, immittimus <sup>\* conclusio  
conductum  
os est,</sup> ceram, uel tabellam alearem, aut seruicam, & ductu contrario fasciolarum corrigere tentamus deprauata, declinante passione. Etenim ante id tempus difficiles in consensu partes esse perspicuntur, & propterea quasatio potius quàm effectus sequitur. Vtimur præterea eodem tempore etiam cerotariis \* qualibet paralyti \* in qualibet uitiata: & primo simplicibus, ut ex cera & oleo pin- <sup>parte</sup> gui, uel \* sabina, & \* squimanto, admixta hibisci deco- <sup>\* Sabino:  
\* Schenango,  
\* Alij Sabino,  
\* antiquo</sup> ctione, uel scæni græci semine contuso, atq; trito: tum ex oleo ueteri, & resina terebinthina: adhibemus & etiam embasin ex oleo calido: tum calida & \* oleum: <sup>μπασι.  
\* oleo:</sup> cibum dantes diurnis diebus ex oleribus non acrioribus, atq; piscibus petrensibus, & uolantum paruioribus. Vtimur etiam acopis, ut est diasamfucum, & dia- <sup>ἀνισκ.</sup> melilotum, uel omnibus quæ ex adipibus conficiuntur,



Et medullis, Et irino oleo, uel malabatrino, Et chirino, Et his similibus, Et malagmatibus talibus, ex quibus est diachylon, atq; mnafeum, Et diamelilotum, Et

\* melinum Sc  
rapianis, Passio  
nis, Andro-  
machi descri-  
bis Aetius.

\* meline simplex. Tum gestatione corpus mouemus pro uirium modo, firtoria sella, siue cathedra tum longiore uehiculo manibus acta, dehinc animalibus. Sic enim consensu persuasæ altiores in corpore materiæ ad exteriora cōcurrunt, cū in embasi ex oleo fuerint constitutæ, motus beneficio prælatato ægrotante. Dehinc lauacrum adhibemus, atq; uinum paruum, Et cōsequenter singula, quæ passione fuerint uiriata, suo officio exercemus: explorantes etiam, uel intuentes si quia aliud in corpore passionis occurrerit, ex quo paralysis uidetur effecta, ut hoc quoq; destruamus: non

\* ob hoc

\* hac quia, em quod antecedens causa esse uideatur, sed quo etiam ea in ipsam passionem necessariò intelligamus. Quapropter si uulnegratio ei fuerit \* congrua,

\* coniuncta  
Libri Celi  
Xaprovovot.

gerere debemus, sicut in Chirurgumenis, uel Respon- sionum libris demonstrauimus: Reminiscetes, siquidem ex uulneribus præta paralysis sit ac diuisura partium quod necdum proprio nomine uocabulū teneat, sed appellari claudicatio uel tardatio \* possunt, siue alienatio. Si ergo cicatrix fuerit clausa, hanc mollire tētabimus: itē si spine cōtortio uel cōuersio ex aliqua causa effiēta, hanc corrigemus: itē si febricula, aut nimia capitis passio quā cephean uocāt, aut epilepsia, ex \* iisdē eas quoq; destruemus: item si euersio, uel inclinatio fuerit matricis, eidem cōsequēter ordinatæ

\* possit,

\* inidem

Libri Celi  
de muliebri-  
bus passionibus  
\* relocamus  
\* Alij officiiū

adhibebimus, sicut muliebriū passionum libris docui- mus: si uero articuli fuerit eiectio, quanquam longi temporis, eum \* recolamus: item si quis humoris fluor per quodlibet \* officium naturale ultra modum fuerit

dimissus

dimissus, cataplasmata constrictiua probamus, ut ex palmulis thebaicis malis citoniis, acacia, hypocistide, alumine, & his similibus, apponētes etiam emplastro- rum ea quæ constrictiue uirtutis à Græcis enema ap- pellata sunt uel si qua ualent concludere atque sicca- re fluentia, ut sunt uulnerum medicamina quæ appel- lantur\* melana: tunc similiter ut in epilepsia ægros re- sumemus: ac si passio permanserit, \* cyclo ductu resum- ptionis regula dirigemus per uariam gestationem, de- ambulationem, uocis exercitium, lectionem, unctionē, lauacra. Tum post hæc omnia partium adhibemus fri- cationem, dantes uarium cibum atque uinum, iuxta præscriptam disciplinam omnia augentes atque mi- nuentes: & nunc usque ad piscium qualitatem ordina- mus cyclum, nunc usque ad uolantum, \* tunc etiam agrestium, ultimo porcine carnis, sicut superius De capitis curatione scribentes docuimus. Dehinc adhi- bemus etiam metasyncriticos cyclos, & primo\* par- tiles, tum perfectos, nisi ex initio uires ægotatis eos perferre non ualuerint. Deniq; nūc drimyphagia uti- mur attēdente cibi paruitate, nūc uomitum provoca- mus drimyphagian linquentes, & cæteras quoq; cycli regulas cōplemus, & nūc\* uomitus adiungētes drimy phagiā. Ipsum quoq; uomitum primo\* ieiunum proba- mus, tū ex radicibus, uel his similibus qualitate mate- riis. Atq; ita post frequentem radicū uomitum hellebo- ro utemur. primo\* radicibus\* inserto, uel aceto in- fuso. Quod detractio radices immisse concise ipso

Emplastra  
iv. x. μ. α.

Ad medicamina  
μ. ι. λ. α. γ. x.

\* Barbara en-  
liema signifi-  
cat, sic uocata,

quod magna  
ex parte As-  
phalto & pice  
constant. Ni-  
grorū multas  
descriptions

Ætius tradit.

\* cyclico

\* tum

\* ex parte, ut  
pag. 279. vel

paruliter, ut  
pag. 276. adhi-

bilos,

\* uomitui adhi-  
gimus

\* supra pag.

305.

\* Utendi mo-  
dus est Ætio.

Radiculæ veratri. 3. vj. insuntur Rhaphano, prius arundine compuncto. Post integram noctem Veratri festuæ eximuntur. Rhaphanus concisa, & in oxymelite acerata comestur, oxymelique inter edendum paulatim bibitur.  
\* inserto mulso ex aceto infusus.

Ἀγρίππας.

φάρμακον.

ψιλάθρον.

\* tum vel: vt

supra pag. 305

dropace, primo

communi, tum

\* detractis

\* in hoc morbo

\* membro iā-

dudum motu

vacuo

\* singulas vias

\* membris

\* conuerso ve-

ro ordine

\* fece vina u-

sta: Gal. libr.

1. κατὰ τὴν πρ

paulo lib. 7.

\* Eleomeli in

telligit memo-

ratum à Plin.

capit. 7. lib. 15.

et cap. 4. lib.

23.

\* Scylla

\* Bulbum su-

riosum.

\* alcionio

\* lemnistide,

seu Adarce.

\* nates

cum liquore sorbentur. Vtimur etiam localibus adiu-  
torii in his partibus quæ sunt paralyti uitiatae, ut  
dropace primo simplici, \* tunc composito, quem Græ-  
ci pharmacoden uocauerunt. Psilotro quoq; , et cu-  
curbitis recorporatiuis multa cum flamma admonitis,  
atq; uiolenter remotis, aut \* circumtractis, \* nunc ex  
superioribus ad inferiora. Etenim spiritus \* iandudum  
motu uacuatus ex alto adducitur, et quadam prouo-  
catione excitus, et accurrens, sua cubilia cognoscit,  
\* singularum uiarum motus inuadens, passionis detur-  
bato langore, Hoc igitur facere tentabimus multis cu-  
curbitis per spinam, recto scilicet ordine post inuicem  
adfigentes, atq; sufficiens tempus adductioni largien-  
tes, primoq; primarum faciemus detractiōem: tum  
sequentium, quo \* sibi adductum spiritum tradunt, atq;  
insolitos prouocēt motus: \* atq; uerso ordine inferio-  
res primo affigētes, easdē detrahemus primo. Post cu-  
curbitationem atq; dropacis usum, puluere nitri par-  
tes aspergi facimus, et fricari: uel sinapi, uel ex utro-  
que. Tunc etiam iis pulueribus quæ sunt ex calce ui-  
ua, \* fecla, pumice, pipere, pyretro, et his similibus  
uirtute rebus. Ordinamus etiam unctiones gestatio-  
nes uarias, acopa quæ mordicatione quadam corpus  
afficiant, uel accendant, et emolliant: ut sunt ea quæ  
conficiuntur ex oleo sicyonio, \* syriaco, castoreo,  
aphronitro, sulphure uiuo, agresti cucumere, ammo-  
niaci gutta, \* squilla, quā uulgo \* uulum pluriosum uo-  
cant, urtica semine, pyretro, pipere, helleboro \* albo,  
nigella, galbano, iri illyrica \* lemnida carie, et his simi-  
libus. Non aliter etiā malagmata sunt adhibenda, quæ  
corpus ualeat papulare lateffendo, ut sunt ex flore sa-  
lis, uel ex nitro, et illud quod \* nilecos, appellatur, uel  
Diad

Diadaphnidō uel Apollophanis, & \* caphysophōtos: quorum cōpositiones Responſionū tradidimus libris, pro modo magnitudinis paſſionū adhibendas, atq; leni imentorū, alias augētes, alias indulgentes. Ordinamus etiā ſole corpus torrendū, uel paropteſin ex carlōnibus: aut parietibus calefactis, uel pauimēta, itē lapidibus ac teſtis: \* hoc faciūt. Etiā ceremota ſub ſole ignita: uel \* terga præuēta ſimili modo calefacta, quæ ſubſtrata accipiūt ægrotātes uolūtatione quadā conuertendos, ac defricādos, & mutādos: qua in re etiā loca quæ deſeruerint \* repetenda, ut ueniant feruentiora: quippe cum naturaliter tergora oleo ac ſole facile ſerueſcant. Vtemur etiam ob ſimilē corporis curationē, quā Græci phœnigmon uocant, barena littori uicina, quæ ſit ſole ignita, ut \* circūteſta gremio foueat ægrotantem: tum etiam ſomentationibus ex aqua ſaſa, uel marina, aut decoctione baccarū lauri, uel omniū quæ ita corpus afficiunt. Manēte paſſione etiam cataplaſma ex ſinapi adhibemus, uel contuſa atque liquata ſerulagine, quam Græci Thapſian uocant, corpus unge mus uſque ad cutis ruborem, atque mediocrem partiū inflationem. Etenim uulnerari, ſiue uexari quosdā ex iſtius herbæ uſu immoderationis eſt uitium, tanquā ſinapiſmi uſu immodico. Generaliter autē ſimiliter medentur etiā uaporationes ex ſaccellis ſale torrido repletis, atque in lauacro \* igneo uſus ſlabrorum. Ordinamus etiam ſi quid \* partialiter loco patienti poterit adhiberi, ut capiti paſſione uexato raſionem capillorum, nunc pro capillatura, nunc contra \* capillaturam. In mulieribus uero, quæ id fieri non facile permittunt, denſo peſtine \* exerceri capillos imperamus, ſu prædicta ſcilicet \* diuerſitate, & cum uehementi co-

\* Cteſiphōti:  
hæc quatuor  
Malagmata  
deſcribuntur à  
Celſo Aetius  
deſcribit Em-  
plē Sale

\* quod & qui  
dam  
\* quadrupedū  
coria  
\* oleo. redunge  
da

quiritus.  
\* circūteſta.

\* ligneo uſus  
accenſorū car-  
bonum.

\* partialiter: uſ  
pag. 276

\* ſic ſupra

pag. 255.

\* exercere ſu-  
pra pag. 279  
decurrere.

\* pro capillatu-  
ra & cōtra ca-  
pillaturam.

natu: atque primo, aliorum manu, & raro pedine:  
tum magis denso, & egrotantis manu. At si odorandi  
officium fuerit paralyti uitiatum, erunt adhibenda a-  
criora odoramenta, ut ex aceto & sale, aut adiuncto

\* origano aceto  
to intincto

\* profectam

\* lascre

in os lugraui-  
nbs.

\* prouocemus  
eos vel nolentes

\* succi

\* utendū etiā  
et sequinā.

\* nasturtio

\* origono in aceto extincto, quo ex eo acriorem  
\* profecto exhalationem naribus sapiant egrotan-  
tes: aut etiam sinapi, uel castoreo ex aceto soluto, per  
intervalla, uel \* lascre, quod Græci opon cyrenaicum  
uocant. Sed hæc erunt naribus quoque immittenda,  
uel sinapi cum aceto, donec \* prouocentur iubemus  
eos uolenter emungere. Probamus denique betæ ni-  
græ, uel cyclamini herbæ \* succum cochlear plenum  
naribus infundendum, \* utentes ptarmicis uehemen-  
tioribus, quæ nos sternutamenta uocamus, ex pipere,  
helleboro, castoreo, \* astrutio, & horum similibus.

Post sternutationem uero magis odoramenta utenda  
probamus. Hæc enim uehementius odorationis mouet  
officium, & solas capitis partes in passione constitu-  
tas quadam mutatione reformât. \* Ac si lingua fuerit  
paralyti uitiata, uel transuoratianis partes, aridum  
sinapi dabimus masticadum ante lauacrum. Tum aqua  
callidius colluere præcipimus. Aliquando etiam lique-  
factum sinapi ex aceto sorbere egrotantem impera-  
mus, & gargarizare. Hoc quidem etiam de similibus

\* hyssopo, Tra  
gorigano, ori-  
gano.

\* lascre

liquoribus faciemus, ut ex fico, \* hyssopo, draganto,  
origono, thymo, pipere, pyretro, staphisagria, hæc  
etiam masticanda dabimus ipsam quoque linguam \* la-  
scre fricantes ex aqua soluto. Tum etiam cornu cu-  
curbitæ in modum adhibemus, adducit enim nō aliter  
quàm hæc, spiritum, & insolitas prouocat uias, quæ  
sunt ex antecedentibus medicaminibus præpurgatæ.

\* At

\* Item stomacho patiente atque uentre, magis fre-  
quen

quentabimus drimyphagian: dantes etiam\* lasar cum <sup>\* laser</sup>  
 aceto, ex quibus panis erit madidandus, adiuncto quo- <sup>\* Ac</sup>  
 libet pulmento.\* Ac si podex fuerit paralyti uitiatus, <sup>\* indenda</sup>  
 aut eius uicina, acriora facimus uel mordicantia\* inij- <sup>βάλανος</sup>  
 ci collyria, quæ Græci balanos uocant: uel sinapi plu-  
 rimum fico admixto, atque in collyrium collectum,  
 longitudine aptum partibus, inijcimus: & ea quæ in  
 alijs ordinauimus fomenta, tum pro encathismatibus  
 adhibemus: uel per clysterē inijcimus aliqua ex acrio-  
 ribus, ut aquam salsam, uel marinam, uel garum, quod <sup>Garum.</sup>  
 appellamus liquamen ex pisce\* siluro confectum, & <sup>\* Scombro: ex</sup>  
 si qua fuerint similis uirtutis: Quorum omnium dex- <sup>Plu.ca. 3. li. 31.</sup>  
 teros usus, atque confectionis genus, & adhi-  
 bendi rationem libro Adiutoriorum specialium do-  
 cuimus. Oportet præterea singulas partes in pas-  
 sione constitutas, suis ac naturalibus motibus ad-  
 monere, ut supercilium, leuando, ac deponendo:  
 palpebram, concludendo ac\* distinguendo: linguam, <sup>\* discludendo</sup>  
 producendo, atque conducendo. Hæc sunt ægrotan-  
 tibus imperanda. Hortandi etiam locutionem ten-  
 tare, quod si minime facere potuerint, ex onni par-  
 te officio linguæ cessante, erunt suadendi, ut a-  
 nimo concepta uoluant quæ proferre non possunt.  
 Sæpe enim quæ loqui uolentes mente perceperint, in  
 alto formans spiritus, accepto motu\* rumpit in uo- <sup>\* erumpit</sup>  
 cem: Vel certe docendi sunt unius exprimendæ li-  
 teræ curam suscipere, ut intra se exercendo manife-  
 stius probent, & magis ex uocalibus, ne difficulta-  
 te sonitus multarum literarum, uocis organa conclu-  
 dantur potius quàm reserentur: ac tum cum implere <sup>λέγει.</sup>  
 ualuerint, dabimus lexes, atq; nomina, quæ sint ex mul-  
 tis uocalibus cōscripta, ut est Pæan, & his similia: Sic

etiam numeros dabimus: & ex his exclamare prouocamus ægrotantes: ac deinde lectionem offeremus, uel disputationem. Hæc adhibenda sunt, etiam si buccarum partes circa labiorum confinia, quem Græci chalinon uocant, fuerint in passione constitutæ. \* Dandum etiam mastiche masticanda: uel cera indulgentior mordenda: tum ferule particula: & per profectum, tiliæ tabella. Plus enim illorum singula quodam cū certamine partes faciunt exerceri. Tunc danda etiam frangenda arida fabarum grana: uel amygdala molliora: ac nuces, auellane primo, tum etiam \* glandes, paulatim aucto numero quantitatis. Ac si digiti fuerint in passione constituti, erunt commouendi oblatione cere \* emollientis, & malagmatum suprascriptorum, quo non solum motu, sed etiam tactu medicamina propria uirtute medentur. Præterea eodem exercitij tēpore, & in illis quibus totæ manus paralyti fuerint uitiatæ, uel earum quælibet partes, \* altheres erunt offerēdi. Eo enim pondere, pro modo uirium, ægrotantes quodam labore & mortes exercent. Sed erunt a prædictis malagmatibus \* commouēdi, ut primo \* teneant uel bauiulent ægrotantes, tum demum ex ipsis \* simili ratione \* feriendi manus exerceant. At si crura fuerint paralyti uitiata, si fieri poterit, per se ipsos, sin minus, aliorum impulsu, extensione atque \* conclusionē exerceant eas partes, non tamen sine suasionē, \* qua non solum aliorum motibus exerceantur, uerum etiā suis ipsi connittantur. Erunt deniq; ob uarietatem motus, artibus industria partes commouendæ hoc modo. Iacente

χάλινος.

\* Danda uide posthac pa. 341

\* iuglandes,

\* emolliēde

ἀλβή.

\* Halteres, siue Arteres

Artemidoro,

massæ lapideæ

uel plumbeæ,

ansa uel manu

brio addito,

quo commode

tractari possint.

Gal. lib.

2. tuend. ual.

hoc pondere utraque summa

manu apprehenso,

& porrecto, aut in sublimē erecto,

in eodē habitu

persistente eo qui tractat,

musculi &

nerui robur comparari ait.

Quidā & sublatos rotabāt.

Mart. Halte-

res agili rotat lacerto.

Halteras manipulos autor uocat.

Vide lib. 5. capit. 2.

\* motus exercentur

\* commonendi

\* sustineant

\* familiari

\* ferenda

\* conductione,

\* quo

ægroto,



ægroto, cruribus \* imposita fasciola: & superpenden-  
 ti rotule, quam Græci trochilion appellant, alter ex  
 finibus fasciolæ \* inferendum: \* hinc tenendū dare: nūc  
 ministro, nunc ægrotanti demonstrato motu, ac parti-  
 li, qui nunc adducta fasciola subleuet crura, nunc \* in-  
 dulta deponat. Sed cum non solum leuare ac depone-  
 re uoluerimus, sed etiam extendere, aut inflectere par-  
 tes paralyti uitiatas, duæ erunt fasciolæ imponendæ: al-  
 tera genibus, altera talis: tum per supradictam rotulā  
 traiciendæ, & apprehensis initijs similiter offerendæ  
 \* patientibus ministris, ut uicissim ducant, quo, ea quæ  
 genu continet, adducta, & ea quæ talum continet in-  
 dulgēte, hoc motu crura flectantur: Rursum talari ad-  
 ducta, & indulta ea quæ genu cōtinet, cruris fiat extē-  
 sio. Ac si sedere potuerit ægrotans, erit fasciolæ me-  
 dietas pedibus submittenda, cuius \* initia eidem \* tradi-  
 ta, cogatur labore proprio per seipsum adducēdo atq;  
 indulgēdo suis cruribus motum præstare. Simili etiam  
 modo manus in passione constitutæ moueri posse no-  
 scuntur, ut altera fasciola iubeat \* quam oportet \* arte-  
 riam articulis digitorum uicinam, quam Græci carpō  
 uocant, altera cubitum circundari. \* Præmotis igitur,  
 uel exercitis, ut supradictum est consilium dabimus, ut  
 sella tonsoria sedeant ægrotantes, quæ sit obliquis \* an-  
 conibus fabricata, quibus incubentes sese leuare nitan-  
 tur: & tum fulciti ex utroq; alarum latere ministro-  
 rum officio deambulationē tentent, uel incubentes ba-  
 culo, aut uehiculo manibus actō, quod infātibz sæpe  
 motū discētibz fabricatur, sed magnitudine tamen æ-  
 grotantibus cōequandum id est. Dehinc cum gestatio-  
 nis \* augmenta sufficimus, conficienda sunt ligna, quæ  
 transgredi pedibus nitantur ægrotantes. Tunc etiam

\* imponenda  
 τροχίλιον.  
 \* inferendus:  
 \* hunc tenendū  
 ægrotātis mini-  
 stro dare oportet,  
 \* laxata: re-  
 missa  
 \* patientum  
 \* initio  
 \* tradito  
 \* siue dextrā,  
 siue sinistram  
 \* articulatio-  
 nem ossibus  
 \* manuum &  
 pedū artificio-  
 so motu adhibi-  
 to, fasciolarum  
 adductione, &  
 laxatione  
 κατὰ.  
 ἀγκύρις.  
 \* ἀγκύρις, qui  
 uis flexus ad  
 rectum aug-  
 mētū facti, in cur-  
 ru, pariete, pro-  
 montorio, &  
 alijs id genus  
 rebus  
 \* cum gestatio-  
 nes augeri, &  
 uehementiores  
 adhiberi præci-  
 pimus.

perfectis in terra lacunis deambulationem imperabimus, ac deinde calceamētis adiuncto plumbo, prius paruo, ut exempli causa uncia, tum plurimo, atque pro augmentorum gradu usque ad libram deducto: tum etiam itineris celeritas erit augenda: habet enim maioris laboris officium. Varianda etiam omnis regula, ut nunc resumptiuos cyclos in metasyncriticos deducamus, nunc è contrario uersa uice gradum reuocemus.

Cycli resumpti  
ui

μῆτασυνκρι-  
τοι.

\* Patavina.  
Plin. cap. 6. li.  
31.

\* Carentina.  
Carentini su-  
pernates & in  
sernates uicini  
Sulmonēsibus.  
Pli. ca. 12. li. 3.  
Albula.

κατακλυσμῆς

\* ut pag. 184.  
\* potui

Hippocrates.  
Erophilus.

Præterea perseuerāte passione ad hellebori usum probamus accedendem, non solum semel, sed & cogentibus rebus, secundo, uel tertio: tum resumendos, atq; naturalibus aquis dandos, & magis calidioribus, ut sunt in Italia \* Pantherinae, Veseuinae, & Senanae, & \* Caritanae appellatae. Etenim Albae, siue Albulae quae sunt appellatae, quod sint frigidae uirtutis, solutione laborantibus, uel fluore quorumlibet officiorum naturalium à ueteribus sunt approbatae. Utendum etiam nationibus marinis, uel supradictarum aquarum: & primo partibus passione uitiatis inflatae uesicae sunt adiungendae, quo natandi laborem minuant. Item aquarum ruinis partes in passione constitutae sunt subiiciendae, quas Graeci cataclysmos appellant. plurimum etenim earum percussiones corporum faciunt mutationem. Peregrinatio quoque adhibenda \* terrena atque maritima, nec non castoreum \* poto damus, si quisquam eius odoris difficultatem perferre ualuerit. Recorporatiuam curationem, quam Graeci metasyncriticam uocant, utilem denique approbamus, partibus in passione constitutis. Haec est secundum methodon paralyticorum curatio. Veterum autem medicorum Hippocratis atque Erophili sectatores, memorant ea quae in passione constitutos sequuntur, curationem uero nullam

nullam tradiderunt. Diocles libro quo de passionibus  
 atque causis, & curationibus scripsit, eandem dixit  
 conducere curationem, quæ epilepticis est ordinata.  
 Dehinc Praxagoras secundo libro Curationum, pri-  
 mò uomitum probat, & iis præsertim qui caput \* fue-  
 rint paralyti \* uitati, nunc ante cibum, nunc post ci-  
 bum: tum reuocationes \* atque uentristua, & urina-  
 lia medicamina, quæ cœliotica atque diuretica appel-  
 lauit: adhibet etiam clysterem iugem, & acriorem:  
 bibendum etiam cum aceto asininum atque bubulinum  
 lac probat: tum cataplasmata, & malagmata, & su-  
 doris prouocationes: & si quis uomere facîle potuerit,  
 parum hellebori, pulmentis, interiectis diebus admi-  
 scet, neque mox factam paralytin curans, neq; rectâ à  
 uomitu incipiens, & in iis magis qui caput paralyti  
 uitati uidentur, priusquam ex aliis adiutoriis partes  
 fuerint releuatæ. Dehinc \* sensibilis post cibum omnis  
 est uomitus, & multo grauius iugis. At Praxagoras  
 iubet adhiberi quotidianis, aut alternis diebus, \* adhi-  
 bitos suis dogmatibus sublatis erroribus, \* quanquam  
 uentristua, atque diuretica, & clysteres iuges appro-  
 bauerit. Non enim quod mutationem corporis hæc fa-  
 cere ualeant existimauit, sed quod materiæ face-  
 re detractionem, atque corpus liquidis uacuare. Item  
 aceto \* potu dato lac repugnat, \* cuius magis grauis:  
 dehinc qualibus cataplasmatibus, uel malagmatibus sit  
 utendum, dicere negligit. Sed neque tempus adhiben-  
 di discreuit. Non enim quando mitigatiuis utimur ca-  
 taplasmatibus, tum erit malagmatibus utendum. At  
 iste pariter utraque composuit. Item sudores laxatis  
 corporibus fiunt, non ipsi laxamentum faciunt. Sed  
 neque quemadmodum sint prouocandi docuit, aut me-  
 morauit.

Diocles.

Praxagoras.

\* habuerint

\* uitatum

\* per

νοηστικῶς.

Διηρητικῶς.

\* grauabilis

Praxagoras.

\* nondum à

suis

\* ut qui

\* potui

\* eiusq; magis

usque grauius est

quàm supradic-  
torum.

morauit. Item album helleborum paruum datum præfocationis ingerit periculum, & multo potius quoties sunt in uomitum difficiles egrotantes. Mitto, communiter cum dixisse interpositis diebus offerendum, & tempus non memorasse, cum passionem i. cecesse sit

*Erasistratus.* superpositionibus, ac lenimentis uariare. Erasistratus de paralyti scribens, differenter curandos ait eos qui \* conductione \* conclusionem sunt paralyti uitiati, ab iis qui extensione uidentur affecti. Etenim neque cataplasmata,

\* *Herasistratus* neque \* malagmata secundis inquit conuenire: non aduertens, quoniam etiam strictura densata quedam corpora, ui \* maiore, non aliter quam chordæ, tenduntur, laxatæque, medicinalium uirtute, sæpe \* retenduntur. \* Item initio curationis clysterem probat, phlebotomiæ negligēs potētiam: quo adiutorio maius nihil \* maioribus approbatur: tum, inquit, effecta febricula detrahendum cibum, & dandum mulsum ex aceto \* cōfecto. Profecto densata id constringet. Tūc obseruatis temporibus accessionum uel dimissionum, dandam ptisanam probat, aut olus: quorum alterum inflat, alterum faciliē corrumpitur. Dehinc aromaticas approbat potiones, & aliās mites, aliās uehementes. Vtremque quoque facilem cupit, ex quo stomachus necessariō uitiatur, & neque quanta, neque quando, neque quæ danda sint memorat. Prohibet etiam \* unius anni spacio, una intentione tempus definienti. Dat etiam lac cum melle, atque sale, quod est contrarium supradicto mulso ex aceto confecto. Vtitur præterea uomitu post cibos, quod iā superius fieri

seritim strictura factam, qualis est paralyticorum, sanari. \* vehementer, ego Apūs. \* conducuntur, compinguntur, & ab extensione liberantur. \* Idem \* autoribus \* confectum. \* vinum rini, eius loco supra oxymel imperauit.

damna

damnauimus. \* Vitiat etiam deambulationibus harenosis in locis, ex \* sola \* intentione sui dogmatis. Etiam uentrem facilem cupit, caduca suspitione deceptus. Asclepiades uerò principaliter de paralyfi nihil scripsit, sed Erasistrato respondit, eos inquit, qui non graui dolore in ista passione afficiuntur, phlebotomari non oportere. Eos uerò qui priuati sensibus peiore strictura uexantur, abstinendos primò, tum \* initandos probat. Adhibet etiam purgatiua medicamina, quæ Græci cathartica uocauerunt, cum sint hæc corruptiue uirtutis, & propterea corpus \* eliminando, consumant potius, quàm relaxent. Sed specialiter \* à laxatione paralyfi uitiatas adurentia inquit medicamina conuenire, & fomentationem paruam, paulo \* feruentius temperatam: non aduertens quia \* plurima extenta \* conclusis similem exigunt laxationem, atque indulgentiam tensionis, & ut existimat, \* conscriptionem. \* Vtraque etenim hæc passioni subiecta sunt, ut etiam stupor corporis, uel frigidus torpor, quem non semper necessariò uaporationibus calidis, uerumetiam \* frigore adhibito releuamus. Siquidem contrariis inter se \* passionibus hæc subiecta monstrantur. Ordinatur præterea idem in harenæ spacio deambulationem, & quod appellant \* scamma, \* atque transcensum lignorum, & inter plurimum tempus bibendum uinum. Themison primo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare cognoscitur, nondum rectam methodon respiciens. Etenim phlebotomat ex ea alam descendit. \* conductæ & extensæ \* Aphor. 21. lib. 5. \* τὸ σκάμμα: siue τὰ ἰσὰ αὐτῶν, limes ac terminus spatij, quod transiliunt qui saltu sese exercent, uel appposito longurio factus, uel ducto sulco. Sic tigna uel trabes in designato ambulationis spatio collocatas Aurelianus uocat.

\* nempe Themison.

\* Vexat  
\* stulta  
\* quia laxatione morbum hunc fieri putabat.  
Asclepiades.  
\* phlebotomandos. Alij inaniendos  
\* eius substantiâ dissipando.  
\* ex luxatione  
\* feruentiorem  
\* temperata  
\* plurimum  
\* conductis  
\* circumscriptione. Sic vocat obicem crura, quæ caustico aut ferro cadente inducta sese obiciunt ossi capiti, quod è suo cavo delabitur, & sic illud in loco suo continet, quemadmodum Hippoc. lib. de Artic. faciundum docet, cum humeri caput frequenter in alamurationibus

parte quæ passione uitiata est, si, inquit, sensu non caruerit: non curans, ut suprà demonstrauimus cuitanda omnia, quæ adiutorio quadam necessitate ueluti uexabili uidentur esse coniuncta. Dehinc lanam succidam, quam æsypion appellant, capiti iubet imponi. aceto atque oleo rosaceo infusam: neruis autem ceruicis atque spine, & cruribus, & brachiis, uinum atque oleum cum sale imponendum iubet, constringens atque lacescens incongruè ea, quæ phlebotomia miti releuatione laxauerat. Tum tertia die cibum probat, atque quarta die cucurbitam imponi adiuncta scarificatione, non

\* *observans* \* interrogans passionis tempus, sed solum numerum dierum imprudenter attendens. Dehinc sequentibus

\* *ea* gestationem probat, neque in \* *eo* definiens tempus, atque audaciter secundæ diatriiti expectationem spernens. Dat etiam aloem in potu, & ex aqua calida,

\* *cum* \* & oleo intestinis dare laxamentum ordinat. Præterea anatresin testæ faciendam, quam nos perforationem uocamus, iam dudum quidem & in aliis methodicis explosam, & \* *in harena* deambulationem conuenire existimat, atque plagis ferulæ cædendas partes in

\* *que profecto* passione constitutas, \* *profecto* quæ falsæ aquæ mitigatione atque recorporatione uidentur esse curandæ.

\* *Lucius, cuius malagma describit Aetium pag. 844.* \* *medicatu* Lusius primo libro Tardarum passionum cum his omnibus, tum \* *medicosis* quoque fomentationibus utendum probat. Plurimi etiam alij aceto, atque oleo \* *rosco* fouentes, cum herpyllo, & ruta, & he-

\* *rosaceo, ut paulo suprà. Celij liber grecarum Epistolarum.* dera, & castoreo: probant præterea iuges clysteres, atque purgatiua medicamina, quæ cathartica uocauerunt, & magis hieram, cuius usum Græco libro Epistolarum ad Prætextatū damnauimus scribentes. Sunt enim ea quæ stomachum uitiant fugienda, ut sunt cor-

pus

pus infumentia, & quæ moderationis nostræ carent potestate. Theſſalus ſecundo libro de Regulis ſcribēs, Theſſalus. plurima rectè dixiſſe probatur: quædam uerò proterua feſtinatione caduca. Etenim poſt phlebotomiam uſque ad tertium diem imperat abſtineri, & ſolum potum\* diurna cum luce offerendū: tum tranſacta tertia die, atque hora qua ſunt ægrotantes paralyſi uitati,\* cibum portat. Quibus reſpondere facile quiſquā poterit, ſi quærat, qua intentione Theſſalus oriente luce potum iubeat dari. Etenim ſi\* continuationis cauſa id fieri reſponderit, oportebat etiam cibum eodem tempore approbare. Sin uerò acceſſionum frequentia id exiſtimat\* declinādum, uel ſuſpicionem futurarū, & propterea poſt tertium diem cibum tranſferēdum, quo tranſacta hora paſſionis illatæ tertia die rectè ægros nutrire uideamur: oportebat etiam potum non communiter, ſed generaliter diurnis diebus,\* uel initio lucis offerre, ſed horarum dimiſſione captata. Dehinc non ſemper ac neceſſariò tertio die cibum oportet dari, ſed etiam quarta\* continuationis,\* quæ initium ex die ſumpſiſſe uiſa, uel ob typum eadem ratione currentem. Idem poſt hæc, ſimuliter ut Themüſon, quarta inquit die cucurbitas inſigendas, non interrogans utrum paſſio ſumpſerit ſtatum, quod eſt maxime ſeruandum. Ait præterea alternis diebus cibandos uſque ad\* centum numerum dierum, quod infinitum reliquiſſe perſpicitur. Audaciter etiam, atque inuidioſe acopa quædam, uel malagmata probat excludenda, ſolius moderationis\* neglecta arguens uitia. Hæc ſunt quæ etiam Theſſalo Sorani diligentia uidentur eſſe reſponſa.

\* ſub aurorā: diluculo, oriente luce.

\* dandum probat.

\* quia morbus in longum tempus continuatur.

\* quo potum datur.

\* negandum cibum.

\* nec

\* continuati morbi

\* nempe dandi initio eo

ſumpto ob typum: nempe

quia quarto tantum die mi-

teſcere atq; remitti morbus

incipit, qua occasione cibum

dandus eſt.

\* certum

\* neglecta Soranus.

De



mus: tum resinæ\* cabialis, hoc est dicaminis illinimen-  
tum uel dropacis: dehinc etiam ex puluere\* nitreo la-  
cera fricatio quam Græci\* mixin appellāt, uel smeg-  
mata, quorum compositionem Responsorum tradidi-  
mus libris, uel\* lemnida cum oleo, aut\* piretro cum pi-  
pere. Item unctiones ex oleo syriaco, & opobalsamo,  
& laurino, atq; irino oleo, & butyro, & pice liqui-  
da\* apponenda naribus, atque narium cauernis: Tunc  
etiā sinapismus, & gargarismata ex sinapi, uel aqua  
marina, aut decoctione thynni, origani, hyssopi, \* glau-  
cij, quod nos pulegium uocamus, & horum\* similibus.  
Dehinc mutatio locorum appetenda, & magis mari  
timorū: tum usus aquarum naturalium, quibus erit ca-  
put fouendum. Decessores uero medici, nondum rigo-  
re methodico obtinente, in quibus est Erasistratus, se-  
cundo libro Salutarium præceptorum, & Asclepia-  
des tertio Celerum passionum, item Themison Salu-  
tari libro, atq; primo tardarum passionum, quas chro-  
nias appellant, \* meratum potum dari iusserunt. Ait  
enim Asclepiades duplicandam uel triplicandam quan-  
tatem uini solitæ temperationis, adeo ut uni cyatho  
unum admisceri iusserit, quo uini & aquæ quantitas  
coæquetur. Sed hoc facit in tardante passione. Etenim  
recentem atq; nouam curans, libris quos ad Geminiū  
scripsit salutarium, uinum prohibendum tradidit. Era-  
sistratus uero etiam pileum uini calidi infusione infla-  
tum capiti imponendum iubet: Lateribus uero ac præ-  
cordiis lanæ apponendas, uino atq; oleo calido made-  
factas: Quorum, primo, \* neruoriam uitabilis est me-  
rata potio, atque capiti faciens inflationem: Dehinc  
etiam\* abstinentis uino, uel solutæ consuetudinis gra-  
uabilis: atque noxius est usus pilei uino calido præfusi,

\* cabialis, hoc  
est liquaminus.  
Cabiale vocat  
Resinam liqui-  
dam, quod ca-  
da aduolere-  
tur.  
Nitri lanci-  
nans  
\* μύξιν.  
\* γλυκίστα.  
\* lemnisida  
\* pyretro  
\* apponendas  
\* Elecons  
\* similium  
Erasistratus.  
Asclepiades.  
Themison.

\* meracum  
Asclepiadis li-  
bro Salutarium  
ad Geminiū

\* neruis vexa-  
bilis est meraca  
\* abstinentia  
à uino, uel so-  
luta consuetu-  
do: relictæ ui-  
ni miscendi ac  
diluendi.

\* vaporum  
 \* Lucius ut  
 pag. 334.

\* est  
 \* delinc  
 \* non meracū

\* tussicularis,  
 quam Bechion  
 appellant:

\* curationem,  
 illū libro Epi-  
 stolarū ad Di-  
 mantem, hunc  
 secundo Regu-  
 lari. Epistole  
 Themisonis ad  
 Dimantem ci-  
 tantur. lib. 4.  
 cap. 1.

\* plurimū sul-  
 plurim admisce-  
 dum cibi  
 \* aspergendum  
 \* melanthium  
 siue Auriflorū

uel lanæ tinctæ lateribus ac præcordiis circumpositæ,  
 ob \* dolorum uehementiam. \* Lusius secundo libro  
 Tardarum passionum, cum de iis quæ faucibus acci-  
 dunt disputaret, hoc est de supradictis fluoribus, etiam  
 aridam sicum torridam, atque uino infusam ante ci-  
 bum dari iubet. Siquidem rudis atque noua difficili-  
 me \* sit digestionis. Sed \* hinc ait mixtum calidum sor-  
 bendum, hoc est, uinum cum aqua supradicta, \* mera-  
 tum. Idem admixtam sandaracham, quæ sit ex oui al-  
 bore conspersa, in quantitatem oboli unius igni im-  
 ponendam iubet, uel radicem herbæ \* tussicularis,  
 quam uehion appellauit: tum per infundibulum ore  
 rapere fumum adducto uento imperat ægrotantes,  
 cum sit capiti uehementer contraria supradictorum  
 incensa fumatio. Generaliter autem, atque commu-  
 ni repulsione arguendos Erasistratum & Asclepia-  
 dem arbitramur, primo quod nō uiderint pro passio-  
 nis motu in curationibus urgentiora nimis præponen-  
 da: Themisonem uero & Thessalum, memorantes con-  
 strictiuam curationem, \* libro hæc demetico atque  
 secundo Regulari, quem dieteticum uocant, culpā-  
 dos arbitramur, quod non uiderint aliquando strictu-  
 ram fieri superiorum: Item \* plurima sulphureosa ad-  
 miscenda quod satis sit probauerunt, & lanis quibus  
 thorax circundatur, \* aspergenda, ordinantes etiam  
 odora menta yris illyricæ aride contusæ, atque eius  
 oleum: item opobalsamum, & \* melanthium linteolo  
 ligatum naribus frequenter admoendum, & anisum,  
 & cuminum, & rutam, uel destillationem amaricini  
 olei, & samsucum, & styracem, uel ex eo oleum con-  
 sectum, quod styracinum dicitur: item hedicroum,  
 uel murrā cum thure & sulphure, & radicibus  
 sylphij

ſylphij, quæ omnia caput implent, & propterea ſunt  
cuitanda magis acceſſionis tempore: in lenimento ue-  
ro ratione recorporatiuæ uirtutis, atque interieſtio  
tempore, per interualla adhibita poterunt adhiberi.

## De Tuſſicula.

## Cap. VIII.

**T**uſſicula nunc arida, nunc humecta corporibus  
irruit, multos ac pingues humores excludens: \* craffos.  
& quibuſdam ſola, quibuſdam adiuncta reſpirationis  
difficultate, quam Græci diſpnœan uocant, item ſan- *Ασπνυια.*  
guinis egeſtione, aut phthiſica paſſione, uel horum ſi-  
milibus affectis corporibus. Sed de iis tuſſiculis quæ  
aliarum fuerit appendices \* paſſionum, ſingulatim ſcri-  
bentes docebimus: de iis uero quæ ſuæ ſunt, atque  
propria uexatione corpus afficiunt, nunc tradimus cu-  
rationem: quæ ita erit adhibenda, ut de catarrho ſcri-  
bentes docuimus: diſcreta \* ſcilicet ſpecie, quo poſſint  
cleſtaria, atque pota medicamina, uel catapotia, ſiue  
alia quæq; ſub regula medicinali recte mederi corpo-  
ribus. Monendi etiam ægrotantes, ne ueſtra modum  
competentem \* retinendo ſpiritum \* alterent potius  
tuſſiculam quàm mitigent, quod quidem ſi fuerint mo-  
derati, eius motum facilius amputare datur quam ni-  
mis ſpiritum continendo. Tum apponendum per quod  
æger adducto ſpiritu accipiat uaporem ex mulſo, uel  
alica, aut ſucco \* ptiſanæ: uel eorum quiddam ſorbeat:  
aut ex aqua calida uaporem accipiat. Videnda etiam  
uua, ne ob tumorem ſui, aut indulta laxitate, tuſſiculã  
prouocet. Tum gargarismaſibus, uel inunſtionibus  
utendum, circa thoracem atq; gutturis ſuunitatem,  
Græci anthereona uocant. Epithemata etiam appo-  
nenda, nunc laxatiua, nunc conſtrictiua, quorum ſpe-

\* aut pleuriti-  
dis, Peripneu-  
monia, inſlam-  
mationis hepa-

\* ſtricturæ atq;  
ſolutioni de  
quibus ſupra  
multoties ver-  
ba fecit.

\* Nam deten-  
tionē ſpiritus  
in hoc morbo  
quidam rtilē  
iudicauerunt,

\* irritent  
\* ptiffanæ

cies ex antedictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere uideamur.

De Sanguinis fluore. Cap. ix.

**S**anguinis fluor occultis ex locis ueniens uelut sæpe salutaris est, ita uehemens ingerit periculum, quibusdam extemplo, ob redundantiam floris, celerans mortem, \* corpore disiecto: quibusdam in postremum effecta phthifica passione, uulnere non coeunte: siquidem primo tumet, dehinc excoriatur, atque fluidum

\* rixibus prostratis, & accisis.

\* madore fordescit ac pus reiecit. aph. 16. lib. 7.

\* sanguine multo abundare

\* Diuanescent hebetantur.

\* adueniant

\* imperitè & ignoranter. Inertia dixit pro citra artē

ex \* uapore fit. Sunt autem quæ conuentum siue glutinationem uulnorum impediunt, plurimæ, uel innumerales causæ. Etenim natura altiora plurimum feruere necesse est, atq; fluida \* qualitate manere, & multo uel assiduo motu pulsari. Obstat etiam, quod occulta, atq; alta, atq; celata sint uisu, & à uicino medicaminum tactu remota. \* Frustrantur etenim frequenter eorum illatæ qualitates, priusquam locis patientibus \* aduenient, itineris detrimento, cum non statim, uel extemplo illibata partibus patientibus admouentur. Sunt autem passionis antecedentes causæ, ut sæpe approbatum est, percussio uel casus, item exclamatio, uel ponderis perferendi conatio, uomitus uehemens, aut Venus plurima, & tussicula perseuerans: item abstinentia hæmorrhoidarum ueterum, quæ fuerint \* inertia amputatæ, nec iuxta methodicam rationem curatæ: item catarrhus. Sed non erit secundum has differentias curationis regula commutanda. Nominatur autem sanguinis fluor duplici significatione, propria, & abusua. Nam propria est, qua ex supernis partibus labens fluor significatur, ut de capite per sensuales uias: Abusua est, qua etiam ex inferioribus ascendens fluor significatur, ut ex pulmone, uel stomacho, nausca

nausea, aut tussicula exclusus. Impropriū est enim fluorem uocare id quod ascensu quodam, non lapsu fertur. Sed hæc Græci uersa uice posuerunt, deriuationem nominis intuentes. Hi enim \* anagogen uocant quod magis ex inferioribus ad superiora fluorem significat. Differt præterea fluor sanguinis à sputo, quod neq; fluor sanguinis sputum dici potest. Paruam enim materiae significationem sputus refert, fluor plurimæ: neque sputus sanguinis fluor est supradicta ratione. Paruam enim materiam sanguinis ex gingiuis, aut uua, aut faucibus emissam, sputū magis quàm fluorem recte nuncupamus.

Quot, vel quæ sint differentia fluoris sanguinis. Cap. x.

**D**ifferētias etiam fluoris sanguinis ueteres quæsierunt. Et quidam aiunt unam solam esse uel intelligi, hoc est uulnerationis, ut Themison libro Tardarum passionum. Alij uero eruptiones, ut Hippocrates, Euryphon- Sed Hippocrates solarum uenarum, Eurypho uero etiam arteriarum. Alij duas differentias posuerunt, eruptionis, & putredinis, ut Asclepiades. Alij tres, eruptionis, & putredinis, & osculationis, quam Græci anastomosin uocant, ut Erasistratus. Alij quatuor, adiicientes \* expressionis, siue sudationis, ut Bachius, adferens ex gingiuis sanguinē fluere sine ulla uulneratione, & in curationibus fracturarum sæpe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiri. Demetrius Herophili sectator, duas inquit esse principales differentias fluoris sanguinis: unam incisuræ, aliam sine ulla incisura. Speciales uero plurimas, quas principalibus subiiciendas ordinauit. Etenim quam memorat \* incisuram fieri, in

ἀναγωγή.

\* eadem ratione vox hæc introducta est, qua & Græci ἀναγωγή dici posthac scribit, infra. c. 14.

Themison.

Hippocrates.

Eurypho.

Asclepiades.

ἀναστροφῆς.

Erasistratus.

\* διακρίσεως.

Græci uocant

Bacchius.

Demetrius.

Herophilus.

\* incisura

\* raritate viarum fieri ut in sine capitis, raritas vasis ad tunicarum vasis laxitatem pertinet: expressio ad sanguinis liquidioris & nimis fluxilis tenuitatem.

ἀραια.

ἀραιότητα.

\* expressione

\* etiam

\* enim

\* est

\* tenuia ferri

\* ex aliis locis,

non ex iislem

\* Nam acer

humor qui ro-

dit, in parte

quam ulcerat

gignitur: qui

autem vasa di-

uidit, & perru-

pit, aliunde im-

mittitur.

\* ferri

\* rationabili-

ter

\* pulmonis sic

ri putredinem

Soranus.

\* At

\* raritate

duas diuisit partes: quarum alteram uocauit eruptionis, alteram putredinis. Eam uero quæ sine ulla diuisura est, in quatuor diuidit partes: quarum unam \* uarietate fieri dixit, aliam expressione siue sudatione: tertiam defectione uel debilitate corporum, quæ Græci atoniā uocant: quartam osculatione: uult enim eam differre à supradicta, id est, \* expressionis, quam tertiam nominauit. Osculari \* enim inquit corpora nimia plenitudine, siue uirtute medicaminū osculantium, quæ Græci anastomatica uocant: & magis inquit uenarū ultimos fines: exprimi \* etiam sanguinem, siue excludi per uenarum latera. Alij Asclepiadis sectatores unam esse dicunt differentiam fluoris sanguinis, hoc est eruptionem. Siquidem omnem sanguinis solutionem eruptione fieri Asclepiades memorauit, negantes eam osculationis differentiam, siquidem \* sit impossibile sanguinem crassum \* tenera fieri per oscula, uel excludi. Item putredinis esse differentias negant, siquidem \* ex iisdem, non \* ex aliis locis acrior humor \* fieri uideatur. Alij uero eundem Asclepiadem non \* naturaliter putredinis differentiam ab Erasistrato constitutam expugnasse dixerunt: non enim ex aliis locis acriore ueniente liquore \* pulmonem fieri in putredine accepimus, sed eundem quadam passione in putredinem, uel acerrimos transire liquores. Nos autem iuxta Sorani iudicium hæc questione nullis commodis curationes adiuuari probamus: sed dicimus tres esse differentias fluoris sanguinis, hoc est, eruptionis, uulnerationis, & putredinis, siue lacerationis ex tussicula uenientis, sicut operantium manus iugi frictione laceßiti uulnerantur. \* Item sudatione sine uulnere, siue ex \* uarietate

vietate uiarum effectus fluor \* osculationis differentiam tenet, siue expressionis, uel cuiuslibet alterius causæ.

Quomodo intelligamus differentiam fluoris sanguinis.

Cap. XI.

**Q**uasitum etiam quomodo supradictæ differentie intelligantur, uel apprehendantur. Sed discernantur hoc modo. Nam eruptionis esse intelligimus fluorem, quoties repente egrotantes atque \* limpido sanguinem fluunt, nulla querela uulneris præcedente. Vulnerationis uero differentiam dicimus, siue putredinis, uel \* defricationis, cum adiuncto humore purulento sanguis excluditur, & non repente uel coadseruatim: præterea antecedente longi temporis, uel mulcorum dicrum tussicula, uel catarrho. Item sudationis dicimus esse, cum nullus fuerit uulneris sensus, aut acceptorum cibo uel potu acriorum materiarum mordicationis affectio. Qui sunt loci ex quibus sanguis fluit? Loci sunt plurimi, summitas faucium, arteria asperior, quæ etiam faux nuncupatur, pulmo, thorax, & membrana quæ interius latera cingit, à Græcis hypozygos appellata: item membrana quæ thoracem à uentre discernit, à Græcis diaphragma appellata, quam nos discrimen dicere poterimus: item stomachus, uenter, & secundum aliquos iecur, ac lien, & uena maior, quæ spinæ cõiuncta est. Quomodo intelligimus ex quibus locis sanguis feratur? \* Intelligimus locos ex quibus \* sanguis fluor, uel lapsus fertur, \* quod erit aptissimū, ob adhibendā curationē iisdē, uel eorum uicinis partibus, & nō, ut quidam existimant, commutandæ curationis causa, cum generaliter eadem cunctis

\* siue osculatione, siue expressione, siue cuiuslibet alterius causæ ratione, ruptionis differentiam tenet.

\* limpidum sanguine

\* corrosione, lacerationis, uel pagina præcedente.

καὶ σπύρον.

Διάφραγμα

Discrimen

\* Discernimus quidem  
\* sanguinis  
\* quoniam est



\*probemus      adhibenda \* probamus, ijs igitur qui ex supernis fau-  
 \*sanguine      cium \* sanguinem fluunt, primo paruus intelligitur  
                      ferri, aut si plurimus, non spumofus. Præterea cū quo-  
                      dam ex creatu deſpuitur: ipſæ quoque partes ſumpto  
 \*depreſſa      cibo, uel potu, aut gargarifmate mordicātis materiæ,  
                      dolore pulſantur, & inſpicientibus nobis \* expreſſa  
 αὐτοὶ δὲ λέγουσι αἱ  
 \*ſunt            etiam, ut Eraſiſtratus ait, tubercula, quæ Græci con-  
                      dyloinata uocant, uiſibus occurrunt, quæ \* ſint ſimilia  
                      hæmorrhoidis, ex quibus ſanguis fertur. ijs uero qui  
                      ex arteria ſanguine fluunt, paruus atq; flauus ſanguis  
                      ferri perſpicitur: & ſæpe ſalius uel humoribus com-  
                      plexus, in imaginem capilli unius, aut multorum. Se-  
                      quitur etiam pruritus, ac mordicatio, & magis circa  
                      extantiam gutturis, cum quodam titillatu, & tuſicu-  
                      la leui: Tum deinde plurimus ſanguinis fluor: uox  
 \*rauca: obtuſa      \* hirta cum dolore, qui nunc \* tactu mouetur, nunc  
 \*titillatu            tuſicula uehementi: plurimus, tenuis, & ſpumofus, &  
                      plurimum feruens ſanguis excluditur, atteſtante tho-  
                      racis grauedine, & aliquando dolore, cum uoce hir-  
 \*tato              ta, & ſæpe \* cibo quodam, cum infracto ſonitu, eo  
                      tempore quo ſanguis excluditur, ijs uero qui ex dia-  
 \*prædictis        phragmate, quod iam dudum diſcrimen uocauimus, &  
                      cætera \* prædictos ſequentur communia. Sed dolor  
                      inferius à pectore fit, rotunditate quadam thoracem  
                      pungens. Eos autē qui ex hypozygo ſanguine fluunt,  
                      multa ſimilia ſupradictis ſequentur: ſed dolor ſecun-  
                      dum latera uel pectus, aliquando etiam inter ſcapulas  
 \* & minus co      fit: ipſe quoque ſanguis minus flauus, \* minus excludi-  
 proſus            tur. In \* eos qui ex ſtomacho \* ſanguinem fluunt, ſine  
 \*ijs                ulla tuſicula uomitus ſanguinis ſequitur, nigri, atque  
 \*ſanguine        gelati, & nunc ſolius, nunc cum admixtione cibi,  
    atte

attestante dolore inter utrasque scapulas, ad\* superio  
 res tendentem, & magis eo tempore quo quædam re-  
 mordentia transuorauerint egrotantes. Accedit etiã  
 animi desponsio cum fastidio cibi, & salinarũ \* fluor,  
 & corpore frigido, & pulsu obscuro, uel demerso, \* sanguine  
 ijs uero qui ex uentre \* sanguinem fluunt, cum supra-  
 dictis, quæ sunt cunctis communia, sequitur etiam dol-  
 lor, & mordicatio, uel tormentum inter præcordia,  
 & aliquando sanguinis particula per officium uētris \* excluditur  
 \* excludetur. Item ijs qui ex iccore uel splene \* san-  
 guinem fluunt, uel ex uena magna, quæ spinæ coniu-  
 cta est, ut quidam memorant, sensu loca designantur.  
 Nam in dextera parte præcordiorum \* dolorum dolo  
 re aurigineo sequetur eos qui ex iccore fluunt. Item  
 in sinistra parte præcordiorum hæc accidunt, quoties  
 ex liene sanguis ferri perspicitur: uel secundum spi-  
 nam, quoties ex maiore uena ferri dicitur. Sed Sora-  
 nus alta consideratione ex ijs \* locis per uentrem, ac  
 per eius officium ferri sanguinem magis quam per os  
 posse credibilius approbavit, ijs uero qui ex gingiuis,  
 uel uua, uel faucium lateribus, uel tonsillis sanguine  
 fluunt, supradictorum nulla sequuntur, sed locorum  
 uulnerationem ore aperto oculorum approbat uisus.  
 Item ij qui ex capite \* sanguinem fluunt acceptũ pri-  
 mo, uel exceptum internis uisceribus, \* atque ita red-  
 ditum, si in arteriam defluerit, excludunt: deinde,  
 cum tussicula, uehementi etiam, \* quam de pulmone se-  
 ratur similitudinem dabit. Sin uero in stomachum de-  
 fluxerit, uel uentrem, commota nausea uomitur, \* etiã  
 quam ex iisdẽ locis ferri uideatur similitudinẽ \* dabit.  
 Sed discerni hoc facile potest, siquidem egrotantibus  
 feruor igneus ora \* pertractans antecedit, & capitis \* perurens

\* superiora ten-  
dente

\* fluore,

\* sanguine

\* excluditur

\* sanguine

\* dolor cum co-  
lore aurigino-  
so sequitur in  
ijs\* Hepate.  
Splene uena  
magna.\* sanguine  
\* ac postea\* qua ueluti se  
de\* & etiã tan-  
quam  
\* dat.

\* perurens

grauedo, uel dolor, & extensio uenarum, & magis ea-  
 rum quæ tempora uel frontem cingunt. Sequitur etiã  
 \*nares faucium titillatus, & aliquando per \*narium quædam  
 sanguinis distillatio, uel per eas caueanas quæ ad fau-  
 \*exerta ces ex capite descendunt, quod aperto ore, atque \*ex-  
 \*quia uicina perta lingua uisu probatur, & \*uicina loca quoq; san-  
 guinolenta apparebunt. Aliquando etiam \*remeantis  
 quoque loca materiæ causa laxiora \*transuorationis efficiuntur  
 \*cumeantis loca, & ægrotantes excreatu quodam sanguinem re-  
 \*transpirationis spuunt, accipientes ex supernis, adducto spiritu, ut sæ-  
 pe muculenta consueuerunt dormientes. Præterea in  
 \*ad excreadū ore collectus \*excitat sanguis: uel transuoratus, &  
 in stomachum, uel in uentrem ueniens premit perma-  
 nens ægrotantes, aut eiectus releuat: & ij qui pas-  
 sione afficiuntur, acceptis uel transuoratis remordenti-  
 bus materijs nullam interiorum mordicationem sen-  
 tiunt, quod necessario eos qui ex stomacho fluunt se-  
 quitur. \* Ac si in arteriam flux erit, tuſſicula rursum  
 excluditur: quo reiecto ægrotantibus tuſſicula mitiga-  
 tur. Siquidem nulla inesse uidetur interioribus rema-  
 nens causa, quæ tuſſire prouocet ægrotantes: nisi forte,  
 quod est rarissimum, aliqua corpuscula gelati sangui-  
 nis inhæreant interioribus locis. Itē de pulmone fluens  
 discernitur, quod iam præcedente tuſſicula in fluorem  
 ueniant, inde tuſſire non desinant. Communiter autē,  
 cæteris inter se paribus signis, ex arterijs ueniens san-  
 \*tenuior guis \*tenuior, ac rubri coloris, & spumofus esse per-  
 spicitur: ex uenis nero crassi or, & atrii coloris. Hæc  
 est locorum singulatim posita significatio.

ἀποτελεσμα.

De effectu siue exitu supradictarum pas-  
 sionum quem Græci Apotelesma  
 uocant. Cap. XII.

Quæsi

**Q**uæsitum de euentu, siue exitu, uel effectu passionum. Nam Erasistratus facile curabiles succulentos homines dixit, atque fortes, & paruicollēs, quos microtrachelos appellauit, hoc est, qui minime longitudinis habent colla: difficile autem curari posse tenuēs, ac debiles, & porrecta collorum longitudine formatos. In his enim, inquit, summa cum difficultate \* sanguis & tussis plurimam per colli longitudinem \* tractus, & quod obsident uuida plurimo tēpore habitudinem gutturis, siue cannæ, quam arteriam uocāt, ob hoc graues atque tardas tussiculas faciunt. Asclepiades difficile curabiles inquit succulētos, atque carnosos, ob uehementiam spirationis. Eadem ratione etiam atates medias, & pueros: celerius etenim inquit spiritū ferri, & in sputis \* perscindiendis offensione car \* affeccionibus retardari. Plurimi deinde etiam \* affeccionibus uitæ quæsierunt, & regiones, & temporum annales partes. \* Item per putredinem factum fluorem \* difficile curabilem dicunt, ab eō qui eruptione fuerit effectus: siquidem putrefactæ partes non \* coquant. Nos uero iuxta Sorani sententiam fluores sanguinis alios dicimus esse nouos corporibus atque recentes, alios tardi temporis atque inueteratos: & alios solos, alios cum \* tumore, alios etiam cum febricula, & tussicula: & alios iuges, alios dimissionibus intercapdinatos: ordine seruato, aut inordinatos, & superpositionibus ac lenimentis magnis, aut paruis: & detracta uirium fortitudine, \* ac seruata. Hæ sunt enim urgentiores differentię, secundū quas diligentiam uariamur curationis, siue \* seruata, siue incerto motu existente passione. Sed difficile curabiles fluores, præ ceteris dicimus tardos magis recētibus, ob iugē perseuerationē:

Erasistratus

μικροτράχηλοι.

\* sanguinis  
\* tractus est: et

Asclepiades

\* perscindiendis

ἐπιτρίδιμα-  
τα:

\* Idem

\* uita genae:  
studia in quib.  
uita exiguus.

Soranus.

\* difficilius

\* coeunt

\* phlegmonē

\* aut

\* certo

item

\* hanc com-  
plexionem  
\* dictis

\* enim

\* nec plethuri-  
cis, nec ca-  
cochymis.  
\* effecti

\* carent,  
\* facilitatem

\* multū mo-  
tu

item cum tumore, uel febribus ab iis qui soli esse per-  
spiciuntur. Etenim supradicti spem futuræ congluti-  
nationis negant, & ob \* hoc complexioni contraria  
sepe adiutoria poscunt, quæ sint \* diuersis aduersa:  
item iuges fluores ab iis qui dimissionibus mitigantur.  
Etenim graue, atque minimè tutum omne quod nulla  
fuerit mitigatione uariatum: item inordinati ab iis  
qui ordine seruato corpus afficiunt. Est enim insidio-  
sa curationi temporum inopinata uarietas. Non ali-  
ter etiam superpositione asperati fluores curatione  
difficiles ab iis qui in lenimento constituti sunt, iudi-  
cantur, ob prædictam rationem uulnerum. Item ij qui  
plurimum corpus affecerint, atque uires egrotantis  
insumpserint. Dat \* etiam adiutoriis medicinalibus  
fortitudo corporis uiam. Hæc denique etiam in uul-  
neribus nudis, hoc est, in exterioribus partibus cor-  
poris constitutis fieri cernimus, cum iuuenibus, uel  
ut specialiter dixerim, athleticis & laborantibus ho-  
minibus facilia uulnera fieri uideamus: senibus uerò,  
& omnibus imbecillibus, difficilia. Quapropter etiam  
in \* uacuis, uel exercitatis corporibus Asclepiadis di-  
cta minimè conueniunt. Item ulceratione facti fluores  
difficiles curatione ab iis qui eruptione fuerint \* affe-  
cti iudicantur. Siquidem transceso, atque prætermis-  
so initio nouitatis fructu \* caruerint, quo facilis glu-  
tinatio fieri solet: negat enim tarditas \* facultatem.  
Item eruptione facti fluores ab iis qui sine eruptione  
fuerint, diffciles sunt curatione. Eius enim factæ glu-  
tinationes alterius passionis initium referunt. Item  
ex partibus \* multis factos fluores, ab iis qui paruo  
motu agitantur diffciles curatione accipimus. Est  
enim motus coherentium partium disiunctio. Item ex  
occultis

occultis partibus uenientes ab iis qui \* proprias tenuerint partes. Etenim adhibita adiutoria occultis uel celatis partibus, uitiatæ suæ uirtutis sinceritate, perueniunt, sanis primò locis excepta, ac deinde transmissa: ij uerò qui ex primis locis fluores ueniunt, indomita adiutoriorum uirtute curantur. Denique à stomacho, uel uentre, aut faucibus uenientes, faciliè curabiles approbamus. Etenim pota medicamina patientibus primò locis adueniunt, & non nimio, aut iugis naturæ motu \* exercitatis. Ii uerò qui ex hypozygo membrana fluores uenerint, difficiles curatione iudicantur: & magis si ex diaphragmate, quod nos iamdudum discretorium diximus: item ex arteria, hoc est pulmonis calamo. Omnium præterea maximè difficilis atque grauior curatione ex pulmone fluens accipitur, ob iuge spirationis officium. Iis enim qui omnè fluorem de pulmone uenientem incurabilem dicunt, assentiendum nō est. Sed iuxta Sorani sententiam difficilis est eorum curatio iudicanda: quippe cum uulnerationibus thoracis sæpe pulmo penetratus non intulerit mortem, ut iis exclusis uel \* cadentibus, feбри adhibita decisio in cicatricem uulnera fecerit conuenire, ut omnes approbant Chirurghi, memorantes in bello quendam sagittatum penetrato pulmone conualluisse, sanguinemq; à sagitta uomuisse, nec tamen mortem fuisse consecutam. Hæc sunt quæ de effectu, siue de euentu fluorum credidimus ordinanda. Etenim ex capite ueniens fluor generaliter est curatione facilimus: siquidem non multos sustinet motus. Nunc nobis necessariò dicendum remanet, \* ne cui cœnotetesi sanguinis fluor adscribatur. Aliqui etiam Thessali sectatores recenti incisuræ, siue \* uulneris passione subigidi dixerunt.

\* superficialis tenet: uel ut paulo post. primas

\* ut pulmone. Referendum hoc ad supradicta: nepe agere curari fluorem, qui fit ex parte motu iugis & nimio exercitata. Αἰσχρογῆμα discretorium.

\* uel exeuntibus, obortaque feбри adhibita curatio his, nepe sanguine puro, tenui, seruido, spumoso.

\* num alicui cœnotetesi uulneris passioni subici

dixerunt. Non enim oportet locorum differentia cœnoteton mutare uirtutem. Externam igitur corporis eruptionem recentem dicimus incisuram, quo erit cōsequens, ut etiam interiorum eruptio huic cœnoteti subiiciatur. Sed his respondemus, quod passio non chirurgia, sed dietetica traditur curatione. Omne etenim adiutorium, quod adhiberi uidetur supradiſtis fluoribus est dieteticæ partis, non chirurgiæ. Quapropter

\* dieteticæ  
inueniuntur.

\* dieteticas scriptores libris regularibus, quos dieteticos uocant, de hæmoptycis scripserunt, quos nos sanguinem spuentes nuncupamus. Chirurghi uerò in chirurgummentis hoc memorare non ausi sunt. Ipse quoque Theſſalus secundo libro Dietetico de fluore sanguinis scribens, nihil in chirurgummentis memorauit.

\* Est uerò im  
proprium in eo  
quod  
\* curatur

\* Et improprium, quod sola dieta \* curetur, in adiutorijs adhibendis chirurgiæ cœnoteta scribere. Nos uerò iuxta Sorani iudicium, siue in exterioribus, siue interioribus corporis eruptionem factam, recentem diuisuram rectè dici probamus, atque etiam solutionem cognominamus, sed in exterioribus \* attentionem recentis uulneris \* iudicamus. Hæc enim nos necessario

\* indicationem  
in dæſis

\* potius quam  
solutionis.

\* dominatur,  
et filamentorum,  
siue fibrarum

\* est

\* solutionibus

\* membris ad-

huc infixarum

\* diuisuræ

\* laxandæ so-

lutiones. Diuisura omnis fibrarum coniunctionem postulat: at non item omnis

solutio. Nam sanguinis fluxus qui accidit herente adhuc sagitta, quamuis solu-

tionis morbus sit, laxandum et diducendum uulnus ostendit, ut telum extra-

haur, id quod solutionem auget, et coniunctioni fibrarum contrarium est.

rapit, siquidem solutioni diuisura \* dominetur, et figmentorum uel ſabularum coniunctionem ex initio deponit, atque hæc diuisura aptissima uidetur, quæ non in omnibus \* sunt congrua \* solutioni. Etenim \* sagittarum \* diuisuræ laxatiuæ necessario accipiuntur. Interiorum uerò eruptionum diuisura urgente solutionis cœnoteta ipsam magis cognatur iudicare. Siqui-

dem



dem prior\* oculis occurrit\* solutio, ac deinde diuisura ratione atque intellectu mentis apprehendi uideatur. Secundò, quòd cum sint multæ differentie fluoris sanguinis, omnes uni subiici solutioni uidentur, hoc est, eruptionis, & ulcerationis, & sudationis. \* Quæ non cogatur. Hæc causa fluoris differentias querere, aut aliæ cœnoteti eruptionem adscribere, aliæ ulcerationem, & non eadem\* sine ulcere, <sup>a</sup> uel ruptione, \* uel emissionem emissum fluorem. Tertiò, quòd nullo adiutorio chirurgiæ uti \* cogamur, sed omnibus congruis solutioni, \* qua sæpe consequenter etiam glutinationem partium perfecerunt. Ad summum quidem, est recens incisura siue ulnus cœnotes, sed ex medicaminum regula, quam Greci pharmacian appellant, dieteticæ parti ingesta aptè \* curatur: quibus \* etiam supradicta passio curatur, \* obstinente iudicio solutionis. Hæ sunt fluoris sanguinis cœnotetes. Eas enim \* qui iis cognominari atque conscribi possunt præscripta lectione tradidimus. Nunc curationem necessariò ordinamus.

## De curatione.

## Cap. XIII.

**O**Portet igitur ex qualibet parte sanguine fluentes iacere loco mediocriter frigido, atque obscuro, lecto immobili, & schemate \* declinato, ut paulo \* promptius caput leuatum habere uideantur, stramentis non nimie cedentibus, neque calidis, & ut potuerint, uno atque eodem schemate perseverantes, hoc est, immobiles: præterea animi intentionibus solutos. Vehementer enim \* motibus corporis ani-

\* siue a siue \* siue sudatione \* cogimur \* quæ \* adnumeratur  
 \* medicaminibus \* obtinente \* quæ in his nominari, eas nempe cœnotetas di-  
 uisuræ & solutionis \* reclinato corporis \* altius \* humoribus

\* in externis  
 vulneribus sa-  
 cilius à nobis  
 diuisura cogno-  
 scitur, ut quæ  
 oculis insue-  
 mur: solutione  
 verò morbuna  
 esse, non adstru-  
 ctionis, haudi-  
 ta facile nos in-  
 telligimus, quæ  
 nam ex Me-  
 thodi & artis  
 principis sta-  
 tuendum hoc  
 est. At in in-  
 ternis vulneri-  
 bus solutio quæ  
 sanguinis flu-  
 xus ostendit,  
 prior cognosci-  
 tur, ex eaq; di-  
 uisuram factam  
 deprehendimus,  
 cum in exter-  
 nis potius diui-  
 sura solutionem  
 denuntiet.  
 \* magis (sub.)  
 in internis co-  
 sideramus so-  
 lutionem quam  
 diuisuram.  
 \* Quare non  
 cogimur hac  
 causâ.

morum cura sepius turbationes addiderunt. Erunt etiam solo consternenda folia atque ramu lentisci, uitis, mali \* punici, tallie, murte, salicis, pini, & horum simulum, quibus sine capitis iniuria constrictius aer \* adnatus atque confectus congrue \* egrotantibus inspiramentis inferatur. Non enim cibi atque potus ratio, ac diligentia curanda est quæ interuallis distantibus adhibetur, quo constrictionis faciant commodum, uel fluentia retineant, potius quàm aer, qui \* pausabiliore inspiratione adductus, omni parti atque particule corporis ingressu suo fluentia facit cohiberi, nutrienditate persuasa. Conuenit præterea, egrotantes \* delatiore lecti sessione \* declinari, ut omnifariam immobiles curandi perseuerent: prohibere etiam occasiones, quæ \* poterint passionem in commemorationem perducere, ut locutionis, uel uisus: ne aut eadem plurimis \* fabulis reuoluendo, aut inspiciendo quæ exclusa sunt, uiso admoniti commoueantur. Conuenit denique etiam sanguineos colores parietum, uel straminum, siue operimentorum declinare. Adhibenda præterea cibi abstinentia permittentibus uiribus, usque ad tertium diem, non ob \* relaxanda corpora, sed quo altiora, quorum est officium accepta digerere, immobilia perseuerent. Omnis etenim ciborum \* appropriatio motu quodam necessario \* perspicitur. Quo fit, ut ea quæ sunt aptissime \* cōglutināda, motu resoluta differantur. Quapropter ob acceptorum digestionem, \* ciborum sumi prohibemus, & abstinentiam utilissimam iudicamus. Prohibendi denique egrotantes ab officio locutionis, ut si quid uoluerint, uerbis nutus, uel scriptura dari significant: magis quando ex pulmonis cannula, quam Græci arteriam uocant, uel ipso pulmone

\* punice, thallia

\* inductus  
\* egrotantium

\* mitiori, leniori

\* in arctiore  
\* reclinari

\* poterunt

\* multa oratione, & sepius repetita sanguinis exitum in memoriam renouando.

\* Nam Methodicis inedia laxat, potus & cibi adstringunt  
\* accessus, apulsus, uel etiam inuicis, abstinentia.

\* perspicitur.  
\* cōglutinanda  
\* cibum

mone, aut thorace sanguinis nascitur fluor. Conuenit  
 etiam articularum tenacior ligatura, si fluor uehe-  
 mens fuerit. \* Denſitati etenim articularum patietes \* arctationi;  
 conſentiunt partes: item ſpongiarum mollium, ac lim- & adſtrictioni  
 pidarum & leuium, ex aqua frigida, uel aqua & ace-  
 to, uel decoctione mali punici, uel rubi, aut lentifci,  
 aut \* myrtæ patientibus partibus appoſitio, hoc eſt, ex \* murta  
 quibus ſanguinem ferri agnouerimus. Et erunt hæc  
 iugiter commutanda, ne naturali corporis uapore te-  
 peſcant. Ac ſi ſpongiæ uiſæ fuerint ægrotantibus gra- \* inuoluti pan-  
 ues, erunt apponenda \* ptygmata ex ſupradictis liquo niculi, & mul-  
 ribus inſuſa, aut ſucco plantaginis, uel intybi, aut her- tiplices  
 bæ \* calicularis aut uuæ lupinæ, quam Græci ſtrychnō \* calicularis  
 uocant; uel ſemperuiæ, quam aizoon appellant, aut & πυκνόν.  
 polygoniæ, & acaciæ ex aceto ſolutæ. Ac ſi ex capi- & αἰζών.  
 te fuerit ſanguinis fluor, erit pſilothro \* expoliandū: \* capillus de-  
 tum ſomenta adhibenda ex oleo uiridi, aut roſeo, aut trahendus  
 lentifcino, aut melino, aut murtino. Sin uero plurimus  
 fuerit floris lapſus, radendum caput, atque Gypſo  
 illiniendum, uel acacia ex aceto & magis frontis atq;  
 temporum partes. Perſeuerāte fluore cucurbita quoq;  
 apponenda, ſubiecta flamma plurima occipitio. Si au-  
 tem etiam per nares ferri uideatur, \* erunt \* ſtypte- & ναιſία.  
 ria immittenda ſicca, uel aceto inſuſa, uel \* erit  
 bet ex liquoribus ſupradictis. Ora quoque ſpongia ex \* Alumen  
 aqua frigida expreſſa iugi tactu detergenda. Tunc \* alio quolibet  
 etiā cataplaſmatū adhibendus eſt uſus ex rebus coſtri- \* odore graui,  
 ctuius atq; epithematibus, quæ paulo poſt cū ſuis nomi & caput ſe-  
 nibus ordinabimus. Danda etiā aqua frigida, uel puſca riente  
 frigida aut gargarismus ſine ullo \* percuffu, quoties ex \* inferiora,  
 proximis partibus gutturis ſanguinē ferri uiderimus. & iterum, ſedem  
 Ac ſi per \* inferiora, uel altiora ferri ſanguinem uide- & urina rias: al-  
 tiora vomitum

rimus, sorbēdos dabimus cyathos duos uel tres. Quod si minime mederi ualuerint, etiam succus plantaginis, aut intybi, uel uuae lupinae, aut \* polypodij, aut herbae calycularis, aut rosae erit offerendus, & neque plurimus iugiter, ne eius percussu partes noceantur, aut liquidorum influxio, quae quidem sint constrictiuae uirtutis, redundantia tamen, laxare uideatur: neque rursum longioribus interualis. Sic enim frigus à nobis illatum naturali \* uapore obtusum parui temporis \* medullam dabit uitiatam, tum tertia die transacta, hora accessionis solitae articulos leuiter unguimus frigido, atque uiridi oleo. Dehinc detergemus faciem quoque, spongia aqua frigida expressa \* retangentes; cibum damus paruum, constrictiuum, ut panem ex aqua frigida, uel pusca, aut alicam similiter, uel oryzam decoctione thebaicarum palmularum confectam, uel easdem ex aqua \* recenti: aut si plurimum ualere haec uoluerimus in aqua coelesti tamdiu coctas donec liquor mellis habeat crassitudinem, aut ex \* malis cydoniis. Tunc etiam danda oua tremula ex pusca, aut \* rore syriaco aspersa. Dandus etiam panis simplex, aut in his infusus, tum interposito spacio temporis dandus potus aquae frigidae paruae. Dehinc permittentibus uiribus alternis diebus aeger nutriendus, etiamsi nondum repressus fluor uideatur, usque ad id tempus, quo cicatricem firmatam senserimus. Quod quidem Themisonis atque Thessali sectatores usque ad septimum diem \* seruari dixerunt, hoc est, trium diatritorum spacium. Vt enim Antipater ait tertio Epistolarum libro ad Gallum scribens, Naturalis est ratio tri-  
ni numeri, non solum in his diebus, sed etiam in omni-  
bus diatritis. Sed est melius, ut Soranus ait, quoniam

\* polygonia,  
ut supra

\* tepore  
\* medellam

\* contingentes

\* recentes. Nā  
vetustae palmu-  
le dulcescunt,  
& minus ad-  
stringētes fiunt.  
\* mala cydo-  
nia: tum  
\* Rhoe Sy-  
riaco

Themison.  
Thessalus.  
Antipater.  
\* seruandum

Soranus.

non

non equali tempore, nec dierum numero cūctis poterit cicatricis firmari soliditas, ob alias causas, & ob fortitudinem corporis, ac debilitatem, pro differentia naturali uariatam, neq; nos unum atq; eundem signare\* poterimus finem. Dehinc sequētibus diebus aliqua\* posse erunt emplastrorum apponenda, aut epithematū constringentium atq; frigidantium, quæ sunt plurima particulariter. Etenim Thebaica palmulæ uino\* acriori\* acerbiori infusæ, uel aceto contritæ, admixtis malis cydoniis decoctis, aut mali punici corticibus, aut alumine, uel acaia, aut hypocistide, aut galla, aut cenanthe, aut aloe, aut cerotario ex oleo roseo confecto, uel melino, aut myrtino, aut lētiscino, aut cenanthino, aut mixta etiā\* & aspersa mastiche trita, aut melle decocto, galla contrita,\* aut aspera, aut puluere mali punici, uel mannæ thuris admixto alumine\* Liparo, quo malagmatis sumant omnia\* Liparo in qualitatē, tum linteo, uel panno illinita patientibus partibus apponenda: uel illud medicamen, quod confecto. Plin: cap. 15. lib. 35. Medicamen libris Celerum passionum memorauimus, de cardiacis diarros. & appellauimus diarhoos, uel ex polento, & uirgultis rubi, uel arnoglossæ, aut herbæ sideritis, & calycularis uel uuæ lupinæ, aut\* calyculariæ, aut anulorum uitis, aut semperuiuæ: item intyba cum pane ex aceto, aut palmulis, aut murtæ mollibus foliis, aut eiusdem semine\* & non diu uiridi, ante cibum offerenda: uel ante cibū dare oportet elixum\* aut non coctum panem, & plantaginē<sup>co</sup>\* Rhoe Syria ex aceto coctam, & uiridi oleo, asperso\* rore syriaco: item bulbi ex aqua & aceto, &\* rore syriaco cō<sup>co</sup>\* Rhoe Sy. riacō\* vtræq; aqua festi dari poterunt cibo. Non aliter etiam cochleæ<sup>co</sup>\* vtræq; aqua erunt offerendæ: habent enim quiddam glutinis naturæ & terre-<sup>co</sup>\* vtræq; aqua stes: uel Pomatia & vul-<sup>co</sup>\* vtræq; aqua gares: uel nu-<sup>co</sup>\* vtræq; aqua de & tecta.

- \* tosta præ- mala cydonia cocta recenti mulso: uel \* torrida præ-  
 dempto sumpto tegmine, farina conspersa, aut sorba, aut mali  
 punici grana, aut \* fabrilium uuarum: item uolantium  
 \* fabriles ruas non pingua, ut sunt pectora turdorum, uel pullorum  
 vide c. 3. lib. 4. matrem sequentium, item columbarum, aut phasianorum,  
 aut attagenarum, aut perdicum, quarum erunt  
 murta pectora penetranda: tum etiam porcine carnes,  
 cerebrum, pedes, auriculæ, ora, uel auricularum  
 summitates, quæq; fuerint nutritibilia, nec tamen difficilia  
 digestionem. Dandum etiam catapotium ex melle decoctum,  
 sub lingua detinendum, singulare, aut admixto  
 \* tragacantho gummi, uel \* draganto. Etenim sufficienter decoctum  
 mel sicut in externis corporum, glutinat diuisuras, non  
 aliter etiam interioribus mederi necesse est, atq; iam  
 glutinata solidare proficiente curatione. Dabimus  
 etiam uinum, & magis illud quod non fuerit mordicantis  
 uirtutis, hoc est quodam sensu linguam remordentis,  
 tum ad summam paulatim erunt egrotantes resumendi,  
 cum præcautione uehementium commotionum.  
 Sunt enim \* leuiter atq; sensim mouendi, portatoria  
 \* scilicet, uel cathedra longiore, & firmato corpore  
 lauandi. Etenim lauacra firuoris causa, atq; motus  
 illati, quod corpora celerato spiritu agitant, recedunt  
 glutinationum, atq; mollium uulnere redulcerantia  
 probantur. Cum enim oporteat coherceri atq; densari  
 patientia loca contraria qualitate, necessario  
 \* uexantur firuoris illati causa. Inflata etenim parua  
 ex occasione, atq; turgentia redulcerantur. Præcauenda  
 deniq; etiam uehementia exercitia, & magis recto  
 spiritu peracta: tum utendum peregrinatione terrena  
 atq; maritima: & si corpus uiderimus non attente  
 fortitudine augmenta carnis accepisse, erit abstinentia

nentia cibi imperanda: tum sequentibus diebus paruus  
 dandus est cibus uino detracto. Etenim cicatricis no-  
 uitas, quippe \* ex uenarum uasculis confecta atque \*super uenarū  
 nondum fortificata, si carnis pondere fuerit prægra-  
 uata, uecessariò rumpetur. Semper autem oportet uen-  
 trem mitius emollire. Acriores etenim clysteres in-  
 congruis motibus lacerant cicatrices, atque recursum  
 faciunt passionis. At si uehemens atque plurimus fue-  
 rit sanguinis fluor, erunt extendendæ adiutorij uirtu-  
 tes. Acetum denique \* sincere dabimus ore retinen-  
 dum, uel gargarizandum, aut sorbendum, spreto quo-  
 rundam iudicio, qui asperum, uel tussiculam commo-  
 uens, atque fluorem prouocans acetum dixerunt, si-  
 quidem etiam gelatum sanguinem soluit. Etenim aspe-  
 rat, uel tussiculam commouet, si iugiter atque immodi-  
 ce fuerit datum. Soluit autem eius percussibilem uirtu-  
 tem distantia temporum, oblatione uariata, quæ non  
 sensibili tactu, sed \* remissibili quadam digestionem lon-  
 gioribus actibus immoratur. Item quod fluorem non  
 prouocet demonstrandum non est, siquidem \* sit manife-  
 stum, in externis corporibus uulneribus constitutis  
 necessariò fecisse densitatem, & propterea conducibi-  
 lis atque glutinantis uirtutis \* fuerit approbatum.  
 Danda etiam acacia aceto soluta, aut pusca, aut ex  
 supradictis liquoribus: non aliter etiam hypocystis,  
 uel licium indicium, aut omphacium, uel balaustium,  
 aut ænanthe, aut polios herba, aut gentiana, aut \* ma-  
 cir, \* aut \* ponticū, uel \* ægyptia spina, quam acāthan  
 uocant: quarū nunc sunt radices infundendæ, uel deco-  
 quendæ, nunc earū succi uel lachrymæ admiscendæ: si-  
 quidē \* sint frigidæ atq; cōstrictiue uirtutis cōuenien-  
 tia obturamēta: itē \* corticis uasculi uetustissimi uini,

Acetum.  
 \* syncerum  
 \* leni  
 \* est  
 \* fuisse  
 \* macer  
 \* Rhaponticū  
 \* pastillos ex  
 \* Ægyptia spi-  
 na describit  
 \* Aetius pag.  
 465.  
 \* sunt

\* quidā hic sa-  
 cem interpretā  
 tur. Ego uero,  
 Picem siccam  
 in fundo dolio-  
 rum uini reper-  
 tam, eorū pra-  
 sertim in qui-  
 bus uinū dulce  
 uetustatē ade-  
 ptum est. Eius  
 & Sabina pul-  
 uere curatum  
 Ægyptium  
 quendā fuisse  
 iam ad Hydro-  
 pis initium per-  
 ductum Aet-  
 iustradat pag.  
 568.



\* quam  
 \* dare oportet,  
 \* potius,

\* Pastillos ex  
 Rosæ, & ex  
 Succino descri-  
 bit Paulus.  
 Quidam legen-  
 dum putant, pa-  
 stillos ex Ro-  
 sis, *ἀνὰ σφῆρα*,  
 & ex Semini-  
 bus, *ἀνὰ σφῆρα*.  
 utrosq;  
 hic convenien-  
 tissimos Pau-  
 lus descripsit  
 \* trochiscis  
 \* differentes  
 \* alius simili-  
 bus  
 \* sue tenuita-  
 tis causa, quæ  
 \* &  
 \* Rhos Sy-  
 riaci  
 \* eccleima  
 \* succorū. Alia  
 \* Annulis  
 \* lixiuo  
 \* viduum: hu-  
 more multo di-  
 lutum.  
 \* teritur

exusti, & triti puluerē asperum tribus cyathis pusce  
 frigide, aut decoctionis, \* qua supra diximus, bibendū  
 \* dari, in modū cochleariorū duorū. Etenim constrin-  
 git cortex inueteratus, & magis antiquissimi uini,  
 \* cōmutatus, tarditate tēporis aucta uirtute. Utendum  
 etiam trochiscis cōfectis ex supradictis speciebus, item  
 \* ex rosæ seminibus \* trochiscos, quorum compositio-  
 nem Responsionum libris, de medicaminibus \* dicētes,  
 tradidimus: item eo quod appellatur dielectrum, item  
 eo quod œnocraton, & \* alia similia, quorum compo-  
 sitionem ut supra dictum est, Medicaminum libris tra-  
 didimus. Ac si coadceruatus per seuerauerit sanguinis  
 fluor, utendum etiam uehementioribus quibus obtu-  
 rentur altiora, \* sua & teneritudinis causæ, tamen  
 erunt ocysus adhibenda, ne passionis ipsius impetu in  
 manibus nostris uitam linquere cogantur egrotantes.  
 Prædicto igitur periculo eorum proximis aut mini-  
 stris, \* uel producta uita spem sæpe uanam dederint  
 sanitatis, erūt hæc adhibenda: supradicti corticis cinis  
 exustus cum liquida pice spongiæ impressus: decoctio  
 lentisci, & \* roris syriaci, & \* clygmaticum supradi-  
 ctorum \* suorum. Nam hæc conficiuntur hoc modo.  
 \* Agmine uitis uitis, & uirgultis, atq; ex eorum ci-  
 nere confecto \* liquamine, scilicet aqua imbriali ad-  
 mixta, quā uulgo cisterninā uocant, dabimus ex ipsa  
 bibendos cyathos tres, uel quatuor, nullis aliis specie-  
 bus admixtis. Nam quidā in his si febrilis adficiatur,  
 etiam uinū immiscuerunt \* uiuidum, uel spongiæ usta  
 cinerem, qui conficitur hoc modo. Spongia expressa  
 aceto, atq; pice liquida madefacta uasculo nouo inclu-  
 ditur testeo: tum circumtegitur luto, & usq; eo inuri-  
 tur, donec carbone scat: dehinc \* trita in puluerē, ex  
 quo

quo cochlearis unius quantitas aquæ uel puscæ frigide mixta datur bibenda : uel si uirtutem medicaminis augere uoluerimus, tinctam, ut supra diximus, spongiã

\* liquide picis puluere bituminis aspergimus . Deco-  
ctio autem lentisci conficitur hoc modo. Eius uirgultorum sumentes sufficientem modum, aquæ imbrialis infundimus sestarijs duobus: tum decoquimus: & cum semel uel secundo scatere uiderimus, expressas detrahimus lētisci comas: tum liquorem decoquimus, donec ad tertiam partem deducatur, cuius cyathum admixtum duobus cyathis aquæ bibendum propinamus. Non aliter etiam electariorum decoctio conficitur. Ob electarium autem conficiendum erunt sumenda mala punica recentia uel infusa, nisi fuerint mollia, quibus cōtusis atque compressis, aliquantum detrahimus succum, atque decoquimus, donec mellis crassitudinem sumat. Et quantum medicaminis uirtutem

\* liquida pice

tendere uoluerimus, tanto ualentius mala exuccamus, quo expressa ultimum atque crassiorem succum dimittant, ut etiam eorum cortex si quid humoris habuerit, sudet.

\* intendere

Conuenit etiam medicamē, quod Themison ordinauit hoc modo. Mali punici partibus duabus aloë admixta parui cochlearis quantitate cum aqua frigida offerenda . At si solutio perseuerauerit, addenda etiam con-

Themison.

strictiua cucurbita patiētibus partibus: tum \* diateon  
emplastrum, quod uehementer astringit superimpositis spongijs aqua pusca infusis, ut supra scriptum, ciborum constrictiua qualitate permanente . Dandum

\* Diateon

Diateon em-  
plastrum.

etiam noctis initio medicamen, quod \* diaporon ap-  
pellant, uel diasycaminon, siue catapotia, quæ Medicaminum libris prædiximus . Nunc autem persi-

Diaporon.  
Medicamen  
diaporon.

Diasycami-  
non.

cienda conscripsimus hoc modo, Gummu & acacia

æquis ponderibus, admixto alumine scisso ad duplex pondus, sunt colligenda decoctione papaueris, & danda quibusdam in duplicem modum. At si quisquā non plurimum sanguine fluxerit, nec tamen materia ferri cessauerit, conuenit etiam tertia die phlebotomiā adhibere. Etenim ex eo quod sanguis ferri non quieuerit, manifeste conijcimus glutinationē non fuisse perfectam diuisuræ, siue uulneris partium, & propterea in tumorem uenisse perspicimus. Omne etenim uulnus, quod usque in tertium diem glutinari non potuerit, necessario tumescit. Thessalum deniq; indigna accusatione appetitum Sorani sentētia recte purgauit. Tertia etenim die phlebotomandos sanguine fluentes constituit, nutriendi consuetudine cibo, non in consequentia ordinans adiutoria, sed tanquam complexis passionibus apta, ut contrarijs contraria obijcere uideatur. Ac si etiam intra diatrity tempus fuerit attestata partium grauedo, uel dolor, aut spiratio difficilis, uel tuſsacula sicca, phlebotomare conuenit, atque aërem loci paruissimū\* trepidare, & ijsdem partibus lanæ oleo calido uiridi expressas apponere, uel ob sanguinis fluorem ea ordinare, quæ glutinare ualent, sed uirtutis frigida non sint, neque transuorationis aspererent loca, nec tumorem commoueant.\* Plurima dābimus etiam samie terræ, quam\* ges astra uocant, uncia partem tertiam, cum duobus uel tribus cyathis aquæ tepida: non aliter etiam amyllum, uel\* argallici radicem, atque foliorum eius succum. Conuenit denique sub lingua retenta eius radice particula, siue amyli, siue terræ supradictæ. Danda etiam ex gummi\* tragacantho siue\* draganto, & thure, & opio, & his simulibus cōfecta electaria. Tunc tertia die accepta diatrity tem-

poris

Thessalus.  
Soranus.

\* tepidare

\* Plurimis  
\* gen  
γῆς ἀστῆς

\* Symphiti.  
c. 2. lib. 5

\* tragacantho

poris obseruatione, non solius fluoris, sed etiam fe-  
brium, erunt egrotantes oleo calido atque plurimo,  
& uiridi perungendi. Facies quoque aqua tepida so-  
uenda. Cibus dandus complexionis passionis aptus, &  
pultes ex oryza uel alica frixa, siue \*simplici, uel mi- \*cruda  
lio, & decoctio Ptissanæ calidæ, sed non oleosæ, ac po-  
tius siccæ, uel ex oleo uiridi confectæ, aut cum palmu- \*Ge asteræ  
lis, uel amylo, admixto \*ges asteros, aut argallici ra-  
dice incocta. Cæteris uero diatritis, hoc est interual-  
lis dierum trino numero seruatis, cogentibus dolori-  
bus erit utendum fomentis, atque cataplasmatibus la-  
xatiuis: tum etiam cum scarificatione cucurbitis, siue  
hirudinum appositione, quas sanguisugas uocant:  
Tum uaporatio spongiarum apponenda. Sin uero e-  
tiam fluor periculosus fuerit sanguinis, cum tussicula  
uel asperitate gutturis, erit utendum quidem constri-  
ctiuis epithematibus, sed calidis: dandum etiam sorben-  
dum mulsum ex melle decocto, & à uino abstinendū:  
danda denique aqua potanda calida, sed paruo modo:  
tū sorbilia, quæ passioni uirtute apta mederi possunt,  
ut est amygdala † ex pusca, in mulso decocta, quæ † expolita.  
abijcienda, & admittendum amyli quantum ualeat expoliata, ut  
mulsum in quandam crassitudinem redigere. Deinde paulo post.  
similibus electarijs, atque sub lingua continendis medi-  
caminibus utemur tempore \*amissionis, ut est mel atti- \*remissionis  
cum admixto gummi, uel \*dracanto decoctū, aut gly- \*tragacanthæ  
cyrriza, uel eius succo: nisi quisquam egrotantiū hoc  
improbauerit nausea commotus, quo eius stomachus fa-  
cile ad uomitum moueatur: item ex lini semine trito,  
& \*tracanto drachmis duabus, & amygdalis expo- \*tragacanthi  
liatis XXV, & strobilorum granis XXX, & oui  
uniui costi uitello, & amyli drachmis duabus, in fuso

passo sufficientis quantitatis, quo medicamen electarij  
 crassitudinem sumat. Sin uero etiam rauci fuerint æ-  
 grotantes, erit mel decoquendum cum cæteris specie-  
 \* *tragacantho* bus singulatim, resoluto\* tracanto, ex infusione passi  
 confecto. Terminatur enim hoc asperitas faucium, &  
 transuorationis partes leniuntur. & tussicula mitiga-  
 \* *Dandum* tur, sputaq; sanguinolenta reprimuntur. \* Danda etiã  
 \* *describitur a* \* *Paulo* Diacodion. Continuum uero medicaminũ usum, quæ  
 \* *Tussicularia* tussicularia sunt appellata, siue eorũ immodicam quan-  
 \* *medicamina* titatem necessario fugiendam mandamus. Est enim me-  
 lius simplicibus atque cõsuetis mederi rebus. Illa enim  
 temporaliter quidem nütigare uidentur tussientiũ mo-  
 \* *At* tum, sed passionem totam faciunt deteriore. \* Ac si  
 attestante tumore fluor perseverans produxerit tem-  
 \* *Si* pus, in ijsdem perseverare conuenit, quæ supra memo-  
 rauius, admixto etiam lacte. \* Si minui tumorem ui-  
 derimus, dandum quoque lac amylatum, & panis laga-  
 num pultibus infusum, sed ex fermento confectum, quo  
 panis habeat qualitatem, faciat etiam medelam me-  
 liorem. Strobilus deniq; cum suis fructibus, quod in se-  
 \* *resinale quid* met habeat \* resinale, \* ptisana decoctus. Dehinc profe-  
 \* *da, ut pag. 389* ctu cedente erit panis cum malua decoquendus, sed nõ  
 \* *ptisana* exquisite conditus. Danda etiam \* ptisana cum lenticu-  
 \* *ptisana* la, quam Græci \* psisanaon uocant, & apponenda ex-  
 \* *Ptisano* trinfecus cerotaria ex murtino uel lentiscino, aut me-  
 \* *cen* lino oleo confecta: tum urgentius augenda resumptio,  
 ut supra demonstrauimus, ita abstento sanguine, quo  
 \* *fiet* ad \* fiet glutinatio perfecta. At irruente tumore erit  
 coniiciendum, uel aduertendum, utrum glutinatio  
 fecerit retentionem, \* cum neque grauedo, \* neque  
 \* *et an* dolor, aut punctio, uel pulsatio, uel saltus partium, aut  
 \* *an* exten

extentio, uel febris cum arida tuſſicula, aut ſtridor,  
 aut ſingultus, uel quæpiam \* ſanitati impedita \* ſau- \* ſanitati  
 cietas ægrum ſequi uidebitur: \* ſed ſit æqualis, atque \* anxietas  
 ordinata aſpiratio perſeuerans. Tum ſi tumoris cauſa \* ſed & an  
 fuerit retentio ſanguinis temporaliter effecta, quæ ſit  
 neceſſariò ſordidum atque humectum uulnus efficit,  
 phthiſicorum fluorem \* pronuntiamus: ac cum pro- \* fore, ut æger  
 ducto tempore ſanguinis fuerit \* ruptio uariata, erit putria & pu-  
 curatio pro motibus temporum uarianda, ut ſuperpo- rulentia multa  
 ſitionem emergentem eadem curatione curemus. In ſpuat, & phthi-  
 lenimento uerò leues atque quietos adhibemus motus, ſicus efficien-  
 ſub magiſterio aliptæ uel muſici, quo etiam uocis exer tur.  
 citium artificis præcepta moderentur. Cibus dandus \* erupitio ite-  
 ex mediæ qualitatis materia, adhibitis reſumptiuiſ cy- rata  
 clis, in quibus non erunt repentine mutationes facien-  
 de, ſed ex mediæ qualitatis materia primus ordinan-  
 dus eſt cyclus, dehinc ex uolantum, ſecundus: tunc ex  
 agreſtium, tertius, atque ex porciniſ carnibus ultimus.  
 & coniunctis deinde duobus \* contiguis ordo dirigen- \* primo & ſe-  
 dus, atque ita omnibus, & ſingulis materiæ ſpecie- cundo: ſecundo  
 bus erunt magis conſtringentia procuranda, ut in ole- & tertio: ter-  
 ribus intybum, plantago: in mariniſ squillæ, nulli: in tio & quarto.  
 \* uolantibus perdices, phaſiani, attagenæ: in agreſti- \* uolantibus  
 bus, lepores, capræ: & ſi celeriter ægros craſſificari  
 uiderimus, erit abſtinentia intercalanda: tum uenter  
 emolliendus. Utendum præterea partiliter nunc aquæ  
 potu, nunc uini leuiter remordentiſ: deinde ueniendum  
 ad reſcorporatiuæ curationiſ materiæ, latentis motu  
 adhibita drimyphagia, ex piſce gobione, admixto  
 melle. Dandi etiam piſces, & ſuiſ cerebrum, una tan-  
 tummodo die: interuallatiſ diebus, adhibitiſ localibuſ  
 adiutoriſ reſcorporatiuiſ, ut dropace, partibuſ primò,  
 quæ

*παρὶ πυλῶν.*

*ἰλίνος.*

*παρὶ πυλῶν.*

\* absque potu

\* inuenda

\* potu largiore paulatim cō  
cesso.

\* vicissim, &  
alternis.

\* differentia

quæ fuerint remotæ à patientibus, tum vicinis, ac deinde ipsis: addendus etiam ex sinapisimo rubor, quem Græci phœnigmon uocant, atque sicca fricatio: tum torrendum corpus sole, quod Græci heliosin uocant: adhibenda quoque paroptesis, & aliquando\* sicca cibatio, aliquando cum pane palmulæ offerendæ: & \* imitanda consuetudo frigida lauacri, atque potus paruus scilicet primo, ac deinde auctus \* suggestione, quo possint etiam iis ægrotantes uti \* partiliter. Facit enim duriora corpora, atque ualentia, acceptorum uel gestororum \* differentie contrariorum mutatione uariata, quanquã sint ex eodẽ genere ueniẽtia. Vtilis præterea nauigatio approbatur, & peregrinatio: inde enim res salutare uenient. Præcauenda etiam Venus: facile autem hæc passio refricatur. Hæc est secundum methodicos ordinata curatio. Apud ueteres uerò dissonantia sunt ordinata. Etenim de schemate iacendi, atque phlebotomia, & ligatione, & constrictiuis, uel frigidis cataplasmatibus, & aceto bibẽdo, uaria disceptatione pugnatum est. De schemate inquam iacendi: siquidem alij supinos iubent ægrotantes iacere, uel super eas partes quæ non patiuntur. Asclepiades \* consequenter approbat supra partes quæ patiuntur esse locandos ægrotantes: siquidem cum scriberet necessarias curationes, adprehensa \* causa sic fuerit elocutus, etiam sanguine inquit fluentes ita esse locandos. \* Si quidem Erasistratus phlebotomari præcepit patiẽtes. Alij uero eius sectatores etiã fieri principaliter damnauerunt hoc adiutorij genus, tanquam uirium uexabile: item plurimi nostrorum, tanquam laxatiuum, & propterea inconueniens fluori sanguinis ex solutione uenienti, & \* indignum ad constrictionem. Alij adhibendum

*Asclepiades.*

\* inconsequenter

\* causa perficiendas localibus,

\* At quidem Erasistratus.

\* nõ idoneum



bendum probauerunt, ut Hippocrates de morbis scribens: Diocles libro quo de passionibus, causis, & curationibus scripsit: Praxagoras libro tertio de curationibus: item Asclepiades libro, quo de clysteribus scripsit: Dehinc Themison secundo libro Tardarum passionum: & Thessalus secundo libro regulari: sed adiecta discretione. Etenim si tertia, inquit, die rursum sanguine fluxerint aegrotantes atque plurimo: quo intelligitur tanquam in complexis passionibus, hoc est, strictura obtinente, faciendum approbasse. Alij uerò omnes statim, atque sine ulla dilatione, phlebotomandos dixerunt, & magis si ex thorace, uel pulmone sanguis fluxerit, uel plurimus, auertendæ materiæ causa, quo patientibus partibus derelictis, aliorum feratur, hoc est ad eas quæ non patiuntur, uel ob educendam materiæ multitudinem. Deniq; saepe inquit faciendam consuetudinem, si oportuerit, semel, & secundo, uel tertio, quo \* recurrens ex brachio, post \* abstinentiam sanguis, iterum auocetur, uelut Themison ait, \* secundum se, & laxamenti esse, & minutionis, ne initium \* toris efficiat. Item ut alij euacuandas \* uenas, quò exeant latè celerius concedant atque coeant diuisuræ, uelut Asclepiades, ad minuendum sanguinis cursum siue \* spirationem, quibus passio adiunatur. Item de ligationibus pugnauerunt. Siquidem Xenophon & Dionysius, & Erophilus primo libro Curationum, & Erasistratus, probant articulorum faciendam constrictionem. Herophilus uerò capitis, & brachiorum, & fœmorum: Erasistratus magis inguinum & alarum. Etenim \* laxationem, sensus sanguinis approbat fieri \* retentionem. Asclepiades uerò ad ipsum scribens libros Paraceuasticos, ligationem excludit,

Hippocrates.  
Diocles.  
Praxagoras.  
Asclepiades.  
Themison.  
Thessalus.  
\* in partem  
affectam  
\* suppressa & a  
cuatione, &  
clausa plaga.  
\* secandam  
venam esse  
\* tumori fiat  
\* uenas con-  
cedunt amplo  
vulnere, quo  
late existant,  
nec celerius  
coeant  
\* spirationis  
difficultatem  
Xenophon.  
Dionysius.  
Erasistratus.  
Herophilus.  
\* laxationem  
\* vacuationem  
Libri Asclep.  
παρακευαστικῶν.

\* negat esse  
 \* occludi liga-  
 tione non  
 \* nec vinciri

*Antipater.*

\* venire.  
 \* suspensa  
 \* constrictiua

\* album

\* hamoptycis  
 \* semini pa-  
 pauere sylue-  
 stris & corni-  
 culati acetabu-  
 lum ventrem  
 ducit: tantum  
 dem verò semi-  
 nis aphrædis ro-  
 mitum pronos-  
 cat. Dioscor.  
 & xamoria.

cludit, eamq; \* neque Erasistrato congruam, dicens  
 \* osculari nō posse sub discrimine uenulas, quod Græci  
 diaphragma uocant, \* uel museri eas quæ supra dia-  
 phragma esse uidentur. Omnes etiā nostræ sectæ prin-  
 cipes id approbasse uidentur: impressa etenim, inquit,  
 ligatura uexat, non impressa inutilis esse perspicitur:  
 item Antipater tertio libro Epistolarum, ait, teneri  
 materiam quidem ligatione, sed cū fuerit indulta,  
 uel relaxata, in repentinum atque immodicum fluo-  
 rem \* ueniat. Siquidē abstinentiæ causa altiora \* pen-  
 dendo latere potius, quā teneri uidentur. Item de  
 \* constrictis cataplasmatibus plurimi dissenserunt Nā  
 Erasistratus hæc approbat: Asclepiades excludit, tan-  
 quam materiam imprimētia, uel coercendo in \* la-  
 tum reuocantia. Item acetum alij tanquam tussiculam  
 uel fluorem commouens expulerunt, uel quod duras  
 partes densando faciat. Themison uerò his repugnans  
 adhibendum iudicauit, attestante etiam Thessalo. Alij  
 aiunt eius acrimoniam uel nimietatem temperandam  
 admixtione aquæ. Plurimi uerò contrariarum secta-  
 rum etiam clysteres, atque urinales aiunt uirtutes ad-  
 hibendas. Diocles taurinum gluten bibendum dicit,  
 farinæ concoctum & rubo: uel cum nepita amyllum,  
 uel marrubium, uel rosmarinum in aqua pusca dandū.  
 Motus uerò alij adhibuerunt, non solum fricantes, sed  
 etiam deambulationem imperantes post cibum, ut E-  
 rasistratus. Asclepiades uerò de communibus adix-  
 toriis scribens, gestationem in \* hæmoptycis prohibet.  
 Utuntur quidam præterea etiam purgatiuis medica-  
 minibus ex \* papauere, uel helleboro, aut diagridio,  
 quod Græci scammoniam uocant, ut Diocles: item su-  
 dorem mouentibus, & uomitum, ut Praxagoras, qui  
 etiam

etiam plurima urinalia ordinavit. Sed hæc facile iudicantur ex iis quæ secundum methodicos tradidimus. Demonstranda tamen eorum contradictio, & breui ratione formanda. Peccauerunt igitur, qui supra patientes partes ægros iacere uoluerunt. Omnis enim impressio, siue \* affectio incongrua glutinationibus \* afflictio. A-  
 approbatur. Ceciderunt etiam falsa intentione decepti, qui non addita discretione phlebotomiæ memora-  
 uerunt usum. Non enim in omnibus oportuit prohiberi, cum fluorem sæpe fuerit uehemens strictura complexa: & si secundum Erasistratum osculatio uenarum ex redundantia materiæ ueniens, fluorem faciat conuenit uti detractio. Facile enim corrigi uel reparari parua uirium uexatio potest: plurima tamen ex adiutorio patientibus utilitas fuerit. Neq; item in omnibus \* erit approbanda phlebotomia. Nam nullo tumore apparēte uexabilis iudicatur. Etenim corporis fortitudo necessario depurgatur, & stomachus uitiatur, atque debilitate irruente difficile cocunt diuisuræ, & eadem patienti uidebimur ingerere, quæ prohibenda suscepimus. Quippe cum non auersio, sed potius \* par- \* protrusio  
 titio sanguinis fieri intelligatur, & duplici egestione celerata, nullam \* mortis habeat dilationem. Dehinc \* mors  
 erit anceps, utrum irruente rursum tumore phlebotomandi necne sint ægrotantes: sed phlebotomati apertissimè interficiuntur: non phlebotomati magno adiutorio priuantur. Ligationes uerò non \* tantum ad di- \* tam  
 uertendam materiam, ut supra memorauimus, \* quan- \* quam  
 tum ad densitatem faciendam adhibendas probamus: siquidem imprimendo coerceant: sed mediocriter \* ad- \* adhibendas  
 hibere, ne moderatione cessante, uexare potius quam curare \* uideantur. Peccat etiam Asclepiades, frigida \* uideamur.  
 uel

- \* enim uel constrictiua epithemata recusando. Sunt \* etiam  
 \* qui putauit inconsequentia Erasistrati \* placitis, sed officio con-  
 hu intorsum græ curationis efficacia. Nam solutionem constri-  
 retrudi sangui- gunt, diuisuras conglutinant, quod ex uulneri-  
 nē, & ita va- bus in superficie constitutis, & sub uisum lenienti  
 forum avas- bus usu approbatur, quibus apposita apertissime pro-  
 muoip augeri, fuerunt. Peccant etiam non aliter, qui bibendum ace-  
 cuius causa est tum negant. Non enim in omnibus fluoribus sanguinis  
 redundantia. dandum probatur, sed in iis qui \* approbato atque  
 \* profuso largissimo fluore uexantur. In paruis enim aqua fri-  
 gida sufficere potest, aut admixto paruißimo aceto. At sit tumor fuerit attestatus, ut complexam passio-  
 nem demonstret, proculdubio constringentia fugien-  
 da, quantum res pati, uel admittere possunt. Est igitur  
 improprium, ut ea quæ incongruè adhibita nocere de-  
 monstrantur, etiam cum necessariò conuenire fuerint  
 uisa, prohibenda existimentur. Etenim aduersantia  
 solutioni tussiculam ex fluore uenientem mitigant, at-  
 que ipsum fluorem constringunt, & sanguinem reti-  
 nent cohibendo, & neque noxam inurunt. Siquidem  
 \* data sepe \* reddita per digestionis uias patientibus parti-  
 bus adueniunt temperata, atque admixta liquidis in  
 alto conjiutis: & propterea obtusa uirtutis uiolen-  
 tia perdurant. Sunt etiam clysteres contrarij. Siqui-  
 dem commouent corpus, eo tempore præterea, quo  
 \* facere conglutinationem \* faciendam nitimur. Hac ratione  
 etiã urinalia medicamina atq; uentrisflua magis noxia  
 \* subuertunt iudicantur. Siquidem turbant atque uexant, & \* uer-  
 tunt stomachum. Item proteruius omnibus uomitus, &  
 propterea contrarius iudicatur. Rescindit enim uul-  
 nera, nisi quis eum iam solidatis cicatricibus ob recorporationem adhibendum probauerit. Est propterea  
 affectatio

affectatio sudorum, quam Græci\* aphydrosin uocāt, ἀφύδρσις.  
 contraria. Cum enim superflua atq; redundantia tol- \* Aphidrosin  
 lere uidetur, laxatiue uirtutis causa, coeuntia disiun-  
 git. Item taurinum gluten tensionem atq; duritiam fa-  
 cit. Motus uero corporis neq; excludendos generali-  
 ter probamus, neque \* approbandos. Si quidem prius \* admittendos  
 quam passio declinauerit, requiescere debēt ægrotan-  
 tes. In declinatione uero \* sint mouendi, sed non post \* sunt  
 cibum. Tunc enim ob digestionem celebrandam tem-  
 pus est quiescendi: quo fit, ut prius quān cibum sum- \* secundo  
 pserint ægrotantes gestatione sint mouendi, \* secunda  
 etiam deambulatione. Etenim parua\* adiectione ne- \* concitatione  
 que ulcera refricantur, & in resumptione uirtus  
 corporis excitatur.

De Phthisica passione. Cap. XIII.

Phthisis, siue ut plerique appellant phthoe, quod φθίσις.  
 corporis faciat \* defluxionem, siue corruptionē, φθον.  
 fit frequentius antecedente sanguinis fluore, aliquādo \* dissipationē  
 etiam longi temporis tußicula, siue catarrho, quo tho- ούρτιξις  
 racis\* altiora lacerantur, & primo leuius: \* tunc ul- \* profunda ex  
 cerata facientia collectionem intrinsecus \* quæ cum i-ime partes  
 siccata fuerint, citius sumut passio initium. Sed non se- \* at cum ulce-  
 cundum has differentias erit efficacia curationis mu- ra fuerint  
 tanda. Si quidem antecedentes causæ, quāquam diuer- \* & non sic-  
 se, unam facere passionem uidentur. Sequitur autem cata  
 ægrotantes febricula latens & sepe quæ initium de-  
 clinante accipiat die, atq; ueniente luce leuigetur, at  
 testante tußicula plurima initio noctis, atq; fine, cum  
 sputis saniosis, ac paruulis primo, in iis qui non ante  
 sanguinis fluore uexantur: quæ quidem admixta sali-  
 ua latere, \* secundo autem, etiā plurima ferri uidean- \* deinde: deio  
 tur. Iis uero qui ex fluore sanguinis in istam ueniunt cept: postea

Sputa.  
αἱμαλωπα.

\* clausosa:  
\* ἰσχυροῦ νο-  
cat libris de a-  
cutis. cap. 10.  
lib. 2.

\* grauis dolo-  
ris sensus  
\* ulcerato  
Pulsus  
\* myrmeci-  
Zonta  
μυρμηκῶν.  
ὑπόπνοσι.

\* fibra. Eade  
voce utitur  
pag. 320.

\* Aphor. II.  
et 12. lib. 5.  
\* colligatione  
putredine.  
\* perseverant  
quidem, et  
\* ex tenuibus  
densiora facta  
\* sunt  
σύντηξις.  
ἀτροφία.  
Passio  
ἰμπνικὰ.

passionem primo sanguinolenta sputa efficiuntur, hoc est cruenta, quæ Græci hæmalopa uocauerunt: tum feculenta: dehinc liuida, uel prasina: et in ultimo alba, atque purulenta, dulcia, uel salsa, cum uoce rauca, aut \* acuta, et difficultate inspirationis, atque genarum rubore, et cæteri corporis cinereo colore: item sequitur oculos exoletus aspectus, et corporis tenuitas, quæ nudatis mēbris proditur magis quam ex aspectu uultus. Quosdā etiā sibilatio uel stridor \* thoracis sequitur, et crescēte passione sudor superiorū partium usque ad pectoris finē, cibi fastidiū, et maior appetitus sitis, et quibusdā \* grauedo uulnerati pulmonis, ut etiā eius expuāt fibras, quibusdā punctio, \* ulcera thorace: pulsus debilis, densus, ac deinde somicalis, quem Græci \* myrmeczonta uocant: Digitorum summitates crassescunt, obuncatis unguibus, quod Græci gryposin uocant. Sequitur præterea inflatio pedum, et nūc frigus, nunc seruor articularum: nasi summitas pallescit, atque aurium \* lamina frigescent. Tunc peiorante passione uentris efficitur fluor albidarum egestionum, et indigestarum, debilitatis naturalibus digestionis officiis. Discernunt præterea plurimi purulentum liquorem, phlegmata carbonibus imponentes, quo exusta probentur. Nam tetrici \* odoris esse necesse est omne quod natura fuerit mutatum, uelut ex \* defluxione carnis ueniens. Item in aquam mittunt ægrotantium sputamina. Etenim naturalia facile soluuntur, uitiata uero atque mutata, \* perseverant, quadā \* tenuitate coacta subsidunt: siquidem \* sint grauia, et contra naturam ex defluxione carnis uenientia. Vicinæ atque similes passionēs sunt phthisicæ, syntexis, quam nos defluxionem dicere poterimus, et atrophia, quam nos

nutr

nutrimenti cessationem uocamus, item empyica passio, siue \* anaphoretica, quam nos purulentem, siue \* uomifluam dicere poterimus, quod ex uomica interioris \* collectionis purulenta per tussiculam \* excludunt sputa. Sed hæc discernuntur. Siquidem ex his atrophica longo tempore facit tenuari, nullis etiam attestantibus sputis, sæpe etiã sine ulla tussicula. Etenim longo tempore febricitantes, atque tussientes, \* limpidis adhuc sputis affecti, necdum phthisici iudicantur, in phthisicam uero passionem prona ac declinans esse noscuntur. Item empyica passio, siue ut supra diximus, anaphoretica, discernitur à phthisica, non aliter quàm ulcerum collectione. Quippe cum empyicos sæpe antecedit pleuritis, uel peripleumonia, & tumor immensus, & febres uehementes cum horribus frigidis, & inordinatis. Dehinc quod sæpe coadueruata puris copiam excludant repente Empyici, ac deinde egestionem facta, febribus atque horribus præteritis liberentur, ut aut omnino iis careant, aut ex parte afficiantur: in phthisicis ea quæ supra diximus antecedant, & liquida paulatim, non coadueruata excludantur & pro modo auctæ passionis etiã febres auzeantur. Communiter autem hæc passio stricturæ, atque solutioni erit adscribenda, & subiacentibus \* passioni tēporalibus \* cœnotetis. In quibusdam etiã ulcerum differentias monuimus \* promouendas. Sunt enim necessariò intuendæ. \* Siquidem complexa sit regule, quã dietam uocant tum medicaminum ratio, quã pharmacian appellant. Denique si tumens ulcus fuerit, quod intelligitur ex dolore consequenti, & ceteris tumoris signis, conuenit egrotanti calidus locus, & abstinentia unius diei: tum fomentatio laxatiua,

ἀναφαιτική.  
\* eadem ratione vox hæc formata est, quæ supra dixit à Græcis vocari τὸν ἀναφαιτικὸν pag. 317.  
\* uomifluam  
\* abscessus  
\* excluduntur  
\* minime uisiosis alienis præuiis

πλευρίτις:  
περιπλευμονία

\* passionis temporalis quæ tēporū certis interuallis exacerbatur,  
\* cœnotetibus  
\* proponendas  
\* Siquidem cōplexa est tum



atque cataplasmata, & cucurbitæ appositio cum scarificatione, & uaporationibus spongiarum, & totius corporis perunctione: cibus quoque sorbilis, calidus, & magis panosus, obseruatis temporibus singulorum adiutoriorum, ut sæpe docuimus: at si tumens non fuerit ulcus, ob purgationem sordis erunt aquæ mulsæ cyathi duo uel tres offerendi ante cibum, uel fœnigræci sæpe \* torti decoctus succus, sed non ita ut uiscosus fiat, quod \* seruabitur: Si secunda uel tertio \* mollius scatere cœperit deponatur, \* quod sit colore uinosus, ac deinde uni cyatho liquato admisceatur mellis cochleare: habet enim uirtutem fœnigræci semen mutissimæ deterfionis: uel certe mulsum dabimus ex lini semine frictio, atque trito, admixto puluere, aut \* liquato linteolo limpido, uel farina \* merezmi. Si autem maior purgatio fuerit facienda, irin illyricam atque \* herbum dandum probamus. Oportet etiam \* herbum rubrum aquæ infundere, donec infletur: tum testa calefacta atque ignita molere, terere, ac deinde tum tenuissimo cribello eius pollinem mulso aspergere in cochlearij quantitatem: uel ex melle decocto electarium facere, admixto scilicet polline suprascripto. Sed propter uehementiam \* herbi, erit coniicienda sordis magnitudo, ut si fuerit putruosa, quam Græci dysoden appellant, tum solo \* herbi polline \* utemur: Sin uero non ita fuerit cogens cause admixto sesamo \* iri illyricæ equalis ponderis, aut superantis, pro passionis magnitudine. At si plurimum putruosum apparuerit ulcus, ex iis quæ firuntur, non solum per os conuenit \* herbi pollinem dari, sed ex ipso confectum etiam cataplasma cum aceto atque melle extrinsecus apponere. Tunc etiam

leaticu

\* tosti

\* cauebitur

\* lenius bullire

\* quoad

\* ligato in linteolo

\* immersa

\* eruum

\* eruum

\* erui

\* uicinus

\* erui

\* uicinus

\* iridi

\* erui

lenticula simili usu adhibenda probatur. \* Et præ- \* Est  
 terea purgatiuæ uirtutis aristolochia & dracontia  
 herba, siue quæ appellatur aron. Eius generis etiam  
 marrubium approbatur, quanquam sit stomachi ue-  
 xabile, purgatiuæ tamen uirtutis. Oportet autem eius  
 manipulum tribus aquæ sextariis decoquere, donec  
 ad tertiam partem redeant: tum marrubium detra-  
 ctum proiicere, atque admiscere mellis boni libram,  
 & rursum decoquere, donec ad suam ueniat crassi-  
 tudinem. At si marrubium uiridius fuerit, tundendum  
 atque exuccandum, & in unum cyathum succi libra  
 mellis miscenda, & ita decoquenda: aut aquæ sexta-  
 rij tres decoquendi, siue admiscendi, donec mellis cras-  
 situdinem sumant. Faciunt etiam ex strobilis, & amy-  
 gdalis, & lini semine, uel supradictis, electaria: item  
 ex amygdalis, & \* ptisana cum melle & lacte sor- \* ptissana  
 bile medicamen, & primo cum pane \* acceptum in- \* accipiendum  
 fuso \* melle: tum etiam singulare sorbendum, paruissi- \* melli  
 me, ad modum unius cyathi uel duorum: dehinc plu-  
 rimum, longe ante tempus alterius cibi: quanquam sit  
 in quibusdam hoc solum cibo sufficiens. Etenim copus  
 nutrit, & uulnera reterget, & cruentos, uel purulen-  
 tos iuuat. Dehinc cum tenuia sputa ferri uiderimus,  
 facit etiam strobili decoctio, quæ conficitur hoc mo-  
 do. Viridem strobilum sumentes, fructuosum, qui in  
 semet habeat quædam resinalia, \* quem tribus sexta- \* aque  
 riis immixtum decoquimus, donec pars dimidia liquo-  
 ris insumatur: tū detracto strobilo erit residuæ parti  
 liquoris miscēda mellis libra, uel glycyrrhizæ: \* Tūc \* tum deco-  
 decoquendo donec crassitudinem sumat. Conuenit etiā quendum  
 ex \* squillitico uino electarium confectū, \* ex quo erit \* Scybelis  
 sextarius unus libræ mellis admiscendus, & gummi \* in quo

uino perfusi selibra: tum decoquendum mel donec uinum insumatur. Potest præterea etiam melilotum limteolo ligatum tempore decoctionis immitti: item succus glycyrrhizæ simili modo, atque eodem tempore

\* *Diacodion* miferi probatur. Conuenit etiam \* *Diocodion* medicamen cochlearis quantitate sumptum, uel butyrum cum melle in electario datum, & præterea purgatiuæ uirtutis atque siccatiue hoc medicaminis genus: marubij succi uiridis sextarij tres, mellis libra una: quæ cum fuerint coctione crassificata, \* *iris illyricæ* immittende sunt drachmæ duæ. Sed oportet neque semel, atque eodem tempore omnia hæc ægrotantibus dari. Varias etenim materias posuimus: siquidem iugis speciei unius oblatio satiat ægrotantes, & propterea recusatur, neque accessionis tempore hæc danda mandamus. Quapropter \* *uni* etiam cætera in curationibus monemus intuenda, quo purgato ulcere humanioribus cibus utamur, hoc est ex mediæ materiæ qualitate.

*Lecli pensiles* Conuenit interea motus latens, pensili primo lectulo, \* *Adhibenda* uel cathedra longiore, atque in uicina porticu. \* *Adhibita* etiam perunctio primo sedenti, ac deinde recepta fortitudine stanti: purgato ulcere damus uinum album, atque lene, mediocriter remordens. Tum lauacrum adhibendum, quando etiam sicca conuenit cibatio singularis, uel cum palmulis thebaicis: & pulmentum in cibum \* *dato*: uel arnoglossa herba, & uolantum non pingua: item sub lingua amyllum \* *datum*, quod \* *retentum* defluxionem ne ueniens subiectis partibus patientibus irruat, & paulatim adiuuat cicatricem: uel mel decoctum simili modo \* *datum*, aut paruo amylo admixto: Tum etiā trochiscus, qui appellatur \* *trigonos*, uel mel uino remordenti admixtū, \* *parti*

sus

\* *datum*:\* *dandum*\* *retineat*\* *dandum*\* *uide supra*p<sup>42</sup>. 351.

τροχισκος.

πλυσσος.

\* *pari*

sue quantitati, & decoctum, donec \* incoquatur ui-  
 num: tum etiam antidotum, quod appellatur theriaca,  
 & mithridatios, quæ in semet habet siccandi atq; re-  
 corporandi uirtutem: item \* zopirios: & \* dicrisimus.  
 Apponenda præterea extrinsecus emplastra, quæ in ci-  
 catricem ducere ualeant, ut est \* melinon, ac deinde sic-  
 cantia magis. Tum cum firmum apparuerit, leuimen-  
 tum, erit \* amitaonion imponendum uel \* polyarcyon  
 malagma, admixto \* cerotario ex oleo cyprino: con-  
 fecto parte tertia: siquidē hæc singularia primo tem-  
 pore ægrotantes ferre minime \* possint. Tunc cyclica  
 regula adhibenda, sed quæ non repentinas habeat or-  
 dinum mutationes. Denique nunc uinum, nunc aquam  
 potare permittimus, iuxta cycli rigorem. Danda etiā  
 drimyphagia, quam despuentibus sanguinem memora-  
 uimus. Adhibenda etiam localia adiutoria, similiter cu-  
 curbita, dropaces: & sympasmata: & paroptesis: &  
 sinapismus, & bibendum medicamen, quod \* diapipe-  
 reon appellatur. Valet enim callositatem ulceris te-  
 nuare, atque siccare. Fugienda præterea bibendi medi-  
 caminis satietas, & eligendus consuetorum usus. Ma-  
 gis siquidem insueta materia uexatus stomachus, atq;  
 fastidio supinatus \* prodat ægrotātes. \* Et propterea  
 uehementer utilis naualis gestatio, atque longa naui-  
 gatio, lectio, uocis exercitatio, & omne quod dare  
 corpori fortitudinem potest. Veteres autem medici  
 alij nihil de ista passione memorauerunt. Sed Diocles  
 libris, quibus de passionibus atque causis, & curationi-  
 bus scripsit, iubet initio cibos detrahi, nihil de fine ab-  
 stinentiæ significans aut quousque sint ægrotantes re-  
 timendi: tum sudores commouendos, quibus necessario  
 uires auferuntur, & neque hoc quemadmodū faciendū

\* hanc Paulus  
describit

\* dicrisimum.

\* Describitur  
ab Actie.

\* Amythao-  
nii emplastrū

describitur à  
Paulo

\* Polyarchiū  
describitur à

Paulo: & Cel-  
so.

\* cerotarij  
confecti.

\* possunt  
συμπάσματα.

παρὸν παρὸν.

\* vel Dia-  
Auscip. πικρ.

gum, ut pag.  
415.

vel Aia. πικρ.

gum, ut cap.  
10. lib. 5.

\* prodiit  
\* Est præterea

Diocles.

ἀνακείλιασ-  
μ'ς.

\* medicamentis  
quæ supra uen-  
triflua dixit  
pag. 384.

ἔξιμιλι.

\* quod  
ψυχρολόγια.

\* exeat

\* praterea

Praxagoræ.

\* quæ uomitio  
ne ab Hellebo-  
ro incitata, ac  
ulcere propter-  
ea irritato, no-  
centior & de-  
terior fit,  
Themison.  
\* pendente thoro

sit ordinauit. Vtitur etiam \* anacœliasmus, quorum  
qualitates non memorauit, adiiciens uerrendum, siue  
deducendum à pulmonibus humorē, quando fuerat mi-  
tigandum potius ulcus quàm repurgandum: item uomi-  
tum ex oxymelle adhibendum, \* quo corpus desiciens  
do ulceratas lacerat partes: atq; hoc iugiter, & post  
cœnam faciendum probat: dehinc proterua mentis cæ-  
citate deceptus etiam psichrolusian imperat adhiben-  
dam, & allium dandum, quod necessariò \* uexet egro-  
tantes inflando: tum uino flauo utendum, siue nigro,  
& \* propterea duro, atque post prandium deambu-  
latione uexandos imperat egrotantes, & nulli adiu-  
torio sua tempora reddenda perspexit. Praxagoræ  
secundo libro curationum, ijs qui pulmonis ulcere affi-  
ciuntur initio helleborum probat, atque sitim facien-  
dam: tum resumendos: nō aduertens primo resumptio-  
ne, tum helleboro utendum, quo possint eius laborem  
perferre egrotantes. Ad summam, non resumpto uiri-  
bus deficiente helleborum non conuenit, Resumpto au-  
tem, uel fortificato exclusa \* phthisica passione com-  
probatur, & propterea usus hellebori recte prohibe-  
tur. At Themison secūdo libro Tardarum passionum  
quædam recte, quædā caduca proteruitate cōposuit,  
ex quibus est etiam \* pendentis thori gestatio, quo plu-  
rima parte dici ac noctis motu exerceantur egrotan-  
tes cum necessariò accessio uespertino tempore aspe-  
retur, atque luce surgente leuigetur: quo non solū la-  
boriosus, uerum etiam intemporalis, & inordinatus  
motus ab eo adhibitus probatur. Etenim initio lucis,  
& dimissionis tempore nutriri cibo conuenit egro-  
tantes. Est etiam noxium allium, quod imperat dare:  
Allium inflat siquidem inflationem maximam facit. Vnctio item ex  
seruen

feruentibus adhibita uirtutibus, quam circa uesperam  
 probat adhibendam, cruribus atque brachijs cōtraria  
 iudicatur: tunc enim febres ardescunt. Imperat præ-  
 terea inter duos uel tres dies ægros lauandos, cū cor-  
 pus elimatis uiribus debilitet lauacri frequentia, &  
 sordidet atque humectet ulcera. Præterea\* herbū,  
 dehinc intybum, & plantaginē dat, cum sit horum  
 usus differentia temporum \* separatus. Herbum enim  
 purgationis adhibetur causa: frigerantia uero cicatri-  
 cis obducendæ. \* Item imperat ulcera faciēda extrin-  
 secus, iisdem quibus intus inesse senserimus, quod est  
 perniciosum. Putat enim auersione humoris facta ad  
 exteriores partes altiora ulcera præficari, & pro-  
 pterea diutissime differendam ait sanitatem exte-  
 riorum ulcerum, donec \* illa clauduntur. \* Imponenda  
 nanque ait emplastra, quæ humoris prouocant deflu-  
 xionem, cum humoris defluxio iuxta \* sapientia placi-  
 ta nullius commodi teneat fidem: sic etiam plurima lo-  
 calia adiutoria adhibenda conscripsit, quæ multo tem-  
 pore \* magnificas ulcerationes hoc est, quas nōs ex-  
 trinsecus infiximus, in cicatricem uenire \* cohibeant,  
 impediens plurima quæ congrue adhiberi possunt, ut  
 defricationes, dropaces, cucurbitas, sinapismos,  
 paroptescs, & alia quæ cum uehemen-  
 tissime prosint, ulceratione cutis  
 præfecta adhiberi non  
 \* possint.

\* eruum

\* separandus.

Eruum

\* Idem

\* alteriora clau-  
dantur.\* ulceribus ex-  
trinsecus factis

\* sapientum

\* manifestas.

χαροποιουσι.

\* prohibeant

παραπλησσει.

\* possunt.

## CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER TERTIVS.

\* \*

De Suspirio, siue anhelitu, quem Græci  
Asthma vocant.

Cap. I.



Nhelatio, siue suspirium ab accidenti  
nomen sumpsit. Vocatur præterea se-  
cundum aliquos spirationis difficul-  
tas, quam Græci dyspnœan uocant,  
siue orthopnœan: siquidem sese præso-  
cari sentiunt cum iacuerint ægrotantes, atque erecti  
facilius spirent. Itē, ut alij dicunt, contrario uocabu-  
lo suæ uirtuti nomen accepit. Nam cum sui ratione  
conuertat ac deprauet, tanquam corrigat, orthopnœa  
nuncupatur, quam nos spirandi dicere correctionē po-  
terimus. Multa enim contrariæ interpretationis uoca-  
bulū sumpserunt, ut fella, quæ Græci glycea uocant,  
uelut dulcia, cum sint amarissima. Grauat autem atq;  
premit hæc passio magis mulieribus uiros, & iuueni-  
bus senes, atque pueros, & durioribus natura corpo-  
ribus teneriora, hyberno atque nocte magis, quàm die  
uel æstate: in quibusdam ex initio generatur: in qui-  
busdam perfectis irruiat passionibus, sed magis ex pro-  
fundo frigore sequitur patientes spirationis difficul-  
tas, & frequenter natura, celerior magis quàm tarda:

item

Ἀσπνοια.  
δυσπνοια.

\* spirant.  
At ut  
\* spirationē e-  
uertat

Fella  
γλυκία.  
\* Plin. cap. 10.  
lib. 27. Holo-  
steon sine duri-  
tie herba est,  
ex aduerso ap-  
pellata a Græ-  
cis, sicut fel dul-  
ce

\* frequentia  
maturans.



item præfocationis sensus secundum thoracem, atque grauedo, & feruor igneus: item enteron ad superiora *ἐν τῇ ἀ-* conductio, & cum passio uehementescere cœperit, stridor, atque sibilatio \* pectoris, cum uocis debilita- *\* ἰσχυρῶς cap. 10. lib. 2. A-* te: tum extensio colli, atque uultus, cum rubore, & *cutorum.* oculorum suspensio \* attentu: iacendi potestas schema- *\* obtutu. A-* te supino: tussicula nunc orida, nunc uuida, cum sputis *ἐν τῇ ἐν τῇ* tenuibus, & spumosis, aut crassis, & uiscosis, & sudoribus, & calore morbidò, atque pulsu humuli. At si grauior impetus superpositionis fuerit, ora ægrotantium liuescunt, \* & quidem excluso per nares humore mucilento, releuantur, atque præfocationis carent metu, quod non aliter cedit, etiamsi per oculos lachrymarum fuerit fluor. Variantur autem tempora passionis superpositionibus & lenimentis, & nunc limpidis atque synceris, nunc sordidis, & passionis tractibus implicatis, ut etiam tunc leuis difficultas inspirationis inesse uideatur, quæ facili prodetur, si ægrotantes itinere ascensibili gradientur, aut ocius pergant, uel indigestione, aut usu uenereo affecti, uel frigore, atque puluere, siue fumo grauentur. Differt autem hæc passio à peripleumonia, quòd neque cum febribus necessario fiat, & semper tarda esse uideatur. Item secundum aliquos discernitur ab orthopnoea. Siquidem hæc cum frigidore atq; præfocatione asperatur: orthopnoea uerò cum \* thoracis euerfione atque singultu, aliquando *\* stomachi* etiam cum sanguinis fluore. Item secundum aliquos magnitudine discernitur. \* Vehementem enim dicunt *\* uehementiorem* orthopnoean supradictis passionibus. Sed est melius, ut uno atque generali concursu, passionum potentiam iudicemus, ut nunc uehementem passionem dicamus, & magis accessionis tempore, nunc leniorem, &  
m agis

magis dimissionis tempore. Est autē passio stricturae, quapropter conuenit, ut mox corpus inuasit, siue cū repetendo superpositionem asperauerit, iacere agrotantes altioribus stramentis, thorace atq; capite subleuato, loco lucido, atque calido mediocriter, adhibita requie, & abstinentia cibi usque ad tertium diem, si uires permiserint: pectus tegendum lana, atque fouendum oleo dulci, calido: \* adhibita quoq; articulorum blanda calida manu fricatio, ut etiam tenendo \* medeamur temporibus admotis tempore quo accessio uehementescit: \* & cucurbita lenissimis raptibus detrahenda. At si praescotio coegerit, & uires permiserint agrotantis, adhibenda phlebotomia, & diatriiti tempore, unctione antecedente: sorbilis, atque calidus, & uariis in dimissione offerendus cibus, atque alternis diebus, donec passio declinet. Sin uero imbecilles uiribus fuerint agrotantes, diurnis diebus dabimus cibū: sed ea die qua abstimere oportuerat, paruum. Ea uero qua dare licebat, paulo plurimum. \* Sin uero officium non agnouerit, simplex clyster adhibendus, & ante cibum mulsae ex melle despumato duo uel tres cyathi \* praebibendi: cataplasma laxatiuum, atque cucurbita cum scarificatione adhibenda thoraci, & in utraq; scapulas, ac magis paulo inferioribus locis, quo sine ulla quassatione partium, eius raptus efficiatur. Tum uaporatio spongiarum, atque cerotarium, & malagma quod diachylon appellant, uel \* mnascum: Atq; ita lauacrum, & uinum, & uariis \* reddendus cibus. In lenimento uero si passio tardauerit, erit adhibenda re sumptio, gestatione, uocis exercitio, deambulatione, unctione, fricatione, corporis retento spiritu: tum lauacro, atque cibo ex pulmētis mediae qualitatis: Dehinc

\* adhibenda  
\* premamus.  
Sic tamen legitur pa. 401.  
\* sunt &

\* Si uenter

\* praebendum  
\* inter scapulis

\* describitur a  
Paulo.  
μάλαγμα.  
διάχυλον.  
μνάσκον.  
\* dandus

ad recorporatiuam curationem transcundum. Adhibenda drimyphagia, atque ceterarum transitus mutationum, quas sepe cyclos ordinantes docuimus. Tum etiam ex radicibus uomitus, uel si passio coegerit, etiam helleboro prouocatus. Iubemus præterea acetum \* scylliticum ægrotantes ante cibum sorbere, \* scylliticum uel cum aceto nitrum, siue laser, aut hyssopi decoctionem cum fico contriti, uel nucleo pineo, quem Græci \* pityda uocauerunt, admixto mulso: item ab- \* pityda rotanum tritum cum sulphure, atque aceto ex \* mulso \* melle confecto, uel urtica semine, aut \* radicem, & horum \* iridem, & horum similia electaria rebinthina, aut \* cartamum, quod nasturtium uocamus, aut sesamum cum aloe, & amygdalis amaris: aliquando etiam pipere, uel oui uitello: uel illud electarium quod \* diascyllis appellamus, cuius confectio- \* Diascyllis de Medicaminibus scribentes tradidimus. Tum etiam cucurbitæ recorporatiuæ adhibendæ thoraci, atque \* interscapulis: dehinc dropax, paroptesis, heliosis, si- \* interscapulis napsismus, acopa, recorporatiua malagmata, ut est Diadaphnidon, uel Dialoe, uel \* Diaeuphorbio: de- \* Diaeuphorbium hinc nauigatio atque peregrinatio terrena, & potio theriacæ antidoti, & aquarum naturalium usus, quarum præstant in Italia \* cotylis appellatæ, \* siue albæ, Balnea in Italia. uel nepefinæ: tum etiam cataclysmus, hoc est, aquarum \* cutilie illisio supernè, iisdem locis qui patiuntur. Vtilis deniq; \* siue albule, maritima, & plurima mare tenus conuersatio, atque siue nepefinæ consuetudo frigidi lauacri, quam \* psichrolusian ap- \* psichrolusian appellant. Aliqui autem aduersarum sectarum principes etiam dauco cum aceto & melle ægros potauerunt, siue \* iri cum mulso, & uentrem plurimum deduxerunt, dando de diagridio, quod scammonian Græci appellant

pellant, obolos tres, cum duplici pondere aloes siue hieræ, quam catharticam uocant, uel ammoniaci salis obolum siue opopanacis simile pondus, uel \* cneoron, aut polion heritæ, uel peplion, aut calchanthum, uel thapsian, aut asininum lac, & castoreum, non solum lenimenti tempore, sed etiam in augmento, siue superpositione passionis. Alij uerò etiam urendum thoracem, uel caput crediderunt. Themison quoque secundo libro Tardarum passionum in quibusdam eisdem

*οὐραμάρτα-  
ραρ*

\* compeccasse uidetur, cum plurimum uentrem purgandum credidit ex diagridio, atque in ipsa accessione.

\* thapsia

Utitur præterea cōstrictiuis, atque his acrioribus, & imperat dari \* tapsiæ succum cum opopanace, aut sagapeno, ex quibus stomachus necessario uexatur. Hic

\* quod potu  
medicaminum

denique erit memorandum, \* quia potis medicaminibus non sine cautionibus utendum est, ut neque eorum plurima satietate uexandi egrotantes. Item in impetu uel asperitate passionis re corporatiua adiutoria

\* Est enim  
cænotes

prohibenda. \* Erit enim cænoteta consideranda, qua facile medicamina qualitatis ratione accedente \* cor-

\* conuenien-  
tiora

rectius approbamus.

### De stomachicis. Cap. II.

**A** Parte corporis quæ patitur stomachica passio nomen accepit sed non omnis stomachi querela illico passio nuncupatur, nisi fuerit ex multorum concursu signorum, & perseuerantia confecta, atque corporibus tardans, repetendo superpositionibus & \* lenimenta. Plurimi igitur singulatim speciales curationes eius tradiderunt, nunc de stomachi duritia dicentes, nunc de uentositate, de rheumatismo, & debilitate, & horrore ciborum, & fastidio. Themison quoque primo libro Tardarum passionum \* solutionem circa

\* lenimentiis.

Themison.  
\* solutionem  
uocat cæliacū  
morbum

stomac

stomachum appellauit rheumatismum, secundo libro *iuxta*  
 uentositatem. Thessalus secundo libro regulari cura-  
 tionem separauit soluti stomachi atque inflati. Nos  
 uerò communiter sub una propositione de omnibus di-  
 cere curabimus, qua, uentositatem uel ex tumore du-  
 ritiem confectam stricturae iungimus: fastidium uerò,  
 siue horrorem ciborum, & corruptionem \* ambi- \* nidosam,  
 guam, utrisque principalibus \* passionibus subiicien- & acidam  
 tes. Antecedentes causæ quæ stomachi passionem fa- \* strictura &  
 ciunt, cæteris quoque passionibus generandis commu- solutionis  
 nes esse probantur, sed magis \* ista iugis indigestio \* istam  
 parit, siue post cibum \* gemitus, & perfrictio pro- \* vomitus  
 funda: item mæstitudo, & medicaminis insueti pota-  
 tio. Sequitur autem in passione constitutos accessioneis  
 tempore animi defectio, articulorum frigidus torpor,  
 aut uariatus per membra acrior naturali feruor, qui  
 magis medias teneat manus: tum roscidus sudor, &  
 animi angustia, iactatio, anxietas, siue \* concatenatio \* contractio  
 mentis, & desponsio, coloris mutatio, pulsus paruus,  
 celer, imbecillus, corporis tabes, cibi fastidium, uel ma-  
 ior ciborum appetitus: tum corruptio acceptorum  
 cum acore uel in \* bromosam, uel \* fumosam transeun- \* cænosam,  
 tium qualitatem: Quibusdam etiam uocis amputatio, putidam  
 & dentium \* confriictio, siue concubitus: inseparabi- \* nidosam  
 lis capitis grauedo: aurium tininitus, quibusdam sitis \* contritio  
 insatiabilis, & cum in accessu tumor maior fuerit ex-  
 citatus, oris siccitas, & saltus sub præcordiorum par-  
 tibus: tum dolor in eadem parte, aut etiam inter palas  
 tenens, siue \* latius, cum se tremor uberior \* infude- \* latior  
 rit: dehinc transuorandi difficultas cum præfocabili \* diffuderit  
 sensu. Quo denique commoti quidam nostræ sectæ  
 principes, Epistolarum libris hoc accidentiæ genus  
 \* stomati

- \* *stomachica* \* *stomaticam synanchen uocauerunt. Durescente autem stomacho sine ullo seruore atque dolore, cetera communia signa sequuntur: tum igneus earundem partium sensus, & magis inter palas, si omnis aruerit stomachus: sin uero in superioribus, erit transuorandi difficultas, donec ad eius fundum accepta perueniant: aut si in \* eodem fundo, quem Græci basin appellant, fuerit durities, erit transuoratio facilis, sed post eius perfectionem grauatio sequetur, tum durities, atque extantia in interioribus præcordiorum. At si uentositas fuerit stomachi, tensio sequetur inflatione coniuncta: tum capitis plenitudo cum \* oppressus atque iugibus ructationibus, \* testante grauedine, quæ magis accepto cibo sentiatur. Tum sonus in interioribus liquidorum tanquam semipleni folliculi, errante uento per innania: atque \* ita tensione laxata \* erunt ructatione \* releuandi. \* Et si etiam intestina fuerint \* conflata, rugitus interiorum sequetur, quem Græci \* borborigmon appellant. At si solutio fuerit stomachi, quam rheumatismum uocauerunt sequitur salinarum fluo, & quibusdam iugis sputus, & oris humectatio nauseabilis, cum mordicatione interiorum: quibusdam plurimus uomitus crassioris, uel tenacis, aut fellei, & \* prasini humoris, uel alterius cuiuslibet substantiæ circa supradictos colores. Sin uero occulta fuerit solutio, quam Græci adelon appellat, aut \* immensa signa uideantur, quæ Græci logothoreta uocauerunt, sequitur debilitas pulsus egrotantis, & ueluti stomachi pendens atque tremens sensus, marcor ac defectio animi, quam Græci lipothymian uocant, quæ sumpto cibo temporaliter depellitur resumptione suffecta, non tamen perseuerabili: nam rursum in eandem*
- \* *relabent*
- \* *expressis*  
\* *attestante*  
\* *ista*  
\* *agri*  
\* *releuantur*  
\* *Quod si*  
\* *inflata*  
\* *borborigmū,*  
\* *borborigmū,*  
\* *lib. 4. cap. 3.*  
\* *porracei*  
Solutio ἀδελον.  
\* *immanifesta*  
\* *λ' οὐκ ἐμφαντα* si  
\* *gna.*  
\* *λιποθυμία:*

\*relabēt defectionem, in imagine \* ultimæ passionis. \*relabuntur  
 Quo fit ut nisi quis celerius sumpserit cibum, summa \* periculosissi-  
 defectione iactetur. Sic deniq; plurimi \* impausabili-  
 ter tota die atq; nocte cibū sumpsisse ueteribus tradun-  
 tur. Nanque Asclepiades memorat Praxagoræ famu-  
 lum ternos bilibres panes per singulos dies accepisse:  
 quibus comestis nō aliter passione afficeretur, quā \* accepisset  
 si nihil \* acciperet. Sed ab ista passione phagedæna di-  
 scernitur: siquidem in ipsa non \* insumantur, uel dige-  
 stioni traduntur accepta, sed grauatione sequente \* insumuntur  
 \* euomantur. Hæc sunt quæ de stomachi \* reumatismo \* euomuntur  
 occurrunt. Sed \* circa regulam methodicam discer-  
 nentes superpositionis tempore, cōtrariarum adiuto-  
 ria passionum stricturæ ac solutionis, quæ suis specie-  
 bus & signis approbantur, in lenimento, communi se-  
 piissime curatione utemur, quam recorporatiuam di-  
 cere poterimus, à Græcis metasyncriticam appella-  
 tam. Cum igitur primo stricturæ passio corpus inua-  
 serit, atq; noua tempore causa fuerit \* egrotantis, siue \* ægitudini  
 in superpositione constituta, turbando, aut dolore, aut  
 uentositate affecerit patientem, conuenit eum iacere  
 loco lucido, atq; calido mediocriter, adhibito strami-  
 num, atq; operimentorum calidorum usu, & si uires  
 permiserint, adiuncta abstinentia usq; ad tertium diē,  
 & accessionis tempore omnisfariam requie, tum arti-  
 culorum blanda conuenit defricatio, eum quodam ca-  
 lidarum manuum amplexu, ut etiam tenendo medea-  
 mur. Dehinc uaporationes inter scapulas, siue palas  
 adhibendæ: pectori quoq; saccelli calidi ex cantabro  
 confecti, siue polline: \* nam Græci \* omphacomeli uo-  
 cant, & harum \* similium materiarum. Conuenit etiā  
 multiplicati linteaminis uaporatio, siue pānorum, uel  
 \* & quod  
 Græci  
 \* Describitur  
 à Paulo &  
 Actio  
 \* similes mate-  
 ria. Conueniūt



\* sic cornua a-  
 qua feruente ua-  
 porata balnea  
 vides adhibet.

\* accessione  
 affectus

\* mollia

\* intestina

plagellarū, quæ Græci ptygmata uocāt, oleo tinctarum: \* cucurbitæ igni externo uaporata, atq; leniter appositæ, iugi atq; frequēti mutatione: aliquādo etiā testea uascula, quæ Græci amphoras uocant, siue uitrea: tum fomentatio studiosa ac iugis, ex oleo calido atq; dulci, uel in quo maluæ agrestis radices decoctæ sunt: si singultus fuerit, sicyonio: si inflatio cum ruta uel anetho. At si uocis fuerit amputatio, in \* accessionis affectu, decumbentibus, erunt spongiis aqua calida expressis ora uaporāda, & distinctio dentium faciēda digitis immis̃sis, quibus lenius gingiuas deprimamus: tum capitis fomentatio, & resumptionum modicamenta adhibenda, ut panis calidus, uel cucumis, aut melo, uel terræ gleba aqua calida infusa, & oris collutio ex aqua calida, & accessione urgente parua potatio: ac si in uehementiam passio uenerit, adhibenda phlebotomia, qua perfecta, si tertia fuerit dies, quam Græci diatriton uocant, erit egrotans unctione curandus, calido scilicet ac dulci oleo: tum oris adhibenda collutio: cibus offerendus paruus, leuis, calidus, sumptione facilis, ut sorbibile quidquam ex pane atq; melle, & sale, & anetho confectum, sine pulicula \* molli, uelut ex pane, aut alica: & oua sorbilia: Tum alternis diebus, permittentibus uiribus, æger nutriendus, donec passio declinet. Potus præterea dandus est plurimus, sed neq; maioribus haustibus hauriendus, neq; coadceruatim atque eodem tempore, quo potius \* ignotos impleri, quàm relaxari faciamus. Iis autē partibus quæ fuerint in tensione constitutæ, cataplasmata conueniunt laxatiua, ut est præ ceteris ex lini & fœnigræci pollinibus, & semine maluæ, ex solo melle, & paruo oleo admixto confectū, quo plurimo tempore corpori

pori possit sine ulla grauatione immorari: tum cucurbita adiuncta scarificatione, siue hirudinū appositio, quas uulgo sanguijugas appellant: deinde cataplasma, & uaporatio spongiarum expressarū liquoribus sæpe memoratis. Declinante passione si ulla durities fuerit consecuta, erūt cataplasmata apponenda, ut nuper docuimus, admixta resina, siue in olei uicem liquida pice: uel radice hibisci, & adipe porcino recenti primo, tum ueterato, confecta, siue ex bordei pollinibus, aut lolij semine, & arido fico, & hibisco: Tum etiam ex oleo calido embasis, siue \* ex uarietate eiusdē per <sup>μυσσας.</sup> diuersa uirtutis, ut \* scæno-græci decoctione, uel radi- \* ob uarietate, eis maluarū, aut lini semine. Dehinc cibus uarius dan- per diuersa dus, sed qui nullam faciat inflationem, neq; digestionē eiusdem \* tardius approbetur, sed omni facilitate conueniens, \* scæno-græci ut cerebrum porcinū, pisces teneri, atq; olera quæ uen- \* tardior trem mollire ualeant: Tum lauacra cōuenit adhibere, atq; uino egrotantem resumere leni. Utendum etiam malagmate quoddachylon appellamus, siue Mnaseū, uel diamelilotū. Et si \* uētositate fuerit stomachus affectus, adhibendum \* diasamfucum, siue diaspermato: \* cæliacus mor- quorum compositiones de medicaminibus tractantes bus Responſionum tradidimus libris. Si \* reumatismus fue- \* utrunq; hoc rit, quē nihil aliud quā solutionem accipimus, conue- medicamētum nit egrotantē iacere loco mediocriter frigido, supino à Paulo descri- schemate, atritis ac \* teneribus stramētis utentem, ad- bitur \* rheumatif- hibita requie, & abstinentia, sicut superius diximus, mus \* teneris permittētibus uiribus: tum tenacior ligatio articulo- rum, uel si causa coegerit: constrictione faciēda apposita cucurbita stomacho, plurima flamma subiecta: dehinc solutio cogente sponsia frigida, atq; odoramēta quæ percutere minus ualeant caput, ut exhalatione sui

frigus ingerant egrotanti, ut mala cædonia, pira, sorba, mala punica, murta, lentiscum, rosa, uel pulentū infusum, & his similia: oris collutio ex aqua frigida, siue pusca. Ac si plurimus fuerit saliuarū fluor, expuere iubemus egrotantē: siquidem retentus stomachum  
 \* soluit  
 \* soluat: transuoratus autē humectat atq; obducit, & propterea geminat solutionē. Sed hoc conuenit facere urgenti tempore, ne meditatio potius expuēdi fiat, atq; exinde prouocatio fluoris augeatur. Perseuerāte passione gargarismata sunt adhibenda ex supradiētis, uel ex aliquo succo ad fluorem sanguinis præscripto, qui ualeat frigore atq; propria uirtute mederi, uel si res coegerit, ex iisdem spongiæ expressæ, sicut in aliis docuimus, gutturi admouendæ, siue pectori, & \* inter  
 \* interseapulis  
 \* potui  
 \* interseapulo. Lenius autem atq; idem faciunt ptygmata ex supradiētis expressa liquoribus. Constringūt enim saliuarū fluorem, & nauseam releuant, quod non minus etiā masticata conyza, atq; exputa, siue mastiche cōtrita, & lactucæ albæ semen facere ualent. Possunt etiam\* potui dari eā quæ congrue medentur, ut duobus aquæ frigidæ cyathis seminis lactucæ albæ aspergantur cochlearia duo, siue mastiches cochleare unū: uel plātaginis siue mali punici dulcis, uel acidi succus, cum particula menthæ paruissima, uel cucumeris semine cōtrito. Dandum quoq; medicamen confectū, quod Dioporon appellamus, item Diamorō, siue diarhoos, & his similia: quorum compositionem Medicaminum docuimus libris. Cauendæ præterea horrentium materialium fabulæ, quæ quadam cōmemoratione uomitum commouere uidentur: utendum cataplasmatibus, quæ nuper de fluore sanguinis scribētes docuimus: & diatriti tepore adhibenda perunctio ex oleo Hispano, siue

siue lentiscino, uel murtino, qua præcurato ægro, ora  
 fouenda aqua frigida, uel spōgiis ex ea expressis\* de- \* detergenda  
 tergi: tum cibo reficiendi ægri constrictiuo, sicut de  
 fluore sanguinis conscripsimus, atq; ita parua interpo-  
 sita dilatione frigida parum aquæ paulatim bibant.  
 Quod si quisquam non ualuerit sustinere, calidam da-  
 bimus sic ut nimio feruore constringat: imitatione  
 enim uelut usturæ partium perficit densitatem. At si  
 cibum sibi in stomacho natate senserint ægotantes,  
 conuenit articularū impressam ligationem facere, &  
 ut in aquam feruentem manus ægotantium mittere,  
 uel si maiora cogunt, etiam cōstriktiua adhibere cu-  
 curbitam, & primo ori uentris, dehinc inter scapulas,  
 siue palas, quod metaprhenon Græci uocant, & ali- μετάφρενον.  
 quando tertiam inferius à prima conuenit adhibere.  
 Ac si cibis fuerit reiectus, secūdo nutriendi sunt ægro-  
 tantes: & si\* permiserit ut diathriti rigorem serue-  
 mus, erit alternis \* plurimis paruus cibus offerendus. \* vires permi-  
 serint  
 quo quidem diurnis diebus, sed non simili modo ægri  
 nutriri\* uidentur. Sin uero stomacho collectus humo- \* plurimū: sic  
 ris fluor mordicationē fecerit, ilico excludendus, si plu- pag. 396. dixit  
 rimum superare fuerit uisus: non quidem digitis\* im- paulo plurimū  
 misis, quo uomitum prouocemus, ne magis influant cibum dādum  
 acriora, & ex partibus sanis, uel quæ passione conta- esse.  
 minatæ non fuerint patientibus aduenire liquida facia-  
 mus, quippe cum consuetudo sapiissime transeat in na-  
 turam. At si plurimum edax fuerit humor, nec tamen  
 ita superfluous, ut sua sponte per uomitum excludi ui-  
 deatur, ob\* facultatē reiiciendi, quo minus euersio fiat \* nideantur.  
 stomachi, damus potum & perseverante solutione, ca-  
 taplasmatū, siue medicaminū uirtutes augemus. Tum \* sed natura  
 si orexis, siue appetitio cibi fuerit impedita, dabimus spontaneo co-  
natio  
\* facilitatem  
Appetitis

ea quæ naturam ualeant excitare, ut intybi thirsum, uel lactuca, & magis albæ, atq; aceto tinctæ, tum albas oliuas, & panem pusca infusum, cum paruo pulegio, & sale, & Hispano oleo: item pultem ex \* pane uel \* tragoptissana, atq; pusca, & oleo, & sale paruo confectam, & anetho, uel porro capitato, uel \* tragoptisana, quæ ex lenticula atq; alica conficitur: sed erit assanda lenticula. Tunc immittenda mala cydonia, uel orbiculata, siue \* scaudiana, ut plerique uocant, uel mala, \* pira, aut sorba, aut \* pira duracina, quæ crustumina uocant, uel folia plantaginis mollia, aut intybi. Aspergenda etiam alicæ, siue oryzæ, grana mali punici, uel \* uux fabriles: dehinc etiam uina quædam infundenda, ut murtinū, \* malinum, uel ex malo punico confectum, aut hydromel inueteratum \* uel quod melimelon appellant, aut hydromelon. Danda etiam Pruna damascena, & malum assum, uel elixum, uel quidquam ex supradictis. Sic etiam uolantum carnes quæ nulla pinguedine accipientē grauent, ut passerum pectora, uel perdicum, aut attagenarum: tum etiam quadrupedum leuia, deinde porcina crura, item maritima, quæ non sint cōtraria solutioni, ut squillæ, mulli, carabi, \* buccini, spondylia, conchyliæ. Ac si cibus in acorem transierit in iisdem erit perscuerandum, atq; eodem potu, cui erunt aspergendæ coriandri seminis drachmæ duæ: Tunc etiam asperiori uino utendum, quod Græci hypausteron uocant. Perseuerante fluore, erit etiam trochiscis utendum, quos hæmoptycis, & celiacis potandos scripsimus. Lauacrum interea tardius ac serius ordinandum, & multo atque longo

\* Prissana vox sua significatione cōplectitur omnia semina vesca, cortice detracta ad hominū cibos preparata.

\* tragophacoptissana  
Pira crustumina, uel duracina.

\* Alica  
\* scaudiana  
\* pyra  
\* pyra  
\* fumo siccata. c. 3. lib. 4.

\* melinum  
\* Melimelon fit ex succo cydoniorum & melle: hydromelum ex decocto cydoniorum & melle. Vtrumq; Hydromeli nomine Paulus describit. Huius cū positionibus

utrumque similis est Alina simplex officinarum.

\* buccina, spondili, Vinum ὕμπερ

tempore prohibendi ægrotantes bibere priusquam cibum sumpserint, nisi aliqua forte maior necessitas intolerandæ sitis occurrerit. Erunt nanque dandi cogen-  
tibus rebus ex uino asperiore aqua commixti duo uel tres cyathi. Sed si forte complexionis passionum aliqua fuerint signa perspecta, erunt urgentiora conij-  
cienda, quibus ordo magis seruiat curationum. Plurimi uero medici stomachichos putant eos qui duritia laborant, & singultu ijs que dant castoreum ex aqua  
malsa solutum, quantitate pleni cochlearis, tribus cya-  
this aquæ miscentes. Eos autem qui fluore stomachi, hoc est rheumatismo laborauerint, aqua potant, mi-  
scentes aloës cochlearis pleni quantitatem, uel infusio-  
ni adstringentium uel decoctioni, uel succo. Sed erit  
præcauenda medicaminum dandorum satietas, ac ma-  
gis \* inlocandæ qualitatis, quam non solum ægre per-  
ferant ægrotantes, uerum etiam officio appetendi cibi  
deserantur, & propterea passionis augeatur perni-  
ties. Hæc etiam de illo potando medicamine, siue anti-  
doto, quod hieran appellant dixerimus. Facienda etiã  
laboriosa, atque dolore grauissima ignis uisura. Sed  
in lenimento \* oportebat ægrotantium fortificare  
corpora, atque resumere uaria gestatione, & pro mo-  
do uirium, sub diuo deambulationes adhibere, siue le-  
ctionis exercitium, si fuerit literatus ægrotans, uel ut  
communiter dixerim, uocis: tum unctionem ac defrica-  
tionē, & eos motus qui magis humeros ualeant exer-  
cere, rectento spiritu, & nunc palestra corpus agita-  
re, tum lauacro rarissimo uti in ijs qui fluore uexan-  
tur stomachi: iugi autem, ac frequenti in ijs qui stri-  
ctura laborare uidentur. Vinum uero, atque uariū ci-  
bum constrictiuum \* prioribus, \* laxatiuum sequētibz

\* abominādas  
Alij inuicem  
de

Antidotum  
ipsa.

\* oportebit

\* qui fluore la-  
borans

\* qui strictura  
afficiuntur

ordinamus, ut pisces teneros, echinos, ostrea, & olera mollia, accedente regula methodicæ disciplinæ, minuendæ augendæq; quantitatis. Dehinc adhibenda re-

\* metasyncri- corporatio, quam Græci \* metasyncriticam uocant, sin ex acriori cibo, quem Græci drimyphagian appellât, \* & cappari- ex aqua \* capparis confectio, & aceto, & sale, & ce- bus pe: \* sed ex \* depositis, quæ temporis requie nullo acce- \* conditaneis pto marcore instabilis uirtutis careât qualitate. Dan- salgamis dæ etiam rapæ sinapi madidatæ, atque \* salsum ex ace- \* salsamentum to & oleo conditum: uel aceto, & mulso, & sinapi: aut mulso ex uino confectio: quæ quidem erunt uarian-

\* corpori affri- eta. His ver- bis designat τριμματα, & συμπασματα. ψυχρολογία,

\* linimento feruentis resina \* lenimento, nunc ex picis, nunc ex dropacis, primo communis ac lenioris, deinde compo-

\* calfacto ti ac uehementioris: atque ita nitri fricamento \* uten- dum, & sole torrendum corpus, quod Græci heliosin appellant: aut paroptesis adhibenda ex carbonibus, uel parietibus ignitis, & \* ceromate: aliquando etiam ex fico calefacto, tum defricatio ex nitro, atque oleo, & adarce. Adhibenda quoque acopa ex euphorbio,

\* & diagridio, & pyretro, & pipere, & sinapi, uel succo ferulaginis, \* quem Græci thapsian uocant: un- gendæque ijs solis corpora, uel admixta cera ea impo- nenda, donec sufficienter \* inflari ui medicaminis par- tes uideantur. \* Conuenit etiã uomitus arte affectatus,

quo



quo corpora\* discecentur: & primo ex aqua mulsa,  
 uel ex aceto scyllitico melli admixto singulari, uel  
 adiuncto semine cruce, aut cardami, aut urticæ, aut si-  
 napi, aut\* salsamenti multi ex aceto & melle: tum e-  
 tiam ex radicibus: ultimo quoque helleboro lenticulæ  
 admixto, uel orizæ, in ijs qui rheumatismo fuerint  
 affecti: cum sorbilibus uero succis in ijs qui strictura.  
 Adhibenda etiam ptarmica, quibus stomachus commo-  
 tione capitis contremiscat. Item sorbendus, aut insun-  
 dendus rhinenchyto ferramento naribus succus cycla-  
 mini, aut cruce, aut anagallidis herbæ: gargarizandū  
 sinapi ex aceto & melle \* decoctio thymi, aut origa-  
 ni, uel pulegij, aut hyssopi, aut \* squillæ succus cum  
 aqua mulsa, & cætera similia, eius generis quæ fue-  
 rint, & magis cum \* initia atque summitas stomachi  
 callosa, uidebuntur uehementiore modo curationis in-  
 digentia. Tunc etiam adhibemus quædam acriora, uel  
 horum exhalationem egrotantes haustu suo horta-  
 mur adducto spiritu recipere, quo etiam altiora agita-  
 tione medicaminis demutentur. Sumpto igitur fictili  
 uasculo immittimus puscā: tum admixto nitro, origa-  
 no, cardamomo, mastiche chia, carbonibus subiectis  
 decoquimus. Sed erit primo os uasculi prægypsandū,  
 immisso calamo utraque ex parte forato, cuius summi-  
 tati oui uacuati imponimus testā, ex utroque suo  
 uertice perforatā: cuius altera cauerna calamo inse-  
 ratur, altera uaporem fumet acceptum: tum egrotan-  
 tem iubemus ore aperto supradictā cauernā labijs  
 amplecti, siue oui, ut supradiximus, uerticem, atque  
 ita eius exhalationem excipere: cuius quidem feruor  
 erit moderandus, ne nimietate partes exurat. Atq; ita  
 si plurima & perseverans mordicatio affecerit egro

\* eodem gene-  
 re locutionis  
 utitur li. 4. c. 1.

\* salsamento  
 multo

παραμυα.

ρίνιον χυτον.

\* Decoctio thy-  
 mi potui dan-  
 da, aut

\* scyllæ

\* initium

\*mixarum

\*amylō

Medicamen

Polyarchion.

\*Diadaphni-

don

Diadaphnion.

Diechidnon.

κατακλυσμὸς

Balnea in Ita

lia.

\*Cutilia

\*aptissimē

\*his quidem

tantem, erit mitiganda simplicibus gargarismatibus, ut aqua calida, & oleo, siue lacte, aut decoctione cantabri, aut succo ptissanæ, uel \* noxarum decoctione, aut \* amyli cum aqua. Oportet præterea etiam partibus in passione constitutis apponere medicamen, quod Polyarchion appellamus, uel \* Diadaphnion, & horum simulum, quorum compositionem Medicaminum tradidimus libris. Dandum quoque medicamen theriacum bibendum, quod diechydnon appellamus: cuius quoque compositionem Responsorum dedimus libris. Tunc ægrotantes maritima natatione exercēdi, atque cataclysmo curandi, hoc est aquarum illusione, suppositis partibus patientibus. Animo præterea securo atque facili esse conuenit curādos, & aquarum naturalium usum adhibere, ut quæ sunt in Italia \* Cotiliæ appellatæ, & Nepelinæ quarum lauacro atq; potu \* aptissimo utendum, adhibita aeris mutatione longa, terrena & maritima: exercitationibus uarijs palæstrarum, adhibito præceptore utēdum, atque ita \* iisdem resumptionibus corpus cōuenit recurrere. Sic enim perseueratione & uentositas excludetur stomachi, & aliæ quoque supra dictæ passionēs depellentur.

## De Phagedæna. Cap. III.

φαιδαῖνα.

φαιδαῖνα ἀπὸ

τῆ φαιδῆς ἄλλω

ἰ. ἀπὸ τοῦ

ἰσθμοῦ.

\*coadernati

\*cibo

\*fætor

\* &amp; attritu:

\* Hi multa

desunt.

Est etiam phagedæna ex stomachi passionibus, qua affectos sequitur cibi uehemens appetentia quam Græci orexin appellant, & \* coadernati accipiendi cupiditas, & immasticata transuoratio, tum grauedo, atque tensio, & propterea uomitus, quem \* sibi coacti atque oppressi prouocant ægrotantes, corporis macies, pallor, aliquando etiam uultus inflatio, oris \* pedor, quibusdam etiam gingiuarum putredo, cum scabro dentiū detrimento \* tritus, uisus obtusio\*, sed passioni

fioni genus philonij in problematicis daturus nos iterum pollicemur. Interposito enim tempore digestionis, rapiuntur accepta, atque repletis uijs, quos Græci poros appellant, obtunditur appetitus. Erit præterea <sup>πίσις</sup> curandum, tempore quo cibamus, ea ministrare quæ <sup>ῥαγε</sup> parum nutriant, sed quanta ui\* queant, appetentiam obtundant, ut sunt olera quæ non relaxent, ne uomitū moueant. sed constringant potius. Sic enim sui quantitate famem \* sentiunt, atque uirtute propria digestio- <sup>\* satiant</sup> nem non grauando perficiunt. Bibere autem \* non <sup>\* nos</sup> prius quàm solidus \* sumitur cibus, ijs qui fame urgen- <sup>\* sumatur</sup> tur utilissimum iudicamus. Si quidem potu impleti minus solidos appetunt cibos: phagedænicis uero hoc conuenire negamus: humectatus etenim stomachus in uomitum facile prouocatur, & liquefactus atq; supernatans cibus facilius nauscam prouocat ægrotati. Erit igitur sensim uomitus differendus, atque eius consue- <sup>\* parum</sup> tudo mutanda, ut interpositis diebus\* parum demus aliquando cibum, & appositione cucurbitarum eius adiuuemus descensum, qui solitis suis locis insertus tenetur, \* Alia uero uomitum permittamus, ac deinde <sup>\* alias</sup> paucis interpositis diebus prohibeamus, uel iterum adhibeamus, sed in\* adiutorij uicē, hoc est ex radicibus, <sup>\* adiutorij mo</sup> tum etiam ex helleboro, quo regulæ curationis adiu- <sup>do specie ratio-</sup> toria localia concurrant recorporatiua uirtute medentia, & partes ad fortitudinem naturalem ducant, quorum \* usu ex supradictis, atque in alijs passionibus <sup>\* usum</sup> ordinatis accipiendum ducimus. <sup>lecorosi</sup>

De lecorosis, quos Græci Epaticos uocant, & lienosis, quos splenicos dicunt.

Cap. II II.

ἐπατικοί.  
Lienosi.  
σπληνικοί, ἡγέρ  
σπληνικοί.

V tra-

\* phlegmone  
\* abscessu  
ἐπιπλωσις.

\* docebimus.  
• quæ tumoribus  
succedentes

\* arquato  
ιερπής.

\* grauedine,  
ob pondus su-  
spensi iecinoris:  
punctione, ob  
distractionem &  
diuulsam mē-  
branam cui ie-  
cur adnexum  
est, & quæ cū  
Diaphragma-  
te colligatur.

\* conata, συμ-  
πιπλωσις: i.  
cohaerentia, ut  
nihil videatur  
sub costis ina-  
ne iacere, quod  
tamē vacuum  
in sanis depre-  
henditur: quā-  
obrem & xi-  
viana Græci  
vocaucrunt.

**V** Traque passio à locis patientibus nomen acce-  
pit. Siquidem est in iecore, uel in liene constitu-  
ta, \* tumore scilicet effecta, siue \* collectione, uel du-  
ritia, atque saxitate, quam schirrosin uocant. Sed de  
tumoribus libris febrium docuimus. De collectionibus  
uerò, siue uomicis specialiter \* docemus. De duritia  
uerò aut saxitate, \* quæ cedente tumore efficiuntur,  
nunc prosequemur. Sequuntur enim quædam commu-  
nia iecorosis atque lienosis, quædam specialiter pro-  
pria: sed communia, grauedo, spirationis difficultas,  
& magis in itinere & ambulationibus cliuosis, tum  
piger motus, atque anhelatio, & sitis, & oris siccitas,  
coloris mutatio, pedum inflatio, aliquando etiam fe-  
bricula latens, & hydropismi suffusio, cum continua  
cibi corruptione. Propria autem, uel specialia iecoro-  
sis hæc sequuntur, extans durities, siue scirrhis in  
dextra parte præcordiorum, schemate rotundo, costis  
ex aliqua parte subiecta, & propterea ueluti decisa:  
ex alia uerò parte circumscripta, atque rotunditate  
terminata, color sæpius æruginosus, siue \* arquati  
similis, quem Græci iæteron appellant, urina turbata,  
uelut sandarachæ colore: & accessionis tēpore dolor  
tendens usque ad dexterum iugulum, atque palam, &  
difficilis supra latus sinistrum iacendi copia. Siquidem  
adducuntur dexteræ partes suo pondere pendentes,  
& propterea \* grauedine, atque doloris punctione  
ægotantes afficiunt, tum felloso stercorum egestio.  
Lienosis uerò extans duritia, atque saxea sub sinistra  
parte præcordiorum inuenitur, schemate longo por-  
recta, & ueluti pectus inuadens, uel umbilici sæpius  
transgrediens finem, atque latitudine superans, nunc  
minimè, nunc uehementer, ut omnia \* conata uidean-  
tur, &

tur, & insipientes eo falluntur, ut membranam tume-  
 re, siue extare putent, quam Græci peritoneon uocāt, *περιτόνιον*.  
 color plumbeus, atque accessionis tempore dolor ten-  
 dens ad iugulum sinistrum, & palam, & difficilis su-  
 pra dextrum latus iacendi copia. Memorant plerique  
 etiam multitudine pediculorum ægrotantes affici, &  
 grauiore per somnum sudore, attestante ueretri in of-  
 ficio uentris erectione, & assiduo è naribus sanguinis  
 fluore. Præterea oris foetor ægrotantes afficit, cum  
 gingiuarum putrefactione, & \* defluxione. Sectarum \* colliquatio-  
 principes meminerunt tenuari etiam cutem uentris, *ne*  
 & \* uenas nigras apparere, atq; crassiores, & in cru- \* varices  
 ribus ulcera difficilè in cicatricem, uel indecenter ue-  
 nientia. In his igitur communiter oportet superposi-  
 tionum tempore, tanquam in tumore curando, calidum  
 iacentibus prouidere locum: tum fomentis & cata-  
 plasmatibus, & cibis laxatiuis uti tempore, quo sepi-  
 sime docuimus, sed tenuibus, ac sorbilibus. Tunc cu-  
 curbitæ atque scarificationes, & sanguisugarum con-  
 uenit appositio, quas hirudines appellant, & uapora-  
 tiones. Ac si uehemens passio fuerit, adhibenda phle-  
 botomia iis omnibus anteposita, tum clyster, si uenter  
 officium non agnouerit: \* sed ex decoctio fici singu-  
 laris \* impressi patientibus locis: \* flectetur enim & \* ac resolu-  
 exercitio quodam durities \* resoluetur. Conueniunt *tur.*  
 etiam frequentes cyclorum mutationes: denique in-  
 ter paucos dies adhibenda drimyphagia: tum radicum  
 uomitus cum aceto \* squillico, uel certè helleboro  
 erunt \* disiciendi. Tum alia mutatione resumendi æ-  
 grotantes, adhibito usu aquarum naturalium, atque  
 natatione maritima, & uaporatione \* locorum natu-  
 ra spirantium, \* quo etiam sudores moueantur, non ob  
 uirium

\* sed &  
 \* impressa  
 \* mollietur e-  
 tiam  
 \* ac resolu-  
 tur.  
 \* scyllitico,  
 \* adiciendi  
 \* talis est spe-  
 cus prope Nea-  
 polim, quæ in-  
 cole vocant la  
 Grotta di Tri-  
 toli.  
 \* qua

\* recorporatio  
 παρὰ τὴν φύσιν.  
 \* Polyarthron  
 ὁ Ctesiphon-  
 tis, γρ πα. 324.  
 \* Paulus de-  
 scribit empla-  
 strum ex sale.  
 Διαρτυτικὸν.  
 Διαμυρρινὸν  
 βάλεον ὁ.  
 Διαρβυσμ.  
 Διαρβυσμὶν  
 τινὲς.  
 Διαμυρρινὸν  
 βάλεον.  
 \* Apud Ae-  
 tium cap. de scir-  
 rho lienis legi-  
 tur Epithema  
 aurei coloris  
 Asclepiade,  
 quod calcē vi-  
 uam accipit.  
 Gal. ca. 7. lib.  
 14. Meth. ad  
 flatuosi tumo-  
 ris curationem  
 emplastrū pa-  
 rat ex calce vi-  
 ua, ὁ στρίγμῆ-  
 τιν γυμνασίο-  
 rum.  
 Apollonius  
 Citiensis.  
 \* ipsa  
 Medicamina  
 scarotica.

uirium fætigationem, sed quo possit calida spiratione  
 ac naturali \* corporatio fieri patientium partium.  
 Conuenit præterea etiam in littore sicco ex harena  
 sole ignita paroptesis : tum malagmata quæ corpus  
 ualeant papulare : & primò leuiora, ut est \* polyar-  
 thion, ex caphiso fonte, & salibus confectum, quod  
 \* diahalos appellant: item ex tribus resinis, quod \* dia-  
 retisimum uocant : tum etiam, quod appellant \* diamy-  
 repsicen balanum: item Diaoriganum, & Diacarda-  
 mum, uel Diathapsias, & Diasbestū: \* Quorū omniū  
 compositiones Respōsionum libris explicauimus. Sed  
 ijs quæ sunt uehementia, ut est Diathapsias, ita erit u-  
 tendum, tanquam sinapismo uti solemus. Hæc est secun-  
 dum nos curatio eorum qui duritiam, siue scirrhosin  
 in iecore uel in liene habuerint. Apud ueteres autem  
 medicos plura, atque dissonans & turbulenta curatio-  
 nis ordinatio inuenitur. Alij enim phlebotomiam recu-  
 sarunt in lienicis, ut Apollonius Citiensis: alij proba-  
 uerunt. Atque horum alij ex dextro brachio iecoro-  
 sos, & ex sinistro lienosos phlebotomandos dicunt:  
 alij ex talo eius partis quæ patitur: alij ex medio di-  
 gitorum, omnifariam uariis extimationibus tētati. Su-  
 munt enim atque deposcunt ex ijs partibus, quæ facili  
 diuidi possint, phlebotomiam faciendam, hoc est bra-  
 chiorum uenis, nisi fortè \* ipsæ tumuerint, & ob hoc  
 oporteat longè à patientibus partibus phlebotomiam  
 adhibere, quo iniuria lateat adiutorij. Item alij de  
 ustionibus adhibendis certauerunt: & quidam solis  
 aiunt lienosis conuenire: quidam autem iecorosus, me-  
 dicaminibus scaroticis adhibiti, siue cauteribus: & ho-  
 rum alij urenda, alij perurenda probauerunt, atque  
 altius in lienicis cauteris insigendos: quorum quidam  
 simplices

simplices, quidam trifulcos, quidam serratos appro-  
 bent \* frigidos. Tum uestionis ulcera humectantes,  
 atque in ea fluorem humoris longo tempore prouo-  
 cantes, scyrrhosin defluxionibus auferendam credide-  
 runt, ex quibus tumores, atque indignationes, \* &  
 consensus cum uehementibus febribus necessario se-  
 quuntur. Siquidem peritoneos membrana, quæ est na-  
 tura nervosa, ignis uestione uexatur. Fit etiam secundo  
 impossibile plurimis atque uehementibus adiutoriis  
 uti medicantem, ut sinapismo, cucurbitis rapidis, forti  
 raptura motis, fricationibus, dropace, & his similibus,  
 cum cicatrices cæcitæ uie, & hebetudine torpentes,  
 tanquam mortuæ uim nullam medicaminum accipiant.  
 Diuiserunt præterea plerique etiam curationis offi-  
 cium, & alia iecorosis, alia lienosis conuenire proba-  
 runt. Hinc denique \* quasdam lienica uocauerunt. Ie-  
 cori etenim cataplasmata aiunt adhibenda ex abrota-  
 no, & sesamo: item bibenda medicamina, ut theria-  
 cam, \* quam dioscoridian uocauerunt, \* diapatorion,  
 uel diapyrion. Item anodyna, quæ nos indoloria dice-  
 re poterimus, ut ea quæ scribunt \* diadion pipereon,  
 & \* lexyphyreton, & chamæpityn, uel uiridis pini  
 decoctionem singulatim, uel cum melle: item urinalia  
 medicamina quæ diuretica uocant, ut est mulsum cum  
 dauci decoctione, uel scæniculi radice, aut petroselini:  
 aut \* absinthij, aut mali cydonij cum cœnanthe. Vtun-  
 tur etiam oleribus, ut lactuca cocta, uel incocta, aspa-  
 rago, radicibus olusatry. Ventrem quoque \* deducen-  
 tes antidoto quod hieran uocauerunt. In lienicis uerò  
 epithema aiunt specialiter conuenire ex cappare &  
 chigene. à Galeno κ. τ. π. pag. 683. \* Apud Gal. κ. τ. π. pag. 685. lexyphyrei  
 duæ sunt descriptiones. \* Absinthium, aut malum cydonium \* deducunt

\* figendos, al-  
 rigidos.  
 cōsensus Ad-  
 thodici voca-  
 bant tenuissi-  
 morū corpuscu-  
 lorum concu-  
 sus, coitiones,  
 & coacernati-  
 nes, ex quibus  
 fieri putabant  
 phlegmonas, fa-  
 bres, & alias  
 id genus mor-  
 bos: quod indi-  
 cat infra pa-  
 gina 418.  
 Consensum  
 men hic ex-  
 plicare licet,  
 graues affectus  
 per Sympathia  
 excitatos lesa  
 nervosa parte.  
 \* quedam  
 & quod dicit  
 euasi Aru  
 \* Di Eupato-  
 rium, & Zopy-  
 rion: Zopyrium  
 Actius descri-  
 bit.  
 ἀνδύρα indol-  
 oria.  
 \* ἀνδύριον  
 describitur ab  
 Actio pag.  
 726. ex Ar-  
 685. lexyphyrei  
 \* deducunt



ἰξὺαλον.  
ἄσπληνον.

myrobalano, & aceto, sale admixto, quod oxyalmon uocauerunt, & herba cui nomen asplenos. Dant etiam

\* bibendas a-  
quas medica-  
tas, quas dicunt  
\* nutriendum  
corpus innoxia  
cutilia

\* bibendam aquam. Dicunt specialiter lienem deduce-  
re, uel defluxione purgare, ex quibus est ad \* nutrien-  
dum noxiæ cuticula, & aquæ ex lacu, in quo sæpiissi-  
mè candens ferrum fabricatores tingunt, de qua iu-  
bent dari cyathos tres cum aceti cyatho uno. Item po-  
lion herbam, aut ormini semen in cotylæ quantitatem,

\* Scyllæ

aut capparis radicem cum \* squillæ drachma dimidia,

\* aceti mulsi

aut chamædryos, uel herpylli acetabulum, ex \* aceto

\* seminis

mulso cyathis tribus, uel hipposcelini \* semen cotylas

\* mulsi

duas, cum uini cyathis tribus: aut libanotida herbam,

\* confecti

quam nos rosmarinum uocamus, cum fœniculi semine

\* Plin. cap. 37.

in cotylæ quantitatem ex uino mixto: item ammoni-  
ci guttæ drachmam unam, cum \* mulso ex aceto \* con-

lib. 11. liene per

fecto cyathis tribus, uel tamarisci ligno: item cibum

vulnus exem-

uel potum sumere iubent ægrotantes in uasculis ex

pro animalia

tamarisci ligno confectis. Quidam etiam deciden-

uiuere tradit,

dum, uel auferendum lienem ordinare ausi sunt, \* quod

sed homini cū

quidem uoce dictum, non officio completum accipi-

eo simul risum

mus. Sequentibus autem atque diuersis sese \* impli-

adimi.

cantibus potionibus medicaminum uariorum stoma-

\* implicantes

chum uexant, uescicam commouent, atque totum cor-

\* non

pus communiter in cachexiam mittunt, nescij quod

\* inenarrabi-

les

\* lienis

quædam ob acrimoniam propriæ uirtutis, laceratione

\* Hinc appa-

quædam, communi potentia medeantur, & \* nos per

ret methodicos

quasdam \* inerrabiles proprietates: & quod neque a-

peculiares me-

lia iecoris, alia \* uenis esse medicamina, rectè sense-

dicamentorum

runt. Omnia \* etenim omnium corporis partium sunt

facultates, que

communia, quando simili fuerint affectæ passione. Re-

certis corporis

gulantur enim siue diriguntur eorum uirtutes, non

partibus tri-

natura patiētis loci, sed genere passionis extentæ atq;

buuntur irri-

indultæ

sisse, atque re-

pudiassæ.

indultæ pro modo morborum. Hoc ergo est peccan-  
 tium iudicium, sed eorum causa, qui rerum \* magis hi- \* *vanas*  
 storias amant. Cetera quoque à quibusdam probata,  
 breui atque concinna oratione subiiciam. Diocles igitur *Diocles*  
 libro quo de passionibus atque causis, & curatio-  
 nibus scripsit, phlebotomat iecorosos \* & dextero \* *ex*  
 brachio, tum uentrem soluit helleboro nigro, atque  
 papaueris succo. Dat etiam cum mulso rosmarinum,  
 quem Græci libanotida uocant, & murræ, & pini *libanotis.*  
 folia. Adhibenda quoque putat cataplasmata ex phœ-  
 nicobalanis cum uino, atque lini semine, & scsamo,  
 & pollinibus, \* quos omphacomeli appellant. Dat *φαινονιόλα-  
ροι.*  
 præterea aquam bibendam, in qua sit cantabrum præ- \* & eo quod  
 lotum, & \* ptisana ex tritico, quæ omnia sunt inflan- *διμακρόμυλοι.*  
 tia, atque stomachi uexatiua, & digestionem difficilia. \* *ptisana*  
 Lienosos uero, quorum gingivæ sudauerint sangui-  
 nem, phlebotomat, & similiter uexat medicaminibus  
 felliducis, quæ cholagoga uocant, atque urinalibus, *χολαγωγά,  
felliduca.*  
 quæ diuretica appellât. Praxagoras primo libro Cu-  
 rationum iecorosis adhibet uomitum, & uentris fluxa *Praxagoras.*  
 medicamina, & sudorem mouentia, & urinalia, &  
 phlebotomiam, atque fricationem. Utitur etiam uino  
 non aquato, & unctione cauterum, & his similibus.  
 Lienicos uero phlebotomat, & cataplasmatibus cu-  
 rat, utens digestibilibus cibis, & uino potat redolenti,  
 & aceto, adhibita fricatione, atque unctione, & la-  
 uacro. Dat præterea bibendam mulsam aceto admi-  
 xto cum dauco, aut hyssopo, uel thymo, aut capparis  
 radice uel foliis, aut semine, aut ætheriæ herbæ semi-  
 ne quam eryngion appellant, aut chamæleæ, uel cha-  
 mæpitys, aut absinthij, aut marrubij, adhibens etiam  
 uomitum. Erasistratus autem in iecorosis præcicens *Erasistratus*

superpositas iecori cutes atq; membranam, utitur medicaminibus quæ ipsum iecur late amplectantur, tum ventrem deducit, audaciter partem patiëntem nudans.

*Asclepiades*

Aliqui Asclepiadis sectatores gestationes, & lavacra, & uaporationes cataplasmatum, atq; malagmatum excluderunt in iecorosis, suspicantes tenuissimorum corpusculorum fore consensum, hoc est spiritus, quem

*λεπτομερίαι.*

\* congestorum

constrictionem

leptomerian eorum Princeps appellauit, atq; \* in egestorum constrictione falsitate causarum adiutoria magna recusantes. Themison uero secundo libro Tardarum passionum plurima in his methodico rigore ordi-

\* Etenim

navit, sed proterua atq; caduca intentione, \* etiam ex talo eiusdem partis phlebotomari iubet egrotantes, atq; alternis uel interpositis duobus diebus sanguinis

\* iteratam

\* interea fieri detractionem. Vulnerandam quoq; iecoris partem in superficie medicamine uel cauteribus existimat: & concedit esse quædam propria lienis adiutoria, ob eius \* firmitatem, hoc est, quæ fuerint uehe-

\* sensus diffi-

cultati & he-

betudine. Sic

exponendum

esse monstrant

sequentia

\* eousque

mentia, ut cataplasmata, uel unctiones, \* eo concedens, ut etiam ipsum quoq; lienem igneo cauteri transpungendum probet, tribus uel quatuor locis, non aduertens, quia pro magnitudine passionis ac uirium corporis, extenduntur atq; indulgentur adiutoria, & non pro specie patientis partis. Siquidem quædam quæ natura difficilem \* habuerint sensum & propterea non

\* habent

facile tactum accipiunt, morbo tentata, sensibilia caeteris fiant, ut est plātæ cauum, quod tumore, dolidum, atq; omnino sensibile & attentum fit: Atq; rursum ea quæ natura facile sentiunt difficilioris sensus, passionis efficiuntur causa. Quo fit ut sit iuxta regulam metho-

*λαϊνὸν ὄψις.*

\* corporis

dicam explosum, ut qui intentione cœnoteum ducitur, \* corporis facile ne aut difficile sentiant curet, sicut

latius

latius de cœnotetis scribentes doccebinus. Thessalus uero secundo Regulari libro omni ex parte immutata, atq; eandem iecorosis & lienosis formam tradidit curationis. Sed quia plurimæ atq; uariæ his uisceribus irruunt speciales passionēs, ut arquatus, siue aurigo, quā Græci icteron uocāt, & cachexia, uel atrophia, atq; hydrops, de his nunc ordinare curabimus.

De Aurigine siue arquato morbo, quem uulgo morbum regium vocant, Græci icteron appellant. in igit.  
Cap. v.

**P**assio uocabulum sumpsit secundum Græcos ab animalis nomine, quod sit coloris fellei. Fit autem ex antecedenti iugi indigestione, uel medicaminibus uentrisfluis \* potu datis, atque permanentibus, & minime exclusis. Sequitur in passione constitutos mutatio coloris in fellis qualitatem, quæ primo apparet, ac magis uidetur in albidis partibus oculorum, atq; plantarum talis uel uenis quæ sub lingua sunt: uentris quoque abstinentia, uel egestio albida, atq; argilosa: urina etiam crassior, & crocea: oris amaror, & sitis, cibi fastidium, grauedo, & piger atq; segnis uisus, \* insolitus motus, animi difficultas, pruritus, & ariditas corporis, & ueluti exustione solis aspera cutis superficies: sepe etiam iecoris tumentis inflatio, siue saxea durities, difficile autem ac rarissime splenis, uel stomachi \* consensus etiam. Ex his enim plerisque uisum \* & istam fieri passionem, quæ sit quidem facile sanabilis, cæterum neq; ita felleum faciat corpus. Fit præterea nunc cum febribus, nunc sine febribus, & nunc celeriter circumscrip̃ta, nunc corporibus intardans, & propterea chronia appellata. Conuenit igitur cum

\* potui

\* inconsuetæ  
partium carno-  
sarum palpitatio-  
nes.\* euuablia.  
\* est

\* ac  
 \* superpositio-  
 nes  
 \* corporibus in  
 tumore

primum corpus inuaserit\* siue tardauerit, & in \* superpositionem ueniens fuerit apprehensa, eam adhibere curationem, quam de \* tumoribus in corporibus constitutis saepe memorauimus. Deniq; si uehemens fuerit, etiam phlebotomia usus non reprobatur. In lenimento uero, corporis exercitio, atq; cibis digestibilibus resumendos ducimus egrotantes. Tum ad recorporatiua uenimus curationem, prouidentes ut adiutoriis localibus, si qua durities in uisceribus fuerit, hoc est, in iecore, uel stomacho, aut liene, sicut superius docuimus, destruat. Sic enim cum passionis genus fuerit amputatum, etiam color naturalis corpori reddetur.

συμψύματα.

iicienda sunt eius praeterea accidētia, quae Graeci symptomata uocant, cum generali congrua curatione, id est, ut fel diffusum recorporatione adhibita detergentes, uarie deducamus, nunc clysteribus acerrimis, nunc absynthio \* potu dato, uel intybi agrestis \* succo uno uel duobus cyathis singularibus. Ac si declinationis tempus permiserit, etiam cum uino aliquando ipsa quoq; intyba comedenda probamus, cocta, uel incocta, item asparagum, uel daucum, aut fœniculum: & ob plurimam oculorum infectionem erit sternutatio commouenda, medicaminibus scilicet, quae Graeci ptarmica uocauerunt. Item naribus infundendum \* priusquam

\* Tagmaka.

\* Aet. pag.

585. ait phar-  
 maca omnia  
 quae in potu ac-  
 cipiantur, in  
 balneo danda,  
 cum aegri in so-  
 lium descende-  
 re parant.

\* succus

\* Desertur

in lauacrum ueniant egrotantes, ut quidam probant, struthium cum lacte, & ad speciem referendo, asinino uel humano, similiter etiam elaterium quod appellant, hoc est cucumeris agrestis \* succu: item cyclamini, cum eodem lacte. \* Fertur enim statim per nares, quae uultum tenuerat fellis infectio, & magis si aeger ingrediens calidas cellas in feruens descenderit solium, atq; requiescens diurno tempore aqua calida fuerit uapo-

ratus,

ratus, adhibitis aliquando etiam apophlegmatismis, quorum materiã sæpe memorauimus, item ijs quæ superficiali corpore lacessendo\*iaculare uidentur, quæ  
 appellata sunt\*anastomatica, & propterea recorporatiua, in sudorem prouocant fellis infectione, hoc est, dropax iugiter adhibitus, uel solis seruator torridus, quem Græci heliosin appellant, item naturalium aquarum exhalatio, uel medicaminum sudorem mouetium  
 usus. Aspergendum denique corpus struthio, nitro, sulphure, & ijs asperfusionibus quæ ob pruritum corporis adiuuentæ sunt, à Græcis sympasmata\* appellata: feruentiore\* apua fouendi egrotantes. Sic enim seruata regula generali etiam accidentia passionis curabuntur. Non enim hæc solis in acutis\*erunt passionibus obseruanda, uerum etiam in tardis, quas Græci chronicas uocant. Utendum etiam aeris mutatione, & gestatione uaria, & littoraria moratione, animi quoque laxamento ac iucunditate, & aquarum naturalium uoluptate, natatione uaria, & assiduo uomitu, simplicibus, atque radicibus commoto, item drimyphagia, in qua præceteris capparibus magis usus approbatur, & acetum\* squilliticum, in quo sit infusa\* anchusa herta, & bulbi, & \* squilla igne torrida, id est subassata, cum melle in electario data. Vinum præterea tenue probamus: & perseverante passione bellebore decocto corpus agitandum, uel si oportuerit, bibendum damus medicamen ex\* herbo & ceruino cornu, in cotile quantitatem cum tribus cyathis mulsæ, in ijs qui adiuncta febre uexantur,\* uel conditi, in ijs qui sine febre afficiuntur. Sed uitandam probamus frequentem, & uariam medicaminum potationem, quæ filla deducere promittuntur, siue uentrisflua, siue urinalia.

ἀποφλεγματισμοί.  
 \* osculare  
 ἀνατοματικά.  
 \* Anastomatica  
 ἑλίουσις.  
 συμπασματα.  
 \* appellata  
 \* aqua  
 \* sunt  
 \* Scylliticum  
 \* Radicis  
 Anchusæ decoctum  
 Dioscoridi nephriticis  
 ictericis & lienosis datur.  
 \* Scylla  
 \* Sed  
 \* ceruo  
 \* Conditum, laescari, uinum è dolio quod in ampliori & aqua pleno codditum est. Conditum multa scilicet medicata describit Aetius pag. 927. Aetius pag. 584 hoc medicamentum cum uino simpliciter dandum ait ijs qui febre caret codditum lib. 5. c. 1. mulsum.

Etenim sitis extenditur, & solidioris cibi fastidium duplicatur, & corporis fortitudo minuitur, atq; cibi accepti corrumpuntur, & omnis corporis materia ad alterio medicaminū deterior fit, cum habitudine, ut supra diximus, omnis fuerit immutata. Quod facere uideamus eos, qui sepiissime ac iugiter herpyllū dari probauerunt & absinthium, & aloen, & diagridium, \*colocynthida & \*coloquintida, uel ex aloe & colocynthide Hieram confectam: item ex amygdalis, & absinthio, & aniso trochiscos confectos, & decoctiones recentis mulsi ex uino confecti, cū hyperico, uel aristolochia longa, uel herba adianto, quā Latini capillum Veneris uocant, uel cicere albo. Aliquando etiam hæc mandenda probauerūt, item \*rubea, quā Græci erythrodanon uocant, uel struthium tritū cum fico arido, uel palmulis, aut sulphure, in ouis sorbilibus in parui cochlearis \*quātitate: aut certe ceruini cornu elimatum puluerē ad drachmam unam, cum uini cyathō uno, & aque cyathis duobus, uel \*nepete, quam Græci calaminthen uocāt, aut radices pastinacæ, quā \*staphylen appellant, decoctas in uini hemina, & dimidia, donec ad tertiæ partis liquor ueniat quantitatē, ex quo dandum probant cyathū unum cum aque cyathis tribus aut quinq; cū dauci semine: aut apium aut zingiber, \*meon, \*meu, uel asarū, aut radicē herbe bryoniæ, item sese-li, & \*libani herbe infusionē, uel decoctionē, & trochiscos ex herpyllo uel fœniculo confectos, uel ex aristolochia, quos Diherpyllum, uel Diamarathrum, & Diaristolochian appellant. Horū enim uaria multitudo, uel usus frequens, causa sæpe ipsius fuit faciendæ passionis. Non enim fellis detractio facta, illico curationis est causa, nisi totius quoque passionis fuerit destructio



structio consecuta. Sic igitur his utendum erit, ut supra demonstrauius: quidā Veneris probauerunt adhibendum usum, laxationē carnis faciendam aestimantes, ex quibus est Titus Asclepiadis sectator, & Themison. Sed est hoc neruositatis uexabile, quippe cum fortitudinem corporis tollat, quæ magis est egrotantibus adquirenda. Alij aurum iugiter aspicere uel intueri egrotos præceperunt, siue aureos colores, his denique etiam operimentis utendum laudauerunt: siquidē similia \* rapiuntur, & propterea morbi, siue colorū, aut fellis migrantia in alias \* possit transire materias earum concordantes colori, non conijcientes quod sit magis credibile externa in egrotum facilius transire. Quippe cum uiarum densitate in superficie corporis clausa interiora teneantur: ac certe similitudo passionis magis \* possit prouocare externam uirtutem, occulte suasionis admonitione superatam. Semper enim memoracione passionum tristes ac mæsti necessariō fiūt egrotantes: quæ maxima causa est augendæ passionis. Est autem maximum adiutorium, & magis \* utilis egrotantibus animi purissima laxatio, siue serenitas, Erit præterea perseuerante passione etiam longa nauigatio curanda, & unctio, adhibito præceptore, quo assidua defricatione plenissima fieri resumptio possit.

## De cachexia. Cap. VI.

**C**achexia nomen sumpsit à corporis habitu malo: Cacia enim uitium uel uexationem Græci nōcauerūt, hexin habitudinem. Sed principaliter eius curationem ante Themisonem nullus ordinauit. Ipsam namq; secundo libro Tardarum passionum, itemq; primo atq; quarto Epistolarum memorauit, item Thessalus secundo libro regulari. Fit autem siue nascitur

Titus

Themison.

\* rapiuntur.

\* potest

\* potest

\* uile

καχξία.

καχία.

ἴσθις.

hæc passio intemperantia ægrotantis, uel curatione mala medicantis; aut post ægritudinem tardæ resumptionis causa, item ex medicaminibus sæpiissime potatis, uel ex saxeâ duritie iecoris, aut lienis uel ex fluxu hæmorrhoidis longissimi temporis, aut uomitu, item ex febribus longo tempore corpore affecto, aut collectionibus, aut uomitu post uestertinos cibos, & his similibus. Est autem ipsa quoq; passio sæpiissime hydro-  
 \* macularū & mulibus. Est autem ipsa quoq; passio sæpiissime hydro-  
 spilorum in. for- pismi antecedens causa, aut \* macularum simili in su-  
 dium. neuorū. perficie corporis accidentium. Sequitur cachecticos  
 καχεκτικῶν. debilitas. pallor subalbidus, aliquando etiā plubeus color, debi-  
 litate, tardus ac piger corporis motus, cum inflatione inani, aliquibus etiam uentris fluor cum febricula in plurimis latente, quæ circa uesteram magis augetur, pulsus creber ac densus, cibi fastidium, & uini magis appetentia, urina fellea, & extensio uenarum. Est autem passio sæpius stricturæ, sicut ex supradictis conijcimus, aliquando etiam complexa solutione, ob plurimum uentris fluorem, uel \* simili quolibet fluxu. Qua  
 \* similem quæ- libet fluxum laborantibus. propter conuenit complexa passione laborantis, primo abstinere fluentia, & intemperantiam ægrotantis corrigere, uel curationes malas, aut medicaminū potationes prohibere. In iecore uerò aut liene si qua fuerit durities, siue saxositas, destruere, ut nuper demonstraui-  
 mus: aut si fluor sanguinis fuerit plurimus, abstinere: hæmorrhoidas uero auferre: febres quoque soluere, ut de febribus scribentes docuimus, collectiones congrua curatione, sicut de ipsis scribentes monuimus, sanare: & consuetos eis post uestertinum cibum uomitus paulatim detrahare. Ac si \* horum nihil fuerit accidens, & sola in corpore uisa fuerit cachexia, erunt eius superpositiones ac lenimenta prouidenda, & uigilante

\* macularū & mulibus. Est autem ipsa quoq; passio sæpiissime hydro-  
 spilorum in. for- pismi antecedens causa, aut \* macularum simili in su-  
 dium. neuorū. perficie corporis accidentium. Sequitur cachecticos  
 καχεκτικῶν. debilitas.

\* similem quæ- libet fluxum laborantibus. propter conuenit complexa passione laborantis, primo abstinere fluentia, & intemperantiam ægrotantis corrigere, uel curationes malas, aut medicaminū potationes prohibere.

\* fluoris sanguinis: febris: hæmorrhoidum.

gilante sine ulla ratione ægroto, aut \* cibo corrup- \* cibos  
 pente, animi attestante difficultate, cum pigro ac se-  
 gni corporis motu superpositionem cognoscere: &  
 propterea in requie retinere ægrotum, cum abstin-  
 tia cibi, quo turbatio corporis resoluatur. Item ea  
 quæ fuerint extenta lanis contegenda, atque olco cali-  
 do fouenda, ac si uenter fuerit fluens, abstinendus. Item  
 si plurima fuerit corporis tensio cum grauedine, erit  
 adhibenda phlebotomia ex brachio mediocriter, sed  
 non necessario in ijs qui hæmorrhoidarum causa ina-  
 nes uidentur. \* Ac deinde retetione facta cōstricti, sed \* videntur, sed  
 non in omnibus qui communiter tanta, ac tali fuerint \* ubi retentione  
 strictura possessi: tum perunctos conuenit refici cibo \* illarum facta  
 digestibili, ac leui, usque ad declinationis tempus & \* cōstricti sunt  
 seruato genere accidentium, \* alia cataplasmatibus, \* egri: nec eadē  
 alia cucurbitis recurare. Cū uero declinatio apparue- \* quantitate in  
 rit, plurimus ac uariis cibis erit adhibendus. Similibus \* omnibus com-  
 etiam superpositionem urgentem adiuuare oportet: at \* muniter, verū  
 lenimento ueniente, quod facile approbamus \* exer- \* ut tanta, ac ta-  
 centibus asperitatibus passionis supradictis, hoc est, ijs \* cataplasmati-  
 quæ superpositionem designant, erunt corpora resu- \* bus, ut colle-  
 menda atque fortificanda. Tum recorporatiuis uten- \* ctiones, dari-  
 dum curationibus, quo reformata corpora, uel ut ita \* tiemque ieco-  
 dixerim, resectis uitiosis carnibus, ac renascentibus \* ris, aut lienis:  
 \* nobis reparata, ad memoriā redeant sanitatis. Qua- \* cucurbitus ve-  
 propter æger, somno discusso, semet in lecto contine- \* ro, præsertim  
 re iubendus: etiam iacere paulisper: tum etiam neque \* reuellentibus,  
 repente consurgere, sed prætentato motu, discere, u- \* aut deriuanti-  
 trum se leuem ac digestum sentiat. Etenim si fuerit oc- \* bus, uomitum,  
 currens indigestio, erit requies adhibenda plurimo \* fluorem sangui-  
 temporis spatio, donec grauedo digeratur: dehinc me- \* nis, hæmorrhoi-  
 diocri gestatione, atque paruo cibo utendum, si nō ex \* das.  
 \* ex cessanti-  
 \* nouis,  
 Alij bonis

\*nam si ex ac-  
cessione id con-  
tingat à cibo  
prorsus est ab-  
stinendum.  
Augustinus.

\*extra

\*spiritualia te-  
nentur.

\*conciliari.

\*repercussibili  
syphax utatur.

\*spera  
quasi.

\*ammon

\*adhiberi pro-  
hibeant.

\*lane

\*parum bibere

\*quales.

\*accesione, sed ex aliqua causa manifesta, temporalis  
acciderit corporis displicentia, quam Græci diaresece-  
sin uocant. At si nulla fuerit egrotantis querela, erit à  
lecto leuandus, & ob expugnandam frigoris iniuriam  
oleo leuiter perungendus: Tum gestatio adhibenda,  
& si uires permiserint, uel aeris temperies, sub diuo,  
& magis \* intra muros, motu uehiculi. Si uero ali-  
qua fuerit obstans causa erunt hæc sub tecto adhiben-  
da, & pro uirium modo aut uehiculo manuali, aut sel-  
la, aut cathedra exercendus egrotus. Tum gestatione  
perfecta parua deambulatio adhibenda, uel uocis exer-  
citium, atque ad unctionem ueniendum, sed præcalef-  
cto intra uestes egro. Quoties calidum habuerit cor-  
pus, tum deposita ueste erit lintheolis leui defricatione  
tergendus, atque statim oleo paruo ungendus, & sum-  
mo tactu fricandus: primo ab alio, postea à semetipso,  
retento spiritu: ut etiam \* alia teneantur. Dehinc rur-  
sum ab alijs defricandus, tenacius quidem, sed non im-  
pressius, quo possit carnis inflatio \* coagulari. Sed  
hæc erunt adhibito unctionis præceptore facienda, quo  
secundum proprias mutationes omnium partium mo-  
tus equaliter, ac totius corporis integret exerci-  
tium. Tum permittentibus uiribus etiam raptorio ma-  
chinamento gestetur, ac deinde \* recussabili fera, quã  
Italicam uocant. Aliquando etiam harena asperso cor-  
pore, quam amon appellant, defricetur, per interualla  
dierum adhibito lauacro. Cõuenit etiã psichrolusia nul-  
lis obstantibus causis, quæ eã \* prohiberi permittat. Tũ  
uinũ dandum austerum album, \* leuc. Dehinc iubendus  
\* superbibere, atq; siccũ sumere cibũ, uel certe quartã  
partẽ panis siccã manducare, adhibito usu assorum pul-  
mẽtorum, & neq; curiose conditorum, \* ut pisces, clunes,  
uel

uel agrestium leuiora, & iis omnibus iuxta regulam methodicam auctis aut minutis, interiecta uini abstinentia, & cibi parua sumptione. Utendum etiam locorum atque aeris mutatione. Tum \* heliosin, quam nos corporis \* torporem dicimus, \* ita dropacis adhibendus usus, & pulueris nitri fricatio, & sinapismus specialiter, & usus aquarum naturalium, uel natatio maritima: item harena littoraria ignita circumtectio corpore torrendi sunt agrotantes: nunc inter paucos, nunc inter plurimos dies, ut uires permiserint: \* tum \* tum prodest nauiculæ exercitium atque peregrinatio, quemadmodum in precedentibus ordinauimus. et navigationis

De nutrimenti cessatione, quam atrophian ἀτροφία.

Græci vocant. Cap. VII.

**N**utrimenti cessatio, quam Græci atrophian uocant, ab accidenti nomen sumpsit. Contingit in passione constitutis plurimus cibi appetitus, tum corruptio, quibusdam fastidium: item tenues atque latentes \* tepore sunt, \* neque febricula \* iugiter, & quibusdam inter plurimos dies soluta. Ducitur præterea quedam etiam per urinam corporis defluxio, quam syntexin uesicæ uocauerunt, cum plurima fuerit potiliquoris egestio, atque corporis subinde per dies singulos extenuatio etiam. \* Nunc igitur conuenit, sicut in Cachecticis diximus, providere, ne qua pars corporis principaliter patiatur: oportet etiam congrua eadem morbo localia adhibere adiutoria, ut iecoris, uel lienis duritiei, uel fluori uentris, aut intestinorum, uel uesicæ, uel ulceri in interioribus constituto, aut collectioni, quam specialiter uomicam diximus. Ac si etiam febres fuerint consecutæ, iisdem quoque adhibenda medela. Si horum nihil in corpore uiderimus, sed sola fuerit

Deerat quoque principium capiti in exemplari, quod nos uel potuimus, sarsimus.  
\* tepores  
\* atque  
\* iugis  
σύντηξις vesicæ.  
\* Hic

fuerit atrophiam consecuta, cōuenit agrotum fortificari rationabiliter, atque resumī gestatione, pro uirium quantitate, scilicet quibus sepe memorauimus generibus, & unctionibus ordinatis, plurimo oleo superfuso, adhibita fricatione, & \* ministris corpulentis & molli-  
 \* esse debere libus, quales \* esse fricatores salutaribus praeceptis  
 fricatorum docuimus, quo contactu corporum laxiore agrotantis exercitata membra soluantur. Tum temperato utendum lauacro, atque uino tenui, & pane limpidio fermentato, & pulmentis ex media materia, atque iuxta  
 \* varianda cycli regulam eorum augmenta ac detractiōes\* uariare non repetitis, nec perfectis ilico cyclis, sed unius tantummodo qualitatis, ut de cataleptico scribentes docuimus. Denique cū ex uolantibus solis pulmentum adhibemus, initium ex paruulis ordinamus. Tum autem ex agrestibus tenerioribus, tum porcina & membrorum summitatibus. Conuenit praeterea locorum atque aerum commutatio, & aliquando drimiphagia, uel simplex uomitus, tum etiam ex radicibus cōfectus, & localia aliis atque aliis locis adhibenda, & magis medianis partibus. Non enim sine plurima uexatione partium, quibus digestio celebratur, inesse corporibus atrophiam potest. Ipsi igitur, frequentius adhibendus est dropax, & cucurbita, uel paroptesis, aut sinapismus, & sympasmata acriora, quae à nobis aspergines  
 Aspergines. nuncupantur: item malagmata eiusdem \* quantitatis.  
 \* qualitatis Vtilis praeterea littoraria nauigatio, atque natatio maritima, uel naturalium aquarum: tum post cibum animi laxatio, quam diachysin uocant, & articulorum complexio adhibitis ministris, qui mollibus hoc manibus efficiant. Themison secundo libro Tardarum passionum plurima recte ordinasse probatur: aliqua fuerò cadu

παράλησις.

συμπάσματα.

Aspergines.

\* qualitatis

διὰ χυμοῦ.

Themison.

rō caduca intentione dixisse intelligitur. Iubet enim  
 egros non equaliter egrotantes duodecim stadiorum  
 spatium gressu conficere, æqualem modum cunctis de-  
 finiens. Item igneo in loco uel feruenti fricari iubet  
 præfatigatos sudoribus egrotantes: item sole \* torren-  
 ti, atque ita per interualla \* leuiter defricari, & in \* leniter  
 calida, atque oleo calido eorum manus infundi, ex qui-  
 bus periculum \* perfricationis necessario sequetur. \* perfrictionis  
 Item post interdianum cibum deambulationem probat  
 adhibendam, atque fricationem & lauacrum, tū post  
 uespertinum cibum \* iungenda crura, atque brachia, \* inungenda  
 quod est dormituri anxiosum. Præterea post coenam  
 imperat uomitum prædato passo, aut uino dulci, uel suc-  
 co ptissanæ. Tum frequentato uomitu oua duo \* danda \* dat  
 sorbilia, cum panis uncis duabus, ex quo \* incensa \* incense al-  
 tiora, atq; exercitatis uomitu uisceribus facile cor-  
 rumpuntur accepta. Hæc igitur recusantes, alia quæ  
 rectè ordinasse perspicitur amplectenda iudicamus.

## De hydropo. Cap. VIII.

Ἰδρωψ.

**H**Ydrops ab accidenti nomen sumpsit. Siquidem  
 aquosus humor hanc passionem necessario comi-  
 tatur. Nam Græci hydor aquam uocauerunt. Gene-  
 ratur autem ex accidentibus plurimis, atque diuersis  
 causis, ut cachexia, febribus \* corpora tardantibus: *ναχξία.*  
 item duritia, uel saxeæ densitate iecoris, uel lienis, aut \* in corpore  
 stomachi, uel peritonei membranæ, aut matricis: item *πικρόνιον.*  
 spirationis difficultate, quam Græci dyspnœan uocāt, *ἀσπνοια.*  
 uel uentefitate stomachi, aut coli, aut uentris passione,  
 quam Græci cœliacen diathesin uocant: item longi *κοιλιακή.*  
 temporis dysenteria, uel in fœminis menstrualis fluo-  
 ris retentione: item hæmorrhoidarum ueterum re- *διάρροια.*  
 pentina, atq; \* incondita curatione facta, abstinentia, *ἀυσιντρία.*  
 uel *αἰμορροΐδις.* \* intēpestiua



uel coadceruata bibentium transuoratione, & magis si salsa fuerit aqua: item medicaminum frequentata potione, & horum similibus. Græci igitur, uel aliarum sectarum principes eius potestatem, uel differentiam nominibus uariandam crediderunt. Vocant enim hanc passionem etiam hyderon uel parecchysin, origini locorum specialia nomina tribuentes. Nam parecchysin appellant sensibilem, & manifestam liquorem. Item dicunt hyderon ex renibus generari, Hydropē uero ex duritate iccoris. Quod quidem nos iuxta sectæ regulam reprobamus. Etenim infusio, siue

\* *supersufio* liquoris, est passioni communis: & neque antecedentes causæ passionis facere discretionem re-  
 flē creduntur. Siquidem etiam ex plurimis alijs partibus patientibus hydropes generantur. Eius igitur differentiam Hippocrates, & Diocles duplicem dixerunt: aliam enim hypofarcan uocauerunt, aliam asciten. Heraclides Tarentinus secundo libro Internarum passionum totius corporis inflationem, siue humoris infusi \* perforationem catasarcā \* uocant; inter peritoncum uerò, & intestina, asciten, uel tympaniten appellauit. Demetrius Herophili sectator undecimo libro de Passionibus scribens, alium dixit hydropem constitui sine ulla humoris infusione, sed sola inflatione turgente: alium ex humore diffuso, & cum nunc per totum corpus, nunc inter peritoncum & intestina, cuius differentiam nunc plurimo \* uento tradidit.

\* Et est uanum atque intellectu carens, sine ullo humore superfluo laborantem hydropem uocare. Item pluri-

ἡ Ἀγρὸς.  
παρὶνχυσί.

\* *suffusionem*

\* *suffusio*

Hippocrates.

Diocles.

ἡ ὑποσάρκα.

ἀσцитί.

Heraclides

Tarentinus.

\* *penetratio-*

*nem*

\* *vocauit.*

κατασάρκα.

υμπασιτί.

Demetrius.

\* *inani vanā-*

*que opinione*

\* *Est cum*

rimi

rimi tres differentias tradiderunt : aliam enim cata-  
 sarkan, aliam asciten, aliam tympaniten uocauerunt.  
 Asclepiades autem alium celerem dixit, ut eum qui *Asclepiades.*  
 repente constituitur : alium tardum, ut eum qui tarda  
 passione uexat : & alium cum febris, alium sine fe-  
 bribus. Hoc quidem communiter etiam alii speciali-  
 bus passionibus adscribens, non aduertit quoniam pro-  
 prio nomine celer dicitur passio, non \* sola quæ re- \* *solum*  
 pente conficitur, uerumetiam ea quæ celeriter solui  
 posse monstratur. Hydrops autem fit \* quisquam re- \* *quidem*  
 pente ex coadceruata bibendi transuoratione, uel falsi  
 liquoris potu. Celerem autem passionis solutionem  
 nullus egrotantium \* meruit. Proculus Themisonis \* *tenuit*  
 sectator secundum plurimos inquit hydropis differen- *Proculus.*  
 tias temporibus passionis adscribendas. Initium enim  
 atque augmentum esse leucophlegmantian, cum adhuc *λευκοφλεγμαν-*  
 secundam carnem fieri mutationem uiderimus : statum *tia.*  
 uerò tympaniten, cum summa tensio secundum uen-  
 trem fuerit facta : declinationem autem asciten, cum  
 quadam indulgentia fuerit inflatio relaxata, non se-  
 cutus ueri regulam, neque aduertens quia omnis spe-  
 cies passionis sua quæque tempora percurrit. Deniq;  
 etiam catasarca usque ad statum, uel declinationem  
 perseuerat, & tympanites, & ascites ex initio facti  
 in augmentum ueniunt, & statu sumpto declinant. A-  
 pollonius Memphites alium dixit fieri hydropem cum  
 \* retentione, ut si quid biberit, sine \* dilatione tanquã  
 per fistulam transiens egeratur. Eius autem quem cum  
 retentione fieri dixit, secundum plurimos tres esse  
 differentias affirmat. Sed melius Demetrius Apameus  
 ab hydropse discreuit, eum qui sine dilatione potum li-  
 quorem per urinam egerit, diabeten appellans, sicut *διαβήτης.*

*specialiter*

\* docebimus. specialiter de ipso scribentes \* docuimus. Melius igitur, quantum ad species hydropis, quanquam non generaliter, mutemus curationem, alium dicere in toto corpore constitutum, tanquam in papyro uel spongia inter uiarum raritatem insertum, à liquore uocari leucophlegmantiam, quam Latino nomine etiam intercutem rectè dicemus: alium in parte corporis, inter peritoneum & intestina, subiecto liquore solo, uel admixto uento plurimo, uocariq; alterum ascitem, al-

\* cunctis speciebus

terum tympaniten. Sequuntur quædam \* cunctos præterea communia, quædam singulis propria. Communia autem, ut inflatio, uel extantia tumoris, & piger aut difficilis corporis motus, spirationis difficultas, quam Græci dyspnœan uocant, somnus difficilis uel anxiosus, & magis post cibum, sitis, & urina comparatione sumpti potus paruior, fastidium, & aliquando febricula latens in plurimis: item quibusdam etiam uesiculæ,

\* pustula

\* erumpens

\* ulcera. A-

phor. 8. lib. 6.

\* sufficiatur,

&

\* singulis

\* albidis colo-

ris

uel \* fistulæ, quibus \* eruptus humor feratur, ac deinde \* uulnera difficilia \* sufficiant, uel quæ in cicatricem ægrè uenire possint. Specialia uerò, uel propria \* singulos sequuntur, ut leucophlegmantiam, uel intercutem mollis atque humida inflatio uentris, ac uultus, & crurum, & folliculi genitalis, uel præputij, relucente liquore per cutem \* albido colore: item cum oris, uel spirationis, siue anhelitus fœtore, totius corporis grauedo, & impressioni digitorum cedens tumor, ita ut paululum caua permaneant loca. Aliquibus etiam alborum atque crassorum humorum uomitus, uel per uentrem egestio: unde etiam nomen passio

λευκὸν  
φλέγμα

sumpsisse à Græca deriuatione uidetur. Leucon enim albidum, phlegma humorem crassum uocauerunt: uel quod ægrotantis color albidioris pituitæ imaginem

\* ferat

\*ferat. Alij uero tanquam ex superfluo humore gene- \*referat  
 rata passione, penetrans humor singula quæq; spira-  
 menta possederit passionem dictam uolunt, nos uero  
 intercutem nominamus. Ascitem deniq; sequitur uen-  
 tris inflatio, uel extantia, & pro corporis motu li-  
 quoris conlisi sonitus, uel ad cōcussum palmæ resonus,  
 tanquam semipleni utrius, ex quo nomen sumpsit: item  
 proschematis\* mutatione, uel digitorum impressione.  
 demersio, uel resurrectio liquoris, & \* conclusio supe-  
 riorum partium, atq; tenuitas tanquam extentæ cutis  
 secundum ora, uel colla, aut iugula, uel pectora. Iacen-  
 tibus præterea egrotatibus diffusa, \* atq; elatior tu-  
 moris extantia fit, surgentium uero uel stantium ma-  
 ior, atq; extenta, & in crescente passione corporis  
 frigus atq; torpor accedit, aliquando etiam tussicu-  
 la, & stercorum uel urinae abstinentia, & per uentrē  
 fluidior exitus, & apprehenso folliculo, atq; uirili ue-  
 retro \* extans inflatio \* reduplicata, & aliarum par-  
 tium surgēs tensio, sicut in leucophlegmatia. Vocatur  
 autem hic hydropismus, ut Diocles, \* etiam epatias,  
 aut splenites à patientibus partibus nomē ducens, hoc  
 est iecore uel liene. \* Item tympanitē sequitur rotun-  
 da atq; extans inflatio, secundum gastera, cum tensio-  
 ne plurima, & ad percussum palmæ resonus, uelut tym-  
 pani, unde etiam nomen accepit: item ructationes, &  
 aliquando intestinorum tormenta, quæ \* inclusæ uēto \* exclusæ  
 per podicem digeruntur, atque grauedinis detrahunt  
 quicquam. Est autem passio communiter stricturæ om-  
 nis hydropismus, sed complexa aliquādo solutione ex  
 aliis \* accedentibus, ut uentris fluore. Præterea est na-  
 turaliter tarda passio: siquidem nūquam celeriter so-  
 luta uel emota corporibus uidetur: item generaliter

a. o. n. s. v. t. r. e. m.  
 significat.

π. g. i. o. x. u. m. a.

\* cum ex uno  
 latere in alte-  
 rum eger uer-  
 titur.

\* strictura. co-

arctatio. an

g. u. s. t. i. a.

ac calatior

\* extantia

\* reduplicans

u. p. a. t. i. a. s.

\* aut Hepatias

σ. w. n. i. t. u. s.

\* At

γ. a. s. t. r. i. c. t. u. r. a. v. e. t. e. r.

\* exclusæ

\* accidentibus

magna: siquidem & difficultatem, & indecētiam, & periculum infert egrotanti. Deniq; \* semper difficilis curatione, nūc uehementer, nunc minime cōprobatur. Etenim magnitudine uehemens, & uarietate accidentium, & corruptione uirium, magis incurabilis iudicatur: parua uero magnitudine, cōprobatione supradicta, atq; paucis & simplicibus accidētibus, quæ Græci symptomata appellant, & sine nimia uirium lesione, minime curatione difficilis approbatur: & quæ secundum aliarum sectarū principes de effectis uel exitibus passionū scripta sunt, etiam secundum causas ex quibus efficiuntur, & patientes locos, & naturas, & etates, & annalia tempora, ut hyemis, uel æstatis, & eorum\* mediis tēporibus generationes passionis, alij diffciles curatione alij faciles hydropes approbātur. Quæ quidem omnia magnitudini passionis adscribēda sunt, ne infinitus modus differentiarum uideatur accidentiū numero uariatus. Etenim secundū causas, diffciles aiunt curatione hydropes, qui ex saxitate magis quā ex duritia fuerint facti: itē eos qui ex dysenteria, uel coli passione, ab iis qui ex coadseruato haustu bibēdo uitū conceperunt: item secūdum locos, diffciles inquiunt eos qui ex iecore, faciles uero eos qui ex liene: item secundum naturam, uel sexum, diffciliores inquiunt curatione semper fœminas maribus: item secundum etates, faciliores inquiunt curatione pueros, uel \* pubentes, diffciles uero etatis mediæ, uel scnes: non solum quod \* natura crescere & augeri, aliæ minui uel declinare uideantur, sed etiam quod alij\* prohibeantur, alij cogantur, alij neq; suaderi, neq; cogi posse probantur: item secundum annalia tempora, quæ Græci horas appellant, diffciles inquiunt

\* insuper

\* media tempora & generationem

\* pubescentes  
\* nature illæ

\* persuadeantur

quiunt curatione, æstatis tēpore laborantes, siquidem multa siti afficiuntur: alij uero è contrario faciles in-  
 quiunt curatione: siquidem exitum liquorū fieri pro-  
 uocat seruator æstatis, & corporis præterea facit siccita-  
 tem: difficiles uero hyemis tempore, ob corporum  
 densitatem uel frigus: item uerno tempore: siquidem  
 humidiora, atq; liquorum redundantia \* fiant corpora: *\* fiunt*  
 autumnij uero prima, similia æstati, ultima hyemi  
 dixerunt. Item secundum generationem, siue fabrica-  
 tionem passionis, difficilem inquiunt curatione leuco-  
 phlematiam, facilem uero ascitem, & horum medium  
 tympanitem. Dissenserunt præterea etiam de patienti-  
 bus partibus, quæ principaliter afficiuntur. Erasistratus  
 nanq; iecur inquit pati: In aperitionibus enim  
 saxeum semper inueniri cōfirmat: alij uero colum, sed  
 consentire iecur: alij splenem, ac iecur, & colum: alij  
 etiam peritoneum: alij renes quoq; & matricem prin-  
 cipaliter pati dixerunt: & apparet omnia necessa-  
 riò prætangere: quod quidem etiam si latuerit, nullus ti-  
 mor curationis mutandæ medicantibus accedit: neq;  
 etiam ob localium adiutoriorum ordinem quicquam  
 obesse monstratur, \* cum hæc eadem oporteat cero-  
 mate sole seruescēt \* iactari, uel pellibus sole ignitis  
 inuolui. Adhibenda etiam acopa seruentia, & suda-  
 tiones ex naturali materiā \* promouere: habet enim  
 recorporandi uirtutem ex quacunq; metallorum ma-  
 teria exhalatio naturalis: itē ex harena littoris sole  
 ignita torrenda corpora. Hyemis uero tempore igne  
 \* prætorrēda atq; ita corpori admouenda, ut ex ipsa, \* harena  
 excepto capite, cætera corporis omnia contegantur.  
 Item sinapismus usq; ad cutis \* humorem adhibendus, \* tumorem  
 qui maxime uehementem fortitudinem locis humore

labentibus corruptis, atq; ut ita dixerim, \* habētibus admouet ac ministrat: item locorum & aquarū mutatio. adhibenda, & peregrinatio, magis maritima. Est enim lacerantior, atq; corporis apertionibus efficax ob salinitatem maritimus aer. Conueniunt etiam uaporationes spongiarum ex aqua maritima expressarū, uel aqua salsa decocta. In tympanicis uero specialia, ut plerique uolunt, iuxta communem uirtutem re corporatiue curationis ordināda & decoctio centauree herbe, & absinthij & origani, & hyssopi, & marrubij adhibenda, & similis uirtutis epithema, ut est quod appellatur \*

Dianitrum.

\* describitur

& a Paulo

\* absinthij

\* etiam

\* Apud Ae-

tium in cura-

tione Hydro-

pis Epithema

ex farinis, &

emplastrū ton-

foris Bithymi

recipiunt pul-

uerem radices

chameleontis

nigri

Diacapregias.

Diacentaureū.

Diaoriganū.

Emplastrum

icesion.

\* Emplastrū

ex Centaureo

Oribasij descri-

bit Aetius.

pag. 836. &

Thornacen uo-

cat.

\* Icesium, de-

scribitur ab

Aetio.

lunt, iuxta communem uirtutem re corporatiue curationis ordināda & decoctio centauree herbe, & absinthij & origani, & hyssopi, & marrubij adhibenda, & similis uirtutis epithema, ut est quod appellatur \* Dianitrum, ex fico atq; nitro, & absinthio confectum. Tundendū igitur aridum ficū, sed quod sit pingue ac succidum, item singulatim absinthiū, & nitrum admiscendū duabus partibus fici, & quarta pars \* origani. Aliquando etiam rutae admiscenda particula. Facit \* enim medicamen, quod appellamus diabyssopum: item uua passa cum cumino, uel sarre, cū adipe ueteri, & uino. Hoc quidem plurimi magis intercutibus conuenire probauerunt: item bubulo stercore ungendos cum aceto agrotantes dixerunt. Apponenda etiā mlagmata, quae fortificare, ac re corporatiua uirtute mutare ualeant corpora in meliorem habitudinem. Intercutes autem & ascitas iis curandos probant, quae siccare atq; exiccare ualeant corpus, uel sudorem comouere. Sed erit cauendum, ne immodico usu medicaminum corporis superficies ulceretur: Est autem nostrū medicamen quod ex herba chameleonte nigra conficitur: item ex stercore caprino, quod appellatur diacapregias: \* item diacentaureum, & diaoriganū, quae ab herbarum nominibus uocabula sumpserunt: item \* icesion emplastrum, quod magis post humoris detractionem



tionem adhibendum probamus, quo partes robo-  
 retur: item \*diatylon emplastrum, & \*diadistamnium,  
 & barbara\* & diasycaminum. Oportet autem inter-  
 positis quinque diebus, uel eo pluribus detracto iamdu-  
 dum\* posito medicamine perspicere profectum, ac rur-  
 sum imponere omnibus locis, \*ex anterioribus ac po-  
 sterioribus corporis partibus. Singula\* enim medica-  
 mina erunt illinienda pellibus teneris, atque ita corpori  
 addenda, superposita lana molli cum leuibus fasciis  
 colliganda, & pro uiribus corporis adhibenda gesta-  
 tio, atque unguenta congrua, & defricatio. Tympani-  
 ten uero recorporatiua curandum probamus cura-  
 tione, & \*coniicienda etiam inflationis \*medela,  
 quam Graeci empneumatosis uocant: adhibenda deni-  
 que resstantia, ut est quod appellamus Diaspermaton,  
 uel \*polyarcion, aut Diaartymaton, aut Diasamsu-  
 cum, aut Diamelilotum. Haec enim ualent etiam uento-  
 sitatem tollere. Adhibenda praeterea in ijs ea quae su-  
 perius ordinauimus. Tum profectu accedente, regula  
 cyclorum, adhibenda natatio maritima, uel aquarum  
 naturalium. Alij uero non absurde, etiam aquae mari-  
 nae uaporationem probant adhibendam, quo sudores  
 \*prouocantur. Inquiunt enim implendum \*solum a-  
 qua marina feruenti: tum quadrangulam compaginem  
 immittendam, praeligatam loris, in qua erit includen-  
 dus egrotans: sed \*praeliganda compago pelle, ut a-  
 quae prohibeat ingressum, quo exhalatione uaporis  
 calefactus egrotans in sudore uenire cogatur. Sed e-  
 rit aqua calefacienda in nouatione frequenti ferri  
 candentis, \*inmisione massarum. Oportet autem  
 Actio pag. 572. Diamelilotum uero, pag. 569. Diasampsucum: ubi a Paulo  
 \*prouocantur... \*solum \*praetenda. & immersione cadentium

\*Diatylon, de-  
 scribitur ab  
 Actio.  
 \*Describitur  
 a Paulo, ut  
 Diacapregias.  
 Actus in cu-  
 ratione hydro-  
 pis describitur  
 epithema ex  
 stercore caprae.  
 \*Malagma  
 intelligit ex li-  
 quore Sycami  
 no descriptum  
 a Paulo inter  
 emplastra. qui  
 dam legunt  
 oua quidam, ut  
 sit ipoterio ma-  
 lagma descri-  
 ptum ab Actio  
 incurratione hy-  
 dropis pagina  
 590. quod reci-  
 pit succum  
 cor.  
 \*apposito  
 \*antem  
 \*adhibendam  
 \*medelam  
 \*Polyarcion  
 Epithema dia-  
 spermaton de-  
 scribitur ab

*Alia xviij.**\* praebeant va-  
luptatem**\* frequentia  
fint: Alij de-  
lascient.**Libri Respon-  
sionum, sine  
Adiutoriorū  
Cali.**\* subuertunt**Alia xvij.**Aquae ducal  
medicamina.**\* suffusi**\* intercute**\* in potu**\* Scylla**\* Scilla**\* redigantur*

semper agrum adhibito animi laxamento curari,  
quam Graeci diachysin uocant. Querenda denique a-  
nimi desideria, quae sine uexatione corporis \* praeue-  
niant uoluntatem, et amicorum conuiuia, quae cum ci-  
borum parcitate, animi tamē lasciuitate \* frequentēt.  
Vtile etiam si longi fuerint dies partiri modū sumen-  
di cibi: facilius enim accepta digeruntur duorum tēpo-  
rum oblatione diuisa. Ac si iuxta ordinem datum leui-  
gati indulgentia passionis, rursus fuerint accessioni-  
bus typicis egrotantes affecti, quo iterum aqua imple-  
ri uideantur, erit melius uti prius radicum uomitu: de-  
hinc ante diem radicum usus, album ueratrum immitti-  
tere, tunc sequenti die hoc detracto radices dare, uel  
certe hellebori decoctionem. Sed horum usum uel con-  
fectionem dexteram, atque adhibendi modum Respon-  
sionum libris de adiutorijs scribentes docuimus: et  
nunc inde haec accipienda monemus. Haec est mundior,  
atque uera hydropum curatio. Etenim potui medica-  
mina danda cauere decet: alia enim uesicam commo-  
uent, alia intestina lacerando ulcerant, uel dysenteri-  
cam faciunt passionem: alia stomachum \* uertunt, et  
fastidium generant cibi, et sitim extendunt. Quapro-  
pter si cogentibus rebus utēdum uiderimus quibusdam  
aquiducis medicaminibus, quae Graeci hydragoga uo-  
cauerūt, ea dabimus ijs qui plurimo humore \* infusi, a-  
quoso \* corpore laborare uidentur. Habere etiam con-  
uenit curam, ne rursus corpora repleātur: ex quibus  
est euphorbium mulso commixtum \* poto datum, uel  
ouis sorbilibus aspersum, duorum uel triū cochleario-  
rum quantitate, uel decoctio radicum, aut \* squilli. O-  
portet autem \* squilla libras duas omni purgamento  
absolutas, quo ad unam libram \* redigatur, concisas,  
in uas

in uas fictile nouum, prælitum mitti, cum adiectis uini sextarijs tribus: quibus ad tertias decoctis, ex ipso liquore erunt ad duo cochlearia egrotanti danda: & proficiente curatione usque ad uncie unius accedere modum oportet. Sed hoc erit post gestationem adhibendum, uel post perunctionem corporis, & ante sumptionem\* cum plurimo interiecto tempore. Ex decoctione autem radicum duos uel tres cyathos dando probamus. Sin uero etiam urinam quis uoluerit commouere, erunt omnia\* aromatica prohibenda, quæ nō curiosa, sed magis simplicia esse uideantur, ut est decoctio seminis cucumerum, uel sceniculi, aut dauci, aut apij, anesi, petroselini, item menthæ, asari, nardi, squinanti, zinziberis. Hæc singula, uel cum uino, uel ex ipsis confecta erunt offerenda. Ac si ex hijs humor detrahi non potuerit, oportebit\* tanquam alienum paracentesim auferre. Sed nunc decet prius quàm ipsius officij usum doceamus, ijs respondere qui istius curationis adhibendæ dissonantia iudicia posuerunt. Antiquorum igitur aliqui\* congruam paracentesim dicunt, ut Euenor libro quinto Curationum, Erasistratus libro quo de hydropse scripsit, & eius sectatores, Thessalus secundo libro regulari. Alij uero ut congruam laudauerunt, ut Asclepiades libro quo de hydropse scripsit, & Themison secundo libro Tardarum passionum, quibus etiam nos iuxta Sorani sententiam consentimus. Adsertores tamen primæ sententiæ, hoc est, istius reprobandæ curationis hæc dicunt. Peritonei membrana à natura nervosa esse perspicitur, & est omne quod nervosæ fuerit qualitatis punctiōibus inimicum, siquidem consensus ingerit. Præterea spirationis naturalis causa, qua nos aërem

\*cibi

\*diuretica præbenda.

\*quod alienū est paracentesi inopertuit.

\*incongruam Euenoris libri curationum. Erasistratus. Thessalus. Asclepiades. Soranus.

recipere, atque reddere haustu potili necesse est: inter  
stima quoque commouentur, quibus superficies corpo-

\* vicina & fi-  
nitima est.

\* hac

ris consequenter tangitur: & est periculum\* hanc pa-  
racentesi uulnerari loca: quippe cum non solum corru-  
ptus humor detrahi uideatur, uerum etiam naturalis  
sepe spiritus excludatur, quod est uehementer corpo-  
ribus noxium. Dehinc etiam post effectum punctionis,

\* citum

\* infra paulo  
post, passionis  
deponenda

aliqui agri sua uulnera resoluentes uoto\* prius\* tor-  
poris deponendi, uitam quoque liquerunt. Item neq;  
tempus sibi conueniens hoc genus adiutorij habere ui-  
detur. Etenim passionis constituta uel superpositione,

\* Nam secti  
Hydropici, si  
aqua uniuersa  
esuat, mo-  
riuntur. aph.  
27. lib. 6.

\* aut aliam resumptionem, uel recorporationem. Pa-  
racentesis uero cōturbat, atque uires corporis tollit,  
& non recorporatiua uirtute medetur, sed usum re-  
corporatiuum impedit. Ad summam, nemo, inquit,

\* aliud

saluatus est eorum qui per paracentesin curati sunt:  
quapropter adhibēda negatur. Item Erasistratus ait,  
quod iecore in duritia constituto obesse paracentesis  
uideatur: siquidem grauatio iecoris tumētis toleratur  
humoris substantia subleuata, atque natans in liquidis,  
quibus effusis omnis grauedo partium tumētium, quae  
diaphragmati sunt natura connexae, atque uenae maio-  
ri, quam Graeci\* quilē appellant, adductione sui tumo-  
res ingerunt uicinarum, ac deinde celerē faciunt mor-  
tem. Item Ptolemæus Erasistrati sectator ait causam  
passionis esse iecoris duritiam, \* supercreatā uero hu-  
moris infusionem. Paracentesis igitur liquorem detra-  
hens passionem minime detrabere agnoscitur. Si qui-  
dem non aufert causam, ex qua humor creatus esse ui-  
detur. Sed sunt haec omnia facile expugnabilia. Tunc  
enim uulnerata neruositas in tumorem uenire recte  
iudi-

Ptolemæus  
Erasistrati se-  
ctator.

\* consequentē,  
aduentitiam.  
ἐπιγεννημένη

iudicatur, quoties naturali habitu fuerit constituta. Nunc autem morbo uitiata, peritonei membrana contra naturam habere perspicitur: \* & non similia, atq; \*  
eadem sequuntur naturaliter, uel contra naturam constituta. Item intestinorum uulnerationem metuere inanis timor est. Et enim exercitatis atque prudentibus hoc genus officij committitur. Dehinc plurimum peritonei membrana \* distabit interiecta humoris causa \* distat interiecta  
submota. Spiritus uero etiam phlebotomatis sanguini Eli. distat sub: ab intestinis  
iunctus excluditur, nec ilico tamen reprobanda phlebotomia, cum sit ab omnibus \* rectissime adiutorium \* rectissimum  
comprobatum. Ferendum est enim leue damnum naturalis officij, quoties maior utilitas excludende passionis promittitur. Soluere uero ligationem egrotantes, & immoderato fluore & acuto deponende passionis in mortem uenire, simile quiddam est, tanquam phlebotomatum ligaturam medici soluere, ac deinde plurimo sanguinis fluore uitam finire. Hec enim non adiutorij est \* curatio, sed stultitiae egrotantis. Habet praeterea paracentesis etiam aptissimum tempus, quod illi inueniri negant, sicut cucurbita scarificatione adiuncta atque hirudinum appositio, quae non in accessione, aut lenimento, sed in dimissione suppositionis recte adhibenda probantur, sicut in alijs docebimus de adiutorijs specialibus scribentes. Omnes \* enim paracentesi \* etiam  
curatos, ut aiunt, mori, apertissime mentiuntur: nos enim quosdam uidimus euasisse: plurimi uero moriuntur, siquidem medentium tardante \* consilia serius \* paracentesi \* consilio  
sis adhibetur, utq; alij adhuc tumente peritonei membrana, & neq; usu dextero operantes diuisura \* facien: \* paracentesis  
do, mortis periculum incurrunt. Ex quibus est etiam ite quod male faciunt  
Asclepiades, qui diuiso loco fistulam relinquenda pu-

tauit, ex qua stipis in modum impressa, per puncta peritonei membrana graues consensus, atque indignationes adfert. Quippe cum saepe etiam gelati sanguinis corpuscula irruentia uulnerum diuisuris, uel quæq; externa, magnos tumores atque indignationes commouerint. Erasistrato uero causanti, quod post detractionem humoris ex iecoris duritia in passionem uenerunt superiores partes, ac magis salutare, adductione quadam ponderis indigentur, erit respondendum, quia plurimi hydropes sine ulla iecoris duritie in passionem uenire probantur. Etenim ex alijs causis fieri posse superius demonstrauimus. Plerisque etiam quanquam iecur duruerit, non necessario in hydropem uenire cõtingit, ac saepe adductione partium, uel indignatione superiorum uexari perspicimus.

\* *compassione* \* *offendantur* \* *quod* \* *hydropici* \* *nec* \* *quas* \* *inflammatio* aut *Scirrhus* *hepatis absque* *hydropi.* \* *interiecto hu* *more* \* *contingunt.* \* *angustiantur*

\* quo saepe \* tumor etiam perdiderit egrotantes. Ommitto quod iuxta eius sententiam oportebat supinis iacentibus egrotis nullam querelam partium attestari. Siquidem iecur nullo pondere superiora distendit, hoc est discrimen, quod Græci diaphragma appellant. Asclepiades uero repentinam effusionem atque coadernatam cum periculo fieri testatur: Siquidem uiae, quas Græci poros appellant, interiecta mora blandose tactu cõtigant, et propterea illi manet egrotantes: detractione autem facta liquorum, aspero se tactu cõtingunt, atque cõcidentes angustentur: ac simili ratione etiam spiritus uehementer irruens carni dolore facit, atque inflationem, et tormenta intestinorum. Est præterea facile expugnabile Ptolomæi dictum, quod paracætensis humorē detrahens passionem non auferat. Etenim primo, neque ex alio quolibet adiutorio singulari hæc passio solui posse perspicitur: quippe cum sit magna atque perscueras: dehinc

dehinc quedā adiutoriorū ob releuāda accidētia passionum, quæ Græci symptomata uocant, adhibenda probantur, quanquam non totum soluere morbum uideantur, ut phreneticis luce commotis oculorum præfectio. Item alia quedam, quanquam nihil per se medeantur, aliis tamen adiutoriis præparant corpus, uel patientem locum, quo faciliē adiutoriū beneficium sumat, ut tonsura uel rasura capitis, fluore quolibet adfectis, quo detractis capillis illinienda medicamina constrictiua, uel epithemata, aut cucurbitæ appositiones nullis obstantibus medeantur, quanquam sit detractio capillorum laxatiua. At uerò paracentesis etiam per se plurimum medetur. Releuat enim detractiōne plenitudinem, tensionem, atque spirationis difficultatem, quam dyspnœam uocant, & aliis adhibendis adiutoriis præparat partes. Non enim \* potuerunt medica-

minum illinimenta, uel \* appositio sincera uirtute adniscera, uel patientes partes peruenire, cum interiecto humore peritonei membrana plurimum à cutibus distet: transcunt autem faciliē ad ea, ad quæ destinata erant, humoris interiecti ablatione permissa. Quapropter paracentesin adhibendam probamus, sed non iis qui uiribus fuerint fatigati, aut adhuc in \* tumore peritonei membrana constituti: addentes etiam, uel \* prædicentes periculum. Plurimi enim quam \* alterius superesse uitæ potuerint, & sine ullo dolore mortem capere, \* paracentesis cura celerem mortem pertulerunt.

\* possunt  
\* appositiones  
\* inflammatio  
ne, ob distensionem, & inde nasci dolores.

\* præadducetes  
\* uicinius  
\* Lib. 5. ca. 10.

Paracentesis administratio, eius culpa qui librum transcripsit, exponitur, hinc in eū locum transla-



## CAELII AVRELIANI

SICCENSIS CHRONION

LIBER QVARTVS.

\* \*

\* \*

De elephantiasi. Cap. I.

Deest principium capitis.

heliosis; dropacismus, &amp; lixiuij

\* *psychrolusia* calidi perfusio, & \* *psychrolusia*, atque *cataclysmus*,  
*διήκωσις.* hoc est, aquarum e supernis illisio, natatio maritima,  
*ψυχρολύσια.* & aquarum naturalium, & magis frigidarum, quæ  
*λιγυρολύσια.* luminis naturam exhalant, quas \* *stypteriazas* uoca-  
*Αqua* uerunt, siue \* *ferrugineas*, quas \* *siderizafas* appellat.  
\* *stypteriazon-* Item adhibenda sunt *smegmata* alia, donec macule albe-  
*fas* scāt, quas supra memorauimus, uel *cimolia* terra subas-  
\* *ferruginearū* sata, cū hordei polline, & nitri quippiā: uel alia quæ  
\* *siderizonfas* laceffere ualeant magis, ac \* *leuius*, ut est cinis ustarum  
*συντηρησις.* bucnarū, uel *halcyonium*, aut cū eodē pumex assatus,  
*σιδηριζαζα.* uel sulphur uiuum, uel \* *sepia*rum testa exusta cum pu-  
*σμίμαζα.* mice & nitro, & *cimolia* iubassata, atque gummi, &  
\* *granius* galla, æqui hæc omnia ponderis. Item *acopa* & ma-  
\* *sepia*rum lagmata mediocriter laceffentia, præter cutis ulcera-  
*διήκωσις.* tionem, & his unguenta similia, ut *myrobalani* cum  
*γμάζα.* aceto, aut uinum cum ammoniaci gutta, & alumine.  
Ac si ulceratio fuerit locorum consecuta, erunt con-  
grua pro differentia ulcerum adhibenda. Quapro-  
pter ea quæ serpere per corpus uiderimus amputa-  
mus: tumentia uero mitigatiuis temperamus, & la-  
xatiuis uirtutibus: item humecta atq; fluida densamus,  
& for-

& sordida purgamus, caua replemus, & equalia in  
 cicatricem ducimus, sicut Responſionum libris chirur-  
 giam ſcribentes monuimus. Ea autem quæ in cicatri-  
 cem uenerunt ſinapiſmis roboramus, prælatiſ meta-  
 ſyncriticis cyclis, & radicum uomitu, & cæteris quæ  
 \* ſua ſunt. Tum reſumpto corpore uehementer utilis \* ſimilia  
 hellebori albi datio probatur, quo corpora \* diſſecen- \* eodem gen-  
 tur, quæ non ſemel adhibenda, ſed etiam ſæpiſſimè per \* re locutionis  
 interualla, præroborato corpore: item nauigatio, & \* utitur ſuprà  
 in acres meliores tranſitus. Sic enim paſſio ſoluetur, pag. 409. inſrà  
 aut non ex ea deſormatus egrotans ad finem uitæ per- \* verò c. 3. helle-  
 ueniet. Veterum autem medicorum nullus iſtius paſ- \* boro diſſecari  
 ſionis curationem ordinauit, excepto Themifone, atq; \* corpora, et qua  
 ex philoſophis Democrito, ſi uerè eius de elephan- \* dam nouitate  
 tiacis conſcriptus dicitur liber, quo ſanguinis corru- \* cõfirmari ait.  
 ptionis cauſas conſcribens, phlebotomandos imperat \* Themifon.  
 egrotantes, & \* dotandos decoctione herbæ, quam in \* Democritus.  
 Syria memorat naſci & in Cilicia. Sed neque hanc  
 dicere poſſumus, neque paſſio tam difficilis hiſ duobus  
 \* adiutoris ſolui creditur poſſe. Themifon uerò ſe- \* adiutoris  
 cundo libro epiſtolarum, ad Dimantem ſcribens, phle-  
 botomari iubet, rectè quidem ſed non \* ſcripturam cõ- \* ſtricturam  
 ſiderans potiùs quàm \* conuoluantem cauſam ſanguinis \* continentem  
 \* detrahendam; quod eſt æſtimabile, atque ut ita dixe- \* detrahenda  
 rim, dogmaticum, ſicut ſecundo libro de cænotetis ſcri- \* Libri Sorani  
 bens Soranus docuit. Utitur præterea \* uomitiuiſ ie- \* uolūtū.  
 iunus, itemq; radicum, eorum confundens tempus. O: \* uomitibus  
 portet enim ſuperpoſitionis tempore adhibere phle- \* ieini, ut pag.  
 botomiam, in lenimento uerò uomitum. \* Item uen- \* 323. Rationem  
 trem inter paucos dies leuiter \* deducendum iubet, & modum vo-  
 atque ſuperficiem corporis conſtringi unguento my- \* mitus ieini,  
 robalani, cum aceto, & oleo roſaceo paruo, uel myr- \* vide pag. 409.  
 tino, \* Idem  
 \* deduci

tino, & ammoniaci gutta cum alumine. Deponit etiam  
 egrotantes in decoctione frigida ex herba \* perdicia  
 confecta, uel plantagine, aut murta, aut rubo, bis in  
 die, atque sufficienti tempore quadam tarditate egro-  
 tantes imperat immorari. Dat cibos facile reſtabiles,  
 & \* potu magis aquam, quæ sunt incongrua. Phlebo-  
 tomia enim \* ſimiliter laxatiuum genus eſt, & cibus  
 reſtabilis: at ſingula unguenta quæ imperat adhiberi,  
 conſtringunt: item embæſis, quam fieri ex decoctione  
 herbarum iubet ſupradictarum: item unguenta con-  
 denſant corpora. Sed hoc paſſus eſt cum nondum lim-  
 pide methodicam perſpiceret diſciplinã, & Aſclepia-  
 diſ ſecta \* circunſeptus, paſſionis cauſam † in extaſin  
 æſtimaret, quam \* præſtabat fieri † per enſem ſiue cu-  
 tem: & ob hoc quærebat materiam à ſuperficie ad  
 altiora, uelut latius patentia, \* reuocare. Utitur ideo  
 conſtrictiuis extrinſecus, & rapit ad interiora ea quæ  
 fuerint appoſitorum uirtute depulſa. Prouocat etiam  
 uentris fluorem & uomitum, & utitur hellebori pur-  
 gatione, adhibito pſilothro in tres uel quatuor dies,  
 uel alio quolibet urenti medicamine uſque ad cutis ru-  
 borem, quo magis perſeuerantem faciat paſſionem.  
 Adhibet præterea cataplaſmata, in quibus etiam ſuc-  
 cos \* adhibuit arnogloſſæ, uel perdicij herbe. \* Item  
 malagmata adhibet conſtrictiua, ex quibus nunc plu-  
 rimi \* laudant argagation appellatum medicamen. \* I-  
 tem exercitium probat, & defricans cutem, declinat  
 ungere, ſed adhibet \* Græcum, non conſiſciens hoc  
 quoque eſſe laxatiuæ uirtutis. Adhibet etiam ammo-  
 niaci guttam cum aceto, uel uino, quæ ſunt intra ſe  
 contrariæ qualitatis. \* Item poſt exercitium ſudatio-  
 nem faciendam igne uicino, ſed aqua frigida ſouendos  
 imperat

\* perdicia

\* potui

\* medicinaliū

μπαρτ.

\* deceptus

† intrinſecam

\* quam præ-

ſtare putabat

non ferri per

extrinſeca ſiue

† ſuperficiem

\* reuertere

μπαρτ.

\* addidit

\* Idem

\* fortaſſi le-

gendum (lau-

dant ex A-

chate medica-

men) ut em-

plaſtrum Pol-

lotis ex Acha-

te nos intelli-

gamus deſcri-

ptum ab Ae-

no pag. 840.

Argagation

medicamen.

\* Idem

\* picem Gra-

cam

\* Idem

imperat egrotantes, & usum hellebori \*geminū probat. Quæ sunt quidem uera adiutoria, si tempora quæ seruentur, ut Respōsionum docuimus libris. Quidā Themisonis sectatores initia quoque passionis præuise coercētes, pronos ac declines, uel uenturos in eandem, quos uiderint, phlebotomāt, & helleboro purgāt: eos autē quos iam possessos acceperint, iisdem negāt curādos adiutoriis. Siquidem corruptione quadā & laxatione extremæ cutis in corporibus hæc passio generatur, & est arifica carnis atq; mollifica corporis phlebotomia. Quapropter inquirunt esse frigerandam & siccandam corporis superficiem, quo possit eius humor ad intestina uel uentrem recurrere, ac deinde clysteribus, uel purgatiuis medicaminibus, quæ cathartica uocant educi detrahendo cibum. Præterea potandos probant egrotantes succo nepetæ, seruata moderatione quantitatis, quæ neque minuenda, neque superanda sit à tribus cyathis usque ad sex: cibum etiam dandum frigidum, atque constrictiuum & paruum: potum frigidum, sed \*meratum ex uino uehementioris acrimoniae, atque albo, & ueteri: & sæpe \*tenendos egrotantes, ac siccandos abstinentia bibendi, & siccioribus reficiendos cibis: quæ sunt utraq; incongrua ac dissonantia siccandæ cuti, secundum eorum intentionem. Si enim, ut aiunt, è superficie transmittendus est humor ad altiora, atque eò prouocandus, ut clysteribus ac purgatiuis medicaminibus excludatur per uentrem, erit contrarium, siti, atque siccioribus cibis, & uino supradicto, altiora siccare. Item aliqui \*horum multitudinem intuentes frequenter adhibendam phlebotomiam, atque clysteres, & uentrisflua medicamina, quæ cathartica uocant, iubent: & \*magis diacame-

\* albi vomitorium: nigri de iectorium.

κλυτῆρι.  
καταρτικὰ.

\* metacum

\* continendū

\* humorum

\* magis quod  
Diacamelas

leos

ααχία.

\* venenatis

humorum qua  
litatibus.

Lac asininum

αχίρ.

βυγανύμπτρ-

ἀκτις.

• condientes.

\* excluden-  
dum

leos appellant, quibus necessario corrumpentes egro-  
tos in peiorem habitudinem corporis uertunt, quem  
Græci cachexian uocant. Alij corruptione hoc fieri,  
atque mutatiene ex \* uenenis effecta estimētes tem-  
peratiuis uti medicaminibus decreuerunt: ex quibus  
magis asinino lacte egrotantes potandos imperant  
simplici, uel accurato, quod schiston appellant: item  
uino dulci, & cibis simulibus, quibus sœda digestionē  
corruptis maior efficitur corporis corruptio. Ordī-  
nant præterea theriacam dandam, quam cuncti Mi-  
thridatium appellamus: quæ quidem recorporatiua  
uirtute mederi posse perspicitur. Dant etiam uiperas  
mandendas, sed amputato capite atque cauda, mensura  
digitorum quatuor, cætera coquentes atque \* obdul-  
cantes sale, & oleo, ægris offerunt comedendas.  
Alij etiam aqua ex labris quibus candens tingitur ab  
operantibus ferrum, potandos dicunt, cū sit hæc pas-  
sio secundum plurimos scriptores, ex aqua graui, quæ  
aut natura, aut aliqua corruptione sœdata sit, sæpius  
generata. Alij quoque etiam cutis uulnerationem af-  
fectandam probant, qua corpus exhumoretur, neque  
cunctis commune iudicium, & ignaris cognitum pro-  
uidentes, quod peiorante passione superficies cor-  
poris ulceratur. Alij egrotum in ea ciuitate quæ  
nunquam fuerit isto morbo uexata, si fuerit pere-  
grinus, \* cludendum probant, ciuem uerò longius exu-  
lare, aut locis mediterraneis, & frigidis consistere, ab  
hominibus separatam, exinde reuocari si meliorem  
receperit ualetudinem, quo possint cæteri ciues nulla  
istius passionis contagione sauciari. Sed hi egrotan-  
tem destituendum magis imperant, quàm curandum,  
quod a se alienum humanitas approbat medicinæ.

De Phthiriasi.

Cap. II.

phthiriasis.

**A**Ntecedente cachexia etiam hoc symptoma generatur, quod nos accidens dicere poterimus. Sumpsit igitur nomen non à genere, sed à multitudine pediculorum. Plurimi enim creantur nunc per totum corpus, nunc per eas partes quæ capillatura\* cõceptæ\* cooperta sunt: & nunc consueti atq; simplicis formæ, nunc ignoti, hoc est latiores, & duri magis, ac sæuientes morribus uehementer, quos quidam ferales appellant. Nam <sup>Pediculi ferales.</sup> sæpe etiam sub capillis inueniuntur corpora penetrasse. Sequuntur autem ægrotantes uigiliæ & pruritus corporis, atq; pallor, cibi fastidium, & stomachi debilitas, & caluities: & est passio solutionis, cholera rubra egestione plurima per tenues uias emergente, qua hæc animalia generantur. Deniq; superpositionis tempore iacere oportet ægrotos loco mediocriter frigido, atq; cibis constrictiuis, & temporibus iam sæpe demonstratis, refici. Fomēta uero & perunctiones, & cataplasmata membratim erunt adhibenda, qualia Themison elephantiacos curans ordinauit. Sed ea loca quæ capillatura uestita sunt, erunt præterea radenda. In superpositione resumptio adhibenda, atq; recorporatio, sicut in cachecticis, & elephantiacis ordinauimus, sed iugia adhibenda smegmata, quæ nos lacessentes, <sup>σμήγματα.</sup> atq; purgatiuos pulueres nūcupamus. Item unctiões, magis cum mox fuerit capillatura derasa. præfortis partibus aqua marina, uel aceto salso. Sunt denique plurima speciatim posita, ut bulbi cum nitro atque oleo\* <sup>\* facian</sup> contriti, quo mellis\* faciat crassitudinem, ex quibus corpus erit illiniendum: item staphysagria cum aceto atq; oleo trita, uel infusa aceto & oleo, tum contrita <sup>ἀλὲς ἄρβυς.</sup> cum salis flore, quem Græci halos anthos uocant, do-

\* istia

Lévis.

\* similia

Λολλύσια βλε-

φαρικά.

\* blepharica

\* aniso

Lévis.

\* eam

Lévis.

Lévis.

nec liquidi mellis similitudinem faciat: tum etiam sulphure uiuo atq; aceto: uel \* ita ponderibus composita medicamina: staphysagria drachmas duas: sandaracæ drachmas duas, nitri obolos duos: admixto oleo & aceto, donec in mellis crassitudinem ueniat: uel sandaraca cum oleo: & staphysagria, & abrotanum æquis ponderibus, admixta calce, quam Græci conin uocāt, & his \* similibus. Palpebris autem erunt adhibendi sicci pulueres atq; collyria, quæ Græci \* phlepharica uocāt, nos palpebraria dicere poterimus, ex ære usto, atq; \* aniso asso, sed & lapide scisso, & pipere, & staphysagria cōfecta. Hæc etiam in iis qui præter phthiriasin pruritu uexantur sunt adhibenda, adiectis magis feruentioribus aquis in usu lauacri, & asperginibus pulueris ex thure & nitro, & sulphure cōfecti. Itē solicationes, quas Græci helioses uocant, adhibendæ sunt: dropaces quoq; & uomitus radicū, & ea quæ iam sæpe de aliis memorauimus scribentes passionibus, quæ corpus recorporatiua uirtute fortificare, atque in meliorem habitudinem commutare ualeāt. Sic enim detracta corporis cachexia, quam nos malam habitudinem dicere poterimus, \* eius quoque comitantia depellentur.

De Ventriculosi, quos Græci cœliacos vocāt, & de cæteris defluxionibus. Cap. III.

**V**entriculosa passio, quam Græci cœliacen uocant, à parte corporis quæ patitur nomen accepit. Generatur ex antecedenti indigestione continua, uel tumore uehemēti, aut dysenteria. Sequitur in hac passione constitutos uaria stercorum egestio, qualitate, atque colore, nunc tenuis ac soluta, nunc aspera, & inæqua



Inæqualis uel constricta, & nunc alba, nunc similis uri-  
 næ camelorum, nunc flaua & spumosa, nunc prasina  
 uel liuida, aut nigra, aut purulenta, aut sanguinea, cū  
 graui fœtore & rugitu intestinorum, quem Græci  
 borborysmum appellāt, atq; in exitu sonitum: & post  
 effusionem factæ uelut \* scatentis stercoris uesiculæ:  
 & nunc iugiter nocte atq; die, nunc coaceruatim, sed  
 interiecto spatio, ut per diem bis, uel semel, aut inter-  
 positis uno uel duobus diebus, aut eo amplius: & nunc  
 cum tensione, atq; uentositate, & tormento, uel dolo-  
 re aut singultu, confidente atq; conducta cute quæ uen-  
 trem circumtegit, attestāte siti, & ipsius uentris fer-  
 uore, & leui in interioribus torpore frigido. Sequun-  
 tur etiam uigiliæ, fastidium cibi, & aliquibus pluri-  
 mus appetitus, uirium debilitas, pallor subalbidus, &  
 nunc febres, dehinc corporis odor teter plurimus, ut  
 etiam quæ suis manibus tetigerunt computrescant, &  
 difficile careant odore concepto: tum uultus inflatio  
 atq; pedum. Quibusdam etiam dysenteria congenera-  
 tur, cum facile fuerint intestina ulcerata ob defluentiu  
 acrimoniam. Est autē passio solutionis, & \* aliquādo  
 stricturæ complexa. Siquidem aliqua eius uideantur  
 esse \* coniuncta, ut ex supradiſtis conuicitur: sed di-  
 ſcernitur à speciali rheumatismo uentris. Siquidem  
 plurimæ in ipso fiunt egestionēs: sed non uariatæ su-  
 pradiſtis concursibus. Quapropter cum adhuc noua,  
 uel emergens fuerit passio, nec plurimi temporis, sed  
 in superpositione constituta, quam Græci epitasin uo-  
 cant, erit eo tempore \* locandus agrotās constrictiua  
 ratione, ut sepe docuimus, adhibita requie: & quan-  
 tum uires pernūserint, abstinentia. Etenim ad perfe-  
 rendum atq; corpori \* adpropriandū cibum sumptum,

Bapbapimus, &  
 Bapbapimus.  
 \* bullientis

\* tam

\* legunt qui-  
 dam: aliquādo  
 ea uidetur esse  
 coniuncta.

\* constrictiua  
 Rheumatismi  
 uentris.

iuxta  
 \* regendus

\* assimilandū  
 ut pag. 105.

\* tunc nunc uenter patiens indignatur, tanquam oculi patien-  
 \* inquietati. tes uisus officio, \* in qua etati: somnus etiam plurimus  
 \* praenclius curandus, atq; sitis, & lanis mollibus uenter contegen-  
 dus leuiter oleo hispano \* prætactus, uel melino, aut ro-  
 faceo, aut murtino, aut lentiscino oleo. Ac si uentosi-  
 tate quoq; , uel tormento affecti fuerint ægrotantes,  
 dulci oleo dimissionis tēpore lanæ tingendæ sunt. Per-  
 unctio uerò ex oleo uiridi adhibenda: facies quoque  
 \* lananda aqua tepida \* releuanda: tum cibus dandus, ut alica ex  
 \* careat aqua frigida, ita curata, ut sua \* caruerit difficultate,  
 \* torrore ut cap. 4. lib. 5. quod fiet ex farris \* tepore, aut decoctione palmularū  
 ἀπαλὰ. thebaicarum. Dandus etiam panis solus, aut cū eō oia  
 \* vel si dolor admonuerit ad hapala: item pulles ex oryza, uel alica, aut farre, aut  
 adhibenda cucur bitula: iniicien milio, ex paruo hispano oleo confectæ, & paruo salis  
 diſque clyster grano \* uel si dolor admonuerit, adhibenda cucurbi-  
 longiore fistu ta longior: procurandum tamen, ut si quid partis spon-  
 la: procurandū gia ceperit solitæ, damnum moderationi non sit: Tunc  
 samen modera leuiter oppresso liquore, quo folliculi reflatio fiat,  
 zione, parti nul erit tentandum ne clysteris cauerna \* fuerit clausa:  
 lum ut detri- mentum sit, dehinc apponenda podici fistula dextera manu, usque  
 spōgiaque, ut ad eius uerticulum quem Græci aspidiston uocāt, im-  
 solitū est, ano pulsus \* leui, & \* neq; recto ductu cōtra oppositas par-  
 supponēda: tū tes, neq; superiora repentino, uel \* cum plurimo cona-  
 leniter. tu, tumores enim exinde atq; collectiones efficiuntur.  
 Ano spongiæ Quapropter sensim, atq; paulo inferius inclinato du-  
 subici solitæ ctu, iniectio fieri debet ad illam partem, in qua consti-  
 uide pag. 462. tutum est os sacrum, quod Græci quoq; uocant hieron  
 ἀσπίδιστον. osteon. Illic enim spatium latius longaonis, appositio-  
 \* sit ne facta erit digitis \* detrahendus, quo cauerna fuerat  
 \* leni obstrusa, atq; sinistra manu continenda, immobilitate  
 \* atque seruata, clysteris fistula, & dextra comprimendus fol-  
 \* etiam liculus leniter, ac moderatè, quoties inferiora inte-  
 ἰσχυρὸς ἰσχυρ. stina  
 \* detrahendum

stina ulcerata noscuntur. Erit deniq; parue longitu-  
 dinis, atque altioris cauernæ fistula procuranda, qua \* que  
 possit facili effusione patientibus locis medicamen tra-  
 dere, ne \* suspensum iis quæ patiuntur non solum nihil \* nec recta, nec  
 afferat commodi, uerum etiam sanis irruens officiat. <sup>statim ad par-  
 tes aëras trās-</sup>  
 Erit autem folliculi impressio uehementius facienda, <sup>missum</sup>  
 atq; fistula longior procuranda in iis quibus superio-  
 ra intestina fuerint ulcerata, quo medicaminis liquo-  
 res eo ualeant peruenire. Et hortandus ægotans, ne  
 retento spiritu quodam recurso referiat medicamen.  
 Ac si magna fuerit putredo, quam nomen appellant, nō  
 erit \* immodicum etiam ex utraq; parte, clysteris sistit \* incōmodum  
 lam cauernare, quam Græci amphitreton uocāt, quo <sup>ἀμφιτρέτων</sup>  
 possint medicaminum liquida per utranq; partem in-  
 testinorum lateribus aduenire: Tum cum omnis fuerit  
 folliculus complicatione uacuatus, siue oppressione ma-  
 nus \* refusus quo medicamina peruenisse \* sentiamus, <sup>\* infusus, cum</sup>  
 erit detrahēda fistula suspensa manu, & distentis cru- <sup>\* sentiamus;</sup>  
 ribus ægotantis, spongiæ commodandæ podici, ex-  
 presse ex decoctione calidi liquoris, in quo præcocta  
 sint mala punica, quo constrictione quadā uirtutis her-  
 barum, quam Græci stypsin uocant, atq; seruido tactu  
 densatis partibus longaonis, iniecta teneantur. Tum  
 modico temporis spatio intermisso erunt etiam illa  
 quæ clunibus fuerant supposita detrahenda: & si fue-  
 rit æger in uentris officium prouocatus, in inferiori-  
 bus ulceratione constituta, & magis si in longaone  
 fuerit perspecta, erit hortandus paulisper resistere, & \* cōtactu enim  
 iniecta continere, \* tangentibus nobis easdem partes <sup>digitorum inte-</sup>  
 quæ pati noscuntur, quoties prouocari ægrum in ege- <sup>stinum sese col-</sup>  
 stionem medicaminis uiderimus. \* Ac si in superiori- <sup>ligit, & con-</sup>  
 bus fuerint ulcera, erunt permittendi egerere cum \* <sup>trahit.</sup>

uolent. Etenim medicamē iam recurrens atq; defluēs ad inferiora, longaonē sanum inutili uirtute adficiendo exulcerat. Nam quibus *\* aliena* sordes detrahuntur, iisdem non ulcerata uitiuntur, exusta cum admotae corporibus tardius fuerint immoratae. Exclusis igitur cum medicamine post sufficiens temporis interuallum muculentis humoribus, atq; ramentis, & uariis de fluxionibus intestinorum, sufficienter operatum medicamen accipimus, quanquam non de perfecta curatione tutò pronuntiare possimus, cum saepe ulcerationis particula in superioribus constituta minime ualeat medicamen accipere, & propterea non omnibus commodata curatio uideatur: uel si commixtū putredini medicamen cuncta purgauerit, hoc adprehendimus, cum solum, praeter aliqua purgantia, fuerit exclusum. At si hoc egestio secuta fuerit quedam aliena, minus quidem, purgata tamen accipimus ulcera, & propterea sanitatis spem pollicentia. Item si nihil fuerit exclusum, neq; ipsius iniectionis quidquam, erit credendum necessario medicamen inhaesisse, quantum sua ualuit potentia, & propterea sui operis integrasse uirtutē, quanquam non perfecisse uideatur. Nec recte culpanda uirtus est, quae una iniectione non dederit sanitatē, cum *\* planam* plenam fecerit futurae perfectionis fidem, perseverationem sui persuadens. Vnde si omnino nullum fuerit reditum, medicamen erit impauide accipiendum: atque e contratrio si eius nulla particula retenta, nullum seui demonstraerit effectum, omnia desperanda. Est enim plurimae debilitatis, atque *\* alienatarum*, uel mortuarū partium signum. Coniiciendum praeterea, ne, ut saepe contigit, uetustate medicaminum efflata uirtute nullus sequatur effectus, & propterea sicut

*\* occupatarum  
Gangrena*

sicut iniecta sunt, \* limpide reuocentur. Quapropter \* limpida  
 etiam hoc intuentum esse mandamus. Tum post ege-  
 stionem factam spongiis erit \* postea detergendus, uel \* podex  
 si nihil fuerit exclusum, interiecto spatio unius ho-  
 ræ perunctum reficere ægotantem oportet cibus con-  
 gruis, atque stomacho aptissimis, ut lactucæ thyr-  
 so, uel intybo cū aceto, quod sit ex murta confectum,  
 aut oliui fractis, uel natantibus, quas colymbadas *Λαυμβάδας*  
 appellant, & ouis hapalis, & uolantibus nuper me-  
 moratis, quæ sint nutrita constrictiui, ut murta,  
 rosa, lentisco. Etenim eorum pinguedo sic \* deflu- \* defluit  
 xit, atque caro constrictiua sufficitur, magis in eo-  
 rum pectoribus quorum plus ossibus uicina aptiora  
 probantur: sunt enim teneriora \* cæterorum. Dan- \* cæteris  
 da etiam pomorum quedam constringentia, atque  
 olerum cocta, quorum superius de aliis scribentes  
 passionibus memorauimus: potui dabimus aquam fri-  
 gidam: quod si minime tolerauerint ægotantes, da-  
 bimus feruentem plurimum aquam cisterninam: & si  
 sine febribus fuerit ægotans, dabimus uinum \* exer- \* excitant-  
 citioris paulò uirtutis, ut supra docuimus. Omnino *ioris uini id*  
 enim inuitantes adpetitum, siue suscitantes, quem *supra remorde*  
 Græci orexin uocant, stomachi robur debemus cu- *re dixit pag.*  
 stodire, nisi cum nausea etiam uenter fuerit resolu- *379. Alij le-*  
 tus. Oportet enim curare, ne rursus plurimum cibum *gunt: exerci-*  
 demus aut potum, uel priusquam solidum cibum sum- *tationis ut infra*  
 pserint ægotantes bibendum credant. Nam conuenit *c. 8. dixit exer-*  
 neque grauata, neque humecta intestina seruari. Si *citatus cata-*  
 igitur medicaminis iniectio aliquo fuerit peccato ui- *plasma.*  
 tiata, ut non omnibus \* adiutorij partibus \* informa- \* adiutorium  
 ta uideatur, mox medicamento monstrabit errorem. \* immoratum  
 Nam quidam \* iniectioe aliqua ex parte uomuerunt: \* iniectioem

*naposus.*  
\* si quidem

\* tenuiorum

\* expressis

\* Actius ex  
Archigene in  
hoc morbo ual  
de probat Ma  
lagma ex Bac  
cis lauri

\* medicamini-  
bus  
\* oleum, &  
lac sunt inijci  
da At  
\* humoris

aliqui stomachi ac uentris dolorem senserunt, singulti  
bus atque nausea affecti, cum anxietate, ac siti, & im-  
mitigabili ardore, & articulorum frigidus torpore,  
& pulsu maligno, atque sudore uel defectu, aut pressu-  
ra capitis, siue grauatione, quam carosin uocant, \* si-  
quidem sit nimia uirtutis medicamen iniectum, in fe-  
bribus, uel uiribus uitatis, aut in alto tumoribus con-  
stitutis. Vomitus autem medicaminis iniecti si ex tu-  
more uentris fuerit factus, uel \* teneriorum intestino-  
rum, tanquam in iliaca passione, saepius egrotantibus  
intulit mortem. Si autem nullo tumore subiecto fuerit  
effectus, ingerit uexationem atque metum: Aut ut sa-  
pe contigit passionis significat depulsionem: Siquidem  
nulla pars ulcerum in intestinis à medicaminis conta-  
ctu uidetur immunis. Tardante passione etiam recor-  
poratiuis conuenit uti rebus. Quapropter oportet ea  
quae feruntur per uentris officium, celeriter auferre,  
& ora egrotantium spongijs ex pusca frigida \* sicca-  
tis rescicere, articulos ligare, & stomacho cataplasma  
constrictiuum imponere, quod \* diadaphnidon dicunt,  
uel similis uirtutis. Odoramenta quoque resumptiua  
adhibere, & frequentius cibo nutrire ex supradicta  
materia. Ac si accepta non tenuerint, erunt secundo  
offerenda, adhibita articulorum fricatione, cucurbitulae  
que ori uentris infixae, & si fieri potuerit, etiam à ter-  
go inter scapulas. Ac si dolor occurrerit, & singultus,  
ob ardorem, atque sitim, fomentis utendum est, & ca-  
taplasmatibus, & spongiarum uaporatione, & olei  
injectione, quo possit \* medicaminis uexatio celerius  
obtundi. Perseuerante incendio, etiam calida, \* & o-  
leo & lacte sunt inijciendi: Et si nulla fuerit \* humo-  
ris significatio, eorum frigidus adhibendus est usus: &  
ob mi

ob mitigandam sitim iugis adhibenda oris collutio:  
dandus interea potus. Item propter articulorum fri-  
gus adhibendi tepores, cū blanda manuum tenacitate,  
quam diacertosin uocant: item unctio. Sudores autē si  
ex pressura & diaphoresi fuerint apparentes, erunt <sup>diacertosin.</sup>  
detergēdi, & asperginibus cohibēdi, & cōgruo cibo, <sup>diacertosin.</sup>  
& ceteris quæ de\* caroticis scribētes docuimus: qui-  
bus depulsis, hoc est à præsētibz periculis euadētibus  
egrotis, si forte rursum in priscam dysenteriam uene-  
rint, erit tentandum multo tēpore simplicibus uti inie-  
ctionibus, hoc est, hijs quæ sine calce, quam asbesto uo-  
cant, uel auri pigmento, quod arsenicon appellant, con-  
ficiuntur. Tum si perseuerauerit passio, ad uehemen-  
tiora transeundum, sed ex simplicibus rebus confecta, \*periculosam,  
\* sollicitam habentes calcis, uel auri pigmenti iniectione <sup>suspectam, mi-</sup>  
nem. Oportet\* enim putredini etiam cataplasmatibus <sup>nime tutam.</sup>  
occurrere, quorum sunt erui pollines pusta decocti,  
& lentiscinum oleum, acacia immixta, donec mellis su-  
mat crassitudinem, item lēticula molita, cum melle, uel  
rosaceo, uel lentiscino oleo decocta. Ac si putredinis  
causa sanguinis effusio fuerit consecuta, erūt spongiæ  
expressæ ex aceto calido pubetenus, uel sub umbilico,  
& coxarum summitatibus, quas Græci ischia uocant, <sup>ischiæ</sup>  
admouendæ: dehinc ijsdem locis etiam cucurbitæ\* fer-  
uefactæ adfigendæ, articuli ligandi, dandus digestibilis  
cibus, & qui facile corpori insinuetur, tum uinū quod  
sit præcoctum in cortice mali punici. \* Inijciendum au-  
tem acetum, nunc solum, nunc cum thure masculo, <sup>quod in conse-</sup>  
uel eius manna contrita, \* uel quod ex confectiōne <sup>ctione superat,</sup>  
superat diatheon emplastri, cum sibi eius materiæ mi-  
scentur. Imponenda etiam similis uirtutis emplastra: <sup>nocatum dic-</sup>  
uel acacia aceto soluta. \* Tunc donec scatere tentet <sup>edæ emplastrū</sup>  
cū eius mate-  
ria miscentur,  
imponendū, ac  
etiam  
\* Ea



coquenda, aut in amplo mali punici cortice supra tepentem cinerem sensim calefaciēda, & ex ipso liquore partes contegenda. Dehinc cerotaria apponenda ex oleo murtino, aut melino, aut uiridi, contrita acacia atq; consoluta, uel ex omphacino, aut cenanthino, cum \*ruta, aut balanstio, aut aliquando his omnibus: uel ut Themison composuit, acacie partem unam, rose aride partem unam, ammoniaci gutta partem dimidiam, ceræ partes quatuor & olei rosacei quod sit sufficiens. Hæc contrita in uino amineo, cum rosacco oleo & soluta cera miscenda. At si sanguis fuerit retentus, quod sit aliquando \*cum gelatur, aliquando \*densitate putrescentis uenæ, erunt discernendæ causæ hoc modo. Nam densatam intelligimus uenulam, quoties pulsus exurgit, atque frigus corporis resumpto seruire mitescit, ægrotantis animus melior, atque spiratione corpus facillime releuatur. At si gelatus obstiterit sanguis, quod Græci thrombosin uocant, & propterea fuerit fluor celatus, supradictis contraria sequuntur, ut pallor, iactatio, pulsus paruitas, uel amputatio, quam Græci asphyxian uocant, grauedo, inflatio, frigidus torpor pubetenus, ac paulo superintum defectio cum sudore. Quapropter erit acetim, iectio faciēda, tunc cum fluor fuerit abstinentius: diurnis diebus cibo reficiendus ægrotans. Si autem plurima ex parte retenta putredine parua excluderint ægrotantes, quæ sint sanguinolenta, & ramentosa, & propterea profluente apparente melior esse uideatur curatio, adiuncto tamen metu ne \*retenta soluantur, oportet etiam secunda uel tertia \*die eundem \*trochiscum iniicere, sed \*solita, uel certe succum plantaginis, aut acaciam cum aqua. Sin uero quibusdam

\* murtina  
Vinum amineum.

\* nam uenas diuisas sanguinis thrombus nonnunquam obturat.

\* conglutinata uena, quæ putredine debiscibat.

ὀφθαλμοί.

ἀσφύξια.

\* retentia partes soluantur, i. uerent.

\* Autor supra cap. 13 lib. 2. valde probat trochiscos ex seminibus Rose cōfectos, & trochiscos ex Electro.

quos hic fortassis usurpauit.

\* Necesse quædam hæc uox monstrat, cum antea trochiscorum non meminere.

\* solum

dicibus

diebus sine officio uentris fuerint egrotantes, ac rur-  
 sum \*injectionibus asperati, conicimus in his non ci- \* ejectionibus  
 catricem ulceris factam, sed medicaminum supraducto  
 cortice fuisse \*obtrusa, & propterea post \*effectum  
 uentris \*nuda atq; \*sorditata rursum humore fluere: sub. vlcus.  
 ordinabimus autem tribus diebus lenticule \*coctionem \* officium  
 crassioris succi iniiciendam. Etenim intestina ui pro- \* nudatum  
 pria medicaminis coërcentur, quam Græci styphsin uo- \* sordidatum  
 cant, & ulcerum mitescit asperitas, & ex antero- \* coctionis cras-  
 ribus medicaminibus facta conglobatio, siue cortex siorem succum  
 in saniem prouocatus cadit, & subiecta ulcera in ci- iniiciendum.  
 catricem uenire coguntur. Ac si plurimo tempore ul- τὸ φίσ.  
 ceratio perscuerauerit cum corporis debilitate, at-  
 que fastidio, erit frequentia medicaminum euitanda,  
 siue injectionum, siue potionum. Maior enim ex ipsis  
 uexatio fit, cum cibi appetitus extinguatur, & in fa-  
 stidium ueniunt egrotantes, nisi parua insuetorum  
 multis fuerint consuetis admixta. Decoctionem au-  
 tem lenticule secundo uel tertio per singulos iniicie-  
 mus dies. Ex ipsa enim sufficienter intestina coërcen-  
 tur, & latenter corpus nutritur, cum \*quadam parti- \* quadam  
 cula digestionē usurpata uiribus profecerit egrotan-  
 tis. Tum cū limpida ulcera senserimus erunt \*cohiben- \* prohibenda  
 da ea quæ uehementius siccare ualeant, quæ Græci sty- τὸ φίστα.  
 phonta uocant, & iniicienda mediocriter constri-  
 gentia. Ac si quisquam, corū nō tulerit uirtutem, erit  
 diachylon medicamen oleo roseo soluendū, ac diligen-  
 ter liquefactum iniiciendum, uel plumbeo mortario,  
 plūbeo pistillo \*circunducto immisso oleo rosaceo con- \* circunductio  
 terendum, donec in succū ueniat, atq; crassius fiat. Ho-  
 rum quoq; similibus utendū monemus. Tunc uino leni,  
 atq; carne uolātum uel marinorum utendū, ut squille,  
 mulli,

\* *carabi* muli, \* *carani*: & pro modo uiriū, gestatione, resumptionis causa. Dehinc quum omnia tuta uiderimus, lauacrum adhibemus, sed non preparanter, & magis, quum fortè iniectio fuerit facta trochisci, nisi primò uentrem egresserint agrotantes. Tardante passione, superpositionis tempore, iisdem uti conuenit. In lenimento uerò erit fortificatio adhibenda corporibus per uariam gestationem, & uocis atq; corporis exercitium. Post singulas egestionēs, adhibenda spongia ex oleo, & aqua calida, & decoctione lini seminis, aut fœnigræci, aut maluæ agrestis, iisdem partibus, *Id est.* hoc est sessione, quam Græci hedram uocant, & specialiter admouenda uaporatio ex pollinibus, cataplasmate calido, uel saccello. Dehinc etiam radix agrestis maluæ decoctæ atque contritæ, calida testa calefacta, erit apponenda. Ac si iugis fuerit dolor, innutendus digitus usque ad altiora, præunctus adipe anserino cum fœnigræci semine cocto atque contrito, aut aliquo medicamine ex iis quæ appellamus lipara. Ac si hæc minimè fuerint inuenta, erit hoc cerotario faciendum simplici atque limpidō: & quum tempus cibi dandi occurrerit, adhibenda perunctio stricturæ congrua: tum nutrimento dandus panis ex aqua calida, aut alica lota, aut pulticula ex melle confecta, aut oua sorbilia cum pane. Potui autem aqua calida offerenda. Perseuerante autem tumore, adhibenda cucurbita adiuncta scarificatione locis tumentibus, & uaporatio spongiarum. Declinatione occurrente adhibenda cerotaria, & resumptio cauta. Sic enim sedantur iuges egerendi \* irritationes, uentris \* delectationes, quum tumor mitigatione con-

ut pag. 475.

\* *Ac* quiescit, atque ille qui putatur rheumatismus indulgentia tumentium facilius abstinetur. \* Ac si æqualis tumori

*Lipara medicamina.*

tumori fluor occurrerit, utriusque erit cōiicienda cura-  
ratio. Quapropter si fomentum ex oleo hispano, uel  
melino, aut murtino, aut lentiscino adhibuerimus, &  
cataplasmata erunt ex aceto atque melle, \* uel stym-  
matibus praeinfusis coquenda. Item prae scriptis iamdu-  
dum iniectionibus concoquenda quaedam constrictiua,  
ut murta, uel rosa, aut mala punica; \* lacte autem &  
ceteris admiscendum amyllum, & \* enatis matibus ali-  
qua decoctio stymmatum adiungenda, aut mali punici,  
& apponenda rursum sessioni uaporatio stymmatum,  
aut cantabri conligati, uel in aceto decocti, uel quam  
\* omelisin uocant, ex pollinibus panno cōligatis, atque  
ex stymmatibus confectis. Perungenda etiam digito  
interiora longaonis ex cerotario oleo roseo confe-  
cto, aut adipe cum oleo roseo: tum post perunctionem  
ora lauanda aqua tepida: cibus dandus pulticula cali-  
da, ut de uentriculosis scripsimus, quos Græci cœlia-  
cos uocant, ex alica, uel farre, aut oryza, aut milio, aut  
olyra, aut pane Alexandrino. Hæc singularia danda,  
uel aliquando amylo admixto, aut lacte, aut melle ex  
fauo expresso. Potus paruus dandus, sed calidus. Tum  
effecta declinatione resumptio adhibenda. Ac si solu-  
tio fuerit urgentior, uel sola, frigidus conuenit locus  
egrotanti, & supina iacendi positio, paulo \* leuius  
capite locato, & suppositione lanarum, clunes uel in-  
feriores longaonis partes subleuandæ. Adhibenda e-  
tiam requies, & impressus articulis manuum amplexus,  
uel ligatio paulo tenacior. Deponenda etiam omnis  
animi intentio, & magis cogitatio passionis auerten-  
da. Admonet enim \* egestionem, ac prouocat inqui-  
tudinem in memoriam reducta conscientia. Erit deni-  
que persuadendum, ne quoties fuerint ægri in egestio-

\* stymmata  
qua oleu ad-  
duntur ut spif-  
fescant, & o-  
dorem aroma-  
tum contineant:  
ῥοῦμα καὶ ἄλλα quæ  
immiscetur a-  
romata, ut sua  
uicem odore cō-  
ciliant. Stym-  
mata serè om-  
nia adstringē-  
tia sunt. vide  
lexicum Con-  
stantini.

\* lactis  
\* enematibus  
\* uicem lysis

\* leuatiui: vñ  
antea pag. 245

\* egestionum

ne commoti, ilico uentrem facere festinent, sed quan-  
 \* motum tum potuerint resistendo differant \* motu. Fit enim  
 quædam meditatio, atque frequens egerendi consue-  
 \* nudati tudo, & oportet effugere laborem motus, ac \* nutadi  
 corporis frigus, nisi fortè acrior, aut incendiōsa fuerit  
 defluxio. Retenta enim sēssionis in locis, quam Græci  
 hedran uocant, longaonem exurit. Conuenit denique,  
 si possibile fuerit, egros ad sēssionem egestionis de-  
 \* humiliori le- portari, aut \* humilius è lecto scaphia posita ad ege-  
 sto scaphia ap sionem produci faciendam, uel si plurima fuerit cor-  
 posita poris defectio, qua tacentes non ualeant fluentia reti-  
 nere, erunt egestionēs spongijs suppositis excipiendæ,  
 & medijs partibus apponendæ lanæ, uel oleo constri-  
 ctuiuo prætinctæ, uel decoctione buxi, uel murtæ, aut  
 mali punici, & horum similium stymmatum, uel suc-  
 \* rhoë coriario corum constringentium, uel asperso \* rutherginario,  
 rugosus in quo quem Græci byrsodepsicon uocant, uel trita galla e-  
 runt media siccanda: hæc enim constrictionem sine ul-  
 lo frigore fore promittunt. Dehinc apponenda ex  
 palmulis epithemata, & malo cydonio, & balaustio;  
 \* similibus & alumine, & horum \* similitum, sicut de cæliacis, uel  
 sanguinem spuentibus, aut stomachicis scribentes do-  
 cuimus. Iniiciendus etiam per clysterem succus planta-  
 ginis, aut polygoni herbæ, uel intybi, aut uue lupinæ,  
 aut herbæ \* caricariæ, uel semperuiuæ, aut mespilæ,  
 \* maluæ, aut orizæ, aut decoctio mali punici, uel eius  
 caduci, quod Græci cytiron rhoas appellant, nos \* am-  
 \* vide cap. 2. pullagium. Et aliquando hæc ipsa erunt conterenda,  
 lib. 5. uel rosa, aut rubus, quam Græci baton appellant, aut  
 lentiscus, aut galla, aut thalia, aut rubi uirgulta, uel ui-  
 \* uita tis anuli, quos helicas uocant, aut salicis folia ex uino  
 \* bunito iis qui sine febris adficiuntur; ex aqua uerò iis  
 qui

qui febricitant: item \*ros syriacus, aut omphacium, \* Rhue Sy-  
aut acacie succus, uel hypocystidos herbe, aut balau-  
stij drachmæ duæ, in quatuor uel quinque \* cyathis \* cyathos  
coniiciendæ. Est enim ea quantitas iniectionis \* re- \* satis abunde  
dundans, hoc est si quidem plurima, grauedine quadam  
prouocat uentrem. Item lenticule decoctio: aut licium  
indicum cum lacte. Sint autem amyli drachmæ qua-  
tuor, licij drachmæ duæ, lactis cyathi septem uel octo.  
Extendenda enim hæc singula atque minuenda sunt  
pro magnitudine \* solutionis, ac uirium egrotantis. \* solutionis  
Ac si plurimus fuerit in ulceribus sensus, ut medicami-  
num cōstrictione laceßita indignantur, erunt iniicien-  
da ea quæ cum dulcedine admota partes ualeant præ-  
siccare, quo neque ulcerationem prouocemus, neque  
fluorem negligamus: ex quibus est in febricitantibus  
succus \* ptisanæ, cum adipe caprimo, contrito atque \* ptisanæ  
commixto \* tracanto, uel gummi, aut \* aut gillirici  
radice. Sed illa duo infusione præmollienda: radix au-  
tem coquenda, aut rosaceo oleo ouum commixtum,  
aut lac coagulatum, uel cum amylo concoctum ad ter-  
tiam partem. In iis uero qui sine febris fuerint, pas-  
sum conuenit Creticum, & uinum \* squilliticum su-  
pradiæis speciebus. Tum refectionis tempore unctio  
adhibenda ex oleo hispano: ac deinde ora lauanda  
pusca tepida. Cibus autem specialiter, ut in cœliacis  
ordinauimus, dandus. Similiter etiam potum conuenit  
dare. Lac quoque bibendum præcoctum, quod appel-  
lant \* diacocleon, siue singulare. Etenim fluores cras-  
sificando cohibet, & ulcera deterget, & acrimoniam  
humorum temperat, & sine ullo labore corpora nu-  
trit. Est autem coctionis hic modus. Lac sumendum ex  
agresti pastu perfectum. Etenim in ciuitate nutritio-

Lac diacocleō.  
\* Diā cachle-  
cū: uel cachla-  
don.

rum animalium reprobamus: siquidem caprae est falsiore \* pascua sitientes plurimum \* atque coadcerantim \* bibant, & multum lac, sed aequatum faciunt, quod est constrictioni ventris incongruum. Quapropter magis ex capra, quae lentisci pascua, uel murtæ, aut rubi, aut uitis foliis, uel quercus, aut salicis, uel hederæ, aut terbinthi, aut herbæ calicaris, uel polygonij, aut plantaginis, & horum similibus fuerit nutrita, erit lac accipiendum. Confluxit enim costrictiua \* qualitas herbarum in lactis qualitatem. Nam sæpe diagridium uel helleborum mādentes purgatiuæ uirtutis efficiunt \* lactem, sicut \* procicolum comedentes lac generant, quod uisum præstet accipientibus abunde. Denique erit primò probandum, atque eligendum, quod sit albidius, atque sine ullo odore, & neque globosum, hoc est, frustis coagulatis uariatum, quod Græci trombades appellant, neque in urinæ similitudinem \* mutatum, quod iidem \* uroides appellant, sed quod possit unguibus \* destillatum manere sua tenacitate collectum. Boni igitur, ut diximus, lactis quatuor uel quinque sextarios oportet in uas fictile mittere, siue æneum: immittendæ & \* cochleæ, quas nos lapides marinos, uel fluminales accipimus: non marinæ \* igitur ob salinitatem, sed fluminales, iniuste primo, \* quo sint igne pellucidae: tum auferendæ: & ex sufflatis omnibus, quæ de se fortè dimiserint, ac depurgatis, supradicto uasculo immittendæ, ac ferulis lac cum iisdem \* cochleis mouendum, donec ad mediam ueniat partem, siue tertiam: dehinc refuso lacte proiciendæ priores \* cochleæ, atque aliæ innouandæ similiter exustæ, sed per profectum, numero atque forma minores, longa per interualla. Hæc confectio lactis \* diacocleon appellatur.

Sine

\* pascuo

\* aque

\* bibunt

Lac caprinū.

\* facultas

\* lac

\* Sic dictos pu

to Maratri te

neros coliculos.

Quidam legūt

Crocī folium:

aliij Fœniculū.

\* serosum

Lac

βρομίδης.

βρομίδης.

\* sic valde se-

rosus appel-

las, &amp; βρομίδης

\* instillatum

\* cochlades:

quas

Cochleæ lapi-

des.

\* deliguntur

\* quoad

\* cochladibus

\* cochlades

Lac

\* dia cochla-

des



Sine iis uero confectio erit longe simplicior, quam  
 Græci apericergon uocant. Vas enim lactis erit im- <sup>Lac</sup>  
 nendum igni molliori, & immussa ferula metiēda men- <sup>ἀπὸ πύργου.</sup>  
 sura totius, ac dimidiæ, & tertiæ quantitatis, quo nō  
 coniectura, sed uera dimensione coctionis quātitatem  
 sumamus. Tunc ipsa ferula circūlato ductu mouebimus  
 coquentes, ne lateribus uel fundo iugi mansionē \* insi- <sup>\* insidat.</sup>  
 dant. Dehinc ultimo coctionis tempore plurimus de-  
 trahendus est ignis, & cum ad partem dimidiam, uel  
 tertiam uenerit, erit in aliud uas refundendum, exinde  
 egro dandum, non frigidum, sed leuiter \* gelatū, quod \* egelatum te-  
 \* galaētes appellāt. Ac si forte stomachi fuerit euer- <sup>pidum instar</sup>  
 sio cōmota, cum accipere egrotantes horrescunt, erit <sup>lactis ex rbe-</sup>  
 frigidum dandum, præfecto uasculo niuibus, ut enim <sup>ribus produm-</sup>  
 mel decoctum sit constrictiuum, sic etiam lac deposito <sup>γὰρ ἀντιδότης.</sup>  
 atq; excocto tenuissimo liquore, quem Græci orrhon <sup>ὀρρόν.</sup>  
 appellant, & uapore concepto constrictiuum fieri ne-  
 cesse est. Conuenit deniq; etiam supra dictus ex \* re- <sup>\* tegula mo-</sup>  
 gula motus. Est enim uirtute constrictiua, & sui cor- <sup>- dus</sup>  
 poris raritate, tenuitatem lactis, uel aquatū a \* liquo- <sup>\* liquorem</sup>  
 re ebibens. Accipere autem egrotantes debent pro  
 passionis magnitudine, & sumendi uoluntate, quam  
 Græci orexin uocant, quidam plurimum, quidam par-  
 uum, & primo ex ea decoctione, quæ sit ad dimidiam  
 partem redacta; tum ex ea quæ ad tertiā uenerit par-  
 tem: siquidem \* sit paulo plus constrictiue uirtutis. Sed \* est  
 erit eius usus comparatione prioris minuendus. Tunc  
 post bibitum lac nullum potum sumere debent egro-  
 tantes. Est enim ratione carens lac decoctione cōstri-  
 ctum, supermisso liquore in aquam uertere. Præterea  
 in iis qui sufficienter, uel quantum uoluerimus sumpse-  
 rint, nihil erit omnino superdandum, iis uero qui mi-

Secundam la-  
ctis per se co-  
cti, & serula  
moti

\* acini

\* lactis cochla-  
dibus constri-  
cti. Alij pri-  
mam exponunt  
lactis cocti ad  
dimidias: secun-  
dam, cocti ad  
tertias.

Calx

roboret.

\* possint

\* qua

\* quem

\* viscosum

\* quia nullo

nus accepisse uidebuntur. sicut de celiacis ordinauimus, erit superdanda pulicula ex lacte confecta, ut destitatus impleatur modus. Tunc post intermissionem mediocrem si quisquam nauisauerit, erunt danda mali punici grana, uel \* acinae uuarum siccarum, quas fabriles appellant, aut mespila, uel sorba. Quidam igitur \* primam decoctionem probauerunt secundae preponendam. Siquidem lac in semet uelut calcis qualitate accepisse uidetur, qua \* possint putredines ulcerum abstineri: alij uero secundam magis probauerunt, quibus etiam nos consentimus. Non enim admixta supradicta qualitas causa est abstinendae passionis. Potest enim etiam quidam calcis uiuae, quam Graeci asbeston appellant, lacti admisceri. Sed est incoctio siue insumpcio aquosi liquoris, quo amisso syncerior lactis qualitas fit, \* quae neque curiosa confectio, neque nidorosa, uel fumosa sufficitur, si simplici coctione fuerit procurata. Cum enim lac se a suo humore separauerit, \* quam Graeci orrhon appellant, crassius effectum ac \* uiscosus, insidens uentri, atque intestinis, & multo tempore immoratum, liquida concrassat, & ulcera mitiganter amplectitur. Alij tertiam partem aquae lacti miscetes decoquunt, adferentes quod sit decoctio melior, \* ne ullo nidore siue fumo, aut ustione lactis natura uitiat ob aquae admixtionem. Hi autem si usque eo coquendum iubent, donec ad modum premixti redeat lactis, qui fuerat priusquam aqua misceretur, & liquidius conficiunt, & non sine suo naturali liquore, quem Graeci orrhon appellant, egrotantibus dabunt, prisca lactis quantitate seruata. Sin uero ad partem dimidiam uel tertiam decoquent, non solum plurimum decoctionis tempus insumunt, uerum etiam tarditate coquendi

quendi diutina, fumosum faciunt medicamen. Hæc sunt  
 quæ in ipsorum erroribus respondemus. Eius autem  
 \*datio erit discernēda. Nam primo \*gelatum bibi de-  
 bet, siue tepens, quod Græci galaetodes appellāt: tum  
 feruens: sed cū primo fuerit profectus aliquis ex ante  
 dato. Hinc enim perfecta passionis fiet abstentio. At  
 si quisquam ægotantium lac sumere noluerit, aut  
 horrido uisu, aut stomachi supinatione recusans, erit  
 aliis adiutoriis adiuuandus: & si ulcus fuerit in supe-  
 rioribus ac densioribus intestinis, utendum medicami-  
 nibus potis, quæ Græci anoterica uocauerunt. Etenim  
 quæ clystere iniiciuntur hæc magis patientibus apta  
 sunt locis inferioribus. Et cum in cibi fuerint adpeten-  
 tia seruati, nec ullo fastidio ægri uidebuntur adfecti,  
 erit medicaminum consueta magis eligēda materia:  
 at si fastidium fuerit, sola probanda. Sed eorum com-  
 positionem atque ordinem ex iis quæ de celiacis or-  
 dinauimus, sumi mandamus. Licet præterea cum iis  
 etiam acaciæ, uel cœnanthes ex aqua cisternina con-  
 tritæ, donec collyriorum faciat crassitudine \* rotun-  
 data frustra dare bibēda, aut resoluta cum uitello oui  
 assi in \*quantitate dimidij cochlearij, aut aqua reso-  
 luta: in iis qui febre afficiuntur tribus cyathis: in iis  
 uerò qui sine febribus sunt, cum uino \* erit offerēdum.  
 Præterea communiter etiam quæ sanguinem expuen-  
 tibus dantur, probamus, quorum est succus plantagi-  
 nis, uel una die ac nocte \* rhus syriaci infusus uino ue-  
 hementiori: quod detractō oryza immissa \* uino co-  
 quemus: Dehinc lenticulæ pulmentum decorticatæ,  
 atque subassatæ, in pulciculæ modum \* conficere.  
 Item oua aceto cocta danda uel ouorum uitella, quæ  
 sint carbonibus assata. Item decoctio ex plantagine,

\* dosi  
 \* egelatum

Medicamina.  
 ἀνολισκία.

\* in pastillos  
 formata  
 \* quantitatem

\* erunt hæc  
 offerenda  
 \* Rhus Syriaci  
 cus  
 \* vinum: Alij  
 oryzam in mis-  
 sam vino  
 \* conficiendū

- \* *omphacis* aut \* *agresta*, & *intybo*, quod *cichorion* Græci uocant. Sed hæc singula erunt duplici coctione curanda. Nam post primam coctionem erunt in aliam aquam transferenda cum aliis nondum coctis: Quorum co-
- \* & *secundo-* ctione perfecta priorum \* *secundum* probamus effe-
- rum* ctū. Erunt præterea hæc cōdienda oleo uiridi, & ac-
- \* *Rhoe*, to, & paruo sale, uel quod est melius, \* *rhos*. Quod si sordidum tardauerit ulcus in iniectiōe mulsi perseuerandum probamus, nisi solutio fuerit adiuncta: uel
- \* *bibenda* \* decoctione corticis mali punici etiam, si crebræ
- \* *qui quidem* temporaliter uentris egestionēs, \* *que quidem*
- erit terenda* erunt terenda, item corticis pini, aut subassatæ inte-
- Sardiana* rioris tunicæ, siue corticis glandis, quam *sardianam* uocant, aut pulenti, aut cuiuslibet materiæ uehementius astringentis. Ac si quisquam harum uirtutum recusauerit usum, horrens oblata, siquidem sensu torquent acriore, erunt hæc mellis decocti atque durati latitudine cingenda, quo sub dulcedine lateant acriora, & nihil eorum uirtuti derogetur: siquidem etiam mel coctum constringit. Item malorum punicorum trium mediæ magnitudinis corticem sumentes, admixto uino lymphato, hoc est, aqua temperato coquemus, in iis qui sine febribus afficiuntur, uel declinante causa melius habere uidentur. Cum cisternina uerò aqua, ad heminas sex, quas cotylas Græci appellant, in iis qui etiam febribus afficiuntur, donec ad tertiam partem liquor deueniat: tum ex ipso duos uel tres cyathos ante cibum dabimus ægrotanti, uel eadem mala omnia contusa atque colata, uino aut \* aqua immixta erunt offerenda non plus cyathis duobus. Item mala cydonia cum malis punicis decocta in uino dulci, aut \* *squilitico*, tunc fricatione
- \* *aque* siccata
- \* *Scybelitico*,  
sum frizione

siccata atque crassificata cum lacte data conueniunt;  
 uel aquæ cyathis sex. Item ges aster cum aqua \* du- \* datus  
 eta curationi conuenit. Alia quoque plurima similli- \* occurrunt  
 mæ uirtutis, infinita specie \* concurrunt. Item cibo  
 danda alica cum uino melino aut murtino aqua tem-  
 perato: tum plurimo profectu accedente dandi turdi,  
 atque pulli gallinacci, uel columbarum, atque uolan-  
 tum quæque sicciora, ut phasiani pectora, uel perdi-  
 cis, aut attagenis agrestis: quæ singula erunt postea  
 apte coquenda, aut mediocriter assanda, ne lignosa  
 fiant, & digestioni officiant. Aliquando etiam erunt  
 hæc animalia reclusis pectoribus uirgultis murtæ pe-  
 netranda, aut eis magis replenda. Tum mediocriter  
 coquenda, ac deinde farina conspersa tegenda, & ci-  
 nere calido maturanda. Item maritima quæ sunt den-  
 sioris carnis. Agrestium quoque, hoc est, leporis uel  
 capræ conueniunt pulmenta, uel pomorum. \* quæq; \* quæ  
 uiuida uirtute constringere ualent, ut mala cydonia  
 cocta, uel assata: Item \* pira, sorba, mespila, quæ non- \* pira  
 dum fuerint maturitate dulcia, pruna agrestia, mali  
 punici grana cum exterioribus membranis exiccata:  
 Item uua, & magis fumi uapore siccata, quam fabri- Vna fabrilis,  
 lem appellant. Omnis præterea cibus erit diligenter  
 masticatione exercendus, quo digestibilis fiat, ne uen-  
 ter debilitate segnior plurimo labore nixu, appro-  
 priando corpori quæ sumpserit. Melius autem par-  
 tibus erit apponendum \* diatheon medicamen, & \* Dia theiow  
 omne quod fuerit siccatiuum malagma, uel aceto con-  
 fectum. Tunc etiam uinum dandum, quod \* fuerit \* sit  
 natura plurimum constringens, ac pro regionibus co-  
 gnitum, ut in Italia Prænestinum appellatum, uel \* Surrentium  
 \* Surrentinum, & magis Signinum ac Marficum: Vna Italica] constringens.

\* mero: *Alij* ex quo oportet etiam alicam \* myro curatam dari.  
 myrto. Ac si forte hoc uini genus minime fuerit repertum,  
 \* quod inter erit quiddam aquæ calidæ admiscendum, quod ear-  
 corticē & car- dem ualeat imitari uirtutem, ut rhaponticum, uel il-  
 nem quercus lud \* quod Græci appellāt inter corticē quercus inhæ-  
 delitescēs vid- rens, pertetam neruorum fila teneriora. Item rhus lin-  
 goꝝ iuas Græ- tico ligatus, uel galla uiridis, quæ appellata est ompha-  
 ci vocāt, nem- cine, aut uitis \* amyli, quas elicæ appellant, aut uirga  
 pe rubi, aut cerasia, aut mala punica, aut fabæ græcæ  
 \* annuli, folia. Non hæc quidem erunt ingiter adhibenda,  
 quos sed medicaminis uice. Tunc apparente magis profe-  
 ctu adhibendum lauacrum, & corporum motus per  
 gestationem, uel deambulationem insinuandus. Ac si  
 passio perseverauerit transacta superpositione, erunt  
 iisdē quæ supra memorauimus resumendi ægrotātes,  
 adiecto uocis exercitio, cum corporis uehementi defri-  
 catione, & magis, uentris in locis: item cyclus iuxta  
 regulam, quæ aut qualitatis solius habeat ductum, ut  
 æquali quantitate seruata descensus uel transitus ad  
 \* teneris & parui nutrimenti mutationem ueniat, ut à \* tardis uel  
 paruis uolantum animalibus ad palumbos uel perdi-  
 ces, & his similia: aliquando per quantitate solam,  
 ut eodem pulmento seruato, exempli causa, perdicis,  
 \* ex \* & paruo modo ueniant ad plurimum. Tunc erunt  
 utraque iungenda, ut etiam qualitate ac quantitate  
 uariatus formetur cyclus, cum uires ægrotantis ua-  
 lentes uiderimus. Quo modo autem initium sumen-  
 \* quo modo dum sit, uel panis fieri debet partitio, uel \* quia in  
 pulmentorum mutationibus uinum uel lauacrum de-  
 trahimus, ex iandudum dictis accipiendum probamus.  
 Sed lauacra rara, atq; calida magis, inuenimus aptissi-  
 ma. Tum cōfirmato corpore, ac resumptis uiribus uo-  
 mitum

mitum conuenit adhibere: & primo ex simplici aqua  
mulse potu: secundo ex radicibus, quo partiliter loca- ut pag. 409.  
le adiutorium uentri præstemus, & quodam uehemen-  
ti motu, ueluti purgatione per uomitum effecta, omni  
impedimento digestionis officij liberetur. Tum trans-  
eundum ad mediæ qualitatis pulmenta, & cætera \* cy- \* cycli  
clorum ordine suo \* reddenda usq; ad porcine pulmen \* danda  
tum. \* Itaque agrestium, hoc est, leporum atq; capreæ \* Nanque  
danda iamdudum docuimus. Dehinc adiungenda dri-  
myphagia, quæ sine uomitu erit adhibenda, uno uel  
duobus diebus, ac deinde cæteræ cycli partes integran-  
dæ. Conuenit præterea oliuas nigras aceto decoctas,  
cum mali punici cortice contritas, admixto pipere al-  
bo, & oleo hispano modico, atque recenti, ieiuno æ-  
grotanti dare: nunc nulla addita alia specie, nunc ad-  
iuncto pane. Ordinanda etiam cætera resumptiua atq;  
recorporatiua uirtute medentia, ut gestatio uaria,  
deambulatio, uocis exercitium, perunctio, defricatio,  
quæ exercitij tempore, atq; nunc uncto corpore nunc  
arido, uel sicco, erit aptissima: item sicca cibatio, &  
cucurbita recorporatiuæ uirtutis secundum medias  
partes, dropax illitus usq; ad uentris confinia, atq; uer-  
tebrorum, psilothra, sinapismi, & paroptesis usq; ad  
cutis ruborem, cum defricatione ex oleo atque nitro:  
item arena sole ignita, acopa acriora, ut ex euphor- \* unguentum  
bio, & opobalsamo, & simili uirtute medentibus con- Diathapsias  
fecta: item malagma secundum uentrem, quod appel- describitur ab  
latur \* diathapsias, uel \* diacapanecos, & \* diaeu- Ætlio pag.  
phorbium, & aliquando parua sumptio medicami- 657.  
nis poti, quod appellamus diatrion pipercon. Et sunt \* Diasycami-  
hæc cuncta medicamina libro conscripta Responsio- nr.  
num: item peregrinatio, atque natatio maritima, \* Describitur  
a Paulo inter  
Acopa.



et naturalium aquarum. Ac si fortificatum corpus

\* datio: ut rursum fuerit humoris fluore tentatum, quod Græci

pag. 461.

\* Catapelson

Notantur re-  
teres medici.

Hippocrates

\* Nusquā ope

re citato apud

Hippocratem

id legitur

rheumatismum uocant, conuenit hellebori \* dati de-

cocti, uel radicibus inserti, quod \* catapaston appellāt.

Dissecat enim corpus, et quadā nouitate confirmat.

Culpandi præterea etiam nunc ueteres medicinae con-

ditores. Hippocrates enim libro quem \* Ad sententias

Cnidias scripsit, helleborandos principio ægros ordi-

navit, ultimum adiutorium cæteris antepōns. Dat præ-

terea panem ita curatum, ut neq; ab hominibus recte

ualentibus posse digeri facile uideatur: Item pulētum,

atq; scenigræci semina, cum sint hæc qualitate contra-

ria: alia enim astringunt, alia relaxant, et nulli adiu-

torio tēpus adiunxit. Diocles quoq; libro quo de pas-

sionibus atq; causis, et curationibus scripsit, prouidēs

siccandum corpus, urinalibus medicaminibus \* utēdum

iubet, quibus non solum humor uentris siccare minime

posse perspicitur, uerum etiam uesica in morbos cogi

inuenitur. Erasistratus tertio libro de uentre prohi-

bet cibos digestibiles ac nutritibiles, æstimans hæc fa-

cile posse corrumpi, non coniiciens quoniam omni æ-

grotanti digestibilium rerum usus conuenire perspici-

tur: quo minime in laborem mediæ partes, quibus di-

gestionis celebrantur officia, cogi uideantur. Prohibet

præterea specialiter lenticulam, atque mala cydonia,

et si quæ similis fuerint uirtutis, \* quo una uoce om-

nem congruam uidetur recusare curationem. Nutri-

bilis \* etenim, quæ ob resumendas uires principalem

\* tenuerunt locum, superfluum est, ut æstimat, adhi-

bere. \* Lysius etiam quarto libro Tardarum passio-

num principio adhibendum uomitum post cibum pro-

bat, \* cum noua ac recens in corpore fuerit passio,

liter:

\* præcepto

\* etiam

\* tenent

\* Lucius, ut

supra Lucij

Tharsensis me

minit Gal. x.

xi. pag.

766. et 767.

Fortasse Lu-

sus legendum

est.

sine dubio dupliciter nocens: primo quod intem-  
 liter: etenim nouellæ passiones suasu quodam, & non  
 agitatione uehementi sunt depellendæ: dehinc quod \* est  
 incongrue: siquidem \* sit uomitus post cibum grau-  
 bilis capiti. Inquit præterea: si humoris perscuerau-  
 erit fluor, atque longo tardauerit tempore, & typico  
 motu uentrem fecerit humectari, occurribus periodi-  
 cis tribus uel quatuor interpositis diebus uentrẽ con-  
 uenit prouocare. Vnde plurimi etiam lac offeren- *Lac*  
 dum probant, quod schiston appellatur, siue catharti- *σχιστίον*  
 cum, quo in acutum potius, ac periculosum ueniant  
 morbum, & exinde possit medicina tanquam celerem  
 facilius curare passionem.

De ventris debilitate. Cap. IIII.

**E**tiam hoc quidam symptomatis genus, quod nos  
 accidens appellare poterimus, scripserunt: &  
 aiunt debilitate uentris acceptum cibum plurimo tem-  
 pore in eodem permanere: aliquando corrumpi: &  
 magis cum intestinum, quod Græci nestin uocant, fue- *νέστιν*  
 rit quoque debilitate uitiatum. Fieri etiam inflatione  
 secundum uentrem existente, attestante paruo dolore  
 & rugitu intestinorum, quem borborismon uocant, *βορβορίζον*  
 cum plurimo sputu, ac ructatione iugi. Sed erit acci-  
 pienda curatio ex iis quæ cum dolore, atque intestino-  
 rum tormento egrotantibus adhibenda scripsimus.

De ventris tumore ac duritia & ventositate,  
 inflatione, ac saltu. Cap. V.

**T**umorem uentris extantia sequitur secundum  
 præcordiorum media, resistens atque dolorosa,  
 attestante seruore, & iugi saltu, & aliquando febri-  
 cula, cum fastidio, & siti, anxietate, & iactatione.  
 Sequuntur etiam uigiliæ, & cibi corruptio. Sed dis-

*πυλινος.* scernitur à superiorum tumore, hoc est peritonei, siue cutis superpositæ. Primo quod transuoratus cibus  
*\* præstat* uelut percussum *\* præstet* circa stomachi finem, uel uentris initium. Secundo quod adducta cutis digitis, conduplicata sequitur: Duritiam uero uentris sequitur extantia, plurimum resiliens, sine ullo seruire, atque pulsu, uel dolore, sed sola spiratione difficili, & digestionis impedimento paruissimo. Item uentositatem sequitur tensio cum rugitu intestinorum, quæ facile relaxatur, ac rursus colligitur: & si palma faciant partes pulsata, ut tympani resonum fingunt: impressæ uero recessum faciunt tardum. & detracta manu facilius surgendo cœcaua replent loca. Inflationem  
*σκληρυν.* uero, quam Græci œdema uocant, sequitur extantia partium, sed facile atque plurimum impressioni cedens, & neq; tympani resonum fingens, neque feruoris ingerens sensum: item saltus commotos iugis sequitur, sicut etiam cor salire perspicimus, cum nimio uel timore, uel gaudio afficimur. Sequitur etiam sensus tanquam uolantis interius *\* ab iis omnibus, attestante inani tussicula longa per interualla, & thoracis pungente tensione.* Sed erit accipienda curatio ex iis quæ de strictura stomachi conscripsimus.

*δυσεντερία.*

## De dysenteria. Cap. VI.

*πρωκτισμός.* **A** Difficultate officij passio nomen accepit dysenteria. Est autem intestinorum rheumatismus cū ulceratione. Sed fit antecedente fluore, quem Græci diarrhæan uocant, aut cholera, aut tumore uentris. Et  
*δυσήρως.* est *\* difficile* celer, frequentius tamen tardans passio. Sequitur in passione constitutos muculenta uentris egestio, atq; è ramētis *\* innexa, & humore crasso: primo, cum naturalis intestinorū defluit corpulenta soliditas:*  
*\* connexa* dehinc

dehinc uaria atq; sanguinolenta, & felloſa, aut ſanioſa, atq; ſeculenta, aut cum gelatiſanguinis corpusculis, quæ thrombos appellāt, & liuida, aut carnoſa, & mē- βρίμβος.  
 branis plurimæ longitudinis innexa, atteſtante graui ſactore, cum dolore ulcerum, & ſaſtidio, & ſiti, atque interiorum ardore. Sequuntur etiam uigiliæ, & aliquando febricula, anxietas, iactatio, hebetudo, & aliquibus inteſtinorum rugitus, & tenſio cum uentofitate, & impedimento urinae reddendæ: in quibuſdam etiam uomitus, & ſaltus præcordiorum, aut torpor frigidus, lingua humecta, aut plurimum ſicca, aut aſpera, colore cinereo, aut liuido: item corporis deſluxio, & accepti corruptio cibi ſeruens, cum iugi atque inceſſabili egerendi uentris deſiderio, & in eadem admonitione mordicatio inteſtinorum omnium, uel podicis, aut uicinarum partium. Fit autem ulceratio aut in tenuiſſimis inteſtinis, ut pyloro, \* neſtidi, typhlote- πυλωρίς.  
 ro: aut in craſſioribus, ut in colo, uel longaone. In νήστις.  
 omnibus enim eodem tempore fieri, uel eſſe ulceratio- \* Neſti, Ei  
 nem minimè poſſe accipimus: ſiquidem mors præue- leo: aut in craſſioribus, ut Ty  
 niat egrotantes. \* Interioribus igitur inteſtinis fa- phloëtero, culo  
 ctam ulcerationem adprehendimus ex doloris ſenſu τυφλωτίς &  
 ſupra umbilicum conſtituto, ſiue ex eodem loco ini- κώλον.  
 tium ſumentē, & egeſtionibus uentris ſemper tenuiſ- Longao.  
 ſimis. At ſi in craſſioribus inteſtinis fuerit ulceratio \* In tenuiori-  
 conſtituta, ſenſus doloris ſecundum umbilicum effici- bus  
 tur, & egeſtiones uentris carnoſæ apparent, & fre-  
 quenter coagulata magis atque coacta ſtercora ege-  
 runtur, cum ſolus fuerit paſſione longao uexatus, &  
 magis eius inferiora. Præuenit enim tenuiū ulceratio,  
 atq; non ſinit cibi digeſtionem in ſtercoris uenire qua-  
 litatem. Aliquando denique ultimo egeſtionis tempo-

*\* tractu* *re ulcerum* *\* tactu* sanguinatio fit, ut guttarum distil-  
*varius.* latio appareat, & insignia tenesmi demonstret, quo  
*Agg.* iuxta sessionis finem, quam Graeci hedram appellant,  
 longaonis pars ulcerata intelligatur, manifestis atque  
*\* irritatione,* promptis concurrentibus signis. Nam *\* delectatione*  
*vi pag. 460.* frequenti egrotantes afficiuntur ventris egerendi, at-  
 que ipsa egestio cum quadam uoluntate, & labore ni-  
 nio efficitur: tensioq; clunium, & pectinis pubetenus,  
 cum sensu, tanquam quiddam corporis solidioris inesse  
 putetur. Ipsa quoque stercora, uel eorum egestio par-  
 ua, atque leuiter muculenta uidetur, & humore cras-  
 siore confecta. Excluduntur enim primo pingua, de-  
 hinc sanguinolenta cum stercore coagulato. Nos de-  
 nique tenesmon dysenteriae *\* adiungendam* probamus:  
*Tenesmos dy-* siquidem est ulceratio partis intestini, nisi quis uolue-  
*senteria iungi-*  
*tur.* rit ante ulcerationem solum tumorem appellare te-  
*\* adiungendū* nesmon: quod est quidem inconsequens omnium scri-  
*\* describendus,* bentium dictis, quibus tenesmus necessario fuit *\* pro-*  
*explicandus.* uidendus, ut *\* sola* proteruitate medicamina *\* pota-*  
*\* solita* danda, alacri temeritate confingant: sed etiam nobi-  
*\* potui* lium multi, ut Diocles libris quos de passionibus atque  
*\* Multa hic* causis, & curationibus scripsit, lac *\* ordinat* cum mel-  
*desunt.* le bibendum, uentrem *\* prouocans* in fluorem: item  
*Diocles.* murrham cum ouis atque uino commixtam, cum ne-  
*\* ordinant* cessario stomachum murrha euertere uideatur: item  
*\* prouocantes* *Myrrha.* *\* utitur* ptisana cum adipe sorbenda: item galla cum  
*\* memorantes* opio, neque discretionem qualitatum, neque tempo-  
*Praxagorae.* rum *\* memorans* usum. Praxagoras libro primo Cu-  
*\* hoc etiam* rationum statuit uentrem deducendum peplio & lacte  
*condimentum* plurimo, cum mulso, potans & aqua salsa, & succo  
*iniiciens, & o-* betæ, & oleo cum mulso. *\* Hoc condimento iniiciens,*  
*leum, & liqui-* & oleo, & liquido cerotario cum aqua, quibus uen-  
*dum cerotariū*

ter magis in fluorem prouocatur. Item nutrit bis co-  
cto pane, qui \* sit necessario digestionem difficilis, \* cum \* est  
plurimum torretur: item piscibus saxatilibus, & car- \* quia  
nibus teneris, cum debuerit densioribus magis ob strin-  
gendam solutionem. Dat etiam aquam bibendam, &  
uinum dulce, quod etiam sanos inflare perspicitur. Of-  
fert farinam cum lacte coctam, quæ indigestibilis pro-  
batur: sic etiam tritici ptisanā cum cantabro. Ordināt  
etiam \* secundam & tertiam curationem, nullam adii- \* Resumpti-  
ciens discretionem. Erasistratus secundo libro de uen- uam, & Re-  
tre plurima rectè componens, solis utitus constricti- corporatiuam  
uis, cum sint plurimi dysenterici laxatione indigentes. Erasistratus.  
Themison primo libro Tardarum passionum plurima Themison.  
rectè memorauit, aliqua uerè correctione indigentia.  
Laxamenti enim causa, atque \* lapsus faciendi \* aque, \* ut facile de-  
& arnoglossæ succo iniectionem faciendam probat, scendant, &  
& hoc aptum etiam tumoribus memorat, quod ob labantur, quæ  
constrictionem siccare perspicitur. Adhibet etiam na- intestina con-  
ribus atque auribus, & angulis oculorum sanguinis tinent.  
detractionem, nihil propositis profuturam, & post ci- \* ex aqua  
bum unctionem, quo tempore quies est adhibenda, ob  
digestionis perficiendæ facilitatem. Dat etiam uinum  
asperius, cum fluorem uehementescere uiderit atque  
febrem. Et \* meratum probat offerendum, quo tem- \* meracum  
pore ob augmentum passionis aqua uino imfecta con-  
uenit, maximè cum \* merata potio uexare neruos ap- \* meraca  
probetur, quos Græci cremasteras uocauerunt. nymphaeget.

De colicis passionibus. Cap. VII.

Principium huius capituli deest.

Concurrit præterea grauedo, sitis, fastidium, &  
\* incessante passione, siue accessionis tempore articu- \* incessante  
lorum

lorum frigidus torpor, & liuor, attestante sudore, & mentis hebetudo, cum pulsus paruitate, ac densitate: item sequitur singultus, & uentris abstinencia, aut cum dolore egestio, urinae reddendae difficultas, capitis grauedo, intestinum rugitus scatens, quem Graeci

\* borborismū  
βορβορισμός.  
φλύματτα.  
\* selleorum  
\* infra

\* borborignion uocant, & augmento passionis uonitus humorum crassorum, quos Graeci phlegmata uocant, tum \* selineorum, cum tensione membranae quae uentrem \* intra cutem circumtegit, & appellata est peritoneos, quae perseverans facit inflationis causa resonum tympani, cum palma fuerint loca pulsata: tum extantia cum rugitu plurimo, & dimissionis tempore uenti per podicem egestio cum magno sonitu. Ac si tumor fuerit insidens atque roboratus, erit extantia du-

\* veluuloso: a-  
liū pustuloso: a-  
liū rentoso.  
\* tumore

rrior, \* ac puluoso attestante \* feruore, cuius circumspectio simplex, sed inaequalis esse uidebitur: quo discernitur à iccoris ac splenis, uel peritonei tumoribus, qui in peritoneo sunt aequales; in iccore uero ac liene quadam circumspectione finiti. Est autem passio aliquando continua, ut plerosque tanquam \* ileicos interficiat: aliquando deficiens, ut saepe tarditate perseverans difficilè curabilis fiat. Sed eius curatio etiam

ἰλαιοί.  
\* iliacos

\* in hac hypo-  
thesi quae pro-  
ponitur de mor-  
bi caeliaci cu-  
ratione

\* nunc stricturae conueniens probatur. Quapropter si acuta, uel celer fuerit passio, uel in superpositione constituta, conuenit agrum iacere loco calido, contectis partibus in passione constitutis lana limpida, atque calida. Adhibendus etiam fatus olei dulcis calidi, & saepe memoratae uaporationes: cucurbitae apponendae leues, quas Graeci cuphas appellant: item uascula, quae ambigas uocant, & sunt materia testea, uel uitrea confecta. Tum requies atque abstinencia cibi usque ad tertium diem, & si causae poposcerint, adhibenda phle-

Cucurbitae nū-  
q̄m.  
ἀμβίγαι καὶ  
κάδ' αὐτὰ.

botomia.



botomia. Ac si sumpto cibo quisquam dolore fuerit af-  
 fectus, uel nausea, erit uomitus prouocandus sumpta  
 primò aqua tepida, uel aqua & oleo, quibus potis im-  
 missis digitis accepta reddantur. Vexatione enim uo-  
 mitus, sumptorum perseuerans pondus atque tensio,  
 & mordicatio, \* tumentium grauior uexatio iudica-  
 tur. Adhibenda etiam clysteris iniectio ex olci calidi  
 cyathis quatuor, admixto & consoluto adipe anseri-  
 no, uel gallinaceo, uel ouorum uitellis, aut decoctione  
 lini seminis, uel hybisci radicis: aut malue usualis, aut  
 fœnigræci sacco. Iniiciunt autem aliarum sectarum  
 principes etiam \* rutatium, aut anethinum, aut pana-  
 cinum, \* uel ex cymino atque castoreo, & bitumine:  
 secundum Themisonem uerò, etiam cum absinthio. Ca-  
 storei nanque uel bituminis duæ drachmæ cyathis olei  
 quatuor miscentur. Ruta uerò & anethum, & absin-  
 thium, & cyminum linteolo illigata oleo \* coquen-  
 tur. Sed sunt hæc acerrima, & propterea tardis pas-  
 sionibus congrua, quas Græci chronias uocant, uel uen-  
 tositare laborantibus, & non causa tumoris dolenti-  
 bus. Bitumen autem sæpe etiam fastidiū ingessit euer-  
 so appetitu, quem Græci orexin uocant. Cibus dan-  
 dus conueniens dimissionis tempore, atq; alternis die-  
 bus, donec passio declinet, & sorbilis, lenis, calidus.  
 Dandus etiam potus non plurimus, ne intestina gra-  
 uentur, etiam ipse calidus. Tum post fomenta cataplas-  
 ma adhibendum ex lini atque fœnigræci seminibus, &  
 polline, quod Græci \* magton appellant, aqua malsa  
 coctū, uel decoctione fici pinguis, & hybisci radicis,  
 & malue usualis, uel horum similium: cucurbita appo-  
 nenda adiuncta scarificatione: uel hirudines admouen-  
 de omnibus partibus in tensione constitutis: ac deinde  
 uaporatio

\* tumentium  
 vexatio

\* rutacenn  
 \* cum

\* incoquu  
 tur

igitur.

\* μαγν. Sic  
 vocant pollen  
 in iis locis col-  
 lectum ubi sa-  
 rina cernitur,  
 & subigitur  
 ἀπὸ τῆς μαγνῆς  
 \* vel

ὑγαινομυα.  
\* adhibenda.

\* cum qua  
ναῖανταρμα.

\* mulsum in-  
flammat at-  
que inflat.  
Zeno.

\* Dia stæcha  
dos. Actius in  
hoc morbo ef-  
ficacissimā il-  
lam composi-  
tionem tradit.

\* culicum

Cassius.

\* congruo

\* Narcotica  
significat.

ἀρωματίζω.

\* celice

\* Aethiopici  
fortassis quod  
à Dioscoride  
praefertur.

uaporatio spongiarum expressarum in aqua calida,  
& oleo, & decoctione scœnigræci, & maluæ. Tunc  
post unctionem ex iisdem etiam encathismata \* abhi-  
bent. Quidam medici in iis qui uento fuerint inflati,  
ex decoctione stercoreum cum aromatibus coctorum  
uaporationem adhibendam probauerunt, \* ex quo li-  
quorem etiam oxymelitos miscuerunt, cataplasma  
conficientes, admixtis etiam tunc aromatibus, uel ne-  
peta herba, aut pulegio, aut hyssopo, aut cymino. Sed  
hæc in tardis passionibus, adiuncta ratione, locum su-  
munt perseverante morbo. Conuenit in accessionis sta-  
tu etiam bibere aquæ tepidæ cyathos duos uel tres ca-  
lido oleo diligenter admixto. Etenim incendia hoc  
leuigat, & uentrem mollit, & tumorem mitigat. Qua-  
propter hoc melius mulso magis probamus: siquidem  
sepe \* conflagret atque inflet. Dantur etiam pluri-  
ma alia bibenda composita uel simplicia, ut est zeno-  
nis \* diasticon appellatum \* codicum medicamen: item  
cassij ex gingibere confectum, quod diagingibereos  
appellant: & mulle præterea, quæ \* concurrenti tem-  
pore laceffendo medentur: præter tempus uerò grau-  
tationem ingerentia aliquos in periculum grauer mit-  
tunt, aliquos errore \* releuationis fallunt, ob præsen-  
tis temporis perditum sensum, quod Græci anæsthe-  
sian appellant, hebetudine partium suffecta. Item sim-  
plicia, ut decoctio apij, uel nardi \* celtibericæ, aut  
herbæ saluiæ, aut polij, aut cymini \* ægyptij, uel rute,  
aut dauci, magis cretici, aut petroselini tribus cyathis  
aquæ calidæ admixto cochleari, uel asperso succo po-  
lij, aut cymini ægyptij, aut petroselini, aut cochleari  
castorei, itemq; scœniculi. Sed est semper horum datio  
in tumoribus uitanda. Siquidem sunt acria & laceffen-  
tia

tia uirtute. Conuenit præterea cum totius passionis fuerit status, folio oleo calido pleno ægros dare, & firmata declinatione gestationem adhibere, aucta moderatione ciborum: tum uinum, atq; communiter resumptionem, & mediis partibus cerotatia ex oleo sabino, uel cyprino, aut sicyonio, uel \* glaucino, aut amara \* *Glaucino describitur à Dioscorid. & Aetio. pag. 669.*  
 cino, aut laurino, aut panacino, aut rutino, aut anethino, samfucino: uel quod diateffaron appellatur, resina terebinthina, cera, iri illyrica, hyssopo, omnibus æqualibus: siue quod diapente uocant, pice, nitro, alumine, sulphure, cera. Sumendæ deniq; picis liquidæ heminæ due, & ceræ libra: quibus solutis, atq; leuiter refrigeratis aspergendum nitrum rubrum tritum, & alumen scissum, & sulphur uiuum \* singulæ scilibræ. Cum autem in lenimento tardauerit passio, cōueniunt ea quæ fortificare ualent corpus, \* sine recorporatione demutare, ut uaria gestatio, & deambulatio, uocis exercitium, atque perunctio, adhibito monitore, siue frictio cum retentione spiritus, & sphaeræ lusus, uel cursus, & humerorum additus motus: item cibus qui inflare minime possit ex mediæ materiæ qualitate: & tenue uinum, atq; lauacrum longa per interualla: hinc enim facile corpora perfrigescunt: item rubor \* faciens \* *phænigmo*  
 dus uentris in partibus, atque inter scapulas, & clunes, ex dropace, uel sole, & flammæ paroptesi, uel \* parietibus, uel ceromate aut pellibus, uel arena lit- \* *calfactis, & ignitis, ut pag. 408*  
 toris sole ignita: item strigilis rasio adhibenda corporibus, & sicca defricatio ex asperis pannis, & cucurbita recorporatiua apponenda: Item unctio acoporum feruentium acriorum, ut sunt diacuphorbium, aut \* *cachryos &: vel Diacachryos, &*  
 \* cacritum, nitri frictio, & sinapismus, & uaporatio feruens ex aqua marina, uel salsa, uel supradicta

rum acriorum uirtutum decoctionibus, uel saccellis sale repletis: quibus præstitis, uel corpori admotis, erunt aliquando cauteræ superponendi. Et circumuoluenti. Item farina circumclaudendus locus in passione constitutus, Et implendus item oleo: tum immitten-

\* percussione:  
aliq̃ impressio-  
nem

di cauteræ igniti, sensim, non usque ad loci \* scarificationem, siue ustionis effectum, sed usque ad ruborem faciendum: Tum malagma quod appellatur Diasper-

\* naturalis  
supra  
λατὰ κλορμῶς.

matō, uel polyarchyon, aut Diadaphnidon, Diachylon, aut Diacuphorbium: item aquarū \* illisio patientibus locis, quam cataclysmon Græci uocauerunt, Et

\* clystere ruta  
cei

inicctio \* clysteris rutacij aut anethini, aut panacini olei, uel \* extenta uirtute, aquæ salsæ. Et cum olim fu-

\* aucta, fir-  
miore ac robu-  
siori agro.

turam superpositionem uiderimus, uomitus ieiunio adhibendus ex radicibus: tum perseuerante pas-

supra.

sione etiam ex helleboro radicibus inserto: tum infuso, ac deinde conciso, iuxta ordinem partium ceterarum cycli. Dandum etiā potui medicamen, quod Græci theriacen antidotum uocant, uel diagingibereos.

\* bituminis:  
aliq̃ Aluminis

Peregrinatio quoque adhibenda, Et longa nauigatio, Et usus aquarum naturali uirtute medentium, Et ma-

\* bituminis:  
aliq̃ Aluminis

gis sulphuris ac \* medicaminis uirtutem redolentium, item maritimarum, Et primo feruentium, tum frigidarum. Ac si retentio uentris fuerit, ob egestionem faciendam adhibenda iniectio ex melle atque sale, quæ

\* brassicæ  
\* lapathi  
λατὰ πωρία.

si minime cōpleuerit effectum, etiam ex aloe admixto succo \* coliculi agrestis uel usualis, uel \* lapatij erunt catapotia facienda in erui magnitudinem, quorum

\* transuoranda

quatuor uel quinque dabimus \* transbibenda. Item marini coliculi offerendi. Erunt præterea præcauenda magis quæ passionem ualeant refricare, ut frigus, indigestio, libido, uel quæ inflare ualeant cum sumun-

tur: item frigida plurimo scilicet tempore. Veteres autem, & magis Erasistrati sectatores uentrem mouere medicaminibus certauerunt uentrisfluis, quæ cathartica uocant, uel pessulis, quos balanismos dixerunt.

Ventrisflua.  
Cathartica.  
βαλανισμοί.  
pessuli.

## De Lumbricis.

## Cap. VIII.

Item alij ad acriores clysteres confugerunt ex initio adhibendos, uelut Asclepiades: & aliquibus etiam fluor uentris efficitur sine lumbricorum exclusione, aliquando attestante fastidio & debilitate, & pallore, cum \* tenacitate corporis: & nunc tussicula arida leui ex occasione commota: nunc \* solutio atque defectus corporis & animæ, quem lipotimiam appellant. Pueris uero dormientibus turbatio membrorum efficitur gemitu attestante, cum iactatione, & stridore dentium, & sæpe contra solitum morem prona positio iacendi: Tum clamatio sine \* manifestatione, exiliente cum uocibus egrotante. Quibusdam etiam repentinus casus occurrit, ut oppressi obmutescant, nunquam similiter affecti. Item aliquando conuulsione uel contractu membrorum rapiuntur. Quidam per interualla conticescunt, & in febribus demersione lethargorum simili premuntur: Item totius uultus paulatim nimia insinuatio, ac detractio rubore mutatio, aliquando cum articulorum frigore fit & cum difficili responsione, si quidem interrogentur: manibus elatis egri etiam iactantur, attestante sudore. In pueris uero lumbricorum conuersio, siue connexio sæpe occurrit, ut etiam tactu sentiat durities in ea intestini parte, quæ fuerit magis in ultima tenuitate, Tum denique eorum \* eersione egrotantes interficiuntur. Pulsus uero, ut etiam Themison libro nono Epistolarum designat, est

Deest principium capitis.

\* tenuitate.  
\* exolutio

λαπιθυμία.

\* manifesta ratione: ut pag. 485.

\* conuulsione Themison.

inæqualis, ac plurimum deficiens. Excluduntur autem nunc per uentrem, nunc per stomachum atque os, uel nares: & aliquando sponte connexi in sphaera similitudinem aliquando plurimi amplexu mutuo uinculati, aliquando singulares: item sanguinolenti, uel fellofi, aut cum stercore per podicem, uel humore felleo, uiui aut mortui, pleni aut inanes: & omnes, aut ex parte: albi uel fului. Alia deniq; plurima sequuntur egrotantes, quibus designari supra memorata necesse est: & nunc parua, nunc plurima pro quantitate animalium, ac forma: uel quod nunc plurimum, nunc parum noceant, locorum differentia uariante, cum nunc ad stomachum ascendunt, nunc in intestinis perseuerant, & egrotantium uires nunc debilitate, nunc furtitudine \*habentur, & nunc cum febribus, nunc sine febre. Sed quoniam multa ex accidentibus, aliis quoq; similia passionibus inueniuntur, ut alienatio mentis furori, atque phrenetidi: uocis amputatio, lethargo, & praefocationi matricis, & apoplexie, & epilepsiae, atque apprehensioni sensuum, qui certè ex lumbricis patiuntur nunquam spumas excludunt: praefocatio uero ex matrice cum ascensu matricis efficitur, quem Graeci anadromen uocant, & magis in aetatibus perfectis, antecedente matricis egritudine, ex lumbricis uero facta uocis oppressio magis aetatibus imperfectis adscribitur, antecedente uentris atque intestinorum querela. Item à catalepticis discernuntur lumbricis laborantes, siquidem illi in febribus obmutescunt maiore atq; percussibili pulsu testante: qui autem à lumbricis id patiuntur, etiam sine febribus uocis amputationem sustinent, cum pulsu paruo atq; crebro. Item ab \*ilicis discernuntur, qui lumbricorum tormento uexantur,

siquidem

\*habentur

αναδρῶμεν

\*iliaci

siquidem neque uentris officium in iis abstinetur, & pallor antecedit, aut contra consuetudinem iacent proni, uel dormiunt cum gemitu, & irrationabili exclamatione. Item à stomachicis discernuntur, cū nullus fuerit humor in stomachi partibus inuentus, & intestinorum tormenta sustineant. A syntecticis uero discernuntur, quod nulla querela tormentorū, uel \* conuersionis, aut doloris in intestinis, uel uentre afficiantur, quod necessariò lumbricis laborantes sequitur. Item ab iis qui naturaliter, uel ex multitudine cibi per somnum Labia conducunt in similitudinem sorbentium, uel sine ulla ratione exiliunt, quod moderatione accedente, atque cibi facta deductione releuantur, ij uero qui lumbricis afficiuntur magis uexantur paritate ciborum. \* Hæc est similium discretio passionum. De exclusione uero siue egestionem lumbricorum ueteres medici præsciam significationem posuerunt, & appellauerunt prognosin, in \* quo diuersa senserunt. Nam Hippocrates libro Prognostico significare inquit lūbricos interfectionem ægrotantis, quoties mortui fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter mortuos lumbricos aiunt graua denuntiare, siquidem ostendant inesse corpori ruptionem. Diocles libro Prognostico, euomitos inquit lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per inferiora uero excludi quoque lumbricos, non admirandum, sed mortuos & inanes, esse melius ac salutare, uiuos uero, atque plenos, & sanguinolentos, perniciosum. Idem libro de egestionibus scripto, uiuos uel plenos, ac sanguinolentos

*συμπυκνωσι.*  
*\* τὸν τριγυρ*  
*πύρρως.*  
*\* qua*  
*\* ostendunt*  
*\* corruptionē.*  
*\* Perniciosum*  
*quidē est mor-*  
*tuos lumbricos*  
*reici, cum pu-*  
*trium vaporū*  
*materia affla-*  
*tu, non alentis*  
*materiae penu-*  
*ria intereunt:*  
*Salutare uero,*  
*cum materia*  
*defectu qua il-*  
*los gignit, &*  
*nutrit, mortui*  
*sunt. Eodem*  
*quoq; modo lū-*  
*bricos plenos*  
*excludi alias*  
*sanctum est, cū*  
*non multa coa-*  
*cernata mate-*  
*riaqua procreā-*  
*tur paucigeni-*  
*ti, non à tetrīs*  
*& reuenatis*  
*vaporibus vin-*  
*terfecti extru-*  
*duntur, sed ab*  
*expultrice ro-*

busta: alias insanctum, cum collectum materia plurimum indicant, qua sic crassescunt, & distenduntur. Hæc distinctione veteres medici conciliantur.



- Erophilus.* febriles dixit. Herophilus uero libro quem ad Hippocratis Prognosticum scripsit, siue uiuos, siue mortuos excludi negat incongruum. Apollonius Glaucus libris quos de Interioribus scripsit, reiectos rotundos lumbricos initio significare ait indigestionum frequentiam, ultimo uero ægritudinis \*properare iudicium, quod crisin appellant, item uiuos, ac plenos, & sanguinolentos, non recta portendere. Apollonius Memphites percunctatio, siue uniuersali modo, quæ Græci catholicon uocant, omnia inquit in intestinis animalia nata in morbis graua significare, & magis mortua, quàm si uiua excludatur. Antiphanes libro quem Panopten appellauit, melius esse inquit per inferiora, quàm per uomitum lumbricos excludere, & solos magis quàm cum stercorebus. Chrysippus Asclepiadis sectator, libro tertio de lumbricis, solis in celeribus causis, siue periculosis, mortuos inquit lumbricos egestos interfectionem ægro portendere. Ostendunt enim mortui \*aciem uehementem inesse, quando magis ægri periclitantur. Sic inquit denique Hippocratem \*ferri, dicentem suo libro, eos qui in ægritudinis declinatione cum stercorebus egeruntur, nihil graue significare, Sed neque inquit Dioclem Hippocrati contrariam protulisse sententiam, dicendo mortuos uel inanes esse meliores: siquidem hic in febribus solutionum hoc dixisse uidetur, Hippocrates autem mortem significare, in febribus strictione. Nos uero communiter significari aliquam ex lumbricis dicimus corruptionem, quam lientericis irruentem bonum quicquam portendere iudicamus, ut de ipsis scribentes docuimus, in omnibus uero cæteris noxiam. Item sanguinolentorum exclusio etiam \*debilitatem significat. Albi
- \* maciẽ quando in ægri corpore nihil est quo nutriantur. Alij legunt perniciem.*
- \* fari*
- \* coctionis, ob quam materia corrumpitur.*
- etenim

etenim, \* & nondum mutata aut corrupta materia \* ex  
 nutriuntur, sanguinolenti uero uellendo ex ipso \* san- \* quem trahere  
 guine nutriuntur. Item in augmento accessionis se- re coguntur,  
 brium exclusi turborem altiorum partium ostendunt, quia materia  
 & magis si fuerint sanguinolenti in declinatione ue- ex qua ali com-  
 ro, laxamentum, sicut cetera, hoc est stercorum uel sueuerunt, cor-  
 urine, uel quorumlibet officiorum egestio. Etenim rupta, & iis  
 laxatis corporibus reddi uidentur. Quippe cum quo- prorsus alendis  
 rum adiectio grauat, eorum detractio necessariò re- inepta sit.  
 leuet. Hec est lumbricorum significatio, sed ob cu-  
 rationem in iis quos ascaridas uocauimus, si tumor in  
 longaone fuerit constitutus, oportet iniectionem olei  
 adhibere, quæ cum fuerit reddita, erit infusio aut de-  
 coctio centaureæ, uel absinthij iniicienda. Ac si ramen-  
 ta fuerint exclusa \* sanguinolenti coloris, decoctio \* Nam quod  
 mali punici corticis, uel gallæ conuenit iniectioni, ait Diosc. deco-  
 ac si perseuerauerit, chartæ exustæ, & auri pigmen- lum Centau-  
 ti, quod Græci arsenicon uocant, \* æquali pondere, rij minoris inie-  
 quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo ar- lum chylis-  
 noglossæ. At si putredo apparuerit, quam Græci no- sanguinem edo-  
 men appellant, erit aqua salsa iniicienda, atque con- cit.  
 grua medicamina, sicut nuper docuimus. Ex his enim Arsenicon.  
 & animalia interficiuntur, & alij \* trochisci pro- \* æquale pon-  
 hibentur, & ulcera \* cicatricantur. At si rotundi fue- dus  
 rint lumbrici, qui nunc stricturæ accidunt, nunc solu- \* alia prona-  
 tioni, nunc ulceribus intestinorum, & nunc in celeri- sti  
 bus passionibus, nunc in tardis, quas chronias uocant, \* cicatrisan-  
 nunc ex \* supradictis, nunc sua in corpore alienitate tur.  
 \* uacantes ex corruptione ciborum \* effecta, oportebit \* causæ &  
 curationē pro supradicta \* curari differētia. Nā si ipsa morbu  
 animalia \* corrupēda uiderimus, erūt medicamina ad- \* vagantes  
 hibenda, ut tanquā aliena, atq; indigētia detractio- \* effectū  
 ne, ciborum genita, \* fieri  
 corruptione  
 ciborum genita.

auferantur. At si passionibus fuerint appenditia, quæ  
 sæpe generandorum animalium fuerunt causæ, erunt  
 congrua iisdem passionibus adhibenda. Iis enim con-  
 uictis etiam animalia interficiuntur. Quapropter si  
 strictura fuerit in corpore, fomentatio competens est  
 adhibenda, atq; cataplasma laxatiuum, & si ratio coë-  
 gerit, phlebotomia: quæ singula suis temporibus apta-  
 da probamus: tum cucurbita adiuncta scarificatione  
 medianis partibus admouenda. His enim laxatis sine  
 † æque ulla medicaminum uirtute, † atq; facile animalia deci-  
 dunt oleo potò, aut aqua calida & oleo, uel decoctio-  
 ne\* noxarum, aut glycyrrhizæ, cuius libra infusa in  
 aquæ heminas sex, usq; ad tertiam partem erit deco-  
 quenda. Et his præterea cibi tempore dari potest sor-  
 bile quicquam, ut illud quod Græci appellāt\* oleopti-  
 sanon. Ex his enim & tumentia relaxantur, & ani-  
 malia quæ inesse uidentur, lapsu quodam ac desertione  
 tumentium dimissa\* fundentur. At si solutio fuerit in  
 corpore, erunt constringentia adhibenda, & \* exer-  
 citatiu cataplasma, ex lupini pollinibus confectum:  
 & \* aceto cum melle, tribus uel quatuor cyathis aquæ  
 commixtis, cū ceruini cornu ferragine aspersa, quam  
 Græci rhinen uocant, in cochlearis pleni quantita-  
 tem, si tarda fuerit passio, quam Græci chronian  
 uocant, quoniam indiget recorporatione, atque la-  
 cessentium medicaminū uirtute. Sed in lenimento con-  
 stituta erit uaria\* coniectura facienda, quo animalia  
 excludantur. Quapropter adhibenda \* medicami-  
 na harum partium fomentatio ex oleo ueteri, & ap-  
 ponenda unctio fellis taurini egrotantis umbilico, uel  
 lanæ ex ipso tinctæ particula: tum cataplasma ex pol-  
 line lupini consperso decoctione absinthij aut santo-  
 nici.

\* myxarum

Eleoptissanon  
 Oleoptissanon.

\* effunduntur

\* sic vinum  
 exercitatus su-  
 pra dixit pag.  
 455. generosius  
 & tanquam  
 magis actiuo-  
 sum Ἀγριώ-  
 τιστον.

\* est & ace-  
 tum dandum  
 πικρ.

\* confectura  
 \* medicina

nici. Admifcendus deniq; etiam fuccus earundē herba-  
 rum. Si uero uehementius oportuerit animalia \* alia \* talia  
 fauciare, conuenit etiam tanquam acriores cibos, &  
 propterea aptos, uelut in drymiphagia, dare cepā &  
 allium, quæ nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo  
 \* minima eorū uirtus pereat erūt offerēda. Tūc enim \* minime  
 urgente lumbricorū exclusionē iis uti cogimur rebus.  
 Facit idē ſinapi exuccatum, uel adiūcto pane comēstū,  
 itē naſturtiū cum aceto contritū, ſiue ut Græci uocāt, Cardamum.  
 cardamū, immiſſo atq; in fuſo pane: itē laſer aceto ſolu-  
 tum, ſiue ſinapi, quo comedenda tingantur, uel ouo ſor-  
 bili admixtus iſte liquor detur in erui \* modo: itē ab- \* modum.  
 ſinthium cum uino \* pote datum. At ſi ulceratio fuerit \* poti dandū  
 inteſtinorum, congrua probamus adhibenda pro ulce-  
 rum differentia. Ac ſi febres nō fuerint, neq; alia quæ  
 libet paſſio lumbricis conſuerit, nihil oportet \* conii-  
 cere, ſed ex medicaminum uarietate eorū interſectio-  
 nem atq; detractiōem efficere: ſunt enim nocentes be-  
 ſtiole, quæ Græci theridia uocauerūt, ſed \* producēda  
 atq; extendenda erit magnitudo curationis pro acci-  
 dentium modo. Et quoniam aliquando ſunt in uentre  
 conſtitutæ, quod probatur ex ægrotantium querelis,  
 cum locorum ſenſu tanguntur, aliquando in inteſtinis.  
 Neceſſariò quæ in uētre ſunt celerius afficit, quā inie-  
 ctæ medicamina, cibis ac potus, in inteſtinis uerò quæ  
 per clyſterem fuerint iniectæ: nam & ex uētre ad in-  
 teſtina hæc ſæpe animalia, & ex inteſtinis ad uētre  
 refugiunt. Erit ſanabilius ergo, ut, ubi apprehenderi-  
 mus eſſe copiam lumbricorum, uſum primo adhibea-  
 mus congrui cibi ac potus, ſimiliter epithematū conue-  
 nientium uſum ſeruantes, & cataplaſmatum, deinde  
 clyſterem. Oportet igitur \* potum dari abſinthij pon- \* in potu

tici decoctionē, siue marini, aut santonici, usq; ad modum duūm cyathorum uel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nunc oleo adiuncto, uel decoctione

\* *myxarum* lupini, aut \* noxarum cum cornu ceruini ferragine: & laser aqua solutum, uel aceto, & admixto sinapi, aut ouo sorbili transuoratum. Item alica in qua fuerit in-

\* *prodest*, & *aloe sine ipsa* *πρὸς χιτὼν πικρὸν*. *ἐν γὰρ διαλαῖν*.  
\* *medicami-*  
*nibus* fusa aloë \* siue ipsa transuorata: nec non etiam trochiscus dandus, qui appellatur picros, uel illa hiera quæ dialoës appellatur: quorum compositiones Responsionum libris de \* medicamine scribentes tradidimus: item cardamum quod nasturtium uocamus, torridum ac tritum cum aqua, uel mulso, aut cum melle in electario datum: item lupini sicci decorticati atque transuorati cum melle quindecim numero, uel uiginti: quod si minime quisquam transuorare ualuerit,

\* *pollinē aceto* eorum \* polline conspersum atque tritum, quantum tres digiti capere potuerint aquæ bibendum admisce-

\* *myxarum* mus, siue mulso aut decoctione \* noxarum: aut pro electario admixto melle dabimus: item gentianæ succum in cochlearij modum cum mulso cōuenit dare, atque horum similibus uti uirtutibus: item absinthij cum uino, & castoreum cum mulso. In paruis uero pueris, quo latere possit, nasturtium frixum, siue tritum, cum melle atq; lacte dabitur potui, uel commixtū pani. His

\* *parandi* igitur rebus erunt cibi \* ponendi: pultibus enim atque sorbilibus conuenit absinthium concoquere, uel similes herbas. Hoc etiam \* si sicco sico atque pingui, uel

\* *immixta* *Mora celsa.* palmulis, quas patetos appellant, quæ concisæ atque \* immixtæ, & cibo datæ mederi ualebunt. Faciūt præterea mora cibo data, quæ uulgo celsa Latini uocauerunt, Græci uero sycamina: item ex amygdalis amaris *τρίφυλλα*. sorbilia confecta, quæ Græci trophemata uocauerūt.

& com

et communiter cuncta quæ uentrem deducere ualent.

\* Hinc denique etiam pinne aride \* ueluti atque tri-  
ta sufficientem modum miscuerunt. Conuenit etiam  
urtica, siue sola, siue cum aliqua decoctione confecta.

\* Nam ob celebrandam curationem uehementer uti-  
lia probamus catapotia ex \* squilla atque chamelea  
confecta. Sumpta igitur \* squilla erit acriori aceto  
concoquenda, ne \* fluida fiat: tum terenda diligenter,  
ac deinde chamelea: anchusa atque creta admiscenda

\* squilla, quantum res patiuntur, ut ad emplastri ue-  
niat qualitatem. Tum facienda catapotia in fabæ ma-  
gnitudinem, et pro uiribus egrotantis danda, ut for-  
tibus octo uel nouem, imbecillis sex uel septem: pueris

uerò \* tres uel quatuor ex aqua calida. Potest etiam  
ipsius chameleæ concisæ atque contritæ cum mulso  
quippiam dari transbibendum, uel cum lenticulæ par-  
uo modo sorbendum: sed pueris obolus unus, maioribus

uerò oboli duo sunt dandi: item fortibus tres. Perse-  
cta tamen potio drachmæ unius continet modum. V-  
tendum præterea epithemate circa medias partes ex

lupini pollinibus, aut melanthio, et decoctione absin-  
thij, aut \* fuluo liliorū, aut cerotario cedriæ admixtis  
lupinis tritis, aut absinthio, aut agrestis peponis \* in-

teriora, quæ Græci \* colocyntida uocant, cum melle  
atque lupinis, aut centaureæ uel aloes partibus dua-  
bus, et diagridij parte una cum melle et felle tauri-

no. Erunt præterea omnia quæ potui ordinauimus  
danda, etiam per clysterem iniicienda, et magis adiū-  
cto uel admixto oleo plurimo calido, et succis præ-

scriptis, quo plurima mordicatione intestina affician-  
tur. Ac si lati fuerint lumbrici, erit adhibendus uomit-  
us ex oleo, \* non ex radicibus, et alia die clystere

utendum

\* Multi  
\* vulturis

\* Nos  
\* Scylla

\* Scylla

καταπύμα  
ex quilla.

\* nō tam diu,  
ut prorsus li-  
quescat. Sic e-  
nim vim totā  
amiserit.

\* Scylla  
\* tria

\* fuluorum  
\* interioribus,  
quem

\* colocynthida

\* Nam ob a-  
crimoniam ra-  
dix lumbrici

exagitat. Con-  
citatus uero ie-  
uehementer a-

grum torquet  
nec acria con-  
ueniunt prius-

quam vomitu  
purgatio fue-  
rit vetriculus.

Præterea oleū  
lumbricos in-  
terficiat.

utendū, admixta nitri parte, uel salis. Dāda etiā aqua  
falsa potui, aut glycyrrhizæ radicis decoctio, aut simi-  
liter incocta glycyrrhiza. Alij uero tres drachmas  
glycyrrhizæ cum nitro probauerunt. Alij diagridij  
obolos tres, cum polypodij herbæ drachmis duabus.

\* vulturis me-  
moratam pa-  
gina præce-  
dente.

\* proditurorū

Alij ex \* pinnis medicamen confectum. Sed erit semper  
tentandum, ubi res patiuntur, ut iis utamur medicami-  
nibus, quæ minime stomachum afficiant. Tum cum sen-  
sum acceperint egrotantes animalium \* carendorū, ut  
interpellatione uentris admoneantur, subiicienda erit  
aqua calida, quo & loca relaxetur, & animalia pro-  
cedant, ne frigore percussa fugiant. Erit præterea cu-

\* curatione

randū, ne frequēter hæc animalia renascantur, ut \* un-  
ctione regulari corpora fortificemus, adhibito præce-  
ptore, adhibita etiam recorporatione cyclica, quæ sit  
uomitu radicū, & drimyphagia, & dropace, & sina-  
pismo, & paroptesi, & horū similibus uirtute rebus.

magis iust.

De mollibus, siue subactis, quos Græci mal-  
thacos vocant.

Cap. ix.

μαλθακοί.

**M**olles, siue subactos Græci malthacos uocau-  
erunt, quos quidem esse nullus facile uirorum cre-  
dit. Nō enim hoc humanos ex natura uenit in mores,  
sed pulso pudore, libido etiā indebitas partes obscæ-  
nis usibus subiugauit. Cum enim nullus \* cupiditati mo-  
dus, nulla satietatis spes est, singulis \* spartanum suffi-  
ciunt sua: \* Nam si nostri corporis loca diuina pro-  
uidentia certis destinauit officiis. \* Tum denique uo-  
lentes alliciunt ueste atque gressu, & aliis fœmini-  
nis rebus, quæ sunt à passionibus corporis aliena,  
\* sed potius corruptæ mentis uitia. Nam sæpe \* tu-  
mentes, uel quod est difficile, uerentes quosdam,  
quibus forte deferunt, repente mutati paruo tempore  
uirili

\* cupiditatis  
\* subactorum  
non. Alij spar-  
thianorum  
\* tametsi  
\* Hi

\* &  
\* timentes



uirilitatis quærūt indicia demonstrare, cuius quia modū  
nesciūt, rursum nimietate sublatis, plus quoq; quā uir-  
tuti cōuenit faciunt, & maioribus se peccatis inuoluūt.  
Cōstat itaq; etiā nostro iudicio, \* hos uera sentire. Est \* qui hoc pro-  
enim, ut Soranus ait, malignæ ac fœdiſſimæ mentis pas- diderunt  
sio. Nā sicut fœminæ Tribades appellatæ quod utranq; Soranus.  
Venerē exerceāt, mulieribus magis quā uiris misceri 71184 Aus.  
festinant, & easdem inuidētia penē uirili se ctātur: &  
cū passiōe fuerint deserte, seu tēporaliter releuatæ,  
ea quærūt aliis obicere quæ pati noscuntur, iuueni  
\* humilitate duplici sexu cōfecta, uelut frequēti ebrie- \* voluptate  
tate corruptæ in nouas libidinis formas erumpentes, ex  
consuetudine turpi nutritæ, sui sexus iniuriis gaudent,  
illi comparatione talium animi passiōe iactari no-  
scentur. Nam neque ulla curatio corporis depellendæ  
passiōis causa rectē putatur adhibenda, sed potius a-  
nimus coercendus, qui tanta peccatorum labe uexatur.  
Nemo enim pruriens corpus \* fœminando correxit,  
uel uirilis ueretri \* tactu mitigauit, sed \* communiter  
querelam siue dolorem \* alia ex materia tolerauit. \* se utris sub-  
Denique etiam à Clodio historia curationis data ascā- iiciendo, &  
ridarum esse perspicitur, quos de lumbricis scribentes prostituen-  
uermiculos esse docuimus longaonis in partibus natos. do  
Parmenides libris quos de natura scripsit, euentu in- \* tractu ma-  
quit conceptionis molles aliquando, seu subactos ho- stupratione  
mines generari. Cuius quia græcum est epigramma, \* perenniter  
& hoc uersibus intimabo: Latinos enim, ut potui, si- \* tali  
mili modo composui, ne linguarum ratio misceretur. Clodius.  
Parmenides.

Fœmina, uirq; simul Veneris cū germina miscēt  
Venis, informans diuerso ex sanguine uirtus  
Temperiem seruās bene cōdita corpora fingit  
At si uirtutes permixto semine pugnent,

Nec

- \* Nec faciant  
 \* unam vim,  
 mixto  
 \* vt  
 \* vim unam  
 faciant
- Nec faciant\* unam,permixto in corpore diræ  
 Nascentem gemino uexabunt semine sexum.  
 Vult enim seminum præter materias esse uirtutes,  
 quæ si se ita miscuerint,\* & eiusdem corporis\* faciât,  
 unam congruâ sexui generet uoluntatē. Si autem per-  
 mixto semine corporeo uirtutes separatæ permanse-  
 rint,utriusq; Veneris natos adpetētia sequatur. Multi  
 præterea sectarum principes\* genuinā dicunt esse pas-  
 sionē, & propterea in posteros uenire cum semine,nō  
 quidē naturā criminātes, quæ suæ puritatis metas alijs  
 ex animalibus docet:nā sunt eius specula à sapientibus  
 \* nūcupata sed humanū genus,quod ita semel recepta  
 tenet uitia, ut nulla possit instauratiōe purgari, nec  
 ullum nouitati\* liquerit locū,sitq; grauior senescenti-  
 bus mentis culpa,cum plurimæ genuinæ, seu aduētitiæ  
 passiōes corporibus\* in fractæ consenscant,ut poda-  
 gra,epilepsia,furor,& propterea atate uergente mi-  
 tiores procul dubio fiant. Omnia etenim uexatiā uali-  
 dos effectus \* dabunt firmitate opposita subiacentium  
 materiā, quæ cum in senibus deficit,passio quoq; mi-  
 nuitur,ut fortitudo : sola tamen supradicta, quæ suba-  
 ctos seu molles efficit uiros,senescēti corpore grauius  
 inualescit,& infanda magis libidine mouet,non quidē  
 sine ratione. In alijs enim etatibus adhuc ualido cor-  
 pore,& naturalia\* uētris officia celebrāte,gemina lu-  
 xuriæ libido non diuiditur,animorū\* nunc faciendo,  
 nūc facie iactata : in ijs uero qui senectute defecti ui-  
 rili ueneris officio caruerint,omnis animi libido in cō-  
 trariā ducitur appetentiā:& propterea fœmina uali-  
 dius Venerē poscit.Hinc deniq; conijciūt plurimi etiā  
 pueros hac passiōe iactari. Similiter enim senib.usiri  
 li indiget officio,qđ in ipsis\* nōdū & illos deseruit.
- \* sub bruta a-  
 nimantia.  
 \* linguat.  
 \* infarctæ.  
 \* dant.  
 \* uiri.  
 \* animorū for-  
 titudine mini-  
 me.  
 \* nondum est,  
 at illos iam de-  
 seruit.



C A E L I I A V R E L I A -  
N I S I C C E N S I S C H R O -  
N I O N L I B E R Q V I N T V S . |

De Ischiadicis & Psœadicis.

Cap. I.



Partibus quæ dolore uexantur hæ pas-  
siones nomina sumpserunt. \* Nam uer-  
tebrorum summitas ipsorū initio ter-  
minatur, Græci ischia uocauerunt.

\* Nam quæ  
uerteborum  
summitas os  
coxae ineuntia  
terminatur.

\* Item musculos clunium sub spinæ fi-

Vertebras tro-  
chanteras uo-  
cat.

ioxia.  
\* Idem.

Isia.

nem ex interioribus atque exterioribus adherentes  
psœas uocauerunt. Generantur istæ passiones nunc ex  
manifestis, nunc ex occultis causis, ut est perfrictio pro-  
funda, uel terrena cubatio, aut casus, uel repentinus  
percussus, aut iugis atque immodicus usus ueneris, aut  
quolibet longissimi temporis morbus item uehemens  
abductio, uel raptus in exercitio factus, aut longissimi  
temporis hæmorrhoidarum \* fluoris tentus, uel insucta

fluor retentus.

\* humi fossio, aut cuiusdam ponderis leuandi ex \* inte-  
rioribus conatio. Fit præterea in omnibus ætatibus.

\* telluris

\* inferioribus.

sed frequentius in medijs. Sequitur ischiadicos dolor  
uerteborum, quam passionem multi \* duplicē ischiada  
uocauerunt, attestante grauedine, & difficili motu,  
contra solitum morem, & quibusdam cum leui torpo-  
re ac fornicatione: quibusdam cum uehementi atque  
pungenti, & feruido dolore, & ad sensum patientis,

ioxiadici.

ioxias.

\* cum utramq;  
coxedicem ve-  
xat.

tanq

conuoluti mo-  
 tu.  
 \*positionem.  
 \*penetrat.  
 ἀγνάλη.  
 \*poplitem.

tanquam serpentis\* conuolutus motus: aliquādo etiam  
 cum febribus, ut neque in lecto suā\* conuentionem fer-  
 re ualeant egrotantes, & primo, in uertebro dolor  
 sentitur, dehinc partis suæ\* penetrans loca, usque ad  
 mediam natem, ac superius ad inguen, uel ad\* ancalen  
 perueniens atque suram, dehinc etiam talum, & pedis  
 summitatem. Tum cum passio tardauerit, cessante nu-  
 trimento, cruris totius tenuitas fit, quam Græci atro-  
 phian uocant, incipiens à clunibus, siue ab inferioribus  
 locis, attestante debilitate, & sæpe conductis partibus  
 breuitate cruris, aut ultra naturam, longitudine pas-  
 sionis, \*distensione suffecta, ut in paraly sin ueniat, aut  
 ipsius uertebri duratæ partes extantiores fiant. Con-  
 stringitur præterea sæpe ac retinetur uentris officiū,  
 aut cum plurimo dolore perficitur, ob tensionem, atq;  
 spiritus retenti percussum, & in\* itineris pressu, qui-  
 bus\* forte\* permittitur, ut initia motus impediuntur,  
 feruore partium attestante: \*ac si perseuerans feruor  
 fuerit, \*motus facilius fit. \*Tum rursus subsidunt, uel  
 intenti resistunt repente, tanquam fuerant \*necdum  
 gressu tentato, \*Tunc magis uehementem dolorem  
 sentiunt: & ambulant quidam, capitibus digitorum  
 gradientes, alij extenti quidem, sed\* sinuatis clunibus,  
 ut neq; se pronos inclinare ualeant: alij contracti at-  
 que conducti, qui peius omnibus habere noscuntur: si-  
 quidem passio apprehendit etiam spinæ musculos, &  
 propterea duritia quadam hæc inuasisse uidetur loca.  
 Patitur autem principaliter membrana quæ ossa cir-  
 cuntegit, quam Græci periosteon uocant: item muscu-  
 lorum capita, uel summitates. Denique augmento pas-  
 sionis\* intercreatus humor, & frequenti dolore cor-  
 ruptus, in saniem transiens partes aliquas\* collectio-  
 nibus

\*extensione.  
 \*itinere pres-  
 sum.  
 \*valide  
 \*premitur,  
 initio motus im-  
 pediuntur.  
 \*at si  
 \*Nam calore  
 flatu & hu-  
 mor crassius di-  
 scutiuntur, qui  
 motum impe-  
 diebant.  
 \*sed rursus  
 subsistunt, ac  
 detenti  
 \*nondum  
 \*ac tum  
 \*eiecto capite  
 ossu femoris  
 ex acetabulo  
 coxa, adeo ut  
 acetabuli va-  
 cuit sinu de-  
 prehendantur.  
 ὑπὲρ τῆς  
 \*intercolle-  
 ctus.  
 \*abscessu.

nibus afficit. Sed quoniam plurima supradictorum sequuntur etiam eas quæ matricis uexatione afficiuntur, & magis cum eius fuerit inclinatio facta, quam paracelis in uocant, faciendâ est discretio passionum: & primo, quod matrice patiente in eadem potius causæ inueniantur, atq; ex ipsa initium sumant, \* Pseudicæ uero clunium dolore afficiuntur, & tardo motu, ut serenitente dolore nec inclinare ualeant, ac difficilior & dolentius subrigant. Plurimis \* igitur dolor cito \* earum conuiescit: aliquibus uero perseverat: partes dureſcunt atque conducuntur: his deniq; \* usq; ad pene \* pene usq; ad cutem unicus sequetur gressus. Si itaque exteriores muscoli fuerint in passione constituti, etiam tactu tentati dolescunt, interiores autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquam in nephriticis contingit: quos propterea deniq; similes discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrunt, quæ de ipsis scribentes memorauimus. Pseudicis autem, atq; ischiadicis, quorum nunc curationem scribimus dolor efficitur nunc iugis, nunc deficiens, ordinatus aut inordinatus, ac longis uel paruis interuallis recurrens, ac puris & limpidis lenimentorum uariatus spatius, aut mediocres reliquias seruans. Vtilem inquit \* Hippo- Dysenteria ischiadicis utilis. crates ischiadicis dysenteriam: Habet enim imitatio- \* libro Prorrhethici utilem nis quiddam recorporationis faciundæ; quanquam plurima uexatione corpus afficere uideatur: item hæmorrhoidas, uel uarices, ut alij dicunt, laxamenti causa. esse ait Podagricis, in quibus sunt autem difficiles curatione magis, qui plurimo tempore fuerint passione uexati, & multis atq; uariis toplicis contineantur accidentibus & signis affecti. In ordine itaq; curationis hæc erunt intuenda, ut cum recens fuerit passio uel ueterata, sed in superpositionis tempore constituta, ia-

cere faciamus ægrotantem mollioribus stramentis, calido in loco, adhibita abstinencia, & requie usque ad  
 \* non succidis primam diatripton. Tunc lanis mollibus, ac \* limpidis  
 oleo calido dulci prætinctis dolentia loca cõtegendenda.  
 Adhibenda etiam fomentatio iugis ex oleo dulci calido: item uaporationum commutatio, sicut in multis docuimus scribentes, & phlebotomia tempore consueto, atq; ex brachio dolenti parti contrario, uel plurimum dolenti comparatione alterius. Ac si æqualis in utraq; fuerit parte dolor, ex eo in quo fuerit facilius uena, erit detractio facienda. Si neq; hoc occurrerit, ex sinistro brachio adiutorium adhibendum: si quidem  
 ex diu. minus officiũs domini necessaria pars esse uidetur, nisi forte sinistri, hoc est scæi fuerint ægrotantes. Tum tertia die adhibenda perunctio ex oleo dulci atq; calido: dehinc ora lauanda, cibus dandus nutritibilis, calidus, tener, tanquam stricturæ conueniens, & potui aqua calida usq; ad declinationis tempus. Seruanda etiam cibi  
 \* alina alterna dierum oblatio: tum cessante dolore resumptio adhibenda. Perseuerante uero \* alia diatripti tempore, adhibenda iniectio decoctione scœnigræci seminis, aut lini, aut hybisci, quam Græci althæan uocant, quo pariter fota atq; uaporata interiora laxamento consentiant. Admiscendum deniq; oleum calidum: item succus alicæ, uel ptisanæ, uel oleũ solum, aut admixto adipe anserino, uel gallinaceo iniiciendum, uel iis quicquam simile cõsolutum. Ac si uenter fuerit abstentus, erit mulsus iniiciendum. Tentanda deniq; & \* prope-  
 \* procuranda sequentibus diebus facilitas uentris. Quo conuenit, si hoc minime perficere ualuerimus, etiam lino zostin herbam nunc solam cibo dare, nunc adiuncta malua: itẽ \* agreste coliculũ. Sed fõgienda prædicimus  
 quæcun

quæcunq; fuerint uehementiora; quantum quidem res  
 admittunt, ut diagridium, helleborum nigrum, chamæ-  
 leæ semen, quod Græci coccum Cnidium uocant, aga-  
 ricum, agrestem peponem, quem \* colocyntida dicunt, <sup>\* colocynthida</sup>  
 singularia uel coniuncta, item hieram, quam diascam- <sup>ἱερὰ διασκαμ</sup>  
 monias appellant, ne plurima uexatio pro parua com- <sup>μαρίας.</sup>  
 moditate sequatur. Nam post fomenta conuenit cata-  
 plasmata adhibere, quorum confectioes atque spe-  
 cies sæpe conscripsimus. Ac si permanferit dolor, adhi-  
 benda scatifcatio. Hirudines etiam adhibendæ, quas  
 Græci bdellas appellant. Hoc quidem secundo uel ter- <sup>βδλλα.</sup>  
 tio faciendum, si causæ poposcerint. Tunc uaporatio  
 spongiarū ex aqua calida, uel aliqua decoctione \* la- <sup>\* laxatiua</sup>  
 xatiua uirtute mitigantium materiarum adhibenda, <sup>virtutis.</sup>  
 quarū iam sæpe species memorauimus. Ex ipsis quoq;  
 encathismata facienda. Item cerotaria dolentibus ap-  
 ponenda partibus ex oleo pingui, uel cyprino, aut  
 sicyonio, uel ex radice hybisci confecto, aut irino, aut  
 malabatrino, singularibus, atq; commixtis. Ac si duri-  
 tia emerferit, \* admiscendum adipem, aut medullam <sup>\* admiscere</sup>  
 ceruinam, uel bubulam, aut melilotum, aut hybisci ra- <sup>oportet</sup>  
 dicem percoctam in mulsæ, ac diligenter cōtritæ, aut  
 decoctionem eiusdem hybisci, uel fœnigræci, & lini  
 seminis triti, in mellis crassitudinem confecti. Ac si dif-  
 ficile passionem declinare uiderimus, erit embasis ad- <sup>ἐμβασις.</sup>  
 hibenda ex oleo, & aqua calidis. Tum cum fuerit plu-  
 rimum minutus dolor, uariis offerendus est cibus, ex  
 mediæ qualitatis materia. Adhibendum etiam laua-  
 crum, dehinc lene uinum: tum malagnata partibus in  
 passione constitutis, ut Diachylon, uel Mnauseum, aut  
 \* Dioxycleū, uel \* Nileos: item unctioes quæ mitigan-  
 ter emolliat, & neq; perfrigescere partes permittat, <sup>\* describitur  
 ab Actio pag.  
 819.  
 \* Nilei</sup>



cerotaria quoq; limpida, aut Diasamsucum acopum, aut irinum oleum aut samsucinum. Ac si passio fuerit tarditate inueterata, & plurimo tempore perseuerans, & in lenimento constituta, si hoc limpidum uiderimus lenimentum, erit pro modo permanentis doloris curationis facienda moderatio: Tunc enim conuenit motus quidem, sed fertorio lecto, dehinc cathe-

\* sella. Est autem venter in Paracentesi usq; Hac trās ferēda sunt in pag. 440.

\* fistula quae uesica mulierū inditur proliciende urinae causa. Est autē breuior quā quae peni uiro- rum inditur.

\* aqua salse ut pag. 430.

\* imitationem inuentionem

\* si vires. Nā cū grauis morbus est, aquarū euacuatione vires acri iam inuolide ob morbi rehemētiā, magis nō sunt labefactandae.

Aphorif. 27. lib. 6.

\* applicantes

dra uel \* sella usq; ad inanem penetrādus, sicut in phlebotomandis facimus: sed ab umbilico inferius iis qui leuius afficiuntur, praecauentes uenarum diuisiones: ac deinde muliebri \* catethere liquorem detrahimus, qui saepe aquosus, saepe fuluus, aut sanguinolentus, uel spumofus excluditur: quod quidem etiam ante factam diuisionem pleriq; futurum signis apprehendere uoluerunt. Quorum alij talem fore dixerunt, qualis urina fuerit aegrotantis: alij qualis color apparuerit cutis: alij quolibet uiscere patiente, sanguinolentum: non patiente uero, ex causa auidissimi potus hydropismo concepto, uel \* salis potu mundum atq; perspicuum liquorem fore. Sed haec praeter quod falsissima sunt opinionis, etiam ad \* mutationem chirurgiae inutiliter quaesita uidentur, nisi solum quod recte probamus, per catethera liquore, \* si res patiuntur, semel atq; eodem tempore omnem auferendum. Sin uero aliqua obstiterint, post primam detractionem motarium aqua infusum supra diuisionem res \* implicantes, spongiam desuper mollem apponimus, ac deinde leui fasciola amplexi loco paululum differimus, quo turbatio corporis resoluitur: ac deinde resumpto aegrotante eodem die residuum detrahimus humorem: sin minus, alia die, manibus comprimentes subiectas partes, congrue aegrotante locato, hoc est schemate competenti. Ac

siforte

si forte rursum confluyente humore fuerit repletus, uel uirium debilitas prohibuerit eodem tempore totum detrahi, tunc interiectis duobus diebus, uel quantum uires permiserint residuum detrahimus, sed alio in loco diuisuram facientes: uel si rursum oportuerit, tertio. Etenim prima diuisura seruata distans, aut coherens & \* soluta tumores uel consensus ingerit uehementes. Tum perfecta humoris detractiōe neque abstinentia \* utemur, ut Asclepiades, neque plurimum damus cibum, sed pro modo uirium, etenim abstinentia omni ex parte adhibita uires uexat: quippe post plurimam detractiōem; multi item oblatio cibi grauians opprimit corpus potius, quā resumat. Erunt autem ante cibum sensim perungendi, atq; reficiendi facilibus, & \* potu sufficienti, ac si dolores aliqui emerferint, uaporationibus soluendi, atq; cataplasmatibus mitigandi. Tunc indulgentia relaxatis doloribus uel forte non emergentibus, adhibemus ea quæ tumorem fieri non sinant, & superimpositis spongiis conligamus. Transacto tumoris metu, magis uentris \* folliculum & \* cutem intestinis cogimur \* adserere, atq; similiter cetera quæ in tumore fuerant constituta, ut nuper docuimus. Aegrotantes præterea nauicula exerceri hortamur, & paulatim recorporatiuæ subiiciamus curationi. Ac si neq; ita fuerint resoluti, utemur helleboro iisdem curationibus insistentes, donec corpus repetat fortitudo, atq; densior uel coacta caro noscatur attestante rubore. Hæc est secundum methodū hydropum curatio. Plurimi autem earum sectarum principes, atq; nostræ ueteres, nihil ueri curantes, ac magis contemptu quodam \* astruções corporum aspernantes, solius detrahendi humoris intentione tra-

\* deducta, cū  
in eam rursum  
adigitur catether.

\* utimur,  
Asclepiades.

\* potu

\* peritonæum.  
\* epigastrium.  
\* ad mouere.

\* constructiō  
nem.

ducti quoquo modo id perficiendum crediderunt, im-  
 mensa siti atq; fame egros afficientes, corpore conca-  
 uo \* pestine decurso, & mille præterea urinalibus me-  
 dicaminibus, quæ diuretica uocant uescicam commouen-  
 dam probant, & uentrisfluis potionibus quæ catharti-  
 ca appellant, uentrem prouocandum dicunt, cocco  
 Cnidio, atq; \* lepida cyprina, & chamælea, & hippo-  
 phae herba & ex crotonibus confecto oleo cicino, itē  
 \* neoro ex quibus cunctis stomachus uexatur, atque  
 cibi appetitum amittit, sitis incenditur, corpus de-  
 fluit, sanguis corrumpitur, atq; humor detractus re-  
 nascitur, uires auferuntur: siquidem neq; potestas mo-  
 derandæ detractionis est in artificis manu. Quidam  
 tanquam siccabilem humoris ophiten lapidem ligaue-  
 runt expertis ægrorum salutem credentes. Singula-  
 tim deniq; nobilium medicorum historiam ordinemus.  
 Herodicus igitur, ut Asclepiades memorat, uentris  
 adhibet purgationem, atque post cœnam uomitus, qui  
 sunt implebiles potius quàm siccabiles: tum uapora-  
 tionibus tepidis aceti decocti exhalatione confectis  
 utitur, uel aquæ marinæ, admixta thalia herba, atque  
 hyssopo, & his similibus, uescicis bubulis repletis, cor-  
 pus uaporandum probat, uel aliis quibusq; maioribus  
 \* inflatis, tumentia loca pulsari iubet. Sic etiam anti-  
 quissimus Euryphon. Hippocrates uero libris, quos ad  
 sententias Cnidias scripsit, magis utendum dicit \* ege-  
 state atq; uaporatione, & continentia, & danda sicca  
 uel arida quæq; & acriora mādenda. \* Si enim æquibi-  
 lus æger fiat, hoc est, urina facilior, ac si spiratio diffi-  
 cilis fuerit, quæ dyspnœan uocant, & tēpus \* æstatis, &  
 æstas media, dicit ex brachio plebotomādos, & post  
 detractionē factā dat panem calidū uino infusum atq;  
 oleo

\* strigile: vt  
 pag. 481. Sic  
 decurrere ca-  
 pillum dixit  
 pag. 279.  
 ἀντρίαια.  
 Vrnalia.  
 ἀντρίαια.  
 Ventriflua.  
 ἐλασιον λικινον  
 ἢ λευκόν.  
 \* lepida cy-  
 pria. i. Squa-  
 ma æri cyprî.  
 \* Cneoro  
 Ophi.  
 Herodicus.  
 \* uescicis  
 \* ταλαίπω-  
 ρας: purius:  
 εὐρυφῶν.  
 Euryphon.  
 Hippocrates.  
 \* Sic enim va-  
 lidissimus æger  
 fit, & urina,  
 facillima. At  
 si spiratio.  
 οὐτὸ γὰρ ὄντι  
 τινός ποτος ἔστιν,  
 καὶ μέλαινα  
 τοχνοί.  
 \* uernum, &  
 atati vigor,  
 & uirium ro-  
 bur, dicit à  
 Græco

Lant. Themison secūdo libro Tardarū passionū utitur Themison  
 ostendit

## LIBER V.

503

oleo, & carnem suillā ex aceto decoctā. Dat etiā can-  
 tharidas tres detracto capite, & pedibus, & \*pinnis \* ali  
 in tribus cyathis aquæ cūtritās: sed neq; quo tempore  
 exercitio utendum sit manifestat, neq; usq; quo man-  
 denda sint acriora, uel quando uaporationes adhiben-  
 de. Dehinc si phlebotomare oportuerit, non solum æ-  
 stiuo tempore, ac media estate, sed etiam omni tem-  
 pori atq; etati conuenire phlebotomiam probamus.  
 Est præterea importunum uinū, ac repugnans eo tem-  
 pore commodis phlebotomiæ. Item cantharides humo-  
 rem commouent: carnis quoq; offerēde tempus significa-  
 re neglexit. Diocles libro quo de passionibus & cau-  
 sis, & curationibus scripsit, siccādos inquit, ac medio-  
 criter uaporādos, & deambulationi tradendos egro-  
 tates, & plurimos sudores commouendos, \* uel uomi-  
 tum & urinam \* prouocandam diagridio, & apij se-  
 mine resolutio succo herbe saluæ. Itē cardamomum;  
 quantum uentrem ualeat semel deducere, & in aceto  
 panem solutū, & piscem salsum dandum uel pisces eli-  
 xos & assos, uel silurum piscem, olera, radices, alliū,  
 origanū, rutā, satureciam, uinum album, & nō aquatū,  
 & ferarū carnem: in deambulationibus \* uentrē iubet  
 contineri, ceteras corporis partes defricari, exceptis  
 cruribus. Sed hic quoq; communi ceterorū subiicitur  
 \* accessioni: solum prædamnamus, quod humorem de-  
 trahens purgatiuis atq; urinalibus medicaminibus, &  
 uomitu, & sudoribus prouocatis, quibus ex rebus su-  
 dor mouendus sit tacuerit, uel uomitus. Item deam-  
 bulatio sepe laboriosa, & piscis silurus bromosus, &  
 allium inflabile, & plurima ferarū carniū malos  
 habere succos probantur. Inde etiam quæ sint olera  
 deligenda memorare neglexit, & neque fortificari

Diocles.

\* uentrem  
 \* prouocan-  
 dam: ac ven-  
 trem Diagri-  
 dio, quantum  
 ualeat semel  
 deducere uomi-  
 tū Cardamo:  
 urinam Apij  
 semine resolu-  
 to succo herbe  
 Saluæ  
 \* ægrum  
 \* accusationi

utendū, admixta nitri parte, uel salis. Dāda etiā aqua  
falsa potui, aut glycyrrhizæ radicis decoctio, aut simi-  
liter incocta glycyrrhiza. Alij uero tres drachmas  
glycyrrhizæ cum nitro probauerunt. Alij diagridij  
obolos tres, cum polypodij herbæ drachmis duabus.

\* vulturis me Alij ex \* pinnis medicamen confectum. Sed erit semper  
moralium pa- tentandum, ubi res patiuntur, ut iis utamur medicami-  
gina præce- nibus, quæ minime stomachum afficiant. Tum cum sen-  
dente, sum acceperint ægrotantes animalium \* carendorū, ut

\* proditoriorū interpellatione uentris admoneantur, subiicienda erit  
aqua calida, quo & loca relaxetur, & animalia pro-  
cedant, ne frigore percussa fugiant. Erit præterea cu-

\* curatione randū, ne frequēter hæc animalia renascantur, ut \* un-  
ctione regulari corpora fortificemus, adhibito præce-  
ptore, adhibita etiam recorporatione cyclica, quæ sit

μαρίνησι. pisimo, & paroptesi, & horū similibus uirtute rebus.

μαλθακοί. De mollibus, siue subactis, quos Græci mal-  
thacos vocant. Cap. IX.

**M**olles, siue subactos Græci malthacos uocau-  
runt, quos quidem esse nullus facile uirorum cre-  
dit. Nō enim hoc humanos ex natura uenit in mores,  
sed pulso pudore, libido etiā indebitas partes obscæ-  
nis usibus subiugauit. Cum enim nullus \* cupiditati mo-  
dus, nulla satietatis spes est, singulis \* spartanum suffi-  
ciunt sua: \* Nam si nostri corporis loca diuina pro-  
uidencia certis destinauit officiis. \* Tum denique uo-  
lentes alliciunt ueste atque gressu, & aliis fœmini-  
nis rebus, quæ sunt à passionibus corporis aliena,  
\* sed potius corruptæ mentis uitia. Nam sæpe \* tu-  
\* limentes mentes, uel quod est difficile, uerentes quosdam,  
quibus forte deferunt, repente mutati paruo tempore  
uirili

\* cupiditatis  
\* subactorum  
non. Alij spar-  
thanorum  
\* tametsi  
\* Hi

\* &  
\* limentes

uirilitatis quærūt indicia demonstrare, cuius quia modū  
nesciūt, rursum nimietate sublati, plus quōq; quā uir-  
tuti cōuenit faciunt, & maioribus se peccatis inuoluūt.

Cōstat itaq; etiā nostro iudicio, \* hos uera sentire. Est <sup>\* qui hoc pro-</sup>  
enim, ut Soranus ait, malignæ ac fœdiſſimæ mentis pas- <sup>diderunt</sup>  
sio. Nā sicut fœminæ Tribades appellatæ quod utranq; <sup>Soranus.</sup>  
Venerē exerceāt, mulieribus magis quā uiris misceri <sup>tribades.</sup>

festinant, & easdem inuidētia penē uirili sectātur: &  
cū passiōe fuerint desertæ, seu tēporaliter releuatæ,  
ea quærūt aliis obiiicere quæ pati noscuntur, iuuamini

\* humilitate duplici sexu cōfecta, uelut frequēti ebrie- <sup>\* voluptate</sup>  
tate corruptæ in nouas libidinis formas erumpentes, <sup>ex</sup>

consuetudine turpi nutritæ, sui sexus iniuriis gaudent,  
illi comparatione talium animi passiōe iactari no-  
scuntur. Nam neque ulla curatio corporis depellendæ  
passiōis causa rectē putatur adhibenda, sed potius a-

nimus coercendus, qui tanta peccatorum labe uexatur.  
Nemo enim pruriens corpus \* fœminando correxit,

uel uirilis ueretri \* tactu mitigauit, sed \* communiter

querelam siue dolorem \* alia ex materia tolerauit. <sup>\* se uiribus sub-</sup>  
Denique etiam à Clodio historia curationis data ascen- <sup>diendo, &</sup>  
ridarum esse perspicitur, quos de lumbricis scribes <sup>prostituendo:</sup>  
uermiculos esse docuimus longaonis in partibus natos. <sup>aliq; examinā-</sup>  
<sup>do</sup>

Parmenides libris quos de natura scripsit, euentu in- <sup>\* tractu ma-</sup>  
quit conceptionis molles aliquando, seu subactos ho- <sup>stupratione</sup>

mines generari. Cuius quia græcum est epigramma, <sup>\* perenniter</sup>

& hoc uersibus intimabo: Latinos enim, ut potui, si- <sup>\* tali</sup>

milī modo composui, ne linguarum ratio misceretur. <sup>Clodius.</sup>

Fœmina, uirq; simul Veneris cū germina miscēt

Venis, informans diuerso ex sanguine uirtus

Temperiem seruās bene cōdita corpora fingit.

At si uirtutes permixto semine pugnent,

Nec

\* Nec faciant

ynam vim,

mixto

\* vt

\* vimynam

faciant

\* sequitur.

\* naturam:

hereditariam.

\* sub, bruta a-  
nimantia.

\* linquat.

\* infarctae.

\* dant.

\* viri.

\* animarū for-  
titudinis mini-  
mē.

\* nondum est,  
at illos iam de-  
seruit.

Nec faciant\* unam, permixto in corpore dirae

Nascentem gemino uexabunt semine sexum.

Vult enim seminum præter materias esse uirtutes,

quæ si se ita miscuerint,\* & eiusdem corporis\* faciāt,

unam congruā sexui generēt uoluntatē. Si autem per-

mixto semine corporeo uirtutes separatæ permanse-

rint, utriusq; Veneris natos adpetētia sequatur. Multi

præterea sectarum principes\* genuinā dicunt esse pas-

sionē, & propterea in posteros uenire cum semine, nō

quidē naturā criminātes, quæ suæ puritatis metas alijs

ex animalibus docet: nā sunt eius specula à sapientibus

\* nūcupata sed humanū genus, quod ita semel recepta

tenet uitia, ut nulla possit instauratiōe purgari, nec

ullum nouitati\* liquerit locū, sitq; grauior senescenti-

bis mentis culpa, cum plurimæ genuinæ, seu aduētitiæ

passiones corporibus\* infractæ consenscant, ut poda-

gra, epilepsia, furor, & propterea etate uergente mi-

tiores procul dubio fiant. Omnia etenim uexatiā uali-

dos effectus\* dabunt firmitate opposita subiacentium

materiarū, quæ cum in senibus deficit, passio quoq; mi-

nuitur, ut fortitudo: sola tamen supradicta, quæ suba-

ctos seu molles efficit uiros, senescētī corpore grauius

inaualescit, & infanda magis libidine mouet, non quidē

sine ratione. In alijs enim etatibus adhuc ualido cor-

pore, & naturalia\* uētris officia celebrāte, gemina lu-

xuriæ libido non diuiditur, animorū\* nunc faciendo,

nūc facie iactata: in ijs uero qui senectute defecti ui-

rili ueneris officio caruerint, omnis animi libido in cō-

trariā ducitur appetentiā: & propterea fœmina uali-

dus Venerē possit. Hinc deniq; coniiciūt plurimi etiā

pueros hac passione iactari. Similiter enim senib. uiri

li indigēt officio, qđ in ipsis\* nōdū & illos deseruit.





C A E L I I A V R E L I A -  
N I S I C C E N S I S C H R O -  
N I O N L I B E R Q V I N T V S . |

De Ischiadicis & Psœadicis.

Cap. i.



Partibus quæ dolore uexantur hæ pas-  
siones nomina sumpserūt. \* Nam uer-  
tebrorum summitas ipsorū initio ter-  
minatur, Græci ischia uocauerunt.

\* Nam quæ  
uerteborum  
summitas os  
coxa ineuntia  
terminatur.

\* Item musculos clunium sub spinæ fi-  
nem ex interioribus atque exterioribus adherentes  
psœas uocauerunt. Genrantur istæ passiones nunc ex  
manifestis, nūc ex occultis causis, ut est perfrictio pro-  
funda, uel terrena cubatio, aut casus, uel repentinus  
percussus, aut iugis atque immodicus usus ueneris, aut

Vertebras trop-  
chanteras uo-  
cat.

ioxiæ.  
\* Idem.

quolibet longissimi temporis morbus item uehemens  
abductio, uel raptus in exercitio factus, aut longissimi  
temporis hæmorrhoidarum \* fluoris tentus, uel insucta

fluor retentus.

\* humi fossio, aut cuiusdam ponderis leuandi ex  
terioribus conatio. Fit præterea in omnibus ætatibus.

\* telluris  
\* inferioribus.

sed frequentius in medijs. Sequitur ischiadicos dolor  
uerteborum, quam passionem multi \* duplicē ischiada  
uocauerunt, attestante grauedine, & difficili motu,  
contra solitum morem, & quibusdam cum leui torpo-  
re ac fornicatione: quibusdam cum uehementi atque  
pungenti, & seruido dolore, & ad sensum patientis,

ioxiadici.

ioxiæ.  
\* cum utramq;  
coxædicem ve-  
xat.

tanq

*conuoluti mo-  
tu.* *\*positionem.* *\*penetrat.* *ἀναλῆ.* *\*poplitem.* *\*extensione.* *\*itinere pres-  
sum.* *\*valide* *\*premitur,* *initio motus im-  
pediuntur.* *\*at si* *\*Nam calore* *flatus & hu-* *mor crassius di-* *scutiuntur, qui* *motum impe-* *diebant.* *\*sed rursus* *subsistunt, ac* *detenti* *\*nondum* *\*ac tum* *\*eiecto capite* *ossu femoris* *ex acetabulo* *coxa, adeo ut* *acetabuli va-* *cuius sinus de-* *prehendatur.* *ὑπερῖον.* *\*intercolle-* *ctus.* *\*abscessu.*

tanquam serpentis\* conuolutus motus: aliquādo etiam  
 cum febribus, ut neque in lecto suā\* conuentionem fer-  
 re ualeant egrotantes, & primo, in uertebro dolor  
 sentitur, dehinc partis suae\* penetrans loca, usque ad  
 mediam natem, ac superius ad inguen, uel ad\* ancalen  
 perueniens atque suram, dehinc etiam talum, & pedis  
 summitatem. Tum cum passio tardauerit, cessante nu-  
 trimento, cruris totius tenuitas fit, quam Græci atro-  
 phian uocant, incipiens à clunibus, siue ab inferioribus  
 locis, attestante debilitate, & sæpe conductis partibus  
 breuitate cruris, aut ultra naturam, longitudine pas-  
 sionis,\* distensione suffecta, ut in paraly sin ueniat, aut  
 ipsius uertebri duratæ partes extantiores fiant. Con-  
 stringitur præterea sæpe ac retinetur uentris officiū,  
 aut cum plurimo dolore perficitur, ob tensionem, atq;  
 spiritus retenti percussum, & in\* itineris pressu, qui-  
 bus\* forte\* permittitur, ut initia motus impediuntur,  
 feruore partium attestante:\* ac si perseverans feruor  
 fuerit,\* motus facilior fit.\* Tum rursus subsidunt, uel  
 intenti resistunt repente, tanquam fuerant\* necdum  
 gressu tentato,\* Tunc magis uehementem dolorem  
 sentiunt: & ambulant quidam, capitibus digitorum  
 gradientes, alij extenti quidem, sed\* sinuatis clunibus,  
 ut neq; se pronos inclinare ualeant: alij contracti at-  
 que conducti, qui peius omnibus habere noscuntur: si-  
 quidem passio apprehendit etiam spinæ musculos, &  
 propterea duritia quadam hæc inuasisse uidetur loca.  
 Patitur autem principaliter membrana quæ ossa cir-  
 cuntegit, quam Græci periosteon uocant: item muscu-  
 lorum capita, uel summitates. Denique augmento pas-  
 sionis\* intercreatus humor, & frequenti dolore cor-  
 ruptus, in saniem transiens partes aliquas\* collectio-  
 nibus

nibus afficit. Sed quoniam plurima supradictorum sequuntur etiam eas quæ matricis uexatione afficiuntur, & magis cum eius fuerit inclinatio facta, quam paracelis in uocant, facienda est discretio passionum: & primo, quod matrice patiente in eadem potius causæ inueniantur, atq; ex ipsa initium sumant, \* Psoadici uero clunium dolore afficiuntur, & tardo motu, ut serenitente dolore nec inclinare ualeant, ac difficiliter & dolentius subrigant. Plurimis \* igitur dolor cito \* earum conquiescit: aliquibus uero perseuerat: partes durefcunt atque conducuntur: his deniq; \* usq; ad pene \* pene usq; ad cutem unus sequetur gressus. Si itaque exteriores muscoli fuerint in passione constituti, etiam tactu tentati dolescent, interiores autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquam in nephriticis contingit: quos propterea deniq; similes discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrunt, quæ de ipsis scribentes memorauimus. Psoadici autem, atq; ischiadici, quorum nunc curationem scribimus dolor efficitur nunc iugis, nunc deficiens, ordinatus aut inordinatus, ac longis uel paruis interuallis recurrens, ac puris & limpidis lenimentorum uariatus spatius, aut mediocres reliquias seruans. Vtilem inquit \* Hippo- Dysenteria ischiadici utilis. crates ischiadici dysenteriam: Habet enim imitatio nis quiddam recorporationis faciundæ; quanquam plurima uexatione corpus afficere uideatur: item hæmorrhoidas, uel uarices, ut alij dicunt, laxamenti causa. esse ait Podasunt autem difficiles curatione magis, qui plurimo tempore fuerint passione uexati, & multis atq; uariis accidentibus & signis affecti. In ordine itaq; curationis hæc erunt intuenta, ut cum recens fuerit passio uel ueterata, sed in superpositionis tempore constituta, ia-

cere faciamus ægrotantem mollioribus stramentis, calido in loco, adhibita abstinencia, & requie usque ad  
 \* *non succidi* primam diatriton. Tunc lanis mollibus, ac \* limpidis  
 oleo calido dulci præinctis dolentia loca cõtenda.  
 Adhibenda etiam fomentatio iugis ex oleo dulci calido: item uaporationum commutatio, sicut in multis docuimus scribentes, & phlebotomia tempore consueto, atq; ex brachio dolenti parti contrario, uel plurimum dolenti comparatione alterius. Ac si æqualis in utraq; fuerit parte dolor, ex eo in quo fuerit facilior uena, erit detractio facienda. Si neq; hoc occurrerit, ex sinistro brachio adiutorium adhibendum: si quidem  
 ex auri. minus officiis domini necessaria pars esse uidetur, nisi forte sinistri, hoc est scæi fuerint ægrotâtes. Tum tertia die adhibenda perunctio ex oleo dulci atq; calido: dehinc ora lauanda, cibus dandus nutritibilis, calidus, tener, tanquam stricturæ conueniens, & potui aqua calida usq; ad declinationis tempus. Seruanda etiam cibi alterna dierum oblatio: tum cessante dolore resumptio adhibenda. Perseuerante uero \* alia diatriti tempore, adhibenda iniectio decoctione scæni græci seminis, aut lini, aut hybisci, quam Græci althæan uocant, quo pariter fota atq; uaporata interiora laxamento consentiant. Admiscendum deniq; oleum calidum: item succus alicæ, uel ptisanæ, uel oleû solum, aut admixto adipe anserino, uel gallinaceo iniiciendum, uel iis quicquam simile cõsolutum. Ac si uenter fuerit abstentus, erit mulsum iniiciendum. Tentanda deniq; & \* *procuranda* prope-  
 \* *agrestem* randa sequentibus diebus facilitas uentris. Quo conuenit, si hoc minime perficere ualuerimus, etiam lino zostin herbam nunc solam cibo dare, nunc adiuncta maluatitē \* agreste coliculû. Sed fõgienda prædicimus  
 quæcun

quæcunq; fuerint uehementiora; quantum quidem res  
admittunt, ut diagridium, helleborum nigrum, chamæ-  
lee semen, quod Græci coccum Cnidium uocant, aga-  
ricum, agrestem peponem, quem \* colocyntida dicunt,  
singularia uel coniuncta, item hieram, quam diascam-  
monias appellant, ne plurima uexatio pro parua com-  
moditate sequatur. Nam post fomenta conuenit cata-  
plasmata adhibere, quorum constitutiones atque spe-  
cies sæpe conscripsimus. Ac si permanserit dolor, adhi-  
benda scatificatio. Hirudines etiam adhibendæ, quas  
Græci bdellas appellant. Hoc quidem secundo uel ter-  
tio faciendum, si causæ poposcerint. Tunc uaporatio  
spongiarum ex aqua calida, uel aliqua decoctione \* la-  
xatiua uirtute mitigantium materiarum adhibenda,  
quarum iam sæpe species memorauimus. Ex ipsis quoq;  
encathismata facienda. Item ecrotaria dolentibus ap-  
ponenda partibus ex oleo pingui, uel cyprino, aut  
sicyonio, uel ex radice hybisci confecto, aut irino, aut  
malabatrino, singularibus, atq; commixtis. Ac si duri-  
tia emerferit, \* admiscendum adipem, aut medullam  
ceruinam, uel bubulam, aut melilotum, aut hybisci ra-  
dicem percoctam in mulsæ, ac diligenter cōtritæ, aut  
decoctionem eiusdem hybisci, uel fœnigræci, & lini  
seminis triti, in mellis crassitudinem confecti. Ac si dif-  
ficile passionem declinare uiderimus, erit embasis ad-  
hibenda ex oleo, & aqua calidis. Tum cum fuerit plu-  
rimum minutus dolor, uariis offerendus est cibus, ex  
mediæ qualitatis materia. Adhibendum etiam laua-  
crum, dehinc lene uinum: tum malagmata partibus in  
passione constitutis, ut Diachylon, uel Mnaseum, aut  
\* Dioxcleum, uel \* Nileos: item unctiones quæ mitigan-  
ter emolliant, & neq; perfrigescere partes permittat,

\* colocynthida  
ἰσὴ δισκον  
μυρίας.

βδέλλα.

\* laxatiua  
uirtutu.

ἰσχυρὰ μαλακὰ,

\* admiscere  
oportet

ἐμβασίς. 1 1

\* describitur  
ab Aetio pag.  
819.

\* Nilei

cerotaria quoq; limpida, aut Diasamsucum decopum, aut irinum oleum aut samsucinum. Ac si passio fuerit tarditate inueterata, & plurimo tempore perseuerans, & in lenimento constituta, si hoc limpidum uiderimus lenimentum, erit pro modo permanentis doloris curationis facienda moderatio: Tunc enim conuenit motus quidem, sed fertorio lecto, dehinc cathedra uel \* sella usq; ad inanem penetrādus, sicut in phlebotomandis facimus: sed ab umbilico inferius iis qui leuius afficiuntur, praeuidentes uenarum diuisiones: ac deinde muliebri \* catethere liquorem detrahimus, qui saepe aquosus, saepe fuluus, aut sanguinolentus, uel spumofus excluditur: quod quidem etiam ante factam diuisionem pleriq; futurum signis apprehendere uoluerunt. Quorum alij talem fore dixerunt, qualis urina fuerit egrotantis: alij qualis color apparuerit cutis: alij quolibet uiscere patiente, sanguinolentum: non patiente uero, ex causa auidissimi potus hydropismo concepto, uel \* salis potu mundum atq; perspicuum liquorem fore. Sed haec praeter quod falsissimae sunt opinionis, etiam ad \* mutationem chirurgiae inutiliter quaesita uidentur, nisi solum quod recte probamus, per catethera liquore, \* si res patiuntur, semel atq; eodem tempore omnem auferendum. Sin uero aliqua obstiterint, post primam detractionem motarium aqua infusum supra diuisionem res \* implicantes, spongiam desuper mollem apponimus, ac deinde leui fasciola amplexo loco paululum differimus, quo turbatio corporis resoluatur: ac deinde resumpto egrotante eodem die residuum detrahimus humorem: sin minus, alia die, manibus comprimentes subiectas partes, congrue egrotante locato, hoc est schemate competenti. Ac  
 si forte

\* sella. Est autem venter in Paracentesi usq; Hae trās ferida sunt in pag. 440.  
 la indig.

\* fistula quae uesica mulierū inditur prolicienda urinae causa. Est autē breuior quā quae peni uirorum inditur.

\* aquae salae ut pag. 430.

\* imitationem inuentionem

\* si vires. Nam cum grauis morbus est, aquarū euacuatione vires aegri iam inuolide ob morbi rehemētiā, magis nō sunt labefactandae.

Aphorif. 27. lib. 6.

\* applicantes

si forte rursus confluyente humore fuerit repletus, uel uirium debilitas prohibuerit eodem tempore totum detrahi, tunc interiectis duobus diebus; uel quantum uires permiserint residuum detrahimus, sed alio in loco diuisuram facientes; uel si rursus oportuerit, tertio. Etenim prima diuisura seruata distans, aut coherens & \* soluta tumores uel consensus ingerit uehementes. Tum perfecta humoris detractione neque abstinentia \* utemur, ut Asclepiades, neque plurimum damus cibum, sed pro modo uirium, etenim abstinentia omni ex parte adhibita uires uexat: quippe post plurimam detractionem: multi item oblatio cibi grauans opprimit corpus potius, quam resumit. Erunt autem ante cibum sensim perungendi, atq; reficiendi facilibus, & \* poto sufficienti, ac si dolores aliqui emerferint, uaporationibus soluendi, atq; cataplasmatibus mitigandi. Tunc indulgentia relaxatis doloribus uel forte non emergentibus, adhibemus ea quæ tumorem fieri non sinant, & superimpositis spongiis conligamus. Transacto tumoris metu, magis uentris \* folliculum & \* cutem intestinis cogimur \* adserere, atq; similiter cætera quæ in tumore fuerant constituta, ut nuper docuimus. Aegrotantes præterea nauicula exerceri hortamur, & paulatim recorporatiuæ subiicimus curationi. Ac si neq; ita fuerint resoluti, utemur helleboro iisdem curationibus insistentes, donec corpus repetat fortitudo, atq; densior uel coacta caro noscatur attestante rubore. Hæc est secundum methodum hydropum curatio. Plurimi autem earum sectarum principes, atq; nostræ ueteres, nihil ueri curantes, ac magis contemptu quodam \* astruções corporum aspernantes, solius detrahendi humoris intentione tra-

\* diducta, cū in eam rursus adigitur catether.

\* utimur, Asclepiades.

\* poto

\* peritonæum.  
\* epigastrium.  
\* adnouere.

\* constructio-  
nem.



ducti quoquo modo id perficiendum crediderunt, im-  
 mensa siti atq; fame ægros afficientes, corpore conca-  
 uo \*peſtine decurſo, & mille præterea urinalibus me-  
 dicaminibus, quæ diuretica uocant ueficam commonen-  
 dam probant, & uentriſuis potionibus quæ catharti-  
 ca appellant, uentrem prouocandum dicunt, cocco  
 Cnidio, atq; \*lepida cyprina, & chamaelea, & hippo-  
 phae herba & ex crotonibus coſectio oleo cicino, itē  
 \*neoro ex quibus cunctis ſtomachus uexatur, atque  
 cibi appetitum amittit, ſitis incenditur, corpus de-  
 fluit, ſanguis corrumpitur, atq; humor detractus re-  
 naſcitur, uires auferuntur: ſiquidem neq; poteſtas mo-  
 derandæ detractiōis eſt in artiſicis manu. Quidam  
 tanquam ſiccabilem humoris ophiten lapidem ligaue-  
 runt expertis ægrorum ſalutem credentes. Singula-  
 tim deniq; nobilium medicorum hiftoriam ordinemus.  
 Herodicus igitur, ut Aſclepiades memorat, uentris  
 adhibet purgationem, atque poſt coenam uomitus, qui  
 ſunt implebiles potius quàm ſiccabiles: tum uapora-  
 tionibus tepidis aceti decocti exhalatione coſectis  
 utitur, uel aquæ marinæ, admixta thalia herba, atque  
 hyſſopo, & his ſimilibus, ueficis bubulis repletis, cor-  
 pus uaporandum probat, uel aliis quibuſq; maioribus  
 \*inflat, tumentia loca pulſari iubet. Sic etiam anti-  
 quiſſimus Euryphon. Hippocrates uero libris, quos ad  
 ſententias Cnidias ſcripſit, magis utendum dicit \*ege-  
 ſtate atq; uaporatione, & continentia, & danda ſicca  
 uel arida quæq; & acriora mādenda. \*Si enim æquibi-  
 lus æger fiat, hoc eſt, urina facilior, ac ſi ſpiratio diffi-  
 cilis fuerit, quā dyspnœan uocant, & tēpus \*aſtatis, &  
 æſtas media, dicit ex brachio plebotomādos, & poſt  
 detractiōnē factā dat panem calidū uino infuſum atq;  
 oleo

\* ſtrigile: ut  
 pag. 481. Sic  
 decurrere ca-  
 pillum dixit  
 pag. 279.  
 διαρρίπναι.  
 Vrnalia.  
 καταρρίπναι.  
 Ventriflua.  
 ἡλατορ ὑπεριον  
 ἡ λευκώρυον.  
 \* lepida cy-  
 pria. i. Squa-  
 ma æti cyprij.  
 \* Cneoro  
 Ophi.  
 Herodicus.  
 \* ueficis  
 \* ταλαιπω-  
 ρας: πυρρις:  
 εὐρυφώνης.  
 Euryphon.  
 Hippocrates.  
 \* Sic enim τα-  
 λαιπύριος æger  
 fit, & vrina,  
 facillima. At  
 ſi ſpiratio.  
 οὐτὸν γὰρ δύρε-  
 τικώτερος ἔστι,  
 καὶ μάλλον  
 ἀσχετός.  
 \* uernum, &  
 atati vigor,  
 & uirium ro-  
 bur, dicit à  
 Greco

oleo, & carnem suillā ex aceto decoctā. Dat etiā cantharidas tres detracto capite, & pedibus, & \*pinnis \* aliis in tribus cyathis aquæ cūtritas: sed neq; quo tempore exercitio utendum sit manifestat, neq; usq; quo mandenda sint acriora, uel quando uaporationes adhibenda. Dehinc si phlebotomare oportuerit, non solum aestiuo tempore, ac media æstate, sed etiam omni tempore atq; ætati conuenire phlebotomiam probamus. Est præterea importunum uinū, ac repugnans eo tempore commodis phlebotomiæ. Item cantharides humorem commouent: carnis quoq; offerendæ tempus significare neglexit. Diocles libro quo de passionibus & causis, & curationibus scripsit, siccādos inquit, ac medicriter uaporādos, & deambulationi tradendos ægotātes, & plurimos sudores commouendos, \* uel uomitum & urinam \* prouocandam diagridio, & apij semine resolutō succo herbæ saluiæ. Itē cardamomum; quantum uentrem ualeat semel deducere, & in aceto panem solutū, & piscem salsum dandum uel pisces elixos & assos, uel silurum piscem, olera, radices, alliū, origanū, rutā, satureiam, uinum album, & nō aquatū, & ferarū carnem; in deambulationibus \* uentrē iubet contineri, ceteras corporis partes defricari, exceptis cruribus. Sed hic quoq; communi ceterorū subiicitur \* accessioni: solum prædamnamus, quod humorem detrahens purgatiuis atq; urinilibus medicaminibus, & uomitu, & sudoribus prouocatis, quibus ex rebus sudor mouendus sit tacuerit, uel uomitus. Item deambulatio sepe laboriosa, & piscis silurus bromosus, & allium instabile, & plurima ferarū carniū malos habere succos probantur. Inde item quæ sint olera deligenda memorare neglexit, & neque fortificari

Diocles.

\* uentrem  
 \* prouocandam: ac uentrem Diagridio, quantum ualeat semel deducere uomitū Cardamo: urinam Apij semine resolutō succo herbæ Saluiæ  
 \* ægrum  
 \* accusationi

\* venter si-  
catione  
\* cuius  
Praxagoras.  
κῶνος τρεβῶλης  
λαγρίς.  
\* tumorē &  
habitum corpo-  
ris minuit.  
\* omphacome-  
lite  
\* sunt  
\* Itaque in po-  
tu repugnat:  
dat enim mor-  
dicatiuū acetū  
\* Idem  
\* uentri-  
ficationem, uel crura, aut totum corpus recte  
potest, \* cum nullum modum uel tempus memorauit.  
Praxagoras secundo libro Curationum cataplasmati-  
bus utitur, & malagmatibus sudorem mouentibus, &  
urinalibus medicamentis aliis atq; aliis, & uentrē de-  
ducentibus. Simuliter cono, & foliis hederae, & semi-  
ne coliculi agrestis, aut nasturtij, aut centaurea, uel al-  
lio, pipere, & pseudodictamno, aut dauco, & chamae-  
pity herba, & petroselinum semine, uel radice grami-  
nis, uel quolibet horum similium, & sudorum diuina  
promocatione corpus \* deducit. Vtitur uomitu non so-  
lum ieiuno, uerum etiam post uespertinum cium, &  
egros plurimū potat, ex quibus sensuales uiae imple-  
ntur. Vtitur etiā cataplasmatibus aromaticis, quorum  
species non designat, sed solum cum \* moromeli, uel li-  
ni semine adhiberi iubet, uel malis cydoniis, aut cari-  
cis, uel adipe, & aqua, aut uiae lupinae, uel appij succo:  
equidem uirtutis repugnatione omnia confundens: si-  
quidem alia \* sint constrictiua, ut mala, alia laxatiua,  
ut plurima ceterarū specierum. Deinde post oris col-  
lutionem sorbiles dat cibos, quibus uentrem facilem se  
facere pollicetur. \* Item potum repugnante mordica-  
tuo: dat enim acetū uel puscā, uel his rursus contra-  
ria, ut mulsam, quibus confusa regula etiam secundum  
ipsum approbatur. Erasistratus libro quo de hydropse  
scripsit, de ambulatione ordinata adhibendam prius quā  
aëris aestus ardescat, tanquam in aestate solum curans.  
Sed si uentris, inquit, acilias non fuerit prohibenda  
medicamina, atq; legumina, & olera, cum sint plurima  
olerum quae molliant uentrem, sine ulla corporis uexa-  
tione. \* Item plurimū cibo egros nutriendos probat,  
cum sit ex paruo sepe indigestionis metus ac si neque,  
inquit,

inquit, uenter fuerit motus, adhibendum clysterē simplicem, hoc est, qui nulla sit acriori materia confectus: cibum partitur \* cibo uel cœna, & ante uesperā egros deambulatione moueri iubet: \* Tunc initio noctis reficit, quando etiam sanis metus est digerendi. Post cibum præterea perungit in lectulo, & certo numero utitur fricationum: dat catapotia medicaminum ante utranq; cibi refectionē in † faui modū pro uiribus egrotantis, † fabe neq; plus decē, neq; minus quinq; numero, & corū materiā tacet, solum memorat quod iccorosis hæc catapotia congrua uideantur, atq; ad urinales partes uenientia plurimum faciant mictum: Tum post catapotia dari iubet cibo panē ex farina sesami, & \* salsum, obdulcatū, ne sitim faciat, non discernens tempus drimiphagiæ: Tum inquit dandos pisces, atq; carnem gallinarū, uel ferarum, & agnorum, & hœdorum, & sorbilia plurima cū melle uel lacte, non aduertens lactis & mellis qualitatem in corruptionē facile uenire: \* nūc dat potū paruum, & non post prandiū, sed post uespertinū cibum hoc cōuenire dicit, ut etiam similiter memorat Philistionis frater. Probat etiam ante alios cibos accipienda \* aridi fici pingua duo uel tria, mox contusa atq; oleo tincta. Sed hæc omnino digestionē difficilia iudicantur. Prohibet præterea lauacrum, uel plurimum tēporis interuallo permittit, & non designat, quod illud, uel quantum sit tempus. Vtitur etiam malagmatibus & cataplasmatibus, cum somno cubauerint egrotantes, nec tamen designat eos, qui coaceruatā ac uehementem humoris detractionem reprobāt, quā Græci cenosin uocant, & propterea etiam paracentesin, quod quidē \* congrue dictum superius docuimus. Item timore in iccore constituto, attestantibus febribus,

\* prandio &  
\* idem tum

† fabe

λαϊπρωϊα  
urinalia.  
\* sale obdul-  
catum i. con-  
ditum vi pag.  
448.

\* dat etiam  
potum.

Philistionis  
frater  
\* arida fica.  
pinguia duo  
uel tria vi su-  
pra

λιουσις.  
ωρακνισις.  
\* incongruē

ob tumoris medelam cataplasmatibus utitur ex malis cum uino, constringens ea quæ laxamentum poscere uidentur, & ob digestionem faciendam ex ficu atque chamælea & chamæpity utitur cataplasmatibus. Item

ad eliciendum quicquam in \*locis constitutum utitur Diapegano, quod ex \*ruta cōficitur, & nihil de tem-

poribus memorat adiutoriorū. Asclepiades etiam libro quo de hydropse scripsit paruo humore collecto,

sive plurimo, necdum tamen pedibus aut cruribus infuso, athletarum regulam adhibendam probat, ex plurima deambulatione, atq; cursu, & \*refricatione re-

tento spiritu: Tunc cibo dandū panem diligenter elaboratum, atq; \*exercitum, cum piscibus natura duris.

At si inferiores humor occupauerit partes, plurimos prohibet motus, & medicamina uentrisflua atq; urinaria. Utitur autē paracentesi, sed omnino ex angusto

atq; paruo foramine. In leucophlegmatia uero fricationes adhibet & cataplasmata frigerātia ex malo cy-

donio, & murra, & uitis anulis, quos helicas uocant, & malo punico, & lēticula, & \*herbo, atq; pulento

ueteri, & alumine, uel ruta, & bulbo, & melle, & origano, & thymo, & nitro, & caricis: & ex \*uesicis

illisionem adhibendā probat. Laudat etiā punctiōnem quatuor digitis à talo distantē, faciendā superius, ab in-

teriore parte, sicut in phlebotomia seruatur, ut per eandē punctiōnē humore effuso corpora releuētur: si

minus, scarificatione altiore utendum referēs, scilicet uehemētiorē atq; efficaci adiutorio, & neq; declinās

uulnerationes, quæ necessariò in huiusmodi passiōib. difficiles curatione probātur. Socrates Chirurgus om-

ni ex parte diuisuras faciens easdē \*adusit, ex templo corporis ingerens raptum, quē Græci spasmon appel-

lant.

\*locis interio-  
ribus constri-  
ctum.

Diapeganū.

Asclepiades.

\*Actium pag.

§ 45. describit

Malagma ē

Ruta.

\*defricatio-

ne: ut paulo

post.

\*subactum.

διωκτικὰ  
φάρμακα.

ἰλίκαι.

\*crudo

\*planis deco-

cto herbarum

discentium,

ut pag. 502.

\*adurit

Socrates chi-

urgus.

Lant. Themison secūdo libro Tardarū passiōnū utitur Themison.  
 gestatione, & defricatione, atq; exercitio, uel cōmu-  
 niter regula exercibili, salibus ac nitro fricās corpus,  
 & frigida perfundens: ex quibus \* nō equaliter adfi- \* inaequaliter  
 cit: quippe cum membra interpositis etiam tribus uel \* Idem  
 quatuor diebus aqua marina feruenti perfundat. \* Itē  
 iubet post gestationem tribus uel quatuor cyathis uini  
 mixti agrotātes potari sumptis nutrimentis digestione  
 difficilibus. In ordine, inquit, medicaminū, nō designās  
 quem esse uelit ordinē medicaminū, aut quae nutrimen-  
 ta digestione difficilia. In nespertino inquit cibo uten-  
 dum, mediocri potu, ut nec sitis egros afficiat, neq; plu-  
 rima liquoris \* ingestio, sed uinū \* eligat acrioris uir- \* infusio  
 tutis, & neq; \* confusum. Sed temperādi moderationē \* eligendum  
 tacet, \* ut mediocriter quidē dicat, quod est improprie \* Quidā legūe  
 dictū: etenim \* extendit temperādi moderatio neruos, aqua cōfusum.  
 nocet, & ingerit sitim. Prohibet praeerea idē uentri- \* licet  
 flua medicamina atq; urinalia, quae cathartica atq; diu- \* vini tempe-  
 retica uocāt, & per singulos mēses ternos radicū or- randi neglecta  
 dinat uomitus. Sed erat regulae medicinali conueniens moderatio ner-  
 ad lenimentorū latitudinē, siue spatiū, uomituum desi- uis nocet.  
 gnare quantitatē. Vtitur etiā in utroq; talo scarifica-  
 tione, ut Asclepiades. In ascite uero initium ex uomitu  
 sumit, quem helleboro faciendum probat, si, inquit, me-  
 tuerit quisquā radicū uomitū, \* & est praiceps, atq;  
 ut ita dixerim, periculosum nō \* medicatū corpus ma-  
 gno adiutorio \* discere. Aliā quoq; regulā similē dicit  
 ordinandā, sed passiōis initio neq; unguētis tangi, neq;  
 fricari uētrē permittit. Ceteras autē corporis partes  
 si multa, inquit, fuerit humoris infusio, \* defricādas, ini-  
 tiū ex uētris finib. augēdū curationis modū: sed opor-  
 tebat ob equandum, corpus totum fricatione curari.

Item

Item interpositis quatuor uel quinque diebus aqua calida, & magis marina, tribus uel quatuor uasculis foueri uentrem iubet sed neque hoc æqualiter. Item ante unctionem utitur sinapismo: post singulas gestationes  
 \*scyllam lambendam dicit\* scillam in electarij uicem: & si plurima fuerit humoris infusio, utitur paracætesi. Sed primo die, si uires patiuntur, abstinet cibo. Quod si minime ferre potuerint ægotantes, partem tertiam panis solitæ quantitatis aqua infusam offerendam dicit. Tum alia die articulos ungens, atque ora lauans, simili panis reficit modo, cum pulmento uolantum, cæteris quoque diebus omni æqualitate augens, atque ægros resumens.

*Thessalus & ventri Malagma imponit  
 \*Videtur aliquid deesse, ut fortasse sit legendum: Vtetur etiam emplastris tanquam Apollopheo aut diaeuphorbio.*

*\*Hæc iam pertinent ad ischiadis curationem.*

*\*salis*

*\*meatus  
 lacrymæ.  
 quædam.*

Thessalus autem secundo libro Regulari plurima Themisonis similiter probat, sed quinque uel tribus cyathis uini aqua temperati, ante cibum potat ægotantes, & paracentesim prohibet, \*tanquam Apollopheo, aut Diacuphorbium. \* Vtile plerique ueteres huic passioni etiam Macerinum emplastrum memorant, item Icesion usque ad quinque dies imposita linquentes, laudauerunt. Conuenit recorporationi etiam \*solis igniti uaporatio. Oportet autem sacculum lineum implere sale torrido, & apponere patientibus partibus. Tunc superaspergere aquam salsam calidam, & superimponere cauteris latos, aut igne repletum uas congruæ latitudinis. Sic enim calefacto sacculo instillans humor, & cum feruore acerrimo decedens, atque \*artus singulos inuadens, quos Græci poros appellant, laceffendo demutant, recorporatiua sine dubio uirtute. Facit enim tanquam de sinapismo partium ruborem, quem Græci phœnigmon appellat. Prodest denique etiam ex oleo rubor effectus hoc genere. Farina conspersa, atque manibus exercitata,

quo



quo facilius fiat, erunt partes in passione constitutæ  
circulatim ambiendæ, cuius spatium, siue medium oleo  
replendū. Tunc cauterēs longi atque igniti immitten-  
di, qui quidem cutem tangere minime debent: Hoc fa-  
ciendum alterna uice, donec oleum calefactum seruo-  
rem corpori tradat. Iubendum præterea ægrotanti,  
ut se immobilem præbeat, cum oleum summo seruore

\* coierit, ne se mutando adurat. Tentandum denique

etiam cauterēs sine olei motu submittere, atque \* la-

uare supposita spōgia \* statim, ne distillatione cauteris

uicinæ partes adurantur. Tum cum mediocrem sense-

ria æger \* uestionem, ei uas erit supponendum, uel ad-

iungendum, ut se repente inclinando unam faciat olei

refusionem, ne uicinantia uista pustulentur: Alij cacca-

buli, uel uasis fictilis fundum perforantes, labia uel ora

pertusuræ patientibus locis adfixerunt, supradictō mo-

re farina \* conspersa circundantes, sic oleo caccabu-

lum impleuerunt, cætera supradictō ordine gerentes:

Alij usque ad uestionem \* uaporibus igneis usi sunt: Alij

diuersis generibus pustulationem locorum faciendam

probauerunt, uel \* extemplo escharas patientibus \* in-

gesserunt partibus: aliquando solo sinapi cataplas-

mantes, quo superficies cutis pustulescat: itē sinapi ad-

miscentes glebæ calcis æquis ponderibus & sulphuris

partem, atque simul conterentes, paruo oleo & aqua

admixta linteolo illita, prostrato alio linteolo tenui,

ei parti quam curamus superimponemus illitum, quo

sensim atque per \* triplicem materiam transiens uis

medicaminis pustulationem faciat loci. Item Non ali-

ter etiam ex cinere salicis hæc facere poterimus. Eius

enim corticem inurentes, atque ex eius cinere puluis-

culum facientes in umbra siccari sinimus, tunc locis

\* præulc

\* caluerit

\* leuare.

\* excipiendo

olee quod can-

terium subla-

tum secum au-

fert.

\* olei seruientis

\* aqua suba-

ta quam nul-

go pastam di-

cunt

\* cauteribus:

Alij uapores

& flammæ

igni

\* quemadmo-

dum sarmentis

fit altera par-

te incensis

\* sinapi calcē

ισχάλα.

\* inurentes

sulphur.

\* antea scari  
ficati: alij pra  
cerati.

\* liximum cui  
addita calx  
est. *apollon*  
vocat Pau  
lus lib. 7. *A*  
lij *τὰν τῶν δὴν*  
*θυμῶν*

Colata calx.  
\* carboneſcūt,  
ut paulo poſt.  
Alij ardeſcūt.

\* id ex radice  
*Aristolochia*  
facit *Aegineta*  
\* oliuares vul  
go ducunt.  
Cauteres for  
ma *τ. γ.*

\* hamis  
\* ea ſub anchi  
ſtra *ἀνχίς*

\* ſublata obii  
ciunt, & ven  
dam offerunt.

\* iſchias vocat  
Paulus c. 49.  
& 50. lib. 6.

\* inferius  
\* reduplicatū  
\* tum tabula  
tiliarem

\* ferramento  
prehēſas ſingu  
las partes, o  
leoq; tinctas,  
& accenſas

\* tiliari.

\* praeulceratis adponimus, super distillantes \* liquefa  
ctam calcem, quam uulgo colatam uocant, sed paula  
tim: cum enim fuerint humectati pulvisculi cutis su  
perficiem pustulabunt. Quod si quisquam plurimum  
perseuerauerit, etiam altiora iniusta \* putrescunt, &  
ut Graeci appellant escharam faciunt. Alij denique ex  
radice herbae, quam struthium \* uocant, loca ulcerari  
praecipunt: Vsta etenim radix, concepta flamma, cuti  
apposita pustulationem necessario facit. Sed alij hanc  
ustionem tanquam imbecilem reprobantes cauteribus  
aiunt faciendam: quos quidem primo tepidos probant  
apponendos, donec cutis pustuletur, tum igneos: sed ijs  
omnibus interiecto spatio trium digitorum loca dicunt  
inurenda, & esse cauteris semper aduncos in modum  
\* gamma literae. Sed alij hanc appositionem metuentes  
\* anchistris ex utraque parte cutem \* pretendunt, &  
inter \* eos cauteris imponunt, ne ulla ustione nervi  
tangantur. Alij ligneos \* fungos interius ac superius  
angustos formantes, patientibus apponunt locis, quos  
summitate accensos sinunt concremari, donec cineres  
cant atque sponte decidant. Est enim haec ustio leni pe  
netratione moderata. Alij linteolum aqua tingentes  
partibus \* resimplicatum apponunt, \* Tunc tabulae ti  
liari apponentes struthium herbam concidunt in bre  
ues perticulas, ac deinde ferramento \* igneo singu  
las partes oleo tingentes accensas imponunt tabulae  
scilicet \* tiliae, hoc secundo uel tertio facientes per in  
terualla, donec materia carboneſcat, atq; pustulas cu  
tis efficiat. Alij, ex quibus sunt Demetrii sectatores,  
eius partis quae patitur manum, inter pollicem & de  
monstratiuum digitum, quem Graeci lichanon siue di

Demetrii sectatores. Digitus *λίχανον* uel *ἀνχίς*. Index.

Alicon

Eticon appellant iuxta inferiorem articulum \* inuolutis \* ignitis. Alij  
 inurunt cauteribus quos quidem nunc nude cuti appo- <sup>inuolutam.</sup>  
 nunt, nunc præmisso linteolo oleo tinctos: modum autem  
 ustionis constituunt, cum in alia manu, hoc est quæ sit  
 contraria parti patienti, sudor emergens apparuerit,  
 tum post supradictas ustiones imperant ulcera \* re- \* reserata  
 seruata in saniem prouocari, Alij denique \* statim lana \* ut facta est  
 succida eadem contexerunt loca. Alij marrubij coma <sup>ustio</sup>  
 contrita cum sale uel oliua nigra, aut \* sesamo infuso, \* sesami  
 siue nucibus: tum tertia die lenticula multa, atque muljo <sup>διωμύλα.</sup>  
 decocta, donec ulceris cadat eschara. Tunc ænomeli  
 aiunt imponendum, uel ea quæ ualeant laceffendo pu-  
 ris exitum prouocare: item florem æris cum nigro hel-  
 leboro apponunt. Et quidem aliqui releuantur inter-  
 uenientis recorporationis causa. Sed quoniam istius-  
 modi ustionibus plurima uexatio coniuncta est, erit  
 melius alijs adiutoriis mederi. Ausi sunt præterea qui-  
 dam etiam Venerem adhibere, in iis qui non ex usu ue-  
 nereio ischiadici facti uidentur, quo magis uexata, ner-  
 uositas geminet causam. Alij cantilenas adhibendas pro-  
 bauerunt, \* ut etiam Philistionis frater idem memorat \* et etiam  
 libro xxij. de adiutoriis, scribens quendam fistulatore <sup>\* incantasse</sup>  
 loca dolentia \* decantasse, quæ cum saltum sumerent <sup>\* mitescebant</sup>  
 palpitando, discusso dolore \* mitescerent. Alij denique <sup>Philistionis</sup>  
 hoc adiutorij genus Pithagoram memorant inuenisse: <sup>frater.</sup> Pythagoras.  
 sed Sorani iudicio uidentur hi mentis uanitate iactari,  
 qui modulis et cantilena passionis robur excludi pos-  
 se crediderunt. Item plurimi ex talo atque \* ancala \* poplite  
 eiusdem partis quæ fuerit passione possessa, uenam di- <sup>ἀγκάλα.</sup>  
 uidentes sanguinem detraxerunt: sed magis partes im-  
 pletæ grauantur, cum repente uacuata loca in semet  
 materie fluxum inuitant. Nobilium uero principum  
 Hippoc

- Hippocrates.* Hippocrates libro quo de locis cōscripsit, cucurbitam iubet sine scarificatione apponi. Vtitur etiam seruentibus medicaminibus potis, quæ si essent uerè congrua passioni, minimè tamen ad excludendam uetustatem ualere crederentur.
- Diocles.* Diocles libro quo de passionibus atque causis & curationibus scripsit: item secundo libro de curationibus, regulam dixit siccam, & frigidam, & nutribilem aegris conuenire, cum humida atque calida prodesse huic passioni demonstra-uerimus. Vtitur etiam urinalibus medicamentis, quæ diuretica appellauit, & probat conditum bibendum, quod plerique Latini mulsum uocant. Vtitur etiam cibo è uisceribus asinorum, & clysteribus sanguinem prouocantibus, & uino nunc albo, nunc nigro, neque ordinis, neque temporum, neque congruæ qualitatis memor. Themison secundo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare perspicitur, phleboto-mans talum uel ancalen, atque lanis succidis cum oleo
- Themison.* & aceto, & sale statim patientia contegens loca, articulos adstringens, & intestina per clysterem \* exulcerans, & os ipsum quod ischion Græci uocant. Ante hæc omnia, & equitare imperat egrotantes, quo magis ob uehementiam motus partium faciat uexationem: item alternis sinapizat diebus, quod est immoderatum, & in omnibus ulcerationem cutis existimat faciendam, qua plurima congrua prohibentur adiutoria adhiberi, cum partes ulceratæ apposita tolerare non possint. Thessalus uerò uaporationem faciendam improbè recusauit. Est enim recorporatiuæ uirtutis, neque initio rectè constrictiua probat adhibenda. Et enim ischiadica passio uehementi atque difficili strictura confecta perspicitur.

De articulorum passione, quam Græci arthritin vocant, & de pedum dolore, quem podagram appellant. Cap. II.

**V** Traque passio à parte corporis quæ patitur, nomen accepit: altera communiter ab articulis omnibus, altera specialiter à pedibus. Sed podagram Græci etiam ab impedimento, uel retentione pedum aiunt nominatam, uel à ferali dolore, siquidem omne quod immitte fuerit abusive agreste uocamus. Earum *Agrestia quæ dicamus.* denique passionum discretio promptissima atque manifesta esse perspicitur. Nam podagra pedum tantummodo dolor est. Arthritis uero etiam cunctorum articulorum, siue multorum: & aliquando à pedibus sumens dolor exordiū cæteros articulos implicauit, aliquando in aliis incipiens pedes inuasit. Igitur quidam medici arthriticam passionem genus uocant podagricam *podágrā áμαρ θρίτις.* uero speciem. Etenim quod Græcis hamarthritis recte nuncupatur: siquidem sit in articulis dolor, quamquam in pedibus constitutus, arthritis uero non ilico podagra dici potest, siquidem genua uel manus tenens gonagra aut chiragra dicitur, uel tenontagra si maiores tenuerit nervos. Sed de his nominibus quæ locorum causa discreta uidentur, unius tamen esse uirtutis intelliguntur, in curationibus certandū non est. Sunt enim *Podagra græcis recte Arthritis nuncupatur, si quid sit in articulis γονάγρα. χιράγρα. τενοντάγρα.* harum passionū antecedentes causæ uariæ, ut uimolentia, frigus profundum, cruditas, libido uenerea, labor immodicus, uel repentina desertio solitæ exercitationis in ante actem morem: aut rursus non ex infantia, sed secunda & sera ætate affecta, cum molli-*\* cruditas* bus nervis atque insuetis fuerit illata quassatio: item percussio antecedens ex palestra, *\* ante actio* *\* affectus* *\* forte exercitium:* Alij uel *\* forte exercitium: Alij uel* quentat autem in uiris magis atque mediis ætatibus, dis-*forti exercitio.*

\* Aphor. 28.  
 & 29. lib. 6.  
 \* Podagra hæ  
 reditaria est.

Caria.

\* &  
 Alexandria.  
 \* Apho. 20.  
 b. 3.

\* atq; queris

ficile uero in mulieribus\* atq; in eunuchis, & pueris,  
 & iuuenibus fieri inuenitur. Videtur præterea plu-  
 rimis antiquis medicis etiam genuino cursu in poste-  
 ros migrare cum semine, & propterea succedentes  
 inuadere, de qua re principaliter Responsionum do-  
 cuimus libris: item per aliquas probatur frequentare  
 regiones, ut Cariam, & Alexandriam Aegypti uici-  
 nam, nec non temporibus certis nasci, \* item magis aspe-  
 rari uidetur, ut primo, \* uerno, secundo, autumnio, ter-  
 tio, hyeme, estate uero difficile. Sequitur autem pas-  
 sione articulari tētatos, torpor, atq; fornicatio eorū  
 articulorum qui tanguntur, & difficilis flexio, atque  
 rursum extensio: item grauedo & \* uacandi dulcedo,  
 & ad paruum motum uehemens labor, atq; dormien-  
 tibus sensus quidam resonātium articulorum, & cum  
 de somno surrexerint, ueluti saltu earundem partium  
 afficiūtur: tum horror, uel rigor, atq; tremor sine ulla  
 manifesta ratione partiū sequuntur. Dehinc cum pas-  
 sio se extollere cœperit, in podagricis dolor alterius  
 pedis, aut utriusq; cum pūctionibus nascitur, incipiēs à  
 uestigio aut plantæ cavitare, uel sæpius à maiore di-  
 gito, attestante torpore, & grauedine, & difficili  
 motu, cum horrore rigido, atq; inæquali per membra,  
 & aliquando plurimo seruire, aliquando frigore, ut  
 alij refrigerantia, alij calida desiderent egrotātes, &  
 propterea quidā alterā calidam, alterā frigidam po-  
 dagra putauerunt nuncupandam. Item initio, ut sæpe  
 contigit, similis color patientium atq; sanarū uidetur  
 partiū, atestante æqualitate, nullo emergente tumore.  
 Dehinc inflatio partiū fit cū rubore. Quapropter re-  
 leuatio altiorū sæpe\* sequetur. Tum peiorāte passio-  
 ne arthritica sufficitur passio, cū in unū omniū cogitur

\* sequitur

articu

articulorum cōsensus, & facile ex articulo in articulum uenit dolor, nec\* desinēs priusquā cunctos inuaserit nodos. Sæpe deniq; prioris articuli dolore declināte secundus inuaditur, atq; eodē similiter nāscēte tertius sumit exordiū, consentiente etiā uestica atq; spīne maioribus neruis, quos tenontas appellāt: & in stoma-  
cho etiā nausea uel uomitu iactātur egrotantes. Tunc articuli tumentes inflantur, ac deinde durescūt, & solidati saxeā faciunt qualitātē: tum etiam nigriores efficiuntur, atq; cōtorti, ut in obliquas partes digiti uertantur, aut reflexi supinentur, aut uicinis adfixi incubant, & aliquādo humore purulēto uel mucilento collecto, aut uiscofo generent poros, quos nos\* transitus dicere poterimus: dehinc etiā lapides\* sufficiant, qui quidē articulos soluāt, & cutem distendant, atq; erumpentes promineāt, & chirurgia detrahantur: aut exilientes\* cyathis, cum ferramento tollantur, quod nos\* laureolū dicere poterimus, & rursus renascantur. Tum membra dolentiū partium, cessante nutrimento, tenuata languescunt, & arida efficiuntur. Erunt præterea egrotantes paruis ex causis mobiles atq; iracundi, siquidem motū uel actum nō sine querela\* accipiāt. Principaliter autē hæc passio cōstituitur in neruis, uel eorū colligationibus, tum cætera morbo consentiunt, atq; cōtiguos uel superpositos lacertos, & maiores neruos pati demonstrāt. Est præterea passio nō facilis curatione, & aliquando magnitudine insanabilis, non ut pleriq; putant\* naturæ. Causæ autē difficillimæ curationis, uel ut sæpe contingit impossibilis, manifestæ atq; plurimæ reperiūtur. Est enim passio in neruis cōstituta qui\* sint natura densissimi, & inter articularū nodos cōstituti, quorum angustia cōprimuntur, & ad

\* desinē

τρίπτης.

\* topbos, legisse videtur. Aurelianus πόντος nō πόντος πόντος.

\* sufficiuntur \* ambiente articulum membrana

\* Laureolum.

\* Scalpreolū

σμίλιον,

\* accipiunt.

\* natura

\* sunt



omnem motū asperatur, magis in pedibus, hi enim plurimas cōligationes nodorū naturaliter habent, & totum corpus sustinendo \* laborat. Præterea hæc passio initio paruitatis causa negligitur, & cōtempta cōualefcit: quippe cū à multis minime credatur emergere. Alij deniq; digiti luxati, aliqui pedis uersionē, aliqui cuiusdā rei calcatæ, uel offensæ duritiā aut \* feruorem querūtur, tū necessitate coacti augmēti tēporibus in cōfessionem ueniunt ægrotantes. Ob hoc igitur passio perseuerare, atq; corpora possidere meditatur. Non aut minus etiā longorū lenimentorū causa, quibus recessisse putatur, cū sanos ægrotātes fingendo promittit, adiuuāte etiā intēperantia, qua cū sæpe cōcipi passio, perspicitur, manere posse nō dubitatur, quod dicā diatrīto. Si uēter officiū nō agnouerit, clyster adhibendus simplex, atque ita totius passionis statu accepto ut inflata vel tumētia loca videātur, scarificatio adhibēda: & ubi permiserint partes cucurbita figēda, uel hirudines admouēdæ. Est aut omnium leuior \* præter cucurbitā scarificatio. siquidē nulla quasi satio partium fit, quæ necessariò cucurbitæ cōiuncta est. Item hirudinum morsibus consensus adiūgitur, & propterea, ut supra dictū est, simplex \* cōflatio lenius probatur. Adhibenda etiam uaporatio spongiarū, tum aquæ calidæ fomentatio, uel \* aqua & oleo, aut decoctionis foenigræci, aut lini seminis, uel hybisci. Item cataplasma mitigatiuum, quod iamdudum minime posse adhiberi uidebatur, siquidem tumentia pondere grauari nō \* debeant. Sit igitur panis diligentius emollitus, solus, aut admixta radice argallici, quod Græci symphyton uocant, uel hybisci decocta, uel cuiusquam similis uirtutis quorum probauimus adhibendas

\* laborant

\* à feriendo:  
ictum

Hæc mutila

\* sine cucur-  
bita\* scarificatio le-  
uior. Alij def-  
latio

\* aquæ &amp; olei

\* debent

σύνφυτον

das uaporationes. Tum cum firma declinatio fuerit constituta, adhibenda lauacra, atq; uarius cibus, & a-  
qua\* potu danda, & propter passionis nequitia adhibenda etia cerotaria ex oleo dulci, uel cyprino, aut ex adipe confectum medicamen quod Græci diasteaton uo-  
cant,\* tunc malagma Diachylon, uel Mnaseu, at quod  
appellat Diateleos, uel dioxeleum, uel diathalassestū.  
Paulatim fortificandum corpus deambulatione liberis  
calciamento pedibus, & cum cautione aduersantium  
rerū, ut ne quid nimis, maxime uini, aut indigestionis,  
aut Veneris. Arthriticis uero conuenit etiam digitis  
ceram emolliendam dare, uel \* manipulos tenendos,  
quos palestritæ alteres appellant, tum mouendos, ce-  
reos, uel ligneos primo, cum paruo plumbo interfuso:  
tum pro modo profectus grauiores: & in tardate pas-  
sione, superpositionis tempore supradicta seruanda  
simplicitas curationis. In lenimento uero adhibenda  
fortificatio, tum recorporatio. Sit igitur primo gesta-  
tio pro modo uirium, tum deambulatio molli strami-  
ne coæquato solo, adiecto uocis exercitio, cum cor-  
poris unctione. Etenim uacatio crassificat corpora,  
adeo etiam\* & in hiis qui ex aliis forte plurimo tem-  
pore iacuerint causis, hac ratione articuli\* comoueā-  
tur, cum nerui nō exerciti\* ualidiores efficiuntur. Ad-  
hibenda etia lauacra per interualla dierū, & uarius ci-  
bus ex mediæ materiæ qualitate: uinū paruū, lene, &  
semper post cibum: tum dropax simplex, atq; compo-  
situs: paroptesis ex igni, uel ex sole, atq; pellibus serue-  
factis, & ex arena littoris: tū\* aspergines, quas Græ-  
ci sympasmata uocāt, ex nitro, & adarce, & euphor-  
bio, & sæpe memoratis speciebus: tum ungenta, &  
acopa ex\* squilla confecta, & agresti cucumere, item

\* potui

\* tum

diastaton:

διὰ ἀλὸς ἔρ-

bre describitur

pag. 614 a

Paulo. Dioxe

leu uero pag.

829. ab Aetio.

\* uide cap. 1.

lib. 2.

αλγῆς.

\* ut in iis

\* uexentur

laborent.

\* inuvalidiores

efficiantur.

παραπνοῖς.

\* pag. 420.

Aspersiones.

συμπασματα.

ἀκονα.

\* Scylla

euphorbio, & adarce. Dehinc malagma adhibendum, ut est quod appellāt Diabalon, aut Diadaphnidō, aut Diadarces aut Diastactes conias, uel quicquā similiū: item rubor cutis ex sinapi faciendus, quem Græci phœnigmon appellāt: item drimyphagia, & cyclorū regula, & radicū uomitus, & hellebori, & embasis facienda, sicut de ischiadicis scribentes memorauimus: uel sō mētatio ex decoctione artemisiæ herbæ, aut marinæ fructus aquæ, dehinc natatio seruēs, uel frigida. Item usus adhibendus aquarū naturalium: calidarū tum frigidarū, ut sunt in Italia quæ appellatæ sunt Albulæ, uel \* Cotiliæ, & omnium supradictorū affectanda repetitio, dabit enim curatio aliis integrā sanitatem, aliis raram doloris admonitionem, ne iugi superpositione nexentur. Veterum quidam annalia medicamina potanda probeuerūt, ut est quod appellant Diacentaurion, item Diascordeon, bibendū anno cōtinuo iudicantes, iis qui non plurimo tempore fuerint passione uitati, hoc est intra quinquennij \* temporis constituti, adiiciētes quod bil i debeat medicamē \* prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito. Sin minus, representandum numerum dierum, quo integer cōplectur annus, quanquam longo tempore porrectus. Secundum nos autem iuxta Sorani iudicium est metuenda diuturna medicaminis sumptio, cum neq; soliti cibi iuges, atq; iidem utiles, recte probentur. Sic deniq; legimus quosdam ueteres memorasse ex iugi medicamine poto in celeres, uel acutas uenisse passiones, & alios apoplectos, alios pleureticos, alios peripleumonicos interisse, item quosdam continua difficultate spirationis affectos, quam Græci dyspnœan uocant. Alij uero qui se isto medicamine profecisse testantur, non

aducit

purgatis.

Cubari.

\* Cotilia

\* tempus constituitis

\* nullis cruditatibus aut obstructionibus impedito.

Medicaminū frequentia recusanda.

Albulæ.

aduertunt seruata digestionis causa id fuisse permis-  
sum: quippe cum ceterarum rerum excessus declinan-  
do, quidam seruauerint sanitatem, \*cum interrompe-  
re \*metuerint sumptionem medicaminis sui: & pro-  
pterea his intentionibus occupati alias sibi nesciuerint  
profuisset rationes. Item alij unctionem nodorum facien-  
dam probant, quam nos reprobamus: siquidem consen-  
sus facit tumorem. Item alij transeundum ex aliis in  
alia probant \*unguenta & cataplasmata, nunc specie,  
nunc genere differentia, donec egrotantes releuen-  
tur: siquidem alia pro aliis corporibus uidentur con-  
uenire, & propterea doloris mitigatio sequitur. Or-  
dinauerunt deniq; etiam contrarias uirtute materias  
laxatiuas simul, atq; constrictiuas, & re corporatiuas,  
ut Mnaesium malagma, uel diachylon: item è contra-  
riis uehementius constringentia, ut \*dyateon, & \*cy-  
zicenem, & \*Erasistrion emplastrum: item ex panici  
polline, & lini semine cataplasma, & ex coliculo agre-  
sti, uel herba erigerote, & \*bramite, & maderagora,  
& alterco et lenticula, & citri medio, uel peponis, &  
origani, uel thymi, aut uuae lupinae, aut portulacae, aut  
betulae, aut mali punici foliis uiridibus, uel eius caduco,  
quod Latini \*ambulacium uocant, decocto cum ace-  
to, aut ruta agresti cum aceto, singulari, uel cum \*sim-  
plici alica, aut aceti sedimine, cum apio: aut uitis folia,  
cum simplici pulento, uel \*herbi polline, aut fabae, uel  
hordei, aut lolij, aut lupini, cum fece uini, uel aceti,  
uel ex fico decocto cum aqua & uino & contrito, do-  
nec mellis sumat crassitudinem: Ex \*quo detractis du-  
rioribus \*partibus imperant coquenda rursus residua:  
Itē ex papaueris \*coliculis, quos Graeci \*cocias uocant,  
uel eorum foliis, & malis cydoniis & punicis in uino

\* quia  
\* metuerent  
\* unguenta  
\* Dia item  
describitur ab  
Aetio pag.  
834. cyzicenū  
ab eodem pag.  
eadem.  
\* cyzicenū  
\* Erasistratiū  
\* stratiote. stra-  
tiotis flumina-  
lis folia Diosc.  
refrigerant, tu-  
morib. & igni  
bus sacris me-  
dentur: quae  
inflammationē  
minantur, tu-  
mescere nō si-  
nunt.  
Ambulacium  
\* Ampulla-  
giū. pag. 462.  
\* simila, aut  
alica  
\* erui  
\* emplastri  
apparatu  
\* simplicium  
Lignosorum  
quae teri com-  
modē non pos-  
sunt.  
\* folliculis  
Alij capita-  
lis.  
Lūnax.  
\* Cocias

rationem, omni tumori frigidas conuenire materias.  
 Igitur secundum passionēs ac tempora nos discretas  
 aptamus. Alij uero \*acopū ex \*rana rubea in podagri \*describitur  
 cis admirantur, alij marini \*uituli, alij pedes unxerūt, ab Actio  
 ex eius tergo calciamenta facientes: alij uiuentem be- pag. 674.  
 luam oleo coxerunt, alij lupum, & specialiter unctio- \*ex Rubeta  
 nis genus hoc cōuenire probauerūt. Multa enim ficta \*uituli adipe  
 sine ratione creduntur, cum forte passio non fuerit in-  
 sidiosa, & cum \*corpus tardauerit, nū in uno atq; eo \*in corpore  
 dem tempore perseuerans. Item plurimi uomitū post  
 cibū laudauerūt, secundo, uel tertio, per menses singu-  
 los adhibendū: siquidē & materiā \*redarguit, & indi \*ab articulis  
 gestos esse nō sinit, non aduertētes quod magis uexa-  
 bilis approbetur, cū hoc adhibito gingiuae putrescant,  
 dentes moueantur, oculi confundātur, & totū implea-  
 tur caput, stomachus quoque grauiter afficiatur, &  
 propterea omnes consentiant nerui. Est igitur con-  
 ueniens magis parua cibatio, atque initium ex absti-  
 nentia ciborum sumendum curationis. Multi autem  
 medicinae scriptores purgatiuis & acrioribus \*pol- \*uti solent  
 lent clysteribus, & urinalibus medicamentis, quae diu-  
 retica uocauerunt. Sed oportet cauere stomachi ue-  
 xationem, quae uarietate facile medicaminum fit, item  
 uesticam quae \*sit neruosaē qualitatis prouocare. Tra- \*est  
 dit enim necessariō uniuerso corpori uexationem per  
 sibi cognatam neruorum qualitatem. Specialiter autē  
 ueterum pertransiēdo errores, uanū puto, atq; pro-  
 lixum quod de podagricis scripserunt, & propterea  
 fastidiosum maxime, cū sufficiat communis materiārū  
 memoratio suprascripta, tacitis dominis, qui nunc di-  
 cētur. Diocles libris quos de passionibus atq; causis &  
 curationib. scripsit: Praxagoras tertio libro de mor- Diocles.  
 Praxagoras.

*Erasistratus.* bis: Erasistratus libro quo de podagra scripsit, prohibens tamen purgatiua adhiberi, quæ cathartica uocauerunt, malagma uero Ptolemæo regi promittens, cuius scripturam non edidit: quanquam quidam sibi *Erophilus.* uisum Erasistrati nominent medicamen. Item Erophili sectatores multi, atque Asclepiades libris ad Erasistratum scriptis, & *Heraclides Tarentinus,* & *Themison* secundo libro Tardarum passionum, aliqua ut methodicus, aliqua ut non methodicus decurrit: phlebotomat enim ex peditus, & nihil approbat, & cataplasmatum qualitates confundit, non discernens à constrictiuis laxatiua. Quibus respondere quid oportet: cum uinolentia nervos amputet, phlebotomia patientes impleat partes. *Thessalus.* Thessalus autem secundo libro Regulari, imperfecte quidem, sed consequenter methodicis intentionibus curationem ordinavit.

*vaggius.* De Renali passione, quam Græci Nephritin appellant. Cap. III.

**R**enalis passio à patientibus partibus nomen accepit. Esi autem intellecta passio tarda renis aut renum: passio, inquam, tarda: siquidem cum insidenti atq; perseveranti querela renalem intelligimus passionem, & non ex nouello atq; recenti tumore, sicuti neque cuiusquam osium coxæ, ni fuerit perseverans, ischiada intelligere poterimus. Item adiectimus renis, aut renū, siquidem nūc alterū, nūc utrosq; tenet renes tumentes, ac duratos, & in saniem sepe uenientes, & *\* sanguine,* ulceratos, & *\* humore* fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus, uel uomitis communiter secundo dicemus: nunc de cæteris supra memoratis scribemus, & primo de tumore. Antecedentes itaque causæ, quæ renalem faciunt passionem, aliæ manifestæ, ut perfrictio,

frictio, indigestio, percussus, casus uehemens super clunes, acres cibi plurimi contra consuetudinem, libido uenerica uehemens, uel urinalia frequentata medicamina, aut uenena, quæ specialiter ipsas \* afficiunt partes, ut sunt ex \* cantharidis confecta. Afficiuntur autem hac passione, iuuenibus magis \* grauiore, atque senes, & uiri \* mulieres, & habitudine plenis \* tenuiores: siquidē sit in iis grauior, & generaliter curatio difficilis, ob angustiam locorū, quæ passione uexantur, & ob acrimoniā urinae, quæ insuetē aliquando renibus immorata in uesicam transit. Sequitur autē patientes, cum adhuc leuis fuerit tumor, dolor leuis, & magis cum proni fuerint inclinati, secundum clunes, & circa ilia, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum. Cum autem tumor uehementescere cœperit, dolor etiam plurimus fit cum grauedine & feruore clunium omnium, atque iliorum, & pubetenus, uel umbilico cum consensu usque ad uesicam tendente, ob tumorem urinalium uiarum, quas Græci ureticos poros appellant: quæ quidem à renibus usque ad uesicam sunt porrectæ, attestante urina tenui, & aquata, & ita subalbida, ut colaturæ liquidæ colorem singat, quā Græci charopon uocant, & primò parua, dehinc plurima, aut coaceruatim effusa, quæ nullam faciat \* relevationem, peiorante tumore in \* feculentum colorem ueniens, cum iam nimia tensione tenuissimæ uenule fuerint ruptæ: item in uini transiens qualitatem uiscosæ crassificationis causa: tum \* oleosum ueluti adipis qualitatem simulans, cum renum \* fluor pinguis \* acceperit. Dehinc per incrementa etiam febres accedunt, cum consensu iecoris, ut quidam etiam fellis colorem sumant, attestante uentris abstinentia, cum tor-

mento

\* afficiunt  
\* cantharidibus  
\* grauiore  
\* mulieribus  
\* tenuiores: siquidem est

χαρπών.  
\* nullū enaurema  
\* sanguinis  
portione quadam admixta.  
τὸ τρυγῶν  
χρῆμα intelligit.  
\* oleosa, aut  
\* adipis eorum  
colliquatio.  
\* acciderit.



mento, & ruſtatione, inflationeq; cogente. Tum hebetudo ſequitur, & articulorum frigus & uomitus: & tardante paſſione, corporis tenuitas nimia, adeò ut quidam \* uncati permaneant, & ſemper proni ambulare cogantur, nec unquam ſe erigere poſſint. Eſt præterea ſignum declinationis, ſupradictorum in contraria mutatio, ut urina aquata in craſſitudinem ueniens: craſſior uerò uel uiſcoſa in tenuitatem: item quæ paulatim atque cum mordicatione ferri ſolebat, ſine labore adueniens, & ſi plurima, mediocris effecta, & ad ſummum omnia cum naturæ ſolita uel ſimilia fuerint uiſa. \* Aiunt aliqui eos qui ex caſu uel percuffu, aut uehementi libidine fuerint, tormenta, irruiffe uideantur: colicos uerò maior interior, uel uentri uicinarum partium dolor ſequatur, atque inde ſumat exordium, conſentientibus uel compatiētib; clunibus. Item renali uitio extemplo difficultas urinae coniuncta eſt. Colicis uerò per conſenſum atque ſecundo concurrir. Hæc eſt ſimilium paſſionum diſcretio. Accidunt hæc item ſimilia etiam in urinalibus uiis uitio conſtituto, ex renibus quæ uſque ad ueſicam ducunt, quibus eadem quæ ſuprà diximus rectè concurrunt, ſed dolor uel eius ſenſus erit inter renes & inteſtina, & ueſicæ fundum, nulla inflatione uel extantia in externis renum, partibus prominente. Hæc eſt omnis atque perfectæ ſignificatio. Sed oportet ſanguinis miſtu adfectos ſimiliter curari tanquam ſanguinem ſpuentes. Alios uerò qui cæteris fuerint paſſionibus adfecti, ſicut de ueſica ſcribentes demonſtrabimus, pro ſuis conſiſtentiis uel acciſionibus, quæ Græci ſymptomata uocant, partita curari ratione. Non enim ſola generalis, ſed etiam ſpecialis eorundem conuenit adiutorio-

rum

\* curui: repā-  
di

\* Hic multa  
deſunt.

κωλινός.

συμπίματα.

rum curatio, solum differens, quòd ea quæ localia sunt adiutoria in iis qui renalibus laborant uitiiis magis clu-  
nibus adhibeantur. Illis uerò qui \* uesticæ, peçtini, uel \* sub. uitiiis  
pubetenus, quod Græci perimecon uocant. laborant.

De tardis uesticæ passionibus. Cap. III.

**I**N uestica speciales plurimæ passionibus eueniunt, tu-  
mor, collectio, ulcus durities, phthiriasis, item pso-  
riasis, quam scabiem, uel scabrum appellamus, capilla-  
tio, debilitas, paralysis, calculatio, quam lithiasin uo-  
cant, sanguinis fluor, siue effusio, quam hæmorrhagian  
appellant, mictus tarditas, aut difficultas, aut in toto  
guttæ aquatiles, quas hydatidas uocant. Sed ne por-  
recta longitudine fastidiosa curatio uideatur, una præ-  
ceptione omnia apprehendere festinandum. De para-  
lysi igitur superius docuimus, cum de ea specialiter di-  
ceremus. De collectionibus uerò & ulceribus secun-  
dò dicemus, cum de singulis corporis partibus commu-  
nem trademus curationem. Tumente igitur uestica, se-  
quitur dolor secundum peçtinem, atque ueretri radi-  
cem, & ilia, & clunes, & magis initio ac fine urinæ  
reddendæ: tum feruor incendiosus: item pulsus & ex-  
tantia partis in passione constitutæ, cum iugi ac fre-  
quenti urinæ reddendæ desiderio, & repentina cessa-  
tio, ac rursus egestio fit cum dolore intolerabili per  
singulos mictus, ut extenti ægrotantes etiam uentum  
per podicem reddant, aut ipse podex præcadens ex-  
cludatur: & præterea ægrotantibus supinus exitus  
\* urinae faciliior. Quidam denique necessitate coacti  
defixo capite super \* latus pedibus sese locauerunt, ut  
lapis angusta deferens loca, atque uesticæ aditum repe-  
tens mictus tribuat facultatem. Mulieres deniq; etiam  
digitis immisis in muliebrem sinum sibi met, ipsæ hor-  
tatione

φθίριαις.

ψωρίασις.

πράλυσιν.

λιθίαις.

αίμορραγία.

ὕδατις.

\* quoniam in  
eo corporis ha-  
bitu lapis in  
uesticæ ampli-  
tudinem rela-  
bitur, ex colli-  
angustis.

\* latis sedibus

- \* *amiserunt.* tatione quadam lapidem prouocando \* *dimiserunt.* Pueris autem magis prominens ueretrum fit. Sæpe etiam extantia quadam egrotantibus occurrit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa præterea urina se-
- \* *Aphor. 31.* dimina inueniuntur, aliquando \* *crassiora,* & \* *cali-*  
*lib. 7. & 77.* da, aliquando arenosa & saxosa. Item quibusdam a-  
*lib. 4.* sper lapis, aut sanguinolentus excluditur, & sanio-  
 \* *pallida* sus. Sed quoniam signa communia sequuntur ulceri-  
 bus uesicæ atque lapidibus generatis, & iis qui ge-  
 lato sanguine impediti mictus difficultate afficiuntur,  
 confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita
- \* *catethere so-* \* *melotide,* cuius rationem atque usum Responsionum  
*lido, non sistu-* libris \* *chirurgiam* scribentes plenissimè tradidimus.  
*loso.* In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus. Nūc  
 \* *τιὸν χυμὸν* enim correctionem demonstramus cuiusdam in corpo-  
*γίαν.* re morbi, quo uesica lapidum generatione uexatur,  
 & non ut alium masculum appellemus lapidem, alium
- \* *ex* fœminam, ueluti quidam leuium medicorū, \* *sed quo-*  
 dam corporis uitio, non adhibita recorporatina cura-  
 tione, cum solius auferendæ \* *alienitatis* intentione  
 medici capiantur: \* *cuius plurimæ* sunt differentiæ. Est  
 præterea urinae reddendæ impedimentum, quod Græ-  
 ci stranguriam uocant, mictus officium retardatum.  
 \* *Nam eius* Difficultas autem, quam iidem dysuriam appellāt, quæ  
*σπασμὸς* id adiuncto dolore \* *ingesserit.* Impossibilitas autem,  
*δυσουρία.* quam \* *urian* uocant, perfecta eius officij negatio. Sed  
 \* *ingerit* hæc tria accidentia quæ Græci symptomata uocau-  
*ἰσχίαν.* runt, nunc stricturae sunt appenditia, cum tumor uesi-  
 \* *ischuriam* cam tenuerit, siue durties, aut paralyxis, uel tensio, ut  
*συσπασμα.* quidam uolentes urinam usu solito ac naturali depo-  
 \* *rerum alie-* nere, obstantibus causis, longo tempore continentis  
*narum,* & præ officij dilatione uexentur: aliquando \* *alienitatis ob-*  
*ter naturam in* trusione  
*corpore genita*  
*eum.*

trusione uesicæ impedito meatu, ut lapidis, aut arenæ,  
 aut capillorum, aut squamularum cantabri similitum,  
 uel quocunque sedimine crassiore. Fluor autem san-  
 guinis per uesicam, quā Græci hæmorrhagian \* uocā- αἱμορραγία.  
 tes manifestus, cum acruatim per urinæ meatum san- \* uocant, est  
 guis excluditur. Sed quoniam non \* solo ex ambitu \* solum  
 uesicæ fluor iste fit, sed etiam ex collo, uel mictualibus  
 \* uisco acruatus sanguis excluditur: aliquando etiam \* uis ueteri-  
 de renibus, erit locorum discretio facienda. Nam re- bus  
 nibus patientibus dolor in clunibus demonstratur. V-  
 esicæ \* autem ambitu patiente, sub umbilico, uel pube- \* Aphor. 39.  
 tenus apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus san- lib. 7. & 80.  
 guis excluditur. Item collo uesicæ patiente circa ue- lib. 4.  
 retri initium, quod Græci perineon uocant, dolor sen-  
 titur. Mictuali autem uia patiente, ipsam ueretri ra-  
 dicem dolor afficit, attestante sanguinis puritate, cum  
 iuge ac non intercapedinata emissionē, etiam si digitis  
 loca, quæ iuxta sessionem ueretri sunt, presserimus,  
 quo in loco est ultima mictualis uia, quā, ut suprà  
 diximus, ut eam Græci uocauerunt. Nam si ex aliis ὀρία.  
 locis sanguis feratur, digitorum impressione magis ab-  
 stinetur, cum supradictis locis, hoc est, perineo, uel po-  
 dici uicinis renititur impressio. Tunc \* ex uesicæ col- \* enim  
 lo \* impedimento repressus feretur: ex superioribus \* impedito pres-  
 uerò abstinetur. Aliorum autem medicorum signa de su referetur. ac  
 his discretionibus conscripta Responsionum libris chi- in superioribus  
 rurgiam scribes elogiauimus. Sunt autem uesicæ uis abstinēbi-  
 tia, uel passionēs generaliter curatione difficiles. Est tur.  
 enim natura nervosa, & altioribus insita locis, atque  
 celata, & quæ corporis superflua sustineat acriora.  
 Sed ne Methodi rationem uariare uideamur, erit de-  
 monstrandum, quoniam fluori siue solutioni uesicæ,  
 quam

διουματις  
vesica.

\* Apho. 79.  
lib. 4.

\* Apho. 76.  
lib. 4.  
σκήρσις.

ἡ τρεῖς.

\* cibi potus e.  
pithematum.

\* Prodest &  
seßio

\* austeriori  
ἐκασθίαμα.

\* thalia her-  
bæ, frondis  
κατὸν.

\* facienda co-  
tum quæ  
\* succi

quam Græci rheumatismum uocant, sunt adscribenda plurima, quæ specie discrepare uidentur, ut plurimus mictus cum \* arenoso uel \* capilloso sedimine. Item sanguinis fluor: strictura autem adscribendus tumor est, atque durties, uel saxeæ duritas, quam Græci scirrhosin uocant. Horum duplicem generaliter in superpositionibus curationem demonstramus. Fluente igitur uesica, hoc est, solutionem patiente, locandus æger in frigido mediocriter loco, adhibita requie, cum abstinentia, & articulorum tenaci ligatione: & si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominentius subleuatis: & officio mictus admonente, quātum datur, imperandum ægro, ut neque id retento faciat spiritu, neque ui quadam, uel conatu, excludi cogat aliena. Apponenda etiam spongia noua aceto tincta, secundum clunes, uel umbilicum, ac pubetenus, quod Græci etron appellant, usque ad ueretri initium, quod iidem perineon uocāt, addita tenaci cum amplexu ligatione. Tum epithemata iisdem locis, atque cucurbita constrictiua adhibenda. Potus dandus frigidus: paruus cibus. \* Species, de sanguinis fluore & spūto scribentes, docuimus. Similiter etiam, quæ præbibenda, conscripsimus, eiusdem scilicet qualitatis. \* Et seßionem ex uino \* uehementiori confecta, quam encathisma uocant, in qua sint præcoctæ murtæ baccule, cum rosis: uel in pusca, aut aceto facta decoctio \* herbæ talis, uel rubi, aut mali punici corticis, & horum similibus: uel per ferramentum, quod Græci catethera uocant, iniectio \* secunda, quæ similiter medendo constringat, acaciæ, hypocystidis, aut plātaginis \* succo, uel polygonij herbæ, aut intybi, uel puscæ frigide, singularis, aut adiuncta thuris drachma una, cum æquali pondere hypocystidis, uel galle

gallæ, cum nigro uino, uel\* talliæ herbæ aqua cœlesti \* talis  
 concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit  
 aqua\* coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem. \* recoquenda  
 Mulieribus uero etiam passaria adhibenda, quæ ad  
 fluorem matricis Responsionum conscripsimus libris,  
 muliebria uitia curantes. Est autem curatione \* cor- \* ac correctio-  
 rector, ac facilis eruptione factus, uel\* oscitatione san- ne facilior  
 guinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus. Etenim \* osculatione  
 \* influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: diffi- \* effluxio  
 cilis uero correctione ex putredine effectus fluor. Re-  
 tento enim sanguine, uel abstento, ulcus\* permanet. \* permanet  
 Est præterea ex putredine sanguis ater, & male re-  
 dolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore  
 antecedente, qui putredinis causa aduenisse uidetur.  
 In eruptione autem flauus, & non\* antecedentibus su- \* nigredine: sa-  
 pradietis, sed\* excussu, uel saltu, aut percussu effectus. tore: pure: do-  
 Solent præterea sicut in podice, uel fœminarum sinu, \* succussu, &  
 aut matricis collo, etiam in uesica hæmorrhoides ge- cū quis equum  
 nerari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam in- domare & re-  
 teruallis uariatum, quod oportet apprehendere pru- gere conatur,  
 dentem, cum non coadceruata primo fuerit effusio, sed calcitrosū, &  
 augmentis quibusdam promota, interiectis defectiōni- pernicacem.  
 bus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admo ai, uis p̄p̄d̄s  
 nitione\* cessante cum tensione inguinum, & grauedi- \* attestāte, qui  
 ne clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eru- dā cessare ex-  
 perit, supradictorum\* relatione sequente, siquidē ali- ponunt, cum  
 quando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficulta sanguis fluere  
 tem, uel abstinentiam faciunt mictus, quam Græci dy- desinit.  
 suriam uocāt, uel\* uriam. Hæc sunt quæ de his necessa \* relevatione  
 riò dicenda credidimus. Declinante autem passione \* ischuriam.  
 conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi  
 oleo, & alumine, cibum uarium dare, atque uinum, ac

p. 118. m. 10.

p. 118. m. 11.

\* Cotilia

\* tempus con-

stitutis  
\* nullis crudi-

tatibus aut ob-

structionibus

impedito.

Medicaminū

frequentia re-

suscipienda.

adventum.

euphorbio, & adarce. Dehinc malagma adhibendum, ut est quod appellāt Diabalon, aut Diadaphnidō, aut Diadarces aut Diastastes conias, uel quicquā similiū: item rubor cutis ex sinapi faciendus, quem Græci phœnigmon appellāt: item drimyphagia, & cyclorū regula, & radicū uomitus, & hellebori, & embasis facienda, sicut de ischiadicis scribentes memorauimus: uel sō mētatio ex decoctione artemisiæ herbæ, aut marinæ fructis aquæ, dehinc natatio seruēs, uel frigida. Item usus adhibendus aquarū naturalium: calidarū tum frigidarū, ut sunt in Italia quæ appellatæ sunt Albule, uel \* Cotiliæ, & omnium supradictorū affectanda repetitio, dabit enim curatio aliis integrā sanitatem, aliis raram doloris admonitionem, ne iugi superpositione nezentur. Veterum quidam annalia medicamina potanda probauerūt, ut est quod appellant Diacentaurion, item Diascordeon, bibendū anno cōtinuo iudicantes, iis qui non plurimo tempore fuerint passione uitati, hoc est intra quinquennij \* temporis constituti, adiciētes quod bibi debeat medicamē \* prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito. Sin minus, representandum numerum dierum, quo integer cōpleatur annus, quanquam longo tempore porrectus. Secundum nos autem iuxta Sorani iudicium est metuenda diuturna medicaminis sumptio, cum neq; soliti cibi iuges, atq; iidem utiles, recte probentur. Sic deniq; legimus quosdam ueteres memorasse ex iugi medicamine potu in celeres, uel acutas uenisse passiones, & alios apoplectos, alios pleureticos, alios peripleumonicos interisse, item quosdam continua difficultate spirationis affectos, quam Græci dyspnœan uocant. Alij uero qui se isto medicamine profecisse testantur, non

aduct



aduertunt seruata digestionis causa id fuisse permis-  
sum: quippe cum caterarum rerum excessus declinan-  
do, quidam seruauerint sanitatem, \*cum interrompe-  
re \*metuerint sumptionem medicaminis sui: & pro-  
pterea his intentionibus occupati alias sibi nesciuerint  
profuisse rationes. Item alij unctionem nodorum facien-  
dam probant, quam nos reprobamus: siquidem consen-  
sus facit tumorem. Item alij transeundum ex aliis in  
alia probant \*unguenta & cataplasmata, nunc specie,  
nunc genere differentia, donec egrotantes relcuen-  
tur: siquidem alia pro aliis corporibus uidentur con-  
uenire, & propterea doloris mitigatio sequitur. Or-  
dinauerunt deniq; etiam contrarias uirtute materias  
laxatiuas simul, atq; constrictiuas, & re corporatiuas,  
ut Anaseum malagma, uel diachylon: item è contra-  
riis uehementius constringentia, ut \*dyateon, & \*cy-  
zicenum, & \*Erasistrion emplastrum: item ex panici  
polline, & lini semine cataplasma, & ex coliculo agre-  
sti, uel herba erigerote, & \*bramite, & mādtagora,  
& alterco et lēticula, & citri medio, uel peponis, &  
origani, uel thymi, aut uuae lupinae, aut portulacae, aut  
betae, aut mali punici foliis uiridibus, uel eius cadueo,  
quod Latini \*ambulacium uocant, decocto cum ace-  
to, aut ruta agresti cum aceto, singulari, uel cum \*sim-  
plici alica, aut aceti sedimine, cum apio: aut uitis folia,  
cum simplici pulento, uel \*herbi polline, aut fabae, uel  
hordei, aut lolij, aut lupini, cum fece uini, uel aceti,  
uel ex fico decocto cum aqua & uino & contrito, do-  
nec mellis sumat crassitudinem: Ex \*quo detractis du-  
rioribus \*partibus imperant coquenda rursus residua:  
Itē ex papaueris \*coliculis, quos Graeci \*cocias uocāt,  
uel eorum folijs, & malis cydoniis & punicis in uino

\* quia  
\* metuerent  
\* unguenta  
\* Dia item  
describitur ab  
Aetio pag.  
834. Cyziceniū  
ab eodem pag.  
eadem.  
\* cyzicenum  
\* Erasistratiū  
\* stratiote. stra-  
tioti fluminiati-  
lis folia Diosc.  
refrigerant, tu-  
morib. & igni-  
bus sacris me-  
dentur: quae  
inflammationē  
minantur, tu-  
mescere nō si-  
nunt.  
Ambulaciū  
\* Ampulla-  
riū. pag. 462.  
\* simila, aut  
alica  
\* erui  
\* emplāstri  
apparatu  
\* simplicium  
Lignosorum  
quae teri com-  
modē non pos-  
sunt.  
\* folliculis  
Alij capitū-  
lis.  
lūnam.  
\* Codcia

rationem, omni tumori frigidas conuenire materias.  
 Igitur secundum passionēs ac tempora nos discretas  
 aptamus. Alij uero \* acopū ex \* rana rubea in podagri \* describitur  
 cis admirantur, alij marini \* uituli, alij pedes unxerūt, ab Actio  
 ex eius tergo calciamenta facientes: alij uiuentem be- pag. 674.  
 luam oleo coxerunt, alij lupum, & specialiter unctio- \* ex Rubeta  
 nis genus hoc cōuenire probauerūt. Multa enim ficta \* uituli adipe  
 sine ratione creduntur, cum forte passio non fuerit in-  
 sidiosa, & cum \* corpus tardauerit, nū in uno atq; eo \* in corpore  
 dem tempore perseuerans. Item plurimi uomitū post  
 cibū laudauerūt, secundo, uel tertio, per menses singu-  
 los adhibendū: siquidē & materiā \* redarguit, & indi \* ab articulis  
 gestos esse nō finit, non aduertētes quod magis uexa- anertit.  
 bilis approbetur, cū hoc adhibito gingiuae putrescant,  
 dentes moueantur, oculi confundātur, & totū implea-  
 tur caput, stomachus quoque grauiter afficiatur, &  
 propterea omnes consentiant nerui. Est igitur con-  
 ueniens magis parua cibatio, atque initium ex absti-  
 nentia ciborum sumendum curationis. Multi autem  
 medicinæ scriptores purgatiui & acrioribus \* pol- \* uti solent  
 lent clysteribus, & urinalibus medicamentis, quæ diu-  
 retica uocauerunt. Sed oportet cauere stomachi ue-  
 xationem, quæ uarietate facile medicaminum fit, item  
 uesicam quæ \* sit neruosa qualitatis prouocare. Tra- \* est  
 dit enim necessariò uniuerso corpori uexationem per  
 sibi cognatam neruorum qualitatem. Specialiter autē  
 ueterum pertransiendo errores, uanū puto, atq; pro-  
 lixum quod de podagricis scripserunt, & propterea  
 fastidiosum maxime, cū sufficiat communis materiā  
 memoratio suprascripta, tacitis dominis, qui nunc di-  
 cētur. Diocles libris quos de passionibus atq; causis &  
 curationib. scripsit: Praxagoras tertio libro de mor- Diocles.  
 Praxagoras.

*Erasistratus.* bis: Erasistratus libro quo de podagra scripsit, prohibens tamen purgatiua adhiberi, quæ cathartica uocauerunt, malagma uero Ptolemæo regi promittens, cuius scripturam non edidit: quanquam quidam sibi uisum Erasistrati nominent medicamen. Item Erophili sectatores multi, atque Asclepiades libris ad Erasistratum scriptis, & Heraclides Tarentinus, & Themison secundo libro Tardarum passionum, aliqua ut methodicus, aliqua ut non methodicus decurrit: phlebotomat enim ex peditus, & nihil approbat, & cataplasmatum qualitates confundit, non discernens à constrictiuis laxatiua. Quibus respondere quid oportet: cum uinolentia neruos amputet, phlebotomia patientes impleat partes. *Thessalus.* Thessalus autem secundo libro Regulari, imperfecte quidem, sed consequenter methodicis intentionibus curationem ordinauit.

*viginti.* De Renali passione, quam Græci Nephritin appellant. Cap. III.

**R**enalis passio à patientibus partibus nomen accepit. Est autem intellecta passio tarda renis aut renum: passio, inquam, tarda: siquidem cum insidenti atque perseveranti querela renalem intelligimus passionem, & non ex nouello atque recenti tumore, sicuti neque cuiusquam osium coxæ, ni fuerit perseverans, ischiada intelligere poterimus. Item adiectimus renis, aut renū, siquidem nunc alterū, nunc utrosque tenet renes tumentes, ac duratos, & in saniem sæpe uenientes, & ulceratos, & humore fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus, uel uomicis communiter secundo dicemus: nunc de cæteris supra memoratis scribemus, & primo de tumore. Antecedentes itaque causæ, quæ renalem faciunt passionem, aliæ manifestæ, ut perfrictio,

\* sanguine,  
aut sanie.

frictio, indigestio, percussus, casus uehemens super clunes, acres cibi plurimi contra consuetudinem, libido uenerea uehemens, uel urinalia frequentata medicamina, aut uenena, quæ specialiter ipsas \* afficiunt partes, ut sunt ex \* cantharidis confecta. Afficiuntur autem hac passione, iuuenibus magis \* grauiore, atque senes, & uiri \* mulieres, & habitudine plenis \* tenues: siquidē sit in iis grauior, & generaliter curatio difficilis, ob angustiam locorū, quæ passione uexantur, & ob acrimoniā urinae, quæ insuetē aliquando renibus immorata in uesicam transit. Sequitur autē patientes, cum adhuc leuis fuerit tumor, dolor leuis, & magis cum proni fuerint inclinati, secundum clunes, & circa ilia, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum. Cum autem tumor uehementescere cœperit, dolor etiam plurimus fit cum grauedine & seruore clunium omnium, atque iliorum, & pubetenus, uel umbilico cum consensu usque ad uesicam tendente, ob tumorem urinalium uiarum, quas Græci ureticos poros appellant: quæ quidem à renibus usque ad uesicam sunt porrectæ, attestante urina tenui, & aquata, & ita subalbida, ut colaturæ liquidæ colorem fingat, quā Græci charopon uocant, & primò parua, dehinc plurima, aut coaceruatim effusa, quæ nullam faciat \* relevationem, peiorante tumore in \* feculentum colorem ueniens, cum iam nimia tensione tenuissimæ uenulae fuerint ruptæ: item in uini transiens qualitatem uiscosæ crassificationis causa: tum \* oleosum ueluti adipis qualitatem simulans, cum renum \* fluor pinguis \* acceperit. Dehinc per incrementa etiam febres accedunt, cum consensu iecoris, ut quidam etiam fellis colorem sumant, attestante uentris abstinentia, cum tormento

\* afficiunt  
\* cantharidibus  
\* grauiore  
\* mulieribus  
\* tenuiores: siquidem est

χαρπὶς.  
\* nullū enaurema  
\* sanguinis  
portione quadam admixta.  
τὸ τρυγῶδες  
χρῶμα intelligit.  
\* oleosa, aut  
\* adipis eorum  
colliquatio.  
\* acciderit.

mento, & ruftatione, inflationeq; cogente. Tum hebetudo fequitur, & articulorum frigus & uomitus: & tardante paffione, corporis tenuitas nimia, adeò ut quidam \* uncati permaneant, & femper proni ambulare cogantur, nec unquam fe erigere poffint. Eft præterea fignum declinationis, fupradictorum in contraria mutatio, ut urina aquata in craffitudinem ueniens: craffior uerò uel uifcofa in tenuitatem: item quæ paulatim atque cum mordicatione ferri solebat, fine labore adueniens, & fi plurima, mediocris effecta, & ad fummum omnia cum naturæ folita uel fimilia fuerint uifa. \* Aiunt aliqui eos qui ex cafu uel percuffu, aut uehementi libidine fuerint, tormenta, irruiffe uideantur: colicos uerò maior interior, uel uentri uicinarum partium dolor fequatur, atque indeumat exordium, confentientibus uel compatientibus clunibus. Item renali uitio extemplo difficultas urinae coniuncta eft. Colicis uerò per confenfum atque fecundo concurrat. Hæc eft fimilium paffionum discretio. Accidunt hæc item fimilia etiam in urinalibus uis uitio conftituto, ex renibus quæ ufque ad ueficam ducunt, quibus eadem quæ fuprà diximus rectè concurrunt, fed dolor uel eius fensus erit inter renes & inteftina, & ueficæ fundum, nulla inflatione uel extantia in externis renum, partibus prominente. Hæc eft omnis atque perfecta fignificatio. Sed oportet fanguinis mictu adfectos fimiliter curari tanquam fanguinem fpuentes. Alios uerò qui cæteris fuerint paffionibus adfecti, ficut de uefica fcribentes demonftrabimus, pro fuis concurfibus uel accidentibus, quæ Græci fymptomata uocant, partita curari ratione. Non enim fola generalis, fed etiam fpecialis eorundem conuenit adiutorio-

\* curui: repā-  
di

\* Hic multa  
defunt.

πωλινός.

συμπύματα.

rum curatio, solum differens, quòd ea quæ localia sunt adiutoria in iis qui renalibus laborant uitiis magis clu-  
nibus adhibeantur. Illis uerò qui \* uesicæ, peëini, uel \* sub. uitiis  
pubetenus, quod Græci perineon uocant. laborant.

De tardis uesicæ passionibus. Cap. III.

**I**N uesica speciales plurimæ passiones eueniunt, tu-  
mor, collectio, ulcus, durities, phthiriasis, item pso-  
riasis, quam scabiem, uel scabrum appellamus, capilla-  
tio, debilitas, paralytis, calculatio, quam lithiasin uo-  
cant, sanguinis fluor, siue effusio, quam hæmorrhagian  
appellant, mictus tarditas, aut difficultas, aut in toto  
guttæ aquatiles, quas hydatidas uocant. Sed ne por-  
recta longitudine fastidiosa curatio uideatur, una præ-  
ceptione omnia apprehendere festinandum. De para-  
lysi igitur superius docuimus, cum de ea specialiter di-  
ceremus. De collectionibus uerò & ulceribus secun-  
dò dicemus, cum de singulis corporis partibus commu-  
nem trademus curationem. Tumente igitur uesica, se-  
quitur dolor secundum peëtinem, atque ueretri radi-  
cem, & ilia, & clunes, & magis initio ac fine urinæ  
reddendæ: tum feruor incendiosus: item pulsus & ex-  
tantia partis in passione constitutæ, cum iugi ac fre-  
quenti urinæ reddendæ desiderio, & repentina cessa-  
tio, ac rursus egestio fit cum dolore intolerabili per  
singulos mictus, ut extenti ægrotantes etiam uentum  
per podicem reddant, aut ipse podex præcadens ex-  
cludatur: & præterea ægrotantibus supinus exitus  
\* urinae faciliior. Quidam denique necessitate coacti  
defixo capite super \* latius pedibus sese locauerunt, ut  
lapis angusta deferens loca, atque uesicæ aditum repe-  
tens mictus tribuat facultatem. Mulieres deniq; etiam  
digitis immisiss in muliebrem sinum sibi met, ipsæ hor-  
tatione

φθαρτικός.

ψωρίασις.

παράλυσις.

λιθίασις.

αίμορραγία.

ὕδατις.

\* quoniam in  
eo corporis ha-

bitus lapis in

uesicæ ampli-  
tudinem rela-

bitur, ex colli-  
angustis.

\* latius sedibus

- \* amiserunt. tatione quadam lapidem prouocando \* dimiserunt. Pueris autem magis prominens ueretrum fit. Sæpe etiam extantia quedam egrotantibus occurrit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa præterea urina sc-
- \* Aphor. 31. dimina inueniuntur, aliquando \* crassiora, & \* cali-  
lib. 7. & 77. da, aliquando arenosa & saxosa. Item quibusdam as-  
lib. 4. pper lapis, aut sanguinolentus excluditur, & sanio-  
\* pallida sus. Sed quoniam signa communia sequuntur ulceri-  
bus uesicæ atque lapidibus generatis, & iis qui ge-  
lato sanguine impediti mictus difficultate afficiuntur,  
confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita
- \* catethere so- \* melotide, cuius rationem atque usum Responsionum  
lido, non fistu- libris \* chirurgiam scribentes plenissimè tradidimus.  
loso. In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus. Nūc  
\* τὸν κατὰ- enim correctionem demonstramus cuiusdam in corpo-  
γίαν. re morbi, quo uesica lapidum generatione uexatur,  
& non ut alium masculum appellemus lapidem, alium
- \* ex fœminam, ueluti quidam leuium medicorū, \* sed quo-  
dam corporis uitio, non adhibita re corporatiua cura-  
tione, cum solius auferendæ \* alienitatis intentione  
medici capiantur: \* cuius plurimæ sunt differentiæ. Est  
præterea urinae reddendæ impedimentum, quod Græ-  
ci stranguriam uocant, mictus officium retardatum.
- \* non autem recorporationis deinceps faciē-  
de. Difficultas autem, quam iidem dysuriam appellāt, quæ  
\* Nam eius id adiuncto dolore \* ingesserit. Impossibilitas autem,  
εργασία. quam \* urian uocant, perfecta eius officij negatio. Sed  
δυσπρία. hæc tria accidentia quæ Græci symptomata uocauē-  
\* ischuriam runt, nunc stricturæ sunt appenditia, cum tumor uesi-  
εὐρηστικότητα. cam tenuerit, siue durities, aut paralysis, uel tensio, ut  
\* rerum alie- quidam uolentes urinam usu solito ac naturali depo-  
naturum, & præ- nere, obstantibus causis, longo tempore continentes  
ter naturam in officij dilatione uexentur: aliquando \* alienitatis ob-  
corpore genita- trusione  
rum.



trusione uesicæ impedito meatu, ut lapidis, aut arenæ,  
 aut capillorum, aut squamularum cantabri similitum,  
 uel quocunque sedimine crassiore. Fluor autem san-  
 guinis per uesicam, quā Græci hæmorrhagian \* uocant, est  
 manifestus, cum acruatim per urinæ meatum san-  
 guis excluditur. Sed quoniam non \* solo ex ambitu \* solum  
 uesicæ fluor iste fit, sed etiam ex collo, uel mictualibus  
 \* uisco acruatus sanguis excluditur: aliquando etiam \* viis ureteri-  
 bus  
 de renibus, erit locorum discretio facienda. Nam re-  
 nibus patientibus dolor in clunibus demonstratur. Ve-  
 sicæ \* autem ambitu patiente, sub umbilico, uel pube- \* Aphor. 39.  
 tenus apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus san-  
 guis excluditur. Item collo uesicæ patiente circa ue-  
 retri initium, quod Græci perineon uocant, dolor sen-  
 titur. Mictuali autem uia patiente, ipsam ueretri ra-  
 dicem dolor afficit, attestante sanguinis puritate, cum  
 iuge ac non intercapedinata emissionē, etiam si digitis  
 loca, quæ iuxta sessionem ueretri sunt, presserimus,  
 quo in loco est ultima mictualis uia, quā, ut supra  
 diximus, ut eam Græci uocauerunt. Nam si ex aliis  
 locis sanguis feratur, digitorum impressione magis ab-  
 stinetur, cum supradictis locis, hoc est, perineo, uel po-  
 dici uicinis renititur impressio. Tunc \* ex uesicæ col- \* enim  
 lo \* impedimento repressus feretur: ex superioribus \* impedito pres-  
 uerò abstinetur. Aliorum autem medicorum signa de  
 his discretionibus conscripta Responsionum libris chi-  
 rurgiam scribentes elogiauimus. Sunt autem uesicæ ui-  
 tia, uel passionēs generaliter curatione difficiles. Est  
 enim natura neruosa, & altioribus insita locis, atque  
 celata, & quæ corporis superflua sustineat acriora.  
 Sed ne Methodi rationem uariare uideamur, erit de-  
 monstrandum, quoniam fluori siue solutioni uesicæ,  
 quam

gallæ, cum nigro uino, uel\* talliæ herbæ aqua cœlesti \* taliæ  
 concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit  
 aqua\* coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem. \* recoquenda  
 Mulieribus uero etiam passaria adhibenda, quæ ad  
 fluorem matricis Responsionum conscripsimus libris,  
 muliebria uitia curantes. Est autem curatione \* cor-  
 rector, ac facilis eruptione factus, uel\* oscitatione san-  
 guinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus. Etenim \* ac correctio-  
 \* osculatione  
 \* influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: diffi- \* effluxio  
 cilis uero correctione ex putredine effectus fluor. Re-  
 tento enim sanguine, uel abstento, ulcus\* permanebit. \* permanet  
 Est præterea ex putredine sanguis ater, & male re-  
 dolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore  
 antecedente, qui putredinis causa aduenisse uidetur.  
 In eruptione autem flauus, & non\* antecedentibus su- \* nigredine: sa-  
 pradietis, sed\* excussu, uel saltu, aut percussu effectus. tore: pure: do-  
 Solent præterea sicut in podice, uel sceminarum sinu, lore.  
 aut matricis collo, etiam in uesica hæmorrhoides ge- \* succussu, &  
 nerari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam in- cū quis equum  
 teruallis uariatum, quod oportet apprehendere pru- domare & re-  
 dentem, cum non coadceruata primo fuerit effusio, sed gere conatur,  
 augmentis quibusdam promota, interiectis defectio- calcitrosū, &  
 bus, ac sepe retento sanguine doloris pubetenus admo peruicacem.  
 nitione\* cessante cum tensione inguinum, & grauedi- ai, & poldis  
 ne clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eru- \* attestate, qui  
 perit, supradictorum\* relatione sequente, siquidē ali- dā cessare ex-  
 quando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficulta ponunt, cum  
 tem, uel abstinentiam faciunt mictus, quam Græci dy- sanguis fluere  
 suriam uocāt, uel\* uriam. Hæc sunt quæ de his necessa desinit.  
 riō dicenda credidimus. Declinante autem passione \* releuatione  
 conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi \* ischuriam.  
 oleo, & alumine, cibum uarium dare, atque uinum, ac

deinde lauacrum adhibere. At si strictura fuerit uentris, uel uesicæ, conuenit iacere ægrotantem loco mediocriter calido, atq; lucido, adhibita abstinentia usq; ad tertium diem, cum requie. Item locis in dolore constitutis manuum calidarum cum blando amplexu uaporatio adhibenda: uel\* pubetenus, ac\* ueretri initio, & clunibus calida linteamina, aut uascula ex aqua calida, uel saccelli ex pollinibus calidis, aut uesicæ oleo calido plenæ admouendæ. Ac si uehemens fuerit dolor phlebotomia adhibenda: & partes in passione constitutæ lanis\* limpidis oleo calido ac dulci infusis contegendæ, ex eo etiam totum corpus unguendum: tum ora foruenda. Adhibenda etiam encathismata ex aqua calida, uel aqua & oleo, aut decoctione laxatiua ex iis quæ sæpe memorauius. Tunc cibus dandus sorbilis, & potui aqua calida, moderatione dominante, & usq; ad declinationem passionis, interuallis dierum, nutrimenta offerenda. Ac si dolor minime cessauerit, conuenit usus cataplasmati laxatiui, & cucurbitæ appositio leuis, quam Græci cuphen appellant, cum adiecta scarificatione, & uaporatione spongiarum aqua calida expressarum. Ac si uenter retentus fuerit, clyster conuenit simplex: & secundo cucurbita clunibus adhibenda, ac pubetenus\* præerari capillis. Tunc hirudinum appositio, quas sanguisugas uocant, atq; embasis adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatis tensionibus non solum dolores soluentur uesicæ, sed etiam consequens urinæ difficultas, uel abstinentia. Cauendus præterea usus urinalium medicaminum, quæ diuretica Græci uocant. Etenim uesicam prouocant, & propterea tumores faciunt commoueri. Ac si minutis doloribus urinæ\* fuerit retentio, uel in toto cõquiescerit dolor

\* τῷ ἡτρεῖ  
\* τῷ κινεῖται

\* non succidis  
ἐνυασιμαῖα.

Cucurbita  
λευκά.

\* præerari  
ἐμβασίς.

διυρίνα.

\* cessauerit

dolor, tanquam \* factis superpositionibus repetant le- \* confectis ab-  
nimenta, adhibenda fortificatio per uariam gestatio- solui  
nem, & uocis exercitium, unctionibus quoq; ac defri-  
cationibus admotis, quæ superiora corporis magis  
exerceant, interiecto lauacro, & uario cibo, ac uino:  
& iuxta methodicum modum adiectiones cyclice ac  
detractiones faciende. Tum ad re corporatiua atq; ue- *Διύπαξ.*  
hementia redeundum adiutoria, ut ex resina, uel dro- *παρίπρισις.*  
pace, ac paroptesi, & solis torrore, uel arena ignita,  
& appositione cucurbitæ, fortiraptu, \* atq; tractu quo \* Hanc recor-  
dam circumducto remota, corpora roboremus, morbo- *poratiuam cu-*  
rum pulsa segnitie, adhibito usu asperginum, quæ sym- *cucurbitæ supra*  
pasmata Græci uocauerunt. Tum malagmatum atque *vocauit pag.*  
acoporum laceffentium usus adhibendus, adiecto etiam *324.*  
sinapismo, & fricatione partiū quæ passione afficiun- *συνπασματα.*  
tur. Tum encathismatibus utendum ex aqua marina, *μαλάγματα.*  
uel salsa calida, & magis iis qui mordicatione quadā *ἀκρωα.*  
locorum in iisdem passionibus tanguntur: tum cata- *ιγναθισματα.*  
clysmo utendam, cuius \* nominis uim præscriptis libris \* aquarum il-  
sepius \* latinauimus: ita natatio adhibenda aquarum *lisionem expo-*  
sua uirtute medentium, quibus magis erit in solutioni- *suit. c. j. lib. j.*  
bus utendum. Eligendæ sunt nanq; specialiter quæ alu- *ruinam, cap. j.*  
minis habeant qualitatem, ut sunt in Italia Albule ap- *lib. ij.*  
pellatæ, & Nepefinæ, & \* Cotiliæ, & Auguriæ: iis *κατάνλυσμοι.*  
uero qui lapidibus, uel scabro uesticæ afficiuntur, erunt *\* latini fani-*  
eligendæ aquæ salsæ, uel quæ nitri habeant qualitatem, *mus.*  
ut apud \* Tenariam insulam, quæ potandæ, atq; laua- \* *Cutibis*  
cro adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est cy- \* *Aenariæ*  
clus, & acriora medicamina potanda, ut ex radice la- *λιθοτομία.*  
pati, & capparis, & struthij, uel polij herba, itemq;  
panacis, & horum similium: & lithotomia in iis qui  
maiorē generauerint lapidem. Item in omnibus helle-

bori adhibendus est usus, si passionēs supradictæ permanserint. Tum nauigatio atq; peregrinatio, & earū uarietas appetenda. Erit præterea longo tempore, ut

\* sollicitudum cætera quæq; nimia, Venus præcauenda. Iis enim qui  
 \* reprobanda ob uesicæ paralyšin, propter officium \* sciscitandum  
 \* faciendā usum uenereum probauerunt, consentiendum non est:  
 πρὸς τὴν νόσον.  
 \* quæ debilita trahit enim secū totius corporis uexationem. Ob quā  
 te afficiunt causam erit \* probanda etiam ferularum tenerarum,  
 \* irruunt. Se- uel tabellarum, usq; ad ruborē cutis ab iis probata per-  
 rosi humoris cussio, itemq; ustio, & scarificatio \* faciendæ pubete-  
 corrupti & a- nus, atque clunibus, & circa initium ueretri circula-  
 cris, per colem tim, quod Græci perineon uocant, \* debilitate affi-  
 effluxum intel- ciens. Sunt præterea aquosa semina quæ excluduntur,  
 ligit, quæ Go- & magis cum se pronos fecerint ægrotantes, uel ce-  
 norrhææ spe- leri ambulauerint gressu. \* Irruit autem corporibus,  
 ciem quidam esse putant. cum longa fuerint debilitate uexata, aut immodico  
 Vulgus vocat usu uenereo affecta. Sed est accipiendā curatio ex iis  
 chaude pisse. quæ de uesica sanguine fluente memorauimus: Item  
 \* immo potius ex iis quæ in lenimentis passionū fortificandi corporis  
 Rheumatif- causa, ac demutandi sæpiissime probauimus. Est enim  
 mus. Hic de hæc passio seminalium uiarum \* paralytis.  
 est caput De  
 Diabete.  
 ἰσχυροτέρως.

De Somno uenereo quem Græci onirogonon appellant. Cap. v.

**P**ER somnos inanibus uisis affecti ægrotantes seminis lapsu uexantur. Nomen autem sumpsit ab accidenti, siquidem effectum uenereum prouocando perficit. Sed generaliter neq; illico passio est, neq; accidens passionis, quod Græci symptoma uocāt, sed est consequens uisis, quam Græci phantasia uocauerunt, per somnum ægrotantes afficiens, ob desiderium uenereæ uoluptatis, uel iugem atque continuam libidinem, siue è contrario longam usus dilationem uel con-

παρὰ τὴν νόσον:

timentiam

timentiam. Sed hoc frequentius accidens in passionem  
 saepe deuenit, itēque alterius passionis aliquando si-  
 gnum antecedens fit, ut epilepsie aut furoris, quam  
 Græci maniam uocant, aut cuiusquam similis morbi,  
 quoniam uexationem ostendere probatur, atque præ-  
 moueri corpus, siue prætangi accessione uetura. Item  
 aliquando antecedit causa supradictæ passionis, quam  
 seminis \* appellamus lapsum, fuisse probatur, à qua di- \* Gonorrhœa  
 scernitur, siquidem illa passio etiam per diem uigilan-  
 tibus aegris fluere facit semen, nulla phantasia in usum  
 uenericum prouocante. Somnus autem uenericus eo so-  
 lo tempore quo dormiunt egrotantes inanibus uisus  
 concubitus fingit. Aliqui etiam aiunt oniroplethin  
 ab onirogono discerni, siquidem oniroplethis illa \* sit *ὄνιροπλήθις.*  
 quæ per somnum concubitus fingit, cum \* operan- \* est  
 tium sensu, sed sine seminis iactu: Onirogonos uero \* operis  
 usque ad \* defectum deducit seminis lapsum. Sed \* effectum  
 Milesius nihil inquit supradicta differre: unum enim, *Μιλήσιος.*  
 atq; eundem fluorem dicit esse seminalium uiarum.  
 Sed quod nunc exclusio perficitur seminis, nunc im-  
 peditur, quanquam uisa per somnum eadem fingan-  
 tur, ob alias inquit irruentes fieri causas: sed non est  
 plurima discretio, \* nisi intentio adhibenda: quippe \* nec  
 cum neq; ad curationem necessaria comprobetur. Eos  
 igitur qui ratione futuræ accessionis epilepsie, uel fu-  
 roris, aut cuiusquam alterius morbi commouentur, ex  
 iis quæ suis sunt passionibus tribuenda mitigamus: eos  
 uero qui specialiter hoc uitio afficiuntur, tanquam *γυνήρρεια.*  
 parua gonorrhœa affectos curamus. Supradictorum  
 enim augmentū in istam cadere passionem facit egro-  
 tantes, \* fluentium seminalium uiarum, uel paralyti ui-  
 tiatarum causa. Quapropter cōuenit primo \* egrotanti  
 \* defluxionem  
 ex aliis parti-  
 bus accipien-  
 tium  
 \* egrotantis

φαντάσματα. ab intentione ueneræ uisa mentis auertere, quæ Græci phantasmata uocauerunt, atq; aliorum applicare intentionibus externis admotis. Siquidem facile quæ  
 \* ad actionem uigilantes accipiunt somniorum uisa \* ad actiua cum  
 ducūt, his quæ  
 \* exclusionē hiis motibus exercent egrotantes, & propterea corpus seminis \* discussione uexatur. Tum stramenta duriora atq; frigerantia procuranda. Iubendi etiam supra latus iacere, cum se somno dederint, & \* ante se: uel supponenda tenuis ac producta lamina plumbea clunibus, uel spongiæ circundandæ \* pusca frigide infusæ, uel \* iniiciendo loca rebus frigide uirtutis ex \* anterioribus, ut balaustio, uel acacia, aut hypocystide, uel psyllio herba, quæ sunt singularia, uel cum palmulis adhibenda. Cibus etiam constrictius dandus, uel densabilis, & frigidus, ut de sanguinis fluore conscripsimus. \* Poto  
 \* Poto quoq; frigido nutriēdi, uel constrictiuis, non quidem curiose confectis. Tum adhibenda fortificatio ex communi resumptione, & facienda consuetudo frigidi lauacri, quod Græci psychrolusian appellant. Loca etiam in passione constituta forti impressione fricanda. Sunt enim hæc sufficientia constrictioni faciundæ. Aliqui uero conuenire dixerunt etiam miētus dilationem tendere, ne frequenti officio causa refricetur, & completa uesica, se somno egrotantes dare, quo neq; in altum somnum uenire sinantur, & \* excitari  
 intercessu frequenti \* excitentur, quo uisa ueneræ uoluptatis, quæ somno finguntur, amittant, & extenta uesica seminales uias sibi uicinas comprimendo semen retineant. Alij maiorem digitum ligandum atque constringendum forti filo uel limo iusserunt, quo dolore interueniente altior arceatur somnus, & neque animorum uisa in ueneræ uoluptatem soluantur.

Sed



Sed erunt hæc utraque à nobis excludenda. Vexant enim uigiliæ ægrotantem, & ultra modum urinae retentio difficultatem mictus sæpe \* refecit, ut alterius \* efficiat  
passionis illatæ causa uideatur, \* ut supra docuimus. \* sicut

De sanguinis emissionem ex debilitate seminalium viarum.

Cap. VI.

**M**ilesius debilitate fieri dixit seminalium uiarum, Milesius.  
uel sequi in usu uenereo pro semine sanguinis  
emissionem. Sed hoc commune est etiam iis qui in osculo uesticæ, quam \* uretan uocant, ulcus habuerint. Et \* Vrethram.  
est harum manifesta discretio. In iis enim qui ulcus habuerint, cum mictum fecerint, sanguis \* fluit attestante \* fluat  
te mordicatione, & dolore, & aliquando egestione corpusculorum quæ ephelcydas Græci uocauerunt. In iis autem qui debilitate seminalium uiarum afficiuntur, solo tempore Veneris exercendæ sanguis excluditur, attestante iucunditate, nullis corpusculis, & cum mictum faciunt nullaque mordicatione uexante: sed etiam \* nunc curatio ex supradictis accipienda, ubi \* huius  
uesticam fluentem sanguine curari conscripsimus. Constrictione enim atque densitate fluentia retinentur. Tunc resumptio adhibenda, ac deinde recorporatio, ut sæpe memorauimus.

De priapismo.

Cap. VII.

**S**ine ullo dolore uel consensu \* uertigo ueretri fit, \* tentigo,  
& appellatur priapismus, sed uocabulum sumpsit à similitudine priaporum, \* quod ita \* formentur, ut \* qui  
recto ueretro fingantur. Huius autem passionis meminit Demetrius Apameus libro Signorum. Ait enim \* semen in semet manu operantem nec quicquam \* formantur  
potuisse peragere: tensionem autem fuisse ueretri nimiam, cum paruo dolore, ut cornu putaretur, & Demetrius  
Apameus.  
\* senem

ita perscuerasse multis mensibus. Nullo quoque adiutorio medicinali cessasse, \* ac tarde atque longo tempore quieuisse. Quo fit ut à satyriasi discernatur priapismus. Siquidem illa celer \* sit, & non tardat in corpore. \* Fiet sanè cum contractu neruorum, & stimulo desiderio uenereæ uoluptatis: \* nam intelligitur priapismus paralysis esse seminalium uiarū, atq; aliorum neruorum ad ueretri partes \* ducētium, quorum \* contractione agrotantes afficiuntur. Sed etiam \* nunc curatio sumenda est ex iis quæ de uesica stricturna longo tempore tardante conscripsimus.

De vomicis siue internis collectionibus, quas

ἐμπύματα.

Græci empyemata vocant. Cap. VIII.

**P**lena igitur de his tradenda est ratio. Hæc enim sunt quæ in occultis nata collectiones nuncupantur, ut in splanchnis, ac membrana, quæ latera cingit,

σπλάγχνα.

uel in pulmone, aut discrimine thoracis ac uētris, quod

διάφραγμα.

Græci diaphragma uocant, item stomacho uel uentre, iecore, liene, intestinis, renibus, uesica, aut mēstruali

μήτρει.

uia, uel matrice, aut perineo. Sed de iis quæ in matrice generantur libris quos de muliebribus uitiis conscripsimus Responsionum docuimus: de cæteris uero

\* collectionū

nunc dicemus. \* Harum igitur aliæ solo medicamine

\* ductu

curantur, atq; medicinali \* delectu gubernante usum

\* sunt

chirurgiæ non exigunt: siquidem \* sint occultis in locis,

\* est

& plurimis superpositis membris, & \* sit impossibile atque illicitum plurimas incidere partes,

\* copiosius

ne sanguinis \* pomposus fluor periculum faciat egrotanti, ut sunt quæ in pulmone generantur, uel diaphragmate intrinsecus, uel in ipsa \* alteriore altitudine, aut in stomacho superius scilicet à diaphragmate, uel in uentris \* sessione, aut intestinis, excepto

\* ulteriore

\* fitu, loco, po

fitu.

sine

sine longaonis, item in posterioribus uesicæ, uel in re-  
 nibus: \* alia uero accedente chirurgia curantur, quo- \* *Alia*  
 ties ad exteriora corporis collectionum \* liquorem \* liquores  
 erumpendo feruntur, uel magis ab altioribus rece-  
 dunt, ut in hypozygo membrana, uel diaphragmate *ὡπίζοιτο*.  
 forissecus, atq; stomachi fundo, \* & uentris, circa eius  
 superiorem altitudinem, item \* iecore, & liene, & *aph. 45. li. 7.*  
 longaone ad eius exteriora, atque \* sphinteri uicina, \* *sphincteri*  
 & uesicæ in anterioribus, uel sub umbilico, pubete-  
 nus, quod Græci etron appellant, item in uesicæ col-  
 lo, uel in prima eius parte, quam Græci \* uretan uo- \* *ὑρῆαν*  
 cant, & in perineo. Communiter autem omnis uom- *aphor. 57. li. 7.*  
 ca uel collectio, antecedente tumore nimio, genera- *ὀψύτη.*  
 tur. Denique empyici quos nos uomicosos, appella- *ἰμυϊκοί.*  
 mus, alij ex pleuretico morbo, alij ex pleumonico in  
 supradictam passionem deueniunt, sequētibus signis,  
 nūc communibus cuiusdā partis in uomicam uenientis,  
 nunc specialibus pro singulis corporis locis. Sed ne lon-  
 ga \* hac oratione extimemus, omnium communia si- \* *hac*  
 mul ordināda probamus: tum singulatim specialia de-  
 signantes etiam \* munia adiungemus. Omnibus igitur \* *communis*  
 collectionibus generatis, uel cum tumor in \* liquore \* *liquorem,*  
 uertitur, sequitur febricula uehemens, inordinata, & *pus. aph. 47.*  
 sepe cum rigore, & torpore frigido, uel \* iniquitate *lib. 2.*  
 corporis, tum loci feruor incendiosus, grauedo, ten- \* *inquietudi-*  
 sio, & exceptis quæ in pulmone fiunt, sepe stimulans *ne: iactatione:*  
 dolor, & pulsuosus: tum celer pulsus, atq; humilis, &  
 sepe sudor, magis capitis, atq; collorum. Dehinc per-  
 fecta purulentatione rigor corporis, atq; tremor \* *cessat*  
 cunscrbitur, & febrium recedit inquietudo, ac dolo-  
 rum: sed specialiter ac proprie \* in communibus, si in \* *præter com-*  
 membrana quæ latera circumtegit hypozygos appel- *munia*  
 lata,

lata, fuerit generata collectio, di fficultas spirationis

*Δυσπνοια.* sequitur, quam *δυσπνοαν* uocauerunt, & difficilis iacendi potestas supra contrarium patienti latus, \* hoc est, supra latius quod est, quod causa non tangitur, cum sensu quodam inter morbo  
\* *μεμβρανῶν* \* membrorum, & saepe commotu corporis quasi sonus auditur, uelut inclusi atq; colli si humoris, \* nam Graeci *hydatismon* appellāt. Sequitur etiā displicentia post acceptum cibum, quam Graeci *dysarescesin* uocant, & plurima tensio medi j lateris, aut \* uerricosa inflatio impressiōni digitorum cedens, ac resurgens. In pulmone uero emergente uomica, spirādi plurima difficultas sequitur egrotantes, tussis uehemens, uox obrusa uel rauca, & odoris tetrici spiratio, thoracis grauedo, & adductio superiorū ad inferiora, item grauatio atq; tēsiō supinatis egrotantibus, & releuatio sedentibus: deniq; se ipsi sustollunt ad partes lecti superiores, quo leuati⁹ habeant caput. Sequitur etiam cauitas oculorum, genarum rubor, & albedo sub lingua uenarum. Et si eruptio tardauerit, inflatio quoque articulorum sequitur, uultus pallor, & macies ora deformās. Item in diaphragmate emergente uomica, dolor supra praecordia sequitur, penetrans per latera utraque usque ad posteriora, & aliquando inflatio uel tensio iuxta finem pectoris, uel sub extremis costis, atque ossibus \* ultimis, perseverans usq; ad \* alia. Et si collectio \* forinsecus fuerit, sonitus aliquando humoris inclusi sequitur, tum tussicula, & in spirationibus difficultas plurima, ac respiratio longa, \* & forinsecus spiritu attracto dolor, quod nunquam sequitur eos qui pulmonis uomica.

\* *ilia* \* extrinsecus  
† extra Diaphragma intra ventrē, qua re triculum Diaphragma contingit, non qua pulmonem spectat.  
\* Nam per inspirationes Diaphragma in ventris inferioris spatium distenditur, quemadmodum per expirationes sursum in thoracem adducitur.

nica uexantur. Etenim pleumonici hauriendo magis spiritum releuantur. In stomacho autem emergente uomica ructationes tetrae, atque difficultas spirationis, sed minor egrotantes sequitur, & aliquando tussicula \* paruo sine ullo \* tumoris excreatu: tum torpor frigidus articularum, animi defectio, sudor in summitate cutis, pulsus paruus, & corruptio sumpti cibi, atque acide ructationes, & nausea, & aliquando uomitus, siccitas linguae, uel asperitas, sitis, transuoratio difficilis, plurima uel parua pro collectionis magnitudine. Quod si fuerit in superioribus stomachi, donec cibis transuoretur pressuram sentiunt egrotantes, post \* effectus uero \* releuantur. \* Ac si in inferioribus, erit facilis transuoratio, ac deinde dolida cibi perceptio sequetur, cum ad destinata peruenerint quae \* sumantur, dolore ex anterioribus partibus in ore uentris attestante, cum inflatione, uel extantia quae impressione digitorum cedat ac resurgat. Si uero in superioribus fuerit collectio, nulla uidebitur prompta inflatio uel extantia, sed dolor atque grauedo inter scapulas, \* uel ex posterioribus ceruicis partibus sentietur. \* Ac si in \* uentre fuerit collectio, & magis in eius ambitu, erit inflatio inferius a diaphragmate, quod discrimen appellamus, circa medium praecordiorum sinistrorsus flexa, & impressioni digitorum cedens, ac resurgens, attestante fastidio, nausea, siti post cibi sumptionem, cum ructationibus acidis, atque sumptorum corruptione, & aliquando liquidis per uentrem egestionibus. \* Ac si in aliquo intestinorum fuerit collectio, erit extantia uel inflatio uomica secundum eius positionem, \* in pyloro: denique constituta in ultima parte uentris sub dextro latere, atque ilio, uel sub iecore. Sin uero in nestide fuerit collectio,

\* parua  
\* humoris  
\* At

\* deuoratum  
\* releuantur  
\* At  
\* sumuntur

\* uel in  
\* At si  
\* uentriculo

\* At  
\* pylorus.  
\* ut in pyloro  
erit extantia  
constituta  
ut in.

Atio,

- \* *emiserunt.* tatione quadam lapidem prouocando \* *dimiserunt.*  
 Pueris autem magis prominens ueretrum fit. Sepe etiam extantia quedam agrotantibus occurrit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa præterea urina se-
- \* *Aphor. 31.* dimina inueniuntur, aliquando \* *crassiora,* & \* *cali-*  
 lib. 7. & 77. *da,* aliquando arenosa & saxosa. Item quibusdam as-
- lib. 4. *per lapis,* aut sanguinolentus excluditur, & sanio-
- \* *pallida* *sus.* Sed quoniam signa communia sequuntur ulceri-  
 bus uesicæ atque lapidibus generatis, & iis qui ge-  
 lato sanguine impediti mictus difficultate afficiuntur,  
 confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita
- \* *catethere so-* \* *melotide,* cuius rationem atque usum Responsionum  
 lido, non sistu- *libris* \* *chirurgiam* scribentes plenissimè tradidimus.  
 liso.  
 \* *τις χυρρ-*  
 γία.
- \* *ex* *fœminam,* ueluti quidam leuium medicorū, \* *sed quo-*  
*dam corporis uitio,* non adhibita recorporatiua cura-
- \* *non autem* *tione,* cum solius auferendæ \* *alienitatis* intentione  
*recorporationis* *medici capiantur:* \* *cuius plurimæ* sunt differentie. Est  
*deinceps faciē-* *præterea urinae reddendæ impedimentum,* quod Græ-
- \* *Nam eius* *ci stranguriam* uocant, mictus officium retardatum.  
*γγανγία.* Difficultas autem, quam iidem dysuriam appellāt, quæ  
*δυσγία.* id adiuncto dolore \* *ingesserit.* Impossibilitas autem,  
 \* *ingerit* *quam* \* *urian* uocant, perfecta eius officij negatio. Sed  
*δγία.* hæc tria accidentia quæ Græci symptomata uocauē-
- \* *ischuriam* *runt,* nunc stricturæ sunt appenditia, cum tumor uesi-  
*εμπύματα.* cam tenuerit, siue durities, aut paralysis, uel tensio, ut  
 \* *rerum alie-* *quidam uolentes urinam usu solito ac naturali depo-*  
*narum,* & *ter naturam* in  
*corpore genita-*  
*rum.* officij dilatione uexentur: aliquando \* *alienitatis ob-*  
*trusione*

trusione uesicæ impedito meatu, ut lapidis, aut arenæ,  
 aut capillorum, aut squamularum cantabri similitum,  
 uel quocunque sedimine crassiore. Fluor autem san-  
 guinis per uesicam, quæ Græci hæmorrhagian \* uocā- αἱμορραγία.  
 tes manifestus, cum aceruatim per urinæ meatum san- \* uocant, est  
 guis excluditur. Sed quoniam non \* solo ex ambitu \* solum  
 uesicæ fluor iste fit, sed etiam ex collo, uel mictualibus  
 \* uisco aceruatus sanguis excluditur: aliquando etiam \* uis ueteri-  
 de renibus, erit locorum discretio facienda. Nam re- bus  
 nibus patientibus dolor in clunibus demonstratur. V-  
 esicæ \* autem ambitu patiente, sub umbilico, uel pube- \* Aphor. 39.  
 tenus apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus san- lib. 7. & 80.  
 guis excluditur. Item collo uesicæ patiente circa ue- lib. 4.  
 retri initium, quod Græci perineon uocant, dolor sen-  
 titur. Mictuali autem uia patiente, ipsam ueretri ra-  
 dicem dolor afficit, attestante sanguinis puritate, cum  
 iuge ac non intercapedinata emissionem, etiam si digitis  
 loca, quæ iuxta sessionem ueretri sunt, presserimus,  
 quo in loco est ultima mictualis uia, quam, ut supra  
 diximus, utream Græci uocauerunt. Nam si ex aliis ἑπὶ πρῶτα.  
 locis sanguis feratur, digitorum impressione magis ab-  
 stinetur, cum supradictis locis, hoc est, perineo, uel po-  
 dici uicinis renititur impressio. Tunc \* ex uesicæ col- \* enim  
 lo \* impedimento repressus feretur: ex superioribus \* impedito prof-  
 uerò abstinetur. Aliorum autem medicorum signa de su referetur, ac  
 his discretionibus conscripta Responsionum libris chi- in superioribus  
 rurgiam scribentes elogiauimus. Sunt autem uesicæ uis abstinebi-  
 tia, uel passionibus generaliter curatione difficiles. Est tur.  
 enim natura nervosa, & altioribus insita locis, atque  
 celata, & quæ corporis superflua sustineat acriora.  
 Sed ne Methodi rationem uariare uideamur, erit de-  
 monstrandum, quoniam fluori siue solutioni uesicæ,  
 quam



βουμβουμὸς  
vesica.

\* Apho. 79.  
lib. 4.

\* Apho. 76.  
lib. 4.  
σνιπρῶσις.

ἔσθρρ.

\* cibi potus e-  
pithematum.

\* Prodest &  
seſſio

\* austeriori  
ἰνὰ θισμα.

\* thaliæ her-  
bæ, s. frondis

κατὰ θίρ.

\* facienda co-  
rum quæ

\* succi

quam Græci rheumatismum uocant, sunt adscribenda plurima, quæ specie discrepare uidentur, ut plurimus mictus cum \* arenoso uel \* capilloso sedimine. Item sanguinis fluor: strictura autem adscribendus tumor est, atque durties, uel saxeæ duritas, quam Græci scirrhusin uocant. Horum duplicem generaliter in superpositionibus curationem demonstramus. Fluente igitur uesica, hoc est, solutionem patiente, locandus æger in frigido mediocriter loco, adhibita requie, cum abstinentia, & articularum tenaci ligatione: & si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominentius subleuatis: & officio mictus admonente, quātum datur, imperandum ægro, ut neque id retento faciat spiritu, neque ui quadam, uel conatu, excludi cogat aliena. Apponenda etiam sponsia noua aceto tincta, secundum clunes, uel umbilicum, ac pubetenus, quod Græci etron appellant, usque ad ueretri initium, quod iidem perimeon uocāt, addita tenaci cum amplexu ligatione. Tum epithemata iisdem locis, atque cucurbita constrictiua adhibenda. Potus dandus frigidus: paruus cibus. \* Species, de sanguinis fluore & sputo scribes, docuimus. Similiter etiam, quæ præbibenda, conscripsimus, eiusdem scilicet qualitatis. \* Et seſionem ex uino \* uehementiori confecta, quam encathisma uocant, in qua sint præcocta murtæ baccule, cum rosis: uel in pusca, aut aceto facta decoctio \* herbæ taliæ, uel rubi, aut mali punici corticis, & horum simulum: uel per ferramentum, quod Græci catethera uocant, iniectio \* secunda, quæ similiter medendo constringāt, acaciæ, hypocystidis, aut plātaginis \* succo, uel polygonij herbæ, aut intybi, uel puscæ frigide, singularis, aut adiuncta thuris drachma una, cum æquali pondere hypocystidis, uel gallæ

*gallæ, cum nigro uino, uel\* talliæ herbæ aqua cœlesti* \* *taliz*  
*concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit*  
*aqua\* coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem.* \* *recoquenda*  
*Mulieribus uero etiam passaria adhibenda, quæ ad*  
*fluorem matricis Responsorum conscripsimus libris,*  
*muliebria uitia curantes. Est autem curatione\* cor-* \* *ac correctio-*  
*rectior, ac facilis eruptione factus, uel\* oscitatione san-* \* *ne facilior*  
*guinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus. Etenim* \* *osculatione*  
*\*influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: diffi-* \* *effluxio*  
*cilis uero correctione ex putredine effectus fluor. Re-*  
*tento enim sanguine, uel abstento, ulcus\* permanebit.* \* *permanet*  
*Est præterea ex putredine sanguis ater, & male re-*  
*dolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore*  
*antecedente, qui putredinis causa aduenisse uidetur.*  
*In eruptione autem flauus, & non\* antecedentibus su-* \* *nigredine: sæ-*  
*prædictis, sed\* excussu, uel saltu, aut percussu effectus.* \* *tore: pure: do-*  
*Solent præterea sicut in podice, uel fœminarum sinu,* \* *lore.*  
*aut matricis collo, etiam in uesica hæmorrhoides ge-* \* *\* succussu, &*  
*nerari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam in-* \* *cû quis equum*  
*teruallis uariatum, quod oportet apprehendere pru-* \* *domare & re-*  
*dentem, cum non coadceruata primo fuerit effusio, sed* \* *gere conatur,*  
*augmentis quibusdam promota, interiectis defectioni-* \* *calcitrosu, &*  
*bus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admo-* \* *peruicacem.*  
*uitione\* cessante cum tensione inguinum, & grauedi-* \* *ai, uel poldis*  
*ne clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eru-* \* *\* attestâre, quâ*  
*perit, supradictorum\* relatione sequente, siquidẽ ali-* \* *dã cessare ex-*  
*quando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficulta-* \* *ponunt, cum*  
*tem, uel abstinentiam faciunt mictus, quam Græci dy-* \* *sanguis fluere*  
*furiam uocât, uel\* uriam. Hæc sunt quæ de his necessa-* \* *desinit.*  
*riò dicenda credidimus. Declinante autem passione* \* *\* relevatione*  
*conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi* \* *\* ischuriam.*  
*oleo, & alumine, cibum uarium dare, atque uinum, ac*

διουμασμός  
vesica.

\* Apho. 79.  
lib. 4.

\* Apho. 76.  
lib. 4.

σνίψωσις.

ἵτρον.

\* cibi potus e-  
pithematum.

\* Prodest &  
seßio

\* austeriori  
ἰνὰ θισμα.

\* thaliæ her-  
bæ, frondis

κατὰ ἄρ.

\* facienda eo-  
rum quæ

\* succi

quam Græci rheumatismum uocant, sunt adscribenda plurima, quæ specie discrepare uidentur, ut plurimus mictus cum \* arenoso uel \* capilloso sedimine. Item sanguinis fluor: strictura autem adscribendus tumor est, atque durities, uel saxea duritas, quam Græci scirrhusin uocant. Horum duplicem generaliter in superpositionibus curationem demonstramus. Fluente igitur uesica, hoc est, solutionem patiente, locandus æger in frigido mediocriter loco, adhibita requie, cum abstinentia, & articularum tenaci ligatione: & si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominentius subleuatis: & officio mictus admonente, quantum datur, imperandum ægro, ut neque id retento faciat spiritu, neque ui quadam, uel conatu, excludi cogat aliena. Apponenda etiam sponsia noua aceto tinctâ, secundum clunes, uel umbilicum, ac pubetenus, quod Græci etron appellant, usque ad ueretri initium, quod iidem perineon uocant, addita tenaci cum amplexu ligatione. Tum epithemata iisdem locis, atque cucurbita constrictiua adhibenda. Potus dandus frigidus: paruus cibus. \* Species de sanguinis fluore & sputo scribentes, docuimus. Similiter etiam, quæ præbibenda, conscripsimus, eiusdem scilicet qualitatis. \* Et seßionem ex uino \* uehementiori confecta, quam encathisma uocant, in qua sint præcoctæ murtæ baccule, cum rosis; uel in pusca, aut aceto facta decoctio \* herbæ taliæ, uel rubi, aut mali punici corticis, & horum similium: uel per ferramentum, quod Græci catethera uocant, injectio \* secunda, quæ similiter medendo constringat, acaciæ, hypocystidis, aut plâtaginis \* succo, uel polygonij herbæ, aut intybi, uel puscæ frigide, singularis, aut adiuncta thuris drachma una, cum æquali pondere hypocystidis, uel galle

gallæ, cum nigro uino, uel\* talliæ herbæ aqua cœlesti \* talis  
 concocta: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit  
 aqua\* coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem. \* recoquenda  
 Mulieribus uero etiam passaria adhibenda, quæ ad  
 fluorem matricis Responsonum conscripsimus libris,  
 muliebria uitia curantes. Est autem curatione \* cor- \* ac correctio-  
 rector, ac facilis eruptione factus, uel\* oscitatione san- ne facili-  
 guinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus. Etenim \* osculatione  
 \* influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: diffi- \* effluxio  
 cilis uero correctione ex putredine effectus fluor. Re-  
 tento enim sanguine, uel abstento, ulcus\* permanebit. \* permanet  
 Est præterea ex putredine sanguis ater, & male re-  
 dolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore  
 antecedente, qui putredinis causa aduenisse uidetur.  
 In eruptione autem flauus, & non\* antecedentibus su- \* nigredine: sa-  
 pradietis, sed\* excussu, uel saltu, aut percussu effectus. tore: pure: do-  
 Solent præterea sicut in podice, uel fœminarum sinu, lore.  
 aut matricis collo, etiam in uesica hæmorrhoides ge- \* succussu, &  
 nerari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam in- cū quis equum  
 teruallis uariatum, quod oportet apprehendere pru- domare & re-  
 dentem, cum non coadceruata primo fuerit effusio, sed gere conatur,  
 augmentis quibusdam promota, interiectis defecti- calcitrosū, &  
 bus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admo peruicacem.  
 nitione\* cessante cum tensione inguinum, & grauedi ai uispidis  
 ne clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eru- \* attestat, quò  
 perit, supradictorum\* relatione sequente, siquidē ali- dā cessare ex-  
 quando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficulta ponunt, cum  
 tem, uel abstinentiam faciunt mictus, quam Græci dy- sanguis fluere  
 suriam uocāt, uel\* uriam. Hæc sunt quæ de his necessa desinit.  
 riò dicenda credidimus. Declinante autem passione \* relevatione  
 conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi \* ischuriam.  
 oleo, & alumine, cibum uarium dare, atque uinum, ac

deinde lauacrum adhibere. At si strictura fuerit uen-  
 tris, uel uesicæ, conuenit iacere egrotantem loco me-  
 diocriter calido, atq; lucido, adhibita abstinentia usq;  
 ad tertium diem, cum requie. Item locis in dolore con-  
 stitutis manuum calidarum cum blando amplexu uapo-  
 ratio adhibēda: uel \* pubetenus, ac \* ueretri initio, &  
 clunibus calida linteamina, aut uascula ex aqua cali-  
 da, uel saccelli ex pollinibus calidis, aut uesicæ oleo ca-  
 lido plenæ adnouendæ. Ac si uehemens fuerit dolor  
 phlebotomia adhibenda: & partes in passione consti-  
 tutæ lanis \* limpidis oleo calido ac dulci infusis conte-  
 gendæ, ex eo etiam totum corpus ungendum: tum ora  
 forēda. Adhibenda etiam encathismata ex aqua ca-  
 lida, uel aqua & oleo, aut decoctione laxatiua ex iis  
 quæ sepe memorauimus. Tunc cibus dandus sorbilis,  
 & potui aqua calida, moderatione dominante, &  
 usq; ad declinationem passionis, interuallis dierum, nu-  
 trimenta offerenda. Ac si dolor minime cessauerit, cō-  
 uenit usus cataplasmati laxatiui & cucurbitæ appo-  
 sitio leuis, quam Græci cuphen appellant, cum adiecta  
 scarificatione, & uaporatione spongiarum aqua cali-  
 da expressarum. Ac si uenter retentus fuerit, clyster  
 conuenit simplex: & secundo cucurbita clunibus adhi-  
 benda, ac pubetenus \* præeraris capillus. Tunc hirudi-  
 num appositio, quas sanguisugas uocant, atq; embasis  
 adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatis tensio-  
 nibus non solum dolores soluentur uesicæ, sed etiam  
 consequens urinæ difficultas, uel abstinentia. Cauēdus  
 præterea usus urinalium medicaminum, quæ diuretica  
 Græci uocant. Etenim uesicam prouocant, & pro-  
 pterea tumores faciunt commoueri. Ac si minutis do-  
 loribus urinæ \* fuerit retentio, uel in toto cōquicuerit  
 dolor

\* τῷ ἡτρῷ  
 \* τῷ πρῶτῳ

\* non succidis

ὀγκισμῶτα.

Cucurbita  
 λυγρὰ.

\* præeraris  
 ἰμβραῖς.

διουρητικὰ.

\* cessauerit

dolor, tanquam \* factis superpositionibus repetant le- \* confectis ab-  
nimenta, adhibenda fortificatio per uariam gestatio- solmen  
nem, & uocis exercitium, unctionibus quoq; ac defri-  
cationibus admotis, quæ superiora corporis magis  
exerceant, interiecto lauacro, & uario cibo, ac uino:  
& iuxta methodicum modum adiectiones cyclicæ ac  
detractiones faciendæ. Tum ad re corporatiua atq; ue- *Διύπαξ.*  
hementia redeundum adiutoria, ut ex resina, uel dro- *παρίπρωσις.*  
pace, ac paroptesi, & solis torrore, uel arena ignita,  
& appositione cucurbitæ, fortiraptu, \* atq; tractu quo \* Hanc recor-  
dam circumducto remota, corpora roboremus, morbo- *poratiuam cu-*  
rum pulsa segnitie, adhibito usu asperginum, quæ sym- *cucurbitæ supra*  
pasmata Græci uocauerunt. Tum malagmatum atque *vocauit pag.*  
acoporum laceffentium usus adhibendus, adiecto etiam *324.*  
sinapismo, & fricatione partiū quæ passione afficiun- *συμμάσματα.*  
tur. Tum encathismatibus utendum ex aqua marina, *μαλάσματα.*  
uel salsa calida, & magis iis qui mordicatione quadā *ἀκρωα.*  
locorum in iisdem passionibus tanguntur: tum cata- *ιγναθισματα.*  
clysmo utendam, cuius \* nominis uim præscriptis libris \* aquarum il-  
sepius \* latinauimus: ita natatio adhibenda aquarum *lisionem expo-*  
sua uirtute medentium, quibus magis erit in solutioni- *suit. c. j. lib. j.*  
bus utendum. Eligendæ sunt nanq; specialiter quæ alu- *ruinam. cap. j.*  
minis habeant qualitatem, ut sunt in Italia Albule ap- *lib. ij.*  
pellatæ, & Nepefinæ, & \* Cotiliæ, & Auguriæ: iis *κατάκλυσμοι.*  
uero qui lapidibus, uel scabro uesicæ afficiuntur, erunt *\* Latini fani-*  
eligendæ aquæ salsæ, uel quæ nitri habeant qualitatem, *mus.*  
ut apud \* Tenariam insulam, quæ potandæ, atq; lau- \* *Cusilis*  
cro adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est cy- *\* Aenarium*  
clus, & acriora medicamina potanda, ut ex radice la- *λιθοτομία.*  
pati, & capparis, & struthij, uel polij herbe, itemq;  
panacis, & horum similium: & lithotomia in iis qui  
maiorē generauerint lapidem. Item in omnibus helle-

\* Aphor. 28. facile uero in mulieribus\* atq; in eunuchis, & pueris.  
 & 29. lib. 6. & iuuenibus fieri inuenitur. Videtur præterea plu-  
 \* Podagra hæ- rimis antiquis medicis etiam genuino cursu in poste-  
 reditaria est. ros migrare cum semine, & propterea succedentes  
 inuadere, de quare principaliter Responsionum do-  
 cuimus libris: item per aliquas probatur frequentare  
 Caria. regiones, ut Cariam, & Alexandriam Aegypti uici-  
 \* & nam, nec non tēporibus certis nasci, \* item magis aspe-  
 Alexandria. rari uidetur, ut primo, \* uerno secundo, autumno, ter-  
 \* Apho. 20. tio, hyeme, estate uero difficile, Sequitur autem pas-  
 b. 3. sione articulari tētatos, torpor, atq; fornicatio eorū  
 \* otij quietis rursus extensio: item grauedo & \* uacandi dulcedo,  
 & ad paruum motum uehemens labor, atq; dormien-  
 tibus sensus quidam resonātium articularum, & cum  
 de somno surrexerint, ueluti saltu earundem partium  
 afficiūtur: tum horror, uel rigor, atq; tremor sine ulla  
 manifesta ratione partiū sequuntur. Dehinc cum pas-  
 sio se extollere cœperit, in podagricis dolor alterius  
 pedis, aut utriusq; cum pūctionibus nascitur, incipiēs à  
 uestigio aut plantæ cavitare, uel sæpius à maiore di-  
 gito, attestante torpore, & grauedine, & difficili  
 motu, cum horrore rigido, atq; inæquali per membra,  
 & aliquando plurimo seruore, aliquando frigore, ut  
 alij refrigerantia, alij calida desiderent egrotātes, &  
 propterea quidā alterā calidam, alterā frigidam po-  
 dagrā putauerunt nuncupandam. Item initio, ut sæpe  
 contigit, similis color patientium atq; sanarū uidetur  
 partiū, atestante æqualitate, nullo emergente tumore.  
 Dehinc inflatio partiū fit cū rubore. Quapropter re-  
 leuatio altiorū sæpe\* sequetur. Tum peiorāte passi-  
 one arthritica sufficitur passio, cū in unū omnium cogitur  
 articu

\* sequitur



articulorum cōsensus, & facile ex articulo in articulum uenit dolor, nec \* desinēs priusquā cunctos inuaserit nodos. Sæpe deniq; prioris articuli dolore declināte secundus inuaditur, atq; codē similiter miscente tertius sumit exordiū, consentiente etiā uesica atq; spinæ maioribus nervis, quos tenontas appellāt: & in stomacho etiā nausea uel uomitu iactātur ægrotantes. Tunc articuli tumentes inflantur, ac deinde durescūt, & solidati saxeā faciunt qualitātē: tum etiam nigriores efficiuntur, atq; cōtorti, ut in obliquas partes digiti uertantur, aut reflexi supinentur, aut uicinis adfixi incubant, & aliquādo humore purulēto uel mucilento collecto, aut uisoso generent poros, quos nos \* transitus dicere poterimus: dehinc etiā lapides\* sufficiant, qui quidē articulos soluāt, & cutem distendant, atq; erumpentes promineāt, & chirurgia detrahantur: aut exiliētes\* cyathis, cum ferramento tollantur, quod nos \* laureolū dicere poterimus, & rursus renascantur. Tum membra dolentiū partium, cessante nutrimēto, tenuata languescunt, & arida efficiuntur. Erunt præterea ægrotantes paruis ex causis mobiles atq; iracundi, siquidem motū uel actum nō sine querela\* accipiāt. Principaliter autē hæc passio cōstituitur in nervis, uel corū colligationibus, tum cætera morbo consentiunt, atq; cōtiguos uel superpositos lacertos, & maiores nervos pati demonstrāt. Est præterea passio nō facilis curatione, & aliquando magnitudine insanibilis, non ut pleriq; putant \* naturæ. Causæ autē difficillimæ curationis, uel ut sæpe contingit impossibilis, manifestæ atq; plurimæ reperiūtur. Est enim passio in nervis cōstituta qui\* sint natura densissimi, & inter articulorū nodos cōstituti, quorum angustia cōprimuntur, & ad

\* desinīs

τινιπτιο.

\* tophos, legisse  
videtur Au-  
relianus pro-  
prios nō πάρενε-  
ργει.

\* sufficiuntur  
\* ambiente ar-  
ticulum mem-  
brana

\* Laureolum.

\* Scalpreolū

σμίλον,

\* accipiunt.

\* natura

\* sunt

omnem motū asperātur, magis in pedibus, hi enim plu-  
 rimas cōligationes nodorū naturaliter habent, & to-  
 tum corpus sustinendo \* laborat. Præterea hæc passio  
 initio paruitatis causa negligitur, & cōtempta cōua-  
 lescit: quippe cū à multis minime credatur emergere.  
 Alij deniq; digiti luxati, aliqui pedis uersionē, aliqui  
 cuiusdā rei calcatae, uel offensæ duritiā aut \* feruorem  
 querūtur, tū necessitate coacti augmēti tēporibus in  
 cōfessionem ueniunt ægrotantes. Ob hoc igitur passio  
 perseuerare, atq; corpora possidere meditatur. Non  
 aut minus etiā longorū lenimentorū causa, quibus re-  
 cessisse putatur, cū sanos ægrotātes fingendo promit-  
 tit, adiuuāte etiā intēperantia, qua cū sepe cōcipi pas-  
 sio, perspicitur, manere posse nō dubitatur, quod di-  
 cā diatrīto. Si uēter officiū nō agnouerit, clyster ad-  
 hibendus simplex, atque ita totius passionis statu  
 accepto ut inflata vel tumētia loca videātur, sca-  
 rificatio adhibēda: & ubi permiserint partes cucurbi-  
 ta figēda, uel hirudines admouēdæ. Est aut omnium le-  
 uior \* præter cucurbitā scarificatio. siquidē nulla quas-  
 satio partium fit, quæ necessariō cucurbitæ cōiuncta  
 est. Item hirudinum morsibus consensus adiūgitur, &  
 propterea, ut supra dictū est, simplex \* cōflatio lenius  
 probatur. Adhibenda etiam uaporatio spongiarū, tum  
 aquæ calidæ fomentatio, uel \* aqua & oleo, aut deco-  
 ctionis foenigræci, aut lini seminis, uel hybisci. Item  
 cataplasma mitigatiuum, quod iamdudum minime  
 posse adhiberi uidebatur, siquidem tumentia pondere  
 grauari nō \* debeant. Sit igitur panis diligentius emol-  
 litus, solus, aut admixta radice argallici, quod Græ-  
 ci symphyton uocant, uel hybisci decocta, uel cuius-  
 quam similis uirtutis quorum probauimus adhiben-  
 das

\* laborant

\* à feriendo:  
ictum

Hæc mutila

\* sine cucur-  
bita\* scarificatio le-  
uior. Alij def-  
latio

\* aquæ &amp; olei

\* debent

σύμφορον

das uaporationes. Tum cum firma declinatio fuerit  
 constituta, adhibenda lauacra, atq; uarius cibus, & a- \* potui  
 qua \* potu danda, & propter passionis nequitia adhi-  
 benda etiā cerotaria ex oleo dulci, uel cyprino, aut ex  
 adipe confectū medicamen quod Græci diasteaton uo- \* tum  
 cant, \* tunc malagma Diachylon, uel Mnaseū, at quod διαστατον?  
 appellāt Diatelecos, uel dioxeleum, uel diathalassestū. Διὰ ἀλός ἐν-  
 Paulatim fortificandum corpus deambulatione liberis  
 calciamento pedibus, & cum cautione aduersantium  
 rerū, ut ne quid nimis, maxime uini, aut indigestionis, pag. 624 a  
 aut Veneris. Arthriticis uero conuenit etiam digitis  
 ceram emolliendam dare, uel \* manipulos tenendos, Paulo. Dioxe-  
 quos palestritæ alteres appellant, tum mouendos, ce-  
 reos, uel ligneos primo, cum paruo plumbo interfuso: leū uero pag.  
 tum pro modo profectus grauiores: & in tardate pas- 829. ab Aetio.  
 sione, superpositionis tempore supradicta seruanda \* uide cap. 1.  
 simplicitas curationis. In lenimento uero adhibenda lib. 2.  
 fortificatio, tum recorporatio. Sit igitur primo gesta ἀλγιστος.  
 tio pro modo uirium, tum deambulatio molli strami-  
 ne coæquato solo, adiecto uocis exercitio, cum cor-  
 poris unctione. Etenim uacatio crassificat corpora,  
 adeo etiam \* & in hiis qui ex aliis forte plurimo tem- \* ut in iis  
 pore iacuerint causis, hac ratione articuli \* cōmoueā- \* uexentur  
 tur, cum nerui nō exerciti \* ualidiores efficiūtur. Ad- laborent.  
 hibēda etiā lauacra per interualla dierū, & uarius ci- \* inualidiores  
 bus ex mediæ materiæ qualitate: uinū paruū, lene, & efficiantur.  
 semper post cibum: tum dropax simplex, atq; compo-  
 situs: paroptesis ex igni, uel ex sole, atq; pellibus ferue-  
 factis, & ex arena litoris: tū \* aspergines, quas Græ-  
 ci sympasmata uocāt, ex nitro, & adarce, & euphor- \* pag. 420.  
 bio, & sæpe memoratis speciebus: tum ungenta, & Aspersiones.  
 acopa ex \* squilla confecta, & agresti cucumere, item συμπασµατα.  
 \* Scylla ἀνομα.

euphorbio, & adarce. Dehinc malagma adhibendum, ut est quod appellāt Diahalon, aut Diadaphnidō, aut Diadarces aut Diastactes conias, uel quicquā similiū: item rubor cutis ex sinapi faciendus, quem Græci phœnigmon appellāt: item drimyphagia, & cyclorū regula, & radicū uomitus, & hellebori, & embasis facienda, sicut de ischiadicis scribentes memorauimus: uel sōmētatio ex decoctione artemisiæ herbe, aut marinæ fructus aquæ, dehinc natatio seruēs, uel frigida. Item usus adhibendus aquarū naturalium: calidarū tum frigidarū, ut sunt in Italia quæ appellatæ sunt Albule, uel \* Cotiliæ, & omnium supradictorū affectanda repetitio, dabit enim curatio aliis integrā sanitatem, aliis raram doloris admonitionem, ne iugi superpositione nezentur. Veterum quidam annalia medicamina potanda probauerūt, ut est quod appellant Diacentaurion, item Diascordeon, bibendū anno cōtinuo iudicantes, iis qui non plurimo tempore fuerint passione uitati, hoc est intra quinquennij \* temporis constituti, adiiciētes quod bibi debeat medicamē \* prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito. Sin minus, representandū numerum dierum, quo integer cōpleatur annus, quanquam longo tempore porrectus. Secundum nos autem iuxta Sorani iudicium est metuenda diuturna medicaminis sumptio, cum neq; soliti cibi iuges, atq; iidem utiles, recte probentur. Sic deniq; legimus quosdam ueteres memorasse ex iugi medicamine poto in celeres, uel acutas uenisse passiones, & alios apoplectos, alios pleureticos, alios peripleumonicos interisse, item quosdam continua difficultate spirationis affectos, quam Græci dyspnœan uocant. Alij uero qui se isto medicamine profecisse testantur, non

educt

quidam.

quidam.

\* Cotilia

\* tempus constitutis

\* nullis cruditatibus aut obstructionibus impedito.

Medicaminū frequentia reensanda,

diuturna.

aduertunt seruata digestionis causa id fuisse permis-  
sum: quippe cum caterarum rerum excessus declinan-  
do, quidam seruauerint sanitatem, \*cum interrompe-  
re \*metuerint sumptionem medicaminis sui: & pro-  
pterea his intentionibus occupati alias sibi nesciuerint  
profuisse rationes. Item alij unctionem nodorum facien-  
dam probant, quam nos reprobamus: siquidem consen-  
sus facit tumorem. Item alij transeundum ex aliis in  
alia probant \*ungenta & cataplasmata, nunc specie,  
nunc genere differentia, donec egrotantes relcuen-  
tur: siquidem alia pro aliis corporibus uidentur con-  
uenire, & propterea doloris mitigatio sequitur. Or-  
dinauerunt deniq; etiam contrarias uirtute materias  
laxatiuas simul, atq; constrictiuas, & re corporatiuas,  
ut Mnaseum malagma, uel diachylon; item e contra-  
riis uehementius constringentia, ut \*dyateon, & \*cy-  
zicenum, & \*Erasistrion emplastrum: item ex panici  
polline, & lini semine cataplasma, & ex colicula agre-  
sti, uel herba erigerote, & \*bramite, & maderagora,  
& alterco et leticula, & citri medio, uel peponis, &  
origani, uel thymi, aut uuae lupinae, aut portulacae, aut  
betae, aut mali punici foliis uiridibus, uel eius caduco,  
quod Latini \*ambulacium uocant, decocto cum ace-  
to, aut ruta agresti cum aceto, singulari, uel cum \*sim-  
plici alica, aut aceti sedimine, cum apio: aut uitis folia,  
cum simplici pulento, uel \*herbi polline, aut fabae, uel  
hordei, aut lolij, aut lupini, cum fece uini, uel aceti,  
uel ex fico decocto cum aqua & uino & contrito, do-  
nec mellis sumat crassitudinem: Ex quo detractis du-  
rioribus \*partibus imperant coquenda rursus residua:  
Itē ex papaueris \*coliculis, quos Graeci \*cocias uocāt,  
uel eorum foliis, & malis cydoniis & punicis in uino

\* quia  
\* metuerent  
\* unguenta  
\* Dia item  
describitur ab  
Aetio pag.  
834. cyzicenum  
ab eodem pag.  
eadem.  
\* cyzicenum  
\* Erasistratium  
\* stratiote. stratiote.  
tioris flumini-  
lis folia Diose.  
refrigerant, tu-  
morib. & igno-  
bus sacris me-  
dentur: quae  
inflammationē  
minantur, tu-  
mesce nō si-  
nunt.  
Ambulacium  
\* Ampulla-  
gii. pag. 462.  
\* simila, aut  
alica  
\* erui  
\* emplastri  
apparatu  
\* simplicium  
Lignosorum  
quae teri com-  
modē non pos-  
sunt.  
\* folliculis  
Alij capita-  
lis.  
lūnam.  
\* Codicia

rationem, omni tumori frigidas conuenire materias.  
 Igitur secundum paſſiones ac tempora nos discretas  
 aptamus. Alij uero \*acopū ex \*rana rubea in podagri \*describitur  
 cis admirantur, alij marini \*uituli, alij pedes unxerūt, ab Actio  
 ex eius tergo calciamenta facientes: alij uiuentem be- pag. 674.  
 luam oleo coxerunt, alij lupum, & ſpecialiter unctio- \* ex Rubeta  
 nis genus hoc cōuenire probauerūt. Multa enim ficta pedes  
 ſine ratione creduntur, cum forte paſſio non fuerit in-  
 ſidioſa, & cum \*corpus tardauerit, nū in uno atq; eo- \* in corpore  
 dem tempore perſeuerans. Item plurimi uomitū poſt  
 cibū laudauerūt, ſecundo, uel tertio, per menſes ſingu-  
 los adhibendū: ſiquidē & materia \*redarguit, & indi \* ab articulis  
 geſtos eſſe nō ſinit, non aduertētes quod magis uexa- auertit.  
 bilis approbetur, cū hoc adhibito gingiue putreſcant,  
 dentes moueantur, oculi confundātur, & totū implea-  
 tur caput, ſtomachus quoque grauiter afficiatur, &  
 propterea omnes conſentiant nerui. Eſt igitur con-  
 ueniens magis parua cibatio, atque initium ex abſti-  
 nentia ciborum ſumendum curationis. Multi autem  
 medicinae ſcriptores purgatiuis & acrioribus \* pol- \* ri ſolent  
 lent clyſteribus, & urimalibus medicamentis, quae diu-  
 retica uocauerunt. Sed oportet cauere ſtomachi ue-  
 xationem, quae uarietate facile medicaminum fit, item  
 ueſicam quae \*ſit neruoſae qualitatis prouocare. Tra \* eſt  
 dit enim neceſſariō uniuerſo corpori uexationem per  
 ſibi cognatam neruorum qualitatem. ſpecialiter autē  
 ueterum pertransiēdo errores, uanū puto, atq; pro-  
 lixum quod de podagricis ſcripſerunt, & propterea  
 ſtudioſum maxime, cū ſufficiat communis materiārū  
 memoratio ſupraſcripta, tacitis dominis, qui nunc di-  
 cētur. Diocles libris quos de paſſionibus atq; cauſis &  
 curationib. ſcripſit: Praxagoras tertio libro de mor- Diocles.  
 Praxagoras.

*Erasistratus.* bis: Erasistratus libro quo de podagra scripsit. prohibens tamen purgatiua adhiberi, quæ cathartica uocauerunt, malagma uero Ptolemæo regi promittens, cuius scripturam non edidit: quanquam quidam sibi  
*Erophilus.* uisum Erasistrati nominent medicamen. Item Erophili sectatores multi, atque Asclepiades libris ad Erasistratum scriptis, & Heraclides Tarentinus, & Themison secundo libro Tardarum passionum, aliqua ut methodicus, aliqua ut non methodicus decurrit: phlebotomat enim ex peditus, & nihil approbat, & cataplasmatum qualitates confundit, non discernens à constrictiuis laxatiua. Quibus respondere quid oportet? cum uinolentia nervos amputet, phlebotomia patientes impleat partes. Thessalus autem secundo libro Regulari, imperfecte quidem, sed consequenter methodicis intentionibus curationem ordinauit.  
*Thessalus.*  
*vi. 77. 78.* De Renali passione, quam Græci Nephritin appellant. Cap. III.

\* sanguine,  
 aut sanie.

**R**enalis passio à patientibus partibus nomen accepit. Est autem intellecta passio tarda renis aut renum: passio, inquam, tarda: siquidem cum insidenti atque perseueranti querela renalem intelligimus passionem, & non ex nouello atque recenti tumore, sicuti neque cuiusquam ossium coxæ, ni fuerit perseuerans, ischiada intelligere poterimus. Item adieciuius renis, aut renū, siquidem nūc alterū, nūc utrosque tenet renes tumentes, ac duratos, & in saniem sæpe uenientes, & ulceratos, & \* humore fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus, uel uomicis communiter secundo dicemus: nunc de cæteris supra memoratis scribemus, & primo de tumore. Antecedentes itaque causæ, quæ renalem faciunt passionem, aliæ manifestæ, ut perfrictio,



frictio, indigestio, percussus, casus uehemens super clunes, acres cibi plurimi contra consuetudinem, libido uenerea uehemens, uel urinalia frequentata medicamina, aut uenena, quæ specialiter ipsas \* afficiunt partes, ut sunt ex \* cantharidis confecta. Afficiuntur autem hac passione, iuuenibus magis \* grauiore, atque senes, & uiri \* mulieres, & habitudine plenis \* tenniores: siquidē sit in iis grauior, & generaliter curatio difficilis, ob angustiam locorū, quæ passione uexantur, & ob acrimoniā urinae, quæ insuetē aliquando renibus immorata in uesicam transit. Sequitur autē patientes, cum adhuc leuis fuerit tumor, dolor leuis, & magis cum proni fuerint inclinati, secundum clunes, & circa ilia, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum. Cum autem tumor uehementescere cœperit, dolor etiam plurimus fit cum grauedine & seruore clunium omnium, atque iliorum, & pubetenus, uel umbilico cum consensu usque ad uesicam tendente, ob tumorem urinalium uiarum, quas Græci ureticos poros appellant: quæ quidem à renibus usque ad uesicam sunt porrectæ, attestante urina tenui, & aquata, & ita subalbida, ut colaturæ liquidæ colorem fingat, quā Græci charopon uocant, & primò parua, dehinc plurima, aut coaceruatim effusa, quæ nullam faciat \* relevationem, peiorante tumore in \* feculentum colorem ueniens, cum iam nimia tensione tenuissimæ uenule fuerint ruptæ: item in uini transiens qualitatem uiscosæ crassificationis causa: tum \* oleosum ueluti adipis qualitatem simulans, cum renum \* fluor pinguis \* acceperit. Dehinc per incrementa etiam febres accedunt, cum consensu iecoris, ut quidam etiam fellis colorem sumant, attestante uentris abstinentia, cum tormento

\* afficiunt  
\* cantharidibus  
\* grauiore  
\* mulieribus  
\* tenniores: siquidem est

χαρπὶς.  
\* nullū enaurema  
\* sanguinis  
portione quadam admixta.  
τὸ τρυγῶδες  
χρῶμα intelligit.  
\* oleosa, aut  
\* adipis eorum  
colliquatio.  
\* acciderit.

mento, & rustatione, inflationeq; cogente. Tum hebetudo sequitur, & articularum frigus & uomitus: & tardante passione, corporis tenuitas nimia, adeò ut quidam \* uncati permaneant, & semper proni ambulare cogantur, nec unquam se erigere possint. Est præterea signum declinationis, supradictorum in contraria mutatio, ut urina aquata in crassitudinem ueniens: crassior uerò uel uiscosa in tenuitatem: item quæ paulatim atque cum mordicatione ferri solebat, sine labore adueniens, & si plurima, mediocris effecta, & ad summum omnia cum naturæ solita uel similia fuerint uisa. \* Aiunt aliqui eos qui ex casu uel percussu, aut uehementi libidine fuerint, tormenta, irruisse uideantur: colicos uerò maior interior, uel uentri uicinarum partium dolor sequatur, atque inde sumat exordium, consentientibus uel compatientibus clunibus. Item renali uitio extemplo difficultas urinæ coniuncta est. Colicis uerò per consensum atque secundo concurrit. Hæc est similitum passionum discretio. Accidunt hæc item similia etiam in urimalibus uis uitio constituto, ex renibus quæ usque ad uescicam ducunt, quibus eadem quæ supra diximus rectè concurrunt, sed dolor uel eius sensus erit inter renes & intestina, & uescicæ fundum, nulla inflatione uel extantia in externis renum, partibus prominente. Hæc est omnis atque perfecta significatio. Sed oportet sanguinis mixtu adfectos similiter curari tanquam sanguinem spuantes. Alios uerò qui cæteris fuerint passionibus adfecti, sicut de uescica scribentes demonstrabimus, pro suis concursibus uel accidentibus, quæ Græci symptomata uocant, partita curari ratione. Non enim sola generalis, sed etiam specialis eorundem conuenit adiutorio-

rum

\* curui: repā-  
di

\* Hic multa  
desunt.

κωλινός.

συμπτώματα.

rum curatio, solum differens, quòd ea quæ localia sunt adiutoria in iis qui renalibus laborant uitiis magis clu-  
nibus adhibeantur. Illis uerò qui \* uesicæ, pectini, uel \* sub. uitiis  
pubetenus, quod Græci perimeon uocant. laborant.

De tardis uesicæ passionibus. Cap. III.

**I**N uesicæ speciales plurimæ passiones eueniunt, tu-  
mor, collectio, ulcus durities, phthiriasis, item pso- φθίριαισι.  
riasis, quam scabiem, uel scabrum appellamus, capilla- ψωρίασις.  
tio, debilitas, paralytis, calculatio, quam lithiasin uo- πράλυσις.  
cant, sanguinis fluor, siue effusio, quam hæmorrhagian λιθιασις.  
appellant, mictus tarditas, aut difficultas, aut in toto αιμορραγία.  
guttæ aquatiles, quas hydatidas uocant. Sed ne por- ὕδατις.  
recta longitudine fastidiosa curatio uideatur, una præ-  
ceptione omnia apprehendere festinandum. De para-  
lysi igitur superius docuimus, cum de ea specialiter di-  
ceremus. De collectionibus uerò & ulceribus secun-  
dò dicemus, cum de singulis corporis partibus commu-  
nem trademus curationem. Tumente igitur uesicæ, se-  
quitur dolor secundum pectinem, atque ueretri radi-  
cem, & ilia, & clunes, & magis initio ac fine urinæ  
reddendæ: tum feruor incendiosus: item pulsus & ex-  
tantia partis in passione constitutæ, cum iugi ac fre-  
quenti urinæ reddendæ desiderio, & repentina cessa-  
tio, ac rursus egestio fit cum dolore intolerabili per  
singulos mictus, ut extenti ægrotantes etiam uentum  
per podicem reddant, aut ipse podex præcadens ex-  
cludatur: & præterea ægrotantibus supinus exitus  
\* urinae faciliior. Quidam denique necessitate coacti  
defixo capite super \* latus pedibus sese locauerunt, ut  
lapis angusta deferens loca, atque uesicæ aditum repe-  
tens mictus tribuat facultatem. Mulieres deniq; etiam  
digitis immisis in muliebrem sinum sibi met, ipse hor-  
tatione

\* quoniam in  
eo corporis ha-  
bitu lapis in  
uesicæ ampli-  
tudinem rela-  
bitur, ex colli  
angustis.  
\* latis sedibus

- \* *emiserunt.* tatione quadam lapidem prouocando \* *dimiserunt.*  
Pueris autem magis prominens ueretrum fit. Sæpe etiam extantia quadam egrotantibus occurrit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa præterea urina se-
- \* *Aphor. 31.* dimina inueniuntur, aliquando \* *crassiora,* & \* *cali-*  
lib. 7. & 77. *da,* aliquando arenosa & saxosa. Item quibusdam a-
- lib. 4. *ssper lapis,* aut sanguinolentus excluditur, & sanio-
- \* *pallida* sus. Sed quoniam signa communia sequuntur ulceri-  
bus uesicæ atque lapidibus generatis, & iis qui ge-  
lato sanguine impediti mictus difficultate afficiuntur,  
confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita
- \* *catethers so-* \* *melotide,* cuius rationem atque usum Responsionum  
lib. 1. *lido, non fistu-* libris \* *chirurgiam* scribentes plenissimè tradidimus.  
loso. In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus. Nūc  
\* *τὸν κατὰ* enim correctionem demonstramus cuiusdam in corpo-  
\* *γίαν.* re morbi, quo uesica lapidum generatione uexatur,  
& non ut alium masculum appellemus lapidem, alium
- \* *ex* *fœminam,* ueluti quidam leuium medicorū, \* *sed quo-*  
dam corporis uitio, non adhibita re corporatiua cura-  
tione, cum solius auferendæ \* *alienitatis* intentione  
medici capiantur: \* *cuius plurimæ* sunt differentiæ. Est  
re corporatiuis deinceps faciē- præterea urinae reddendæ impedimentum, quod Græ-  
de. ci stranguriam uocant, mictus officium retardatum.  
\* *Nam eius* Difficultas autem, quam iidem dysuriam appellāt, quæ  
\* *εγγαστρία.* id adiuncto dolore \* *ingesserit.* Impossibilitas autem,  
\* *δυσπρία.* quam \* *urian* uocant, perfecta eius officij negatio. Sed  
\* *ischuriam* hæc tria accidentia quæ Græci symptomata uocauē-  
\* *εγγαστρία.* runt, nunc stricturæ sunt appenditia, cum tumor uesi-  
cam tenuerit, siue durities, aut paralysis, uel tensio, ut  
\* *rerum alie-* quidam uolentes urinam usu solito ac naturali depo-  
narum, & præ nere, obstantibus causis, longo tempore continentes  
ter naturam in officij dilatione uexentur: aliquando \* *alienitatis ob-*  
corpore genita trusione  
rum.

trusione uesicæ impedito meatu, ut lapidis, aut arenæ,  
 aut capillorum, aut squamularum cantabri similitum,  
 uel quocunque sedimine crassiore. Fluor autem san-  
 guinis per uesicam, quā Græci hæmorrhagian \* uocant, est  
 manifestus, cum acruatim per urinæ meatum san-  
 guis excluditur. Sed quoniam non \* solo ex ambitu \* solum  
 uesicæ fluor iste fit, sed etiam ex collo, uel mictualibus  
 \* uisco acruatus sanguis excluditur: aliquando etiam \* viis ureteri-  
 bus  
 de renibus, erit locorum discretio facienda. Nam re-  
 nibus patientibus dolor in clunibus demonstratur. Ve-  
 sicæ \* autem ambitu patiente, sub umbilico, uel pube- \* Aphor. 39.  
 tens apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus san-  
 guis excluditur. Item collo uesicæ patiente circa ue-  
 retri initium, quod Græci perineon uocant, dolor sen-  
 titur. Mictuali autem uia patiente, ipsam ueretri ra-  
 dicem dolor afficit, attestante sanguinis puritate, cum  
 iuge ac non intercapedinata emissionē, etiam si digitis  
 loca, quæ iuxta sessionem ueretri sunt, presserimus,  
 quo in loco est ultima mictualis uia, quā, ut supra  
 diximus, uræam Græci uocauerunt. Nam si ex aliis \* igitur.  
 locis sanguis feratur, digitorum impressione magis ab-  
 stinetur, cum supradictis locis, hoc est, perineo, uel po-  
 dici uicinis renititur impressio. Tunc \* ex uesicæ col- \* enim  
 lo \* impedimento repressus feretur: ex superioribus \* impedito prof-  
 uerò abstinetur. Aliorum autem medicorum signa de  
 his discretionibus conscripta Responsionum libris chi-  
 rurgiam scribentes elogiauimus. Sunt autem uesicæ ui-  
 tia, uel passionēs generaliter curatione difficiles. Est  
 enim natura neruosa, & altioribus insita locis, atque  
 celata, & quæ corporis superflua sustineat acriora.  
 Sed ne Methodi rationem uariare uideamur, erit de-  
 monstrandum, quoniam fluiori siue solutioni uesicæ,  
 quam

gallæ, cum nigro uino, uel\* talliæ herbæ aqua cœlesti \* taliæ  
 concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit  
 aqua\* coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem. \* recoquenda  
 Mulieribus uero etiam passaria adhibenda, quæ ad  
 fluorem matricis Responsonum conscripsimus libris,  
 muliebria uitia curantes. Est autem curatione \* cor- \* ac correctio-  
 rector, ac facilis eruptione factus, uel\* oscitatione san- ne facior  
 guinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus. Etenim \* osculatione  
 \* influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: diffi- \* effluxio  
 cilis uero correctione ex putredine effectus fluor. Re-  
 tento enim sanguine, uel abstento, ulcus\* permanet. \* permanet  
 Est præterea ex putredine sanguis ater, & male re-  
 dolens, atq; purulentus ex ulcere præfecto, & dolore  
 antecedente, qui putredinis causa aduenisse uidetur.  
 In eruptione autem flauus, & non\* antecedentibus su- \* nigredine: sa-  
 pradiatis, sed\* excussu, uel saltu, aut percussu effectus. tore: pure: do-  
 Solent præterea sicut in podice, uel scœminarum sinu, lore.  
 aut matricis collo, etiam in uesica hæmorrhoides ge- \* succussu, &  
 nerari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam in- cū quis equum  
 teruallis uariatum, quod oportet apprehendere pru- domare & re-  
 dentem, cum non coadceruata primo fuerit effusio, sed gere conatur,  
 augmentis quibusdam promota, interiectis defectio- calcitrosū, &  
 bus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admo peruicacem.  
 nitione\* cessante cum tensione inguinum, & grauedi- ai, & poidis  
 ne clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eru- \* attestato, quō  
 perit, supradictorum\* relatione sequente, siquidē ali- dā cessare ex-  
 quando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficulta ponunt, cum  
 tem, uel abstinentiam faciunt mictus, quam Græci dy- sanguis fluere  
 suriam uocāt, uel\* uriam. Hæc sunt quæ de his necessa desinit.  
 riō dicenda credidimus. Declinante autem passione \* releuatione  
 conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi \* ischuriam.  
 oleo, & alumine, cibum uarium dare, atque uinum, ac

deinde lauacrum adhibere. At si strictura fuerit uentris, uel uesicæ, conuenit iacere egrotantem loco mediocriter calido, atq; lucido, adhibita abstinentia usq; ad tertium diem, cum requie. Item locis in dolore constitutis manuum calidarum cum blando amplexu uaporatio adhibenda: uel\* pubetenus, ac\* ueretri initio, & clunibus calida linteamina, aut uascula ex aqua calida, uel saccelli ex pollinibus calidis, aut uesicæ oleo calido plenæ adinouendæ. Ac si uehemens fuerit dolor phlebotomia adhibenda: & partes in passione constitutæ lanis\* limpidis oleo calido ac dulci infusis contegendæ, ex eo etiam totum corpus ungendum: tum ora fouenda. Adhibenda etiam encathismata ex aqua calida, uel aqua & oleo, aut decoctione laxatiua ex iis quæ sæpe memorauimus. Tunc cibis dandus forbilis, & potui aqua calida, moderatione dominante, & usq; ad declinationem passionis, interuallis dierum, nutrimenta offerenda. Ac si dolor minime cessauerit, conuenit usus cataplasmatum laxatiui, & cucurbitæ appositio leuis, quam Græci cuphen appellant, cum adiecta scarificatione, & uaporatione spongiarum aqua calida expressarum. Ac si uenter retentus fuerit, clyster conuenit simplex: & secundo cucurbita clunibus adhibenda, ac pubetenus\* præraris capillis. Tunc hirudinum appositio, quas sanguisugas uocant, atq; embasis adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatis tensionibus non solum dolores soluentur uesicæ, sed etiam consequens urinae difficultas, uel abstinentia. Cauendus præterea usus urinalium medicaminum, quæ diuretica Græci uocant. Etenim uesicam prouocant, & propterea tumores faciunt commoueri. Ac si minutis doloribus urinae\* fuerit retentio, uel in toto cōquieuerit dolor

\* τῷ ἄρῳ  
\* τῷ περιτῷ

\* non succidit

ἐγκλισματῶν.

Cucurbita  
λευκῶν.

\* præraris  
ἐμβασίς.

διουρητικῶν.

\* cessauerit



dolor, tanquam\* factis superpositionibus repetant le- \* confectio ab-  
nimenta, adhibenda fortificatio per uariam gestatio. *solutio*  
nem, & uocis exercitium, unctionibus quoq; ac defri-  
cationibus admotis, quæ superiora corporis magis  
exerceant, interiecto lauacro, & uario cibo, ac uino:  
& iuxta methodicum modum adiectiones cyclicae ac  
detractiones faciendæ. Tum ad re corporatiua atq; ue- *ἀνίαξ.*  
hementia redeundum adiutoria, ut ex resina, uel dro- *παρίπρισις.*  
pace, ac paroptesi, & solis torrore, uel arena ignita,  
& appositione cucurbitæ, fortiraptu,\* atq; tractu quo \* Hanc recor-  
dam circumducto remota, corpora roboremus, morbo- *poratiuam cu-*  
rum pulsa segnitie, adhibito usu asperginum, quæ sym- *cucurbitæ supra*  
pasmata Græci uocauerunt. Tum malagmatum atque *vocauit pag.*  
acoporum laceffentium usus adhibendus, adiecto etiam *324.*  
sinapismo, & fricatione partiū quæ passione afficiun- *συμπύσματα.*  
tur. Tum encathismatibus utendum ex aqua marina, *μαλάγματα.*  
uel salsa calida, & magis iis qui mordicatione quadā *ἀνωα.*  
locorum in iisdem passionibus tanguntur: tum cata- *ἰγκασματα.*  
clysmo utendam, cuius\* nominis uim præscriptis libris \* aquarum il-  
sepius\* latinauimus: ita natatio adhibenda aquarum *lisionem expo-*  
sua uirtute medentium, quibus magis erit in solutioni- *suit. c. j. lib. j.*  
bus utendum. Eligendæ sunt nanq; specialiter quæ alu- *ruinam, cap. j.*  
minis habeant qualitatem, ut sunt in Italia Albule ap- *lib. ij.*  
pellatæ, & Nepefinæ, & \* Cotiliæ, & Auguriæ: iis *λατάνυσμοις.*  
uero qui lapidibus, uel scabro uesticæ afficiuntur, erunt *\* latini fani-*  
eligendæ aquæ salse, uel quæ nitri habeant qualitatem, *mus.*  
ut apud\* Tenariam insulam, quæ potandæ, atq; laua- \* Cutilis  
cro adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est cy-  
clus, & acriora medicamina potanda, ut ex radice la-  
pati, & capparis, & struthij, uel polij herbe, itemq;  
panacis, & horum similium: & lithotomia in iis qui *λιθοτομία.*  
maiorē generauerint lapidem. Item in omnibus helle-

bori adhibendus est usus, si passionēs supradictæ permanserint. Tum nauigatio atq; peregrinatio, & earū uarietas appetenda. Erit præterea longo tempore, ut

\* sollicitudum cætera quæq; nimia, Venus præcauenda. Iis enim qui  
 \* reprobanda ob uesicæ paralyfin, propter officium \* sciscitandum  
 \* facienda usum uenericum probauerunt, consentiendum non est:  
 πρὸς τὸν νοῦν. trahit enim secū totius corporis uexationem. Ob quā  
 \* quæ debilitate afficiunt causam erit \* probanda etiam ferularum tenerarum,  
 \* irruunt. Se. uel tabellarum, usq; ad ruborē cutis ab iis probata per-  
 rosi humoris cussio, itemq; ustio, & scarificatio \* faciendæ pubete-  
 corrupti & a- nus, atque clunibus, & circa initium ueretri circula-  
 cris, per colem tim, quod Græci perineon uocant, \* debilitate affi-  
 effluxum intel- ciens. Sunt præterea aquosa semina quæ excluduntur,  
 ligat, quæ Go- & magis cum se pronos fecerint ægrotantes, uel ce-  
 norrhææ spe- leri ambulauerint gressu. \* Irruit autem corporibus,  
 ciem quidam esse putant. cum longa fuerint debilitate uexata, aut immodico  
 Vulgus vocat usu uenerico affecta. Sed est accipiendæ curatio ex iis  
 chaude pisse. quæ de uesica sanguine fluente memorauimus: Item  
 \* immo potius ex iis quæ in lenimentis passionū fortificandi corporis  
 Rheumatif- causa, ac demutandi sæpiissime probauimus. Est enim  
 mus. Hic de hæc passio seminalium uiarum \* paralyfis.  
 est caput De  
 Diabete.  
 in ægrotos.

De Somno uenerico quem Græci onirogonon appellant. Cap. v.

**P**ER somnos inanibus uisis affecti ægrotantes se-  
 minis lapsu uexantur. Nomen autem sumpsit ab  
 accidenti, siquidem effectum uenericum prouocando  
 perficit. Sed generaliter neq; illico passio est, neq; ac-  
 cidens passionis, quod Græci symptoma uocāt, sed est  
 consequens uisis, quam Græci phantasia uocauerunt,  
 per somnum ægrotantes afficiens, ob desiderium ue-  
 nereæ uoluptatis, uel iugem atque continuam libidi-  
 nem, siue è contrario longam usus dilationem uel con-  
 tinentiam

timentiam. Sed hoc frequentius accidens in passionem  
 sepe deuenit, itemque alterius passionis aliquando si-  
 gnum antecedens fit, ut epilepsie aut furoris, quam  
 Græci maniam uocant, aut cuiusquam similis morbi,  
 quoniam uexationem ostendere probatur, atque præ-  
 moueri corpus, siue prætangi acceptione uetura. Item  
 aliquando antecedens causa supradictæ passionis, quam  
 seminis \* appellamus lapsum, fuisse probatur, à qua di- \* Gonorrhœa  
 scernitur, siquidem illa passio etiam per diem uigilan-  
 tibus ægris fluere facit semen, nulla phantasia in usum  
 uenericum prouocante. Somnus autem uenericus eo so-  
 lo tempore quo dormiunt egrotantes inanibus uisis  
 concubitum fingit. Aliqui etiam aiunt oniroplefin  
 ab onirogono discerni, siquidem oniroplexis illa \* sit *ὄνειρος*  
 quæ per somnum concubitum fingit, cum \* operan- \* est  
 tium sensu, sed sine seminis iactu: Onirogonos uero \* operis  
 usque ad \* defectum deducit seminis lapsum. Sed \* effectum  
 Milesius nihil inquit supradicta differre: unum enim, *Milesius.*  
 atq; eundem fluorem dicit esse seminalium uiarum.  
 Sed quod nunc exclusio perficitur seminis, nunc im-  
 peditur, quanquam uisa per somnum eadem fingan-  
 tur, ob alias inquit irruentes fieri causas: sed non est  
 plurima discretio, \* nisi intentio adhibenda: quippe \* nec  
 cum neq; ad curationem necessaria comprobetur. Eos  
 igitur qui ratione futuræ acceptionis epilepsie, uel fu-  
 roris, aut cuiusquam alterius morbi commouentur, ex  
 iis quæ suis sunt passionibus tribuenda mitigamus: eos  
 uero qui specialiter hoc uitio afficiuntur, tanquam  
 parua gonorrhœa affectos curamus. Supradictorum  
 enim augmentum in istam cadere passionem facit egro-  
 tantes, \* fluentium seminalium uiarum, uel paralysi ui-  
 tiatarum causa. Quapropter cōuenit primo \* egrotanti  
 \* defluxionem  
 ex aliis parti-  
 bus accipien-  
 tium  
 \* egrotantis

φαντάσματα. ab intentione ueneræ uisa mentis auertere, quæ Græci phantasmata uocauerunt, atq; aliorum applicare intentionibus externis admotis. Siquidem facile quæ  
 \* ad actionem uigilantes accipiunt somniorum uisa \* ad actiua cum  
 ducunt, hinc quæ  
 \* exclusione hiis motibus exercent egrotantes, & propterea corpus seminis \* discussione uexatur. Tum stramenta duriora atq; frigerantia procuranda. Iubendi etiam supra  
 \* in ventrem praesus iacere, cum se somno dederint, & \* ante se:  
 uel supponenda tenuis ac producta lamina plumbea  
 \* pusca clunibus, uel spongiæ circundandæ \* pusca frigida infusa,  
 \* contegenda lumborum loca uel \* iniiciendo loca rebus frigida uirtutis ex  
 \* anterioribus, ut balaustio, uel acacia, aut hypocystide, uel psyllio herba, quæ sunt singularia, uel cum palmulis  
 \* antea mentis adhibenda. Cibus etiam constrictius dandus, uel  
 \* Potu densabilis, & frigidus, ut de sanguinis fluore conscripsimus. \* Poto quoq; frigido nutriendi, uel constrictius, non quidem curiosè confectis. Tum adhibenda fortificatio ex communi resumptione, & facienda consuetudo frigidi lauacri, quod Græci psychrolusian appellant. Loca etiam in passione constituta forti impressione fricanda. Sunt enim hæc sufficientia constrictioni faciundæ. Aliqui uero conuenire dixerunt etiam mictus dilationem tendere, ne frequenti officio causa refricetur, & completa uesica, se somno egrotantes dare, quo neq; in altum somnum uenire sinantur, &  
 \* excitari intercessu frequenti \* excitentur, quo uisa ueneræ uoluptatis, quæ somno finguntur, amittant, & extenta uesica seminales uias sibi uicinas comprimendo semen retineant. Alij maiorem digitum ligandum atque constringendum forti filo uel lino iusserunt, quo dolore interueniente altior arceatur somnus, & neque animorum uisa in ueneræ uoluptatem soluantur.

Sed

Sed erunt hæc utraque à nobis excludenda. Vexant enim uigiliæ egrotantem, & ultra modum urinae retentio difficultatem mictus sæpe \* reficit, ut alterius \* efficiat  
passionis illatæ causa uideatur, \* ut supra docuimus. \* sicut

De sanguinis emissionem ex debilitate seminalium viarum. Cap. VI.

**M**ilesius debilitate fieri dixit seminalium uiarum, Milesius.  
uel sequi in usu uenerico pro semine sanguinis emissionem. Sed hoc commune est etiam iis qui in osculo uesticæ, quam \* uretan uocant, ulcus habuerint. Et \* Vrethran.  
est harum manifesta discretio. In iis enim qui ulcus habuerint, cum mictum fecerint, sanguis \* fluet attestante \* fluit  
te mordicatione, & dolore, & aliquando egestionem corpusculorum quæ ephelcydas Græci uocauerunt. In \* φελκύδης.  
iis autem qui debilitate seminalium uiarum afficiuntur, solo tempore Veneris exercendæ sanguis excluditur, attestante iucunditate, nullis corpusculis, & cum mictum faciunt nullaque mordicatione uexante: sed etiam \* nunc curatio ex supradictis accipienda, ubi \* huius  
uesticam fluentem sanguine curari conscripsimus. Constrictione enim atque densitate fluentia retinentur. Tunc resumptio adhibenda, ac deinde recorporatio, ut sæpe memorauimus.

De priapismo.

Cap. VII.

πριαπισμός.

**S**ine ullo dolore uel consensu \* uertigo ueretri fit, \* tentigo,  
& appellatur priapismus, sed uocabulum sumpsit à similitudine priaporum, \* quòd ita \* formentur, ut \* qui  
recto ueretro fingantur. Huius autem passionis meminit Demetrius Apameus libro Signorum. Ait enim \* formantur  
\* Demetrius  
\* Apameus.  
nim \* semen in semet manu operantem nec quicquam \* senem  
potuisse peragere: tensionem autem fuisse ueretri nimiam, cum paruo dolore, ut cornu putaretur, &

ita perseuerasse multis mensibus. Nullo quoque adiutorio medicinali cessasse, \* ac tarde atque longo tempore quieuisse. Quo fit ut à satyriasi discernatur priapismus. Siquidem illa celer \* sit, & non tardat in corpore. \* Fiet sanè cum contractu neruorum, & stimulo desiderio ueneræ uoluptatis: \* nam intelligitur priapismus paralysis esse seminalium uiarū, atq; aliorum neruorum ad ueretri partes \* ducētium, quorum \* contractu egrotantes afficiuntur. Sed etiam \* nunc curatio sumenda est ex iis quæ de uesicæ stricture longo tempore tardante conscripsimus.

De vomicis siue internis collectionibus, quas

ἰμπνύματα. Græci empyemata vocant. Cap. VIII.

**P**lena igitur de his tradenda est ratio. Hæc enim sunt quæ in occultis nata collectiones nuncupantur, ut in splanchnis, ac membrana, quæ latera cingit, uel in pulmone, aut discrimine thoracis ac uētris, quod

διάφραγμα. Græci diaphragma uocant, item stomacho uel uentre, iccore, licne, intestinis, renibus, uesica, aut mūtuiali

πυλινον. uia, uel matrice, aut perineo. Sed de iis quæ in matrice generantur libris quos de muliebribus uitis conscripsimus Responsionum docuimus: de cæteris uero nunc dicemus. \* Harum igitur aliæ solo medicamine curantur, atq; medicinali \* delectu gubernante usum chirurgiæ non exigunt: siquidem \* sint occultis in locis, & plurimis superpositis membris, & \* sit impossibile atque illicitum plurimas incidere partes, ne sanguinis \* pomposus fluor periculum faciat egrotanti, ut sunt quæ in pulmone generantur, uel diaphragmate intrinsecus, uel in ipsa \* alteriore altitudine, aut in stomacho superius scilicet à diaphragmate, uel in uentris \* sessione, aut intestinis, excepto

fine

\* sed  
 \* est  
 \* Fit enim  
 \* At

\* tendentium  
 \* distensione  
 \* huius

σπλάγχνα.

διάφραγμα.

πυλινον.

\* collectionū  
 \* ductu  
 \* sunt  
 \* est

\* copiosus

\* uisioris

\* seu, loco, po  
 fin.

sine longaonis, item in posterioribus uesicæ, uel in re-  
 nibus: \* alia uero accedente chirurgia curantur, quo- \* *Alia*  
 ties ad exteriora corporis collectionum \* liquorem \* liquores  
 erumpendo feruntur, uel magis ab altioribus rece-  
 dunt, ut in hypozygo membrana, uel diaphragmate *ὁπισθεν*.  
 forinsecus, atq; stomachi fundo, \* & uentris, circa eius  
 superiorem altitudinem, item \* iecore, & liene, & *aph. 45. li. 7.*  
 longaone ad eius exteriora, atque \* sphinteri uicina, \* sphincteri  
 & uesicæ in anterioribus, uel sub umbilico, pubete-  
 nus, quod Græci etron appellant, item in uesicæ col- *ἔτρον*.  
 lo, uel in prima eius parte, quam Græci \* uretan uo- \* *urethram*  
 cant, & in perineo. Communiter autem omnis uomi- *aphor. 57. li. 7.*  
 ca uel collectio, antecedente tumore nimio, genera- *ὀνίτις*.  
 tur. Denique empyici quos nos uomicosos, appella- *ἐμπίκκοι*.  
 mus, alij ex pleuretico morbo, alij ex pleumonico in  
 supradictam passionem deueniunt, sequētibus signis,  
 nūc communibus cuiusdā partis in uomicam uenientis,  
 nunc specialibus pro singulis corporis locis. Sed ne lon-  
 ga \* hac oratione extimemus, omnium communia si- \* *hec*  
 mul ordināda probamus: tum singulatim specialia de-  
 signantes etiam \* munia adiungemus. Omnibus igitur \* *communia*  
 collectionibus generatis, uel cum tumor in \* liquore \* *liquorem,*  
 uertitur, sequitur febricula uehemens, inordinata, & *pus. aph. 47.*  
 sæpe cum rigore, & torpore frigido, uel \* iniquitate *lib. 2.*  
 corporis, tum loci feruor incendiosus, grauedo, ten-  
 sio, & exceptis quæ in pulmone fiunt, sæpe stimulans  
 dolor, & pulsuosus: tum celer pulsus, atq; humilis, &  
 sæpe sudor, magis capitis, atq; collorum. Dehinc per-  
 fecta purulentatione rigor corporis, atq; tremor \* cir- \* *cessat*  
 cunscribitur, & febrim recedit inquietudo, ac dolo-  
 rum: sed specialiter ac proprie \* in communibus, si in \* *præter com-*  
 membrana quæ latera circumtegit hypozygos appel- *munia*  
 lata,



nica uexantur. Etenim pleumonici hauriendo magis spiritum releuantur. In stomacho autem emergente uomica ructationes tetrae, atque difficultas spirationis, sed minor egrotantes sequitur, & aliquando tussicula \* paruo sine ullo \* tumoris excreatu: tum torpor frigidus articularum, animi defectio, sudor in summitate cutis, pulsus paruus, & corruptio sumpti cibi, atque acide ructationes, & nausea, & aliquando uomitus, siccitas linguae, uel asperitas, sitis, transuoratio difficilis, plurima uel parua pro collectionis magnitudine. Quod si fuerit in superioribus stomachi, donec cibui transuoretur pressuram sentiunt egrotantes, post \* effectus uerò \* releuantur. \* Ac si in inferioribus, erit facilis transuoratio, ac deinde dolida cibi perceptio sequetur, cum ad destinata peruenerint quae \* sumantur, dolore ex anterioribus partibus in ore uentris attestante, cum inflatione, uel extantia quae impressione digitorum cedat ac resurgat. Si uerò in superioribus fuerit collectio, nulla uidebitur prompta inflatio uel extantia, sed dolor atque grauedo inter scapulas, \* uel ex posterioribus. ceruicis partibus sentietur. \* Ac si in \* uentre fuerit collectio, & magis in eius ambitu, erit inflatio inferius à diaphragmate, quod discrimen appellamus, circa medium praecordiorum sinistrorsus flexa, & impressioni digitorum cedens, ac resurgens, attestante fastidio, nausea, siti post cibi sumptionem, cum ructationibus acidis, atque sumptorum corruptione, & aliquando liquidis per uentrem egestionibus. \* Ac si in aliquo intestinorum fuerit collectio, erit extantia uel inflatio uomicae secundum eius positionem, \* in pyloro: denique constituta in ultima parte uentris sub dextro latere, atque ilio, uel sub iecore. Sin uerò in nestide fuerit collectio,

\* parua  
\* humoris  
\* At

\* deuoratum  
\* releuantur  
\* At  
\* sumuntur

\* uel in  
\* At si  
\* ventriculo

\* a At  
\* ut in pyloro  
erit extantia  
constituta  
rigit.

Atio,

- \* *tenuioribus* *tio*, erit in sinistra parte extantia supradicta atq; inflatio ueluti sub liene. Aliis etiā intestinis \* *tērioribus* collectione uitiatas inter umbilici atq; pectinis regionem  
 \* *At si* supradicta reperiuntur. \* *Ac si* in colo fuerit collectio, secundum ilium dextrum, circa umbilicum usque ad sinistra loca, antecedentibus iis quæ sunt solita colicos afficere, supradicta reperiuntur. Item in longaone collectione \* *suffecta*, clunium dolor sequitur, cum difficultate mictus, & abstinentia uentris, & aliquando egestionem muculentam, uel sanguinolentam. Inflatio autem uel extantia erit in superficie, occulta, sed immixta per podicem digitis sentietur, & ad inferiora uenientibus liquidis commixta stercora putria egeruntur, adeo ut plerunque lateat, utrum ex pyloro, uel  
 \* *tenuioribus* nestide, aut \* *tenerioribus* intestinis hæc ferri uideantur. Sed erunt purulenta separatiore à stercore, atque discretæ, quum ex colo referuntur, aut ex longaone. Item in iecore uomica constituta, inflatio, uel extantia, & pulsuosa sequitur egrotantes \* *appositio*, &  
 \* *partes sanas* tangentibus nobis \* *sana principaliter* \* *occurrunt*, &  
 \* *quæ hepati incumbunt* circa confinium interaneorum, quæ ut suprâ diximus, Græci splanchna uocant, circumscripta collectio sentitur, quum nunquam tantum latens, atque ita submersa in peritoneo collectio comprobetur, neque ita circumscripta ac decisa uideatur: sed paulatim deficiens suos  
 \* *distacta* fines sanis partibus iungat, ut non \* *deiecta* atque decisa uideatur. Hæc est uomicarum omnium specialis significatio, sed earum eruptiones aliquæ ad thoracis imania fiunt, aliquæ inter regionem peritonei & intestinorum, aliquæ ad stomachum uel uentrem, ut liquida atque purulenta euomantur, aliquæ ad pulmonem, siue arteriam maiorem, uel rham, quam Græci bronchon

bronchon appellant, quo liquida & purulenta \*etuf-  
 siantur, aliquæ ad intestina, uel eorum spacia, quo per <sup>βρόχας.</sup>  
 podicē liquida\*excludantur, uel purulenta: aliquæ ad <sup>\*extussum-</sup>  
 matricē, quo per muliebrem sinū profundatur: aliquæ <sup>tur</sup>  
 ad renes uel mictuales uias, ac uesicā, quo per mictū se <sup>\*excludun-</sup>  
 ratur: aliquæ ad cor, ut Erasistratus ait, sed harū om-  
 niū eruptionum pleriq; alias rationabiles dicunt, ali-  
 quas irrationabiles: \*sed rationabiles aiunt, ut ad sto-  
 machū uel uentrem ueniētes per os excludi, ad pulmo \* &  
 nem uero per arteriam maiorem, item ad intestina uel  
 uentrem, uel podicem ferri, ad renes uero uel uesicam  
 per mictuales uias, item ad matricē per muliebrem \*ue- \* <sup>prudendum</sup>  
 retrum: Irrationabiles autem dicunt, eas quæ in dia-  
 phragmate, uel hypozygo membrana, aut iecore, &  
 liene generatæ rumpuntur & per arteriā maiorem,  
 uel stomachum, aut uesicam, aut matricē excludi\*cre-  
 dantur, cum nullæ sint ab iis partibus quæ collectione \* <sup>creduntur</sup>  
 affectæ sunt naturales uiae ad supradiēta loca ducen-  
 tes. Alij uero etiam in iis se \*reptos quædam ua- \* <sup>reperisse</sup>  
 scula demonstrant, anatomica ratione adprehensa, <sup>ἀνατομικῶς.</sup>  
 quæ ad hæc penetrant loca. Alij aiunt uias esse laten-  
 tes, quas logothetas appellant, per quas limpida <sup>Vie</sup>  
 uel purulenta quadam exudatione \*ferantur: sed non <sup>λογισθησάν</sup>  
 oportet de his plurimum disputare. Sufficit enim ad <sup>\*feruntur</sup>  
 disciplinam significationis faciundæ, manifesta com-  
 probare. Item aliqui etiam in singula loca ex aliis fa-  
 ctam susceptionem puris, quam metalepsin uocau-  
 runt, signis explicare conati sunt, quæ quidem non <sup>μετάληψις.</sup>  
 necessaria, sed frequentia probauerunt. Etenim ad  
 arteriam maiorem, siue gutturis cannam, quam  
 Græci bronchon appellant, facta eruptio spiratio-  
 nis ingerit difficultatem, & tussiculam: ad stoma-  
 chum

ad stomachum uerò, nauseam, atque fastidium, et euer-  
sionem, uel uomitum ingerit egrotanti. Item ad inte-  
stina, uel uentrem, tormentum facit partium, cum in-  
flatione, ac uentositate. Ad uesicam uerò, delectatio-  
nem facit frequenter urinæ reddendæ. Ad inania au-  
tem thoracis, atque inter peritoneon membranam, et  
uitalia interna nulla sunt antecedentia eruptionis si-  
gna, sed utranque factam intelligimus. \* Sed pro agro-

\* Nam

uicariis.

\* Præstantior

ad uis.

\* Sed si supe-  
riorum partiū  
discriminis,  
quod Græci  
diaphragma  
uocant, in tho-  
raci inaneru-  
ptio facta fue-  
rit.

mon uocauerunt. \* Præstantius autem, si inter perito-  
neon atque intestina id euenerit. Sequitur etiam pro-  
minencia partium, hydropem fingens, cum mordica-  
tionibus, ac doloribus repentinis. \* Sed si inanis fuerit  
ruptio thoracis facta superiorum partium à discrimi-  
ne, quod Græci diaphragma uocant, cum difficultate  
spirationis, tussiculæ querela sequitur. Sin uerò in re-  
gionem, quæ intestinis atque peritoneo interiacet, fue-  
rit facta, inferiorum partium querela sequitur cum in-  
testinorum tormento. Nouitate enim repentinæ effu-  
sionis acriorum humorum, atque corrupti puris edaci-  
tate ea quæ naturali habitu custodita manebant uita-  
lia, uehementissimè uexantur. Præterea repentina,  
atque coadceruata aliquādo ruptio fit, aliquādo \* pau-  
latim, tenuatis primò uomica tegminibus, ut præliqua-  
tum, atque paruum liquorem mittant, quod apprehen-  
dimus, quum tussicula desinuerit esse sicca, atque sputa  
pollui admixtione puris uiderimus, uel in egestionibus  
uentris quicquam saniosi liquoris fuerit repertum, uel  
in egestionibus urinæ sedimina purulenta fuerint in-  
uenta. Sed post supradictas eruptiones, si omnis fuerit  
facta liquoris effusio, febres illico soluantur, atque loci  
prominen-

\* quod dici so-  
let, per resuda-  
tionem.

prominentia reflatur, & grauedo \* circumscribitur. \* cessas  
 Sin uerò ex parte fuerit effusa collectio, quod fit de-  
 bilitate egrotantis, aut crassitudine liquidorum, aut  
 non in fundo \* uomica \* osculatione suffecta, sed è la- \* vomica  
 teribus, aut supernis partibus \* paulatim liquidam in- \* apertione  
 uenturum. Sed erit approbanda significatio non in \* paulatim em  
 fundo factæ ruptionis, quum inter aliquos dies repleta cunctia liquida  
 uomica, siue eruptio, tensionem rursus, atque graue- inueniuntur.  
 dinem cum febre mouerit egrotanti: tum post effu-  
 sionem superflui liquoris omnia leuigantur: \* ac si \* at  
 militer per interualla dierum \* easdem difficultates \* eadem  
 \* representet. Communiter autem, omnium eruptio- \* representat  
 num tutior est comparatione cæterarum, illa quæ in tur.  
 uescam uenerit, atque mistuales uisæ. Etenim natura-  
 liter creduntur hæ partes iugem acrimoniam liquido- \* tunc  
 rum excipere, ac reddere. Quapropter neque \* nunc  
 ulla nouitate facîle uexari posse uidentur, quum in se  
 aliena atque acriora susceperint, quæ eruptione uom- \* collectione  
 icæ descendunt: dehinc, quod naturali urinæ com-  
 mixta purulenta, quæ \* collatione corrupta uidentur,  
 obtusa mitescunt: ultimò quod neque coadæruatam,  
 sed paulatim redditam, ac requiescentem sumant ege-  
 stionem urinæ per exitum & tractum. At facilitate  
 secunda est quæ ad intestina \* ruperit. Hæc enim quo- \* eruperit.  
 que creduntur transitum stercorum sustinere, sed \* ad \* quàm prima  
 primam minus tuta iudicatur. Siquidem \* possit coad- \* potest  
 æruatæ effusionis causa per podicem, egrotanti \* de- \* animi deli-  
 fectionem facere, & propterea mortem. Tertia est, quum  
 quæ ad matricem \* ruperit, & magis in iis quæ iam \* eruperis  
 naturali lege purgantur. Didicerunt enim & ea loca  
 materiæ transitum sustinere, minus \* quidem à prio- \* tamen  
 ribus tuta est. Siquidem neque ex initio natiuitatis,  
 neque

neque per dies singulos naturalem meatum ipsæ sustinent partes, neque ita acria ferre consueuerunt liquorum: siquidem nihil in se sanguis habet mordacissime qualitatis: omnium tamen periculosior indicatur, ut  
*Erasistratus.* Erasistratus ait, quæ ad cor fuerit facta, eius secunda quæ ad arteriam gutturis, quam Græci bronchum appellant, & eius, repentina magis atque coadceruata, ab ea quæ paulatim fuerit effusa. Siquidem defectio- nes ingerit egrotanti, atque difficultatem spirationis, & tussiculam & præfocationem, cum neque natura- libus liquidis ulla consuetudo per ipsam partem trans- eundi uideatur: tertia quæ ad stomachum fuerit fa- cta: siquidem præfocationem minus ingerit, sed magis à supradicta, appetitum cibi extinguit, & propterea fame egrotantes afficiendo\* debilitet. Item post hanc secunda est, quæ ad inanitatem thoracis fuerit facta. Siquidem circumfunditur pulmoni humor corruptus, atque cordi ultima est, quæ inter regionem peritonei & intestinorum uenerit. Siquidem circumfunditur hu- mor iecori & lieni, & uentri atque intestinis, quæ quum fuerint uexata ingerunt periculum. Communi- ter autem, siue uniuersim dicendo, quod Græci catho- licon uocant, omnium uomicarum, uel eorum qui iis af- ficiuntur salutarem intelligimus ductum fore, si post eruptionem factam febres cessauerint, & magis ex- templo, uel eadem die: siti quoque recedente, atque  
 \*perfecto appetitu cibi: uentris quoque officio parua atque \*congesta reddente, ipsius etiam puris \*albedo, atque eodem colore apparente: & cum lenitate, ac si- ne dolore suarum egestionum, & si per superna egeri- tur, sine uehementi tussicula, neque coadceruatim, sed per partes excluduntur liquida: pessima autem aut

*Erasistratus.*

\* debilitas

\* refecto

\* concocta

\* albedine, at-  
que eodem co-  
lore in omni-  
bus sui parti-  
bus.

\* difficul

\*difficulter, aut ut sepe contingit interfectiua ferri iudicamus eis, quibus post eruptionē febres annexæ perseuerauerint, attestante siti cum fastidio cibi, & uentris fluore, uel ipsius puris felloso, uel liuida colore, coadecruatis egestionibus aut cum uehementi tussicula \*uiribus depurgatis. Hæc est uomicarum significatio. Sed oportet ob earum generationem fugiendam, congruam tumoribus adhibere curationem. Horum enim augmenta collectiones faciunt generari, ut sepe in pleuriticis uel peripneumonicis, uel similibus morbis, quibus ita formauimus curationes, ut minime sinantur initia fieri uomicarum. At uero si iam perfectam uomicam uiderimus, & humore corrupto in toto, aut ex parte, tumoris caruerit nomine, oportebit in similibus adhuc perseuerare adiutoriis, ut cataplasmatibus ex polline tritici, uel seminis lini, aut scenigræci, uel \*hordeacii confectis, uel ex aqua mulsa, aut hybisci decoctione, cuius etiam radix erit conterenda, addita uaporatione spongiarum. Vel si in inferioribus corporis partibus fuerit collectio, encathisimatibus quoque iugibus erit utendum ex aqua & oleo calido, ac decoctione cuiusquam ex iis quæ cataplasmatibus congrua supra diximus. Ante cibum præterea olei calidi quicquam \*poto dandum: dehinc etiam mulsi mediocriter cocti: tunc sorbilis offerendus est cibus, atque calidus. est enim improprium ex parte adhuc manente tumore quicquam acrius adhibere, quo magis labor egrotantibus geminetur, scilicet tumore asperato, unde maiores collectiones efficiuntur. Pausante igitur tumore omni ex parte, & nondum erupta collectione: oportet eius adiuuari celeritatem, ut primum perscriptis cataplasmatibus, sicum sa-

\*difficillima

\*deturbatio.  
afflictus. eodē  
genere loquem  
di vsus est  
pag. 553

\*hordeacii

ignatio quæ

καταπλάσμα  
μύλα.

\*potui



δια πῶν πῶ-  
νιου.

\* Dia Galba-

\* vel Meli-

num quod

\* Dia Di-

clannum.

\* Actius pa-

gina 843. de

scribi Melini

Serapionis:

pag. vero 836.

Dia Dielam-

num

αὐτοῦ αὐτοῦ.

\* Andrapha-

zum

\* in thoraci

inanitate. Sic

enim pus mi-

nus in pulmo-

nem decubuit,

sed in costas

conuertitur.

δια πῶν πῶ-

νιου.

\* δια διακον-

νιου.

\* potui.

\* Zopyrios à

Gale. lib. de

Antidotis: &

Actio pag.

522.

\* potui

ciamus admisceri, cum hybisco: tum resinam terebinthinam, adiuncto usu malagmatum, quæ congrua Responsionum docuimus libris, ut est Mnaseum, item ex tribus resinis, quod Græci diatrion retinon uocant, tum etiam\* diagalbanes, uel melinon, uel quam appellant serapionis, aut \* dictamnium, uel quicquam simili promissione conscriptum: Cibo autem dandus suecus ptisanæ cū melle. Itē porri capitati uel atriplex, quam Græci \* andraphasin uocat: itemq; urticam. Iubendi præterea ægrôtautes magis supra latus lacere, si in superioribus à diaphragmate \* partibus collectio fuerit generata. Cauenda etenim supina iacendi positio: siquidem extenta arteria angustatur, quo & magna difficultas spirationis fit, & minima liquidorum exclusio perficitur. Sed si his adhibitis collectionis nō prouenerit eruptio, oportebit uehementioribus eam prouocare, ne humor inclusus plurima tordando membra corrumpat. Quapropter præpotandi sunt ægri decoctione fici, uel hyssopi, ac rutæ, & origani, & tragorigani, & thymi, uel saturiæ, aut absinthij, uel centaureæ, aut marrubij, aut semine radicū, aut sinapi, aut nasturtij cum melle, quorum aliqua etiam uiridia erunt mandenda. Item medicamen quod appellatur dia trion pipereon \* potu dandum, uel diascoredon, aut \* zopirium. Multi tamen etiā hieram dandam probauerūt, & magis illam quæ appellatur diacolocynthidos. Adiuvat quoq; eruptionis celeritatem sternutatio adhibita, & aliquibus etiam excreatus quidā hinnibilis iugiter affectatus. Ac si neq; ita eruptio fuerit consecuta, erit ieiunus, uel dato \* potu, aut radicibus comestis uomitus adhibendus. Aliqui uero in iis quæ superioribus à diaphragmate partibus uexantur,

nexantur, fumationes adhibuerūt, tardante eruptio-  
 ne, hyssopum, uel thymum, aut origanum incenden-  
 tes, uel sulphur: & sandaraca, aut aloe, uel styrace  
 impositis igni agros hiscere iusserunt, & raptu quo-  
 dam potili nidorem transuorare: \* Tunc dandum uel  
 tymminum probant per diem bis uel ter: simile enim  
 inquit hoc curationis genus chirurgiæ. Scā uehe-  
 menter caput grauat implendo. At si in intestinis fue-  
 rit collectio, erunt per clysterem iniicienda ea quæ  
 præbibenda nuper ordinauimus. Tum eruptione fa-  
 cta, speculandum, utrum per partes \* atq; deposito, li-  
 quida excludantur: an uero coaceruata, aut omnino  
 difficulter, & paulatim. Sed si \* partim, & nullis ob-  
 stantibus excludi uiderimus, erit à cibo abstinendus  
 agrotus, uiribus permittentibus: tum alia die adhibi-  
 ta corporis unctioe præpotandus iis quæ supra me-  
 morauimus. cibus quoq; adiuuare \* collectionem opor-  
 tet quo omnia liquida detrahantur, dato mulso bibe-  
 do, uel solo melle, cum resina terebinthina, aut buty-  
 ro non ueteri. Tum sorbilem dabimus succum ex ali-  
 ca uel ptisana melle admixto. Itē porros. coctos cum  
 oleo, atque garo, & ptisana, tum etiam ex tritico pti-  
 sam confectam, aut cum protropo uino, aut \* squil-  
 litico, item lac cum mulso. Et si eruptio liquidorum  
 ad mictuales uias peruenierit, erunt adiungenda su-  
 pradiçtis etiam mictualia medicamina quæ urinā pro-  
 uocāt, à Græcis diuretica appellata, ut asparagi, olus  
 atrum, lactuce, nūc coctæ, nunc incoctæ, item radices,  
 & sorbilia, lacte quoq; confecta. Sin uero ad intesti-  
 na eruptio peruenierit, quo per podicem exitum ha-  
 beat, cum supradiçtis cōmuniter erunt adhibenda quæ  
 uentris officium non densent, neq; plurimum laxent.

\* tum adhi-  
 bendum hoc  
 thymiam.

\* composi-  
 re

\* per partes,  
 ut paulò ante.

\* exclusionem

\* Scybelitico.

Mictualia  
 diuretica.

Quapropter mistualibus prohibitis cibo ordinamus maluam dandam, betas, cauliculos, cucurbitas. Sed si eoadceruatim, ac nimis liquida ferri uiderimus, erit abstinentia\* recusanda. Dandum mulsum\* poto sufficienter decoctum, & plurima sitis aegrotantibus\* indigenda. Dandus praeterea cibus, qui uetris teneat officium, ut orizae succus sorbilis, aut lenticulae: item pisces duri corporis, quos sclerosarcos Graeci uocauerunt, & uolantum sicciora, & \* poto aqua imbrialis offerenda, quam uulgo cisterninam uocant, calida item medicamina quae ad humectanda tussiculam conscripta sunt: tum uinum mediocriter asperum. Sin uero difficulter atque paulatim liquida fuerint exclusa, erit inquirenda causa, utrumne ob debilitantem aegrotantis id euenierit, \* quo minime ualeat excludere aliena, an uero ob crassitiam liquidorum, uel ob eruptionem \* non in febribus factam, uel in fundo collectionis. Etenim si ob debilitatem aegrotantis id aduerterimus fieri, erunt subleuandae uires per resumptionem. Si autem ob crassitudinem liquidorum, tenuantia adhibenda, atque praepotanda quae supra memorauimus, adiectis quoque similibus electariis, ut sunt ex melle, resina, uel lini semine cum melle confecta, ac nucleo pineo, uel strobilus, & urticae semine: praebendum sinapi cum paruo pipere longo: tunc hellebori adhibemus purgationem. Ac si ex uomicis ulcera tardantia perseuerauerint, ea quae supra diaphragma fuerint, quod discrimen appellauimus, ita curabimus, ut est de phthysicis scriptum: in stomacho uero uel uentre, ut de coeliacis: item in intestinis, ut de dysentericis: in renibus uero ac uesica, uel mistualibus uis potis medicaminibus, atque clystere iniectis, uel per cathetera immissa utemur, etenim si sordida

\* vires enim  
cibo sapius, sed  
paulatim sum-  
pto reficiende  
sunt.

\* potui  
\* iniungenda  
aυλγοσ αρνολ.  
\* potui

\* quia  
\* in lateribus  
aut supernis  
partibus fa-  
ctam, non in

φθισιν.  
λευκιαν.  
δυσεντερικ.  
καταλιν.

sordida apparuerint ulcera, lacte atq; melle potamus, semine cucumeris præfuso: aut mulso: aut pinguibus palmulis cū passo: aut nucleis cū amygdalis & amylo. Similia etiā per catethera immittēda, ut tetrapharmacū medicamē diligēter lacte solutū. Sin uero limpi da fuerint ulcera, erūt encathismata adhibēda, quib. præcocta fuerint aliqua constringentia, atq; extrinsecus apponēda emplastra, quæ cicatricē facere naleāt, à Græcis epulotica appellata. potui dandū lac cū amylo, & cucumeris semine, cū decoctione phœnicobalani, aut papaueris \* fixi, atq; cōstricti cū uino protropo, & \* amygdali decoctione, uel mali cydonij, sorborum, & palmularum thebaicarum, uel succo mali punici, uel iis quæ in pharmaceutico Responsionū tradidimus libris, ex quibus est quod appellatur \* carui, & œnocraton, & ex trachanto atq; amylo, & glycyrrhiza. Utendum etiam aquis sua uirtute medentibus, quas supra memorauimus: Itēq; iis quæ in \* Aria insula, & \* Theanitorum provincia esse perhibētur, cæterarum quoq; resumptiuarum materiarum usum adhibendo, ut nutritiliores succos. Vbi uero inter intestina & peritoneum eruptio fuerit facta, siue ex iecore, siue ex aliqua ueniens collectionis parte, quæsitū est quomodo puris detractio fieri possit, utrumne per tennes uias uesicæ ueniat: atq; in intestina \* acceptū uideatur, & propterea per urinā, uel per uentris officium excludi possit: an uero se sitis inguinum locis detrahi facilius uideatur, quod quidem Erasistratus demonstrauit? Sed apparet \* nunc chirurgia ad exitū puri faciendū, incisa secundū inguen. peritonei membrana, quo corruptis liquoribus prolapsio inferioribus \* aperte præbeatur. Tunc cōgrua adhibenda su-

Medicamen.  
τιτραφάρμακον.

Emplastrum.  
ἐπιπλοτικόν.  
ἐπιπλοτικόν.

\* fixi atq;  
contriti  
\* amygdalarū

Diacaryum.  
tragacantho  
\* Aenaria.  
\* Teauitarum

\* accipi

Erasistratus.  
\* commoda.

\* aperte

\* redditur

ὁ Ἀρῶπων πα-  
ρακλῆττοις.  
ἐπ' ἰσχυρόν.\* cheirurgia  
\* axudare

\* restitutio

πάλυσαρκία.

\* nutrimento  
cessanti  
\* copiosius al-  
litum

ὑπερσάρκ.

ἀλλ' ἄρα.  
λενότερ.  
ἰσχυρότερ.  
ἰσχυρότερ.

ratio. Etenim incisa peritonei membrana, in cicatrice facile conducitur, & sine ullo periculo egrotantis sanitas \* datur, ut est cōiiciendum ex hydropum paracentesi, atq; chirurgia ramicis, quā Græci enterocelen uocant. Neq; impossibile putandum, etiamsi quid remanserit, facta detractione \* chirurgiæ, per superficiem cutis, ac tenues uias, & per intestinorū cavitatem \* sudari. quippe cum etiā in hydropilus circumfusus humor intestinis sæpe fuerit exiccatus, quibusdam per uesicā sceminis per matricem, sed omnibus cōmuniter fortitudinē conuenit per nutrimenta præstare. facile enim \* corruptio partium depulsa passione fit, cum corpus fuerit naturali fortitudine possessum.

De superflua carne, quam Græci polysarcian uocant. Cap. ix.

**A**ccidunt corporibus superflua carnis incrementa, quæ Græci ob nimietatem polysarcian uocauerunt, & est hoc passionis genus contrarium \* nutrimento cessante: siquidem cessans nutrimentum tabida facit corpora. Idem ultra naturæ modum \* uehementius elatum plurimam facit carnem generari, ex qua corpora grauata premuntur. Præterea hoc quoq; speciem accipimus cachexiæ, siquidem indecens difficultas patientes afficit: nam sequitur nimia ac superflua multitudo carnis, quæ in pinguem prominentiam erigitur cum tardo motu, atque grauatione, & debilitate, & ex paruo gressu anhelatione, ac sudore, ut suo se corpore præfocari sentiant egrotantes, quo neq; leuia ferre ualent uestimenta. Multi igitur medicorum atq; aliptarum salutaribus præceptis adiungendam diligentiam detrahendæ carnis putauerunt, insistentes cœnoteta, quam epidosin uel eucexian uocant,

cant, hoc est, habitudinis augmentum : sed hoc à So-  
 rano repulsum. Nos igitur solam bonam habitudinem  
 intelligimus, quæ si fuerit cum modica carne fortitu-  
 do, \* & seruanda magis quàm repellenda. Polysarcia \* est  
 uero, quam nunc passionem dicimus, recte cachexian  
 nuncupamus, quæ multis accidentibus denuntiat peri-  
 culum. Etenim quæ \* sequetur animalia nutrimento  
 dedita, uel custodia reseruata, ut \* flato, atq; extento,  
 & prominenti corpore uideantur, hæc eadem cuncta  
 patientes \* sequuntur. Similiter accidentia corpori-  
 bus ulceratis, in quibus uana caro concreuit, uel eo-  
 rum labiis quæ \* fuerit acie circuncisa \* renascantur.  
 Sed istius passionis duplex traditur differentia cura-  
 tionis: alia quæ cohibet fieri plurimum corporis nu-  
 trimentum, quæ quidem ponitur in gestatione celeri,  
 & cibis non multū nutritilibus, ac moderatis, ne plu-  
 ra corpus quàm insumit, accipiat: alia quæ cyclica re-  
 gula atq; operosa recorporatione formatur demu-  
 tandi corporis causa. Sed ut docilis sermo, ac manife-  
 sta tradatur præceptio, partium erit memoranda cu-  
 ratio. Cōuenit igitur corpus exercere gestatione plu-  
 rima ac perscueranti animalium iugo, uel curriculi  
 motu, & equitatione, ac nauicula: item lectione, &  
 uocis exercitio uehementi, uel meditatione modula-  
 tionis agonisticae, & celeri gressu, quo magis labor su-  
 rarum fiat. Item cursu, atq; sicca fricatione, manibus  
 puris, uel aspero linteamine, & arenæ aspergine: tum  
 uolutatione in palestra uaria, quā Græci celadian,  
 atq; choricamachian uocauerunt, quæ sunt speciali-  
 ter ab ipsius artis præceptoribus imperanda: tum ho-  
 plomachia, hoc est armorum ficta \* confrixio: item  
 \* alienis laboribus exercitio, hoc est colluctantiū, uel

\* sequuntur  
 \* inflato  
 \* sequuntur:  
 Similia quoq;  
 accidentia sunt  
 in corporibus  
 \* fuerint  
 \* renascitur,

Modulatio  
 ἀγωνιστική,

celadian.  
 χορικομαχία,  
 ὁπλομαχία.

\* fictione  
 \* alternā

\* haterocopian uel tra  
 chelisinon uocant, atq; longo uel \* raptorio machina  
 mento, quod \* macron sparton uocauerūt: item Itali-  
 ca sphaera, & luctatione, celerique & dura atq; mul-  
 ta uel sicca fricatione. Etenim oleo labētibus manibus  
 fortitudo soluitur exercitij. Conuenit etiā sole corpo-  
 ra torrere, quod Græci heliosin uocāt: tum paroptesi  
 ex flamma; uel carbonibus, & siccis uaporationibus  
 prouocatur sudor: & nunc seruētia lauacra, quæ plu-  
 rumum detrahunt, nūc frigida, quæ corpus in densitatē  
 cogunt: deniq; psychrolutarum corpora densa, ac ue-  
 luti \* testea sentiuntur. Conuenit etiā arenæ littora-  
 riæ adhibendus seruator: tum natatio maritima, uel a-  
 quarum naturali uirtute medentiū, & in lauacris su-  
 dore perfecto asperginē salis adhibere: qua sepe con-  
 dita caro animalium ciborū \* uolūtati sicca seruatur,  
 atq; densior, nec collecta marcescit. Tum fricamentū  
 adhibendum, quod Græci \* xigma uocāt, ex nitro tu-  
 so, atq; in puluerem redacto, & post lauacrū longa  
 cibi dilatio, uel potus. Tunc enim appetitio \* minima  
 marcescit, & eius acies tēporis obtunditur dilatione,  
 cum etiam digestionis parata proteruitas detracto fo-  
 mite languescit. Erit præterea potus semper ante ci-  
 bum prohibendus, uel in toto paruus dandus, & magis  
 cum cibi sumuntur. Etenim immisso liquore plurimo  
 \* fluidantur accepta, atq; caro mollitur, & digestionē  
 facile \* solidiora propriantur. Sed si plurimū quisquā  
 sitierit uinū, paruum dabimus mediocriter asperum.  
 Pulnentū uero alicam, amyllum: lac: nucleos, cerebrū,  
 oua: pisces autē teneros, uel pinguia quæq; reproba-  
 mus. Panē damus frigidum, fermentatū, autopyrū. est  
 enim minus nutriēs: & magis, si fuerit ueteratus. Spē-  
 cialiter

\* haterocopian  
 \* tractorio  
 \* Macrospat  
 ton nempe  
 quia longis su  
 nibus reīs ma  
 ximis & παρτοίς  
 traheretur.

\* testacea:

\* voluptati

Σιγμα.

\* Xigma quasi  
 feruidum

\* maxima

\* fluida red-  
 dantur

\* solidioribus  
 propriantur.

parū corpo-  
 ris substantiæ

adherescunt,  
 & aggluti-  
 nantur.

αυτοπυρ &



cialiter autē ficcus probandus est cibus. Item pulmēto danda sunt olera & pisces durioris naturæ, uel auium ficciora, uel agrestii, ut leporis, capræ: porcina ex deposito, hoc est, longo tēpore sale siccata. Conuenit præterea unū cibum sumere, & post sumptionem plurimū uigilare: \* In requie quidem, quo multa corpus exhalatione infumatur uigilando: additur enim plurimum somno; deniq; dormientiū corpus \* ualidius fit. Potus dandus frigidus: & perseuerāte carnis multitudine erūt initia cycli \* adsumenda, nunc ab omni abstinentia, nunc à paruo cibo & aqua, nunc \* augmenta ordine regulari. Itē à ieiuno uomitu sumendum est initium: \* uel ex radicibus: tum ad drimyphagian ueniedum, ac mediæ qualitatis materiā, uolantū, atq; agrestium: quæ quidem erunt celeranda per dies \* minoris breuitatis, quo urgentius initia repetātur: & in ole-ribus erunt urinalia prouidenda, ut asparagus, pastinaca, apiū, fœniculus, daucus, porri capitati, & horum similia: sic enim cōmunia seruantes corpus ualebimus demutare. Accidentiū quoq; coniecturā faciemus, quo elimatio carnis atq; \* diductio procedat. Aliqui medi-ci phlebotomiā probant, atq; purgatiua medicamina, quæ cathartica appellant, & clysterem, & post laucrum illico Venerē adhibendam ante cibum, atq; ipsa die paruum nutrimentū, \* poto aquam dandam. Item uomitū \* post uestertiniū uinum. Alij quoq; ueluti passioni contrariā, corporis \* expansionem ex \* thalamo fieri probauerunt, quam appellant \* antipalon, itemq; nocturni roris auram ante solis ortum bibendam. Sed horū deliratio manifestis proditur rebus. Nam phlebotomia uires depurgatæ uexātur, & corpora \* pallescunt, quod Græci raccosin uocant. Item purgatiuis

\* irrequietis  
Somnus sagi-  
nat.

\* unidius

\* incipienda

\* augenda

\* deinde ex

\* paucioribus  
diebus

\* deductio  
λαττασινά.

\* potus

\* uestertiniū  
post cœnam.

\* pandicula-  
tionem

\* Venere &  
concubitu

Antipetalon

\* ἀντιπταλον

vocat, quod

Hipp. aph. 56.

lib. 7. ἀνάλω.

\* flaccescunt,

\* quo malus  
laaxifia.  
Venus effæmi  
nat  
\* ordinandum

medicaminibus ex clysteribus, cum supradictis, etiam  
liquida corrumpuntur, \* cum alius habitus corporis sit.  
quem Græci cachexia uocant. Venercus uero usus  
effæminat membra, atq; fortitudinē tollit. Item ali-  
quibus bis in die \* ordinatum lauacrum, & somnum  
prius quàm cibus sumatur, quidam improprie uolue-  
runt. crassificat enim somnus, non tenuat corpora: itē  
nomitus post cibum: uires enim tollunt: & quāquam  
corpori detrahant carnem, implent tamen necessariō  
caput, atq; sensuales uias uexant, & gingiuus in pu-  
tredinem mittunt, atq; os odore \* fætāt, retro stoma-  
chum limant, & ipsum hominem sibi met faciūt displi-  
cere: quod Græci dysarescesin uocant, cum inequali-  
tate febribus uicina. Est & improprium, atq; praua ra-  
tione æstimatum, ob corruptionem paruorū maiores  
corpori uexationes inferre. Sed si forte \* uinorū sue-  
rit excessa moderatio, tunc erit uomitus adhibendus:  
eius enim uexatione maior est immodicæ sumptionis  
grauatio. Item præ cæteris ugheniēs, & maior quàm  
oportet, animi officiis siue curis adplicatio; Videmus  
enim ob has causas etiam studentium corpora fieri te-  
nuiora, limitatione quadam animi iugi cogitatione  
atq; disputatione, eorum uero qui segni ac pigro du-  
am uitam trahunt, solidiora atq; pleniora fieri cor-  
pora, ob contrariam rationem. His de super-  
flua carne conscriptis, omnium tardu-  
rum passionum curationes expli-  
cayimus, intentione aliarum  
sectarum neglecta,

\* sedans, pra-  
terea

Auragionuicis.

\* ciborum

Literis vacan-  
tes macri sunt.

FINIS.



# INDEX RERVM

ET VERBORVM, QVÆ

HVIC TOTO OPERI

INSVNT.



**A**CTVM in epilepsia  
188

Actus sanguinis fluo  
ri conueniens. 374

Actia ex accedente corpore &  
frigus augent. 153

Adiantum capillus veneris. 422

Adi. i. a. i. a. 290

Adscriptiones seu partitiones quid  
Asclepiadi. 4

Aerophobi. 199

Aetheria herba. 417

Alienationes mentis sine febre. 2

Alium inflat. 332

Alcheres. 328

Amor furoris causa. 308

Amphitretos fistula clysteris. 453

Ampullagium. 462

Anacelasma. 392

Anagoge. 357

Anaphonesis. 255. 304

Anatresis testis. 334

Anaudia. 85

Anhelatio seu Asthma unde no  
men sumpsit. 394

Anhelatio quo tempore, qua et  
te & quos magis inuadit. 334

Anhelatio differt ab orthopnea  
395

Anhelatio quo differt à perip-

neumonia. ibid.

Anhelationem qua sequantur.

394. & deinceps.

Anhelationis curatio. 396

Anima quid Asclepiadi. 39

Anodyna *malagmata*. 260. 342

Anoterica medicamenta. 467

Antipatri libri Epistolarum. 370

Amhereon. 163

Antiphani Panopte. 485

Aphydresis. 385

Aphonia pro catalepsi. 84

Apophlegmatismi. 235

Apoplexia strictura morbus est.

178

Apoplexia unde dicatur, &

quid sit. 177

Apoplexia quo tempore, & quos

precipue inuadit. 178

Apoplexiam praecedentia signa.

177

Apoplexia praesentis signa. ibid.

Apoplexia cuius antecedentes.

ibidem.

Apoplexia in alios morbos mu-

tatio. 178

Apoplexia phlebotomia conue-

nit. 181

Apoplexia quae & quando fa-

cilius vel difficilius curantur.

178. & 179

*Am*

# I N D E X.

<i>Apoplexia curatio.</i>	180	<i>Asclepiadis libri de Lue.</i>	157
<i>Apoplexia qui affines morbi, &amp; quibus hac ab illis dignoscitur.</i>	179	<i>Asclepiadu libri Parascenasti- ci.</i>	381
<i>Appellationes quid Asclepia- di.</i>	4	<i>Asclepiadu libri salutarium.</i>	353
<i>Appetentia cibi &amp; potus quo- modo fiat ex Asclepiade.</i>	39	<i>Aspidiscos.</i>	452
<i>Aqua detinctionibus ferri.</i>	290	<i>Atomi Asclepiadis.</i>	36
<i>Aquiduca medicamenta.</i>	438	<i>Atrophia.</i>	314
<i>Aque naturales in Italia.</i>	330	<i>Atrophia unde nomen sumpsit, &amp; quid sit.</i>	427
<i>Argallici radix.</i>	377. & 516	<i>Atrophiam qua consequantur. ibidem.</i>	
<i>Artemidorum Grammaticum timor literarum memoria pri- uauit.</i>	299	<i>Atrophia curatio.</i>	ibid.
<i>Arthritis quid sit, &amp; unde di- catur.</i>	513	<i>Aues nutrita constringentibus, minus sunt pingues.</i>	455
<i>Arthritis aliquando insanabi- lis, &amp; cur.</i>	515	<i>Auricula doloris causa.</i>	336
<i>Arthritis aliquas frequentat re- giones.</i>	514	<i>Auricula doloris curatio.</i>	ibid.
<i>Arthritis hereditaria.</i>	ibid.	<b>B</b>	
<i>Arthritis quem sexum, &amp; qua- tate magis vexet.</i>	513	<i>B Ranchos quid sit, &amp; qua eo consequantur.</i>	347. & 348
<i>Arthritidis quae partes aliae con- sentiant.</i>	515	<i>Byrsodepsicam.</i>	462
<i>Arthritidis causa antecedentes.</i>	513	<b>C</b>	
<i>Arthritidis curatio 516. &amp; de- incept.</i>		<i>Cachexia unde nomen sum- psit.</i>	423
<i>Arthritis certi temporibus ma- gis asperatur.</i>	514	<i>Cachexia unde nascatur.</i>	424
<i>Arthriticos quae comitantur ac- cidentia.</i>	514	<i>Cachexiam qua consequantur. ibidem</i>	
<i>Ascarides quomodo expellantur.</i>	487	<i>Cachexia curatio.</i>	424. & de- incept.
<i>Ascites.</i>	432	<i>Cachexia.</i>	272
<i>Ascitas quae propria curat.</i>	436	<i>Calij emplastrum ex Chamaleon te hydropicis utile.</i>	436
<i>Ascitem quae consequantur ac- cidentia.</i>	433	<i>Calij emplastrum ex stercore ca- primo.</i>	436
		<i>Calij Aurelia. promittit libros de mulieribus.</i>	226. 372
		<i>Calij Aurelii libri de passionum casu.</i>	10
		<i>Calij Aureliani lib. de febribus.</i>	146. & 151
		<i>Calij Anrel. lib. de salutaribus praeceptis.</i>	

præceptis.	94	Catalepticos iam præsentis signa.	89
Caly libri de mulierib. pass.	322	Catalepticos & lethargi signa cõmunia.	ibid.
Caly libri de specialibus adiutoris.	25.164	Catalepticis acria non cõveniunt.	95
Caly libri Chirurghum.	322	Catalepticos antecedentes cause.	88
Caly liber Græcarum Epistolarum.	334	Cataleptos quæ sequantur signa.	86
Caly libri Interrogationum & Respons. ad Lucretiũ. 1 & 2	158	Catalepticorum pulsus.	92
Caly lib. medicaminum.	342	Cataleptis ab aliis similibus diffinitio & curatio.	346
Canis aquarũ testes vel retractor, an epilepticis profunt.	290	Cataleptis quomodo à similibus discernatur.	92
Cantharides detractis capite & pedibus in hydropo.	301	Catalepticos ventura signa.	89
Capitũ diuisio in epilepsia.	286	Cataleptis nomẽ unde sumptum.	84
Capitũ iugis lauatio morbum renouat.	252	Cataleptis febrium symptoma.	88
Caprina pellis epilepsia motum facit.	286. & 289	Cataleptis quo tempore & quibus magis accidat.	ibid.
Caput exhalationes omnes ex inferioribus recipit.	254	Cataleptis quæ consequantur.	346
Caput implatur mentis intentione.	258	Catapasmus.	304
Cardiaca motus inutilis.	158	Cataplasmata nutrititia.	151
Cardiaca futura signa.	130	Catapotia ad sanguinem sistendum.	375
Cardiaca pass. cause.	ibid.	Catapotia ventri constringendo.	237
Cardiaca passio duplex, vna syncope stomachica, altera syncope vera.	128	Cathartica.	258. & 259
Cardiaca præsentis signa.	131	Catether muliebri.	500
Cardiaca passio pro syncope vera ab authore usurpatur.	129	Catoche.	85
Cardiaca passio solutionis est.	140	Causa acclina & synectica.	201
Cardiaca passio unde nomẽ sumpsit.	119	Cauteres forma & litera.	510
Cardiognos.	140	Cauteris usus in Cephalæa.	259
Carnatio.	284	Celeres morbi qui propriè dicantur.	2
Caro mustella & hominum, epilepticos non inuat.	290	Celeres passionibus cum febribus & sine febribus.	2
Cataractis.	257	Cenosis.	505
		Cephalæa unde dicta.	243. 244
		Cephal	

# I N D E X.

<i>Cephalea laborantibus quando cu- rabitur &amp; hirudines admo- de.</i>	<i>146</i>	<i>diaca.</i>	<i>152</i>
<i>Cephalea laborantibus quando tondendum caput.</i>	<i>246</i>	<i>Coagulum conferat ne Epilepsia.</i>	<i>190</i>
<i>Cephalea quibus signis dignosca- tur.</i>	<i>243</i>	<i>Cæbotica medicamenta.</i>	<i>308</i>
<i>Cephalæe causæ.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Cænotetes morborum.</i>	<i>273</i>
<i>Cephalæe curatio.</i>	<i>245</i>	<i>Cœctionem ciborum nullam esse</i>	<i>39</i>
<i>Cephalæe phlebotomia quando conueniat, &amp; quo ex brachio.</i>	<i>246</i>	<i>Asclepiadis sententia.</i>	<i>39</i>
<i>Cephalalgia.</i>	<i>244</i>	<i>Colicos quæ sequuntur accidentia</i>	<i>477. &amp; 478</i>
<i>Cera mordenda.</i>	<i>328 &amp; 341</i>	<i>Cæthæe.</i>	<i>450</i>
<i>Ceratum diateffaron.</i>	<i>108</i>	<i>Colicis qui clystres iniiciendi.</i>	<i>479</i>
<i>Chiasmus.</i>	<i>286</i>	<i>Collectionis in stomacho signa.</i>	<i>539</i>
<i>Chirapsia.</i>	<i>223</i>	<i>Collectionis in ventre signa.</i>	<i>539</i>
<i>Chiragra.</i>	<i>513</i>	<i>Collectionis in aliquo intestino si- gna.</i>	<i>539</i>
<i>Chorda veteribus intestina.</i>	<i>112</i>	<i>Collectionis in pyloro signa.</i>	<i>539</i>
<i>Cholera morbus quid sit, &amp; vn- de ducatur.</i>	<i>227. &amp; 228</i>	<i>Collectionis in nescide signa.</i>	<i>539</i>
<i>Cholera morbus est solutionis.</i>	<i>230</i>	<i>Collectionis in tenuiorib. intestinis signa.</i>	<i>540</i>
<i>Colicæ passionis curatio.</i>	<i>478</i>	<i>Collectionis in colo &amp; longaone signa.</i>	<i>540</i>
<i>Cholera quæ consequantur.</i>	<i>230</i>	<i>Collectionis in iecore signa.</i>	<i>540</i>
<i>Cholericis helleborum noxium co- tra Hippoc.</i>	<i>234</i>	<i>Collectionum eruptiones ad varia loca sunt.</i>	<i>540</i>
<i>Cholera à diarrhoea &amp; stomachi solutione quo differat.</i>	<i>228.</i>	<i>Collectionis eruptio vel repente tota fit, vel paulatim.</i>	<i>542</i>
<i>&amp; 229</i>		<i>Collectionis eruptionum omnium rarisima illa est quæ per ve- sicam &amp; mictuales vias fit.</i>	<i>543</i>
<i>Cholera causæ antecedentes.</i>	<i>228</i>	<i>Collectionis eruptio secunda est, quæ ad intestinum erupe- rit, tertia quæ ad matricem.</i>	<i>543</i>
<i>Cibum nullius esse qualitatis quæ sensu percipiatur ex Ascle- piadis sententia.</i>	<i>39</i>	<i>Collectionis internæ generata si- gna.</i>	<i>517</i>
<i>Cichorium bis coctum.</i>	<i>468</i>	<i>Collectionis in pulmone signa.</i>	<i>538</i>
<i>Clyster superiora inuadens.</i>	<i>207</i>		
<i>Clysteres in cordica inutiles.</i>	<i>155</i>		
<i>Clysteres ad nutriendum.</i>	<i>151</i>		
<i>Clyster ex aqua frigida in car-</i>			

Collectio

Collectionis in Diaphragmate signa. 338  
 Collyria blepharica. 450  
 Collectionis eruptiones quæ magis ac minus periculosa. 344  
 Collectionis eruptionis salubris, & in salubris signa. ibid.  
 Collectionis prohibenda generatio. 345  
 Collectionis iam factæ curatio. ibid.  
 Collectiones interna quæ solum medicaminis curantur. 336  
 Collectiones interna quæ chirurgiæ curantur. 337  
 Conditum. 421  
 Conditum idem quod mulsim. 312  
 Conductio unde dicta, & quid sit. 182  
 Consuetudinis ratio. 36  
 Cor leporis & cameli. 190  
 Cordapfos. 212  
 Cornu cerni. 488  
 Coryza quid, & quæ eam consequantur. 347  
 Cotyle pondus. 352  
 Creta cauum rabie frequenter venatur, ab aliis venenatis animalibus pene libera. 205  
 Crisimos dies passionum non esse. 37  
 Cucurbita constringens. 405  
 Cucurbita cito corrumpitur. 33  
 Cucurbita sicca. 27  
 Cucurbita recorporatiua. 179  
 Cucurbitæ labii flexio. 214  
 Cucurbitæ igni vaporata. 402  
 Curatio philoparabolas. 45, 49  
 Cyclus metasthencicus. 250, 254

Cyclus resumptiuus. 249  
 Cynanche quid. 159  
 Cynolysson. 195  
 Cystophylas. 320

D

**D**ebilitati ventris accidentia, & curatio. 473  
 Democriti mors dilata panis olfactu. 147  
 Dentes dolentes non statim auferendi. 343  
 Dentes dolenti tempore non auferendi. 343  
 Dentis detractione quidam mortui. 344  
 Dentiducum. ibid.  
 Dentium doloris vehementiori curatio. 339, 340  
 Dentium doloris initio quæ solutiones oris adhibenda. 339  
 Diacertosis. 457  
 Diachysis. 249  
 Διακρίσις. 152, 154  
 Διακρίσις αἵματος. 133  
 Diaphoresis in phreniticis quomodo vitanda. 24  
 Diaphragma. 270, 276  
 Diarecesis. 426  
 Diarrhœa quid. 139  
 Diarrhœa curatio. ibid.  
 Diarrhœa in dysenteriam mutatur. 239  
 Dioclis liber de passionibus, & causis, & curationibus. 126  
 Divisio ventris & recti intestini in ileo. 219  
 Dolore quomodo sit ex Asclepiade. 41  
 eod. de. 41

Dormien



# I N D E X.

<i>Dormientes sub sole cur grauentur.</i>	89	<i>Epilepsia vnde dicta.</i>	264
<i>Doria cantio.</i>	308	<i>Epilepsia species tres.</i>	265
<i>Drimyphagia.</i>	251 & 254	<i>Epilepsia causa.</i>	264
<i>Dropax.</i>	255	<i>Epilepsiam qui odores excitent.</i>	267
<i>Dysenteria vnde dicta &amp; quid sit.</i>	474	<i>Epilepsia nervorum omne genus, &amp; maximè caput afficit.</i>	269
<i>Dysenteria causa.</i>	ibid.	<i>Epilepsia à prefocatione matricis quò differt.</i>	269
<i>Dysenteria remedia.</i>	457	<i>Epilepsia quo præcipuè tempore inuadat.</i>	268
<i>Dysenteria putredinis causa si fuerit sanguinis effusio.</i>	ibid.	<i>Epilepsia odorameta tetri odoris noxia.</i>	288
<i>Dysenteria ex sanguinis effusione emplastra, &amp; cerotaria conuenientia.</i>	458	<i>Epilepsia quando omnino depulsa esse indicatur.</i>	284
<i>Dysenteria ex sanguinis effusione cessans, vel sanguinis gelatio, vel densata vena.</i>	ibidem	<i>Epilepsia pueri frequens, &amp; quando.</i>	268
<i>Dysenteria vlceratio in omnibus simul fieri intestinis non potest.</i>	475	<i>Epilepsia in infante, quomodo tractanda.</i>	271
<i>Dysenteria vlceratio in quibus sit intestinis.</i>	ibidem	<i>Epilepsia pueri &amp; famina quando maxime liberantur.</i>	268
<i>Dysenteria vlcerationis factæ in tenuioribus vel crassioribus signa.</i>	ibidem	<i>Epilepsia iam occupatos que accedentia sequantur.</i>	266
<i>Dysenteriam que sequantur accedentia.</i>	474 & 475	<i>Epilepsia accessio, quando indicanda.</i>	281
<i>Dysuria.</i>	326	<i>Epileptice accessiones varie.</i>	267
<i>Duriciam ventris que sequantur.</i>	474	<i>Epileptice accessionis rursus futura signa.</i>	267 & 268
<i>E</i>		<i>Epileptice curatio.</i>	269 &
<i>Empyici quibus ex causis fiant.</i>	317	<i>deinceps.</i>	
<i>Emplastra.</i>	325	<i>Epilepsia phlebotomia adhibenda.</i>	273
<i>Entatica medicamina.</i>	323	<i>Epilepsia obnoxiora que accidentia demonstrant.</i>	265
<i>Ephobia.</i>	211	<i>Epileptici alij ex signis accessionis præsentunt, alij minimè.</i>	267
<i>Ephialtes.</i>	262	<i>Epilepticis sternutamenta in accessione noxia.</i>	283
<i>Epibole.</i>	ibid.	<i>Epilepticis fomenta astringentia, &amp; tetri</i>	
<i>Epilepsia passio strictura, &amp; rehemens.</i>	269		

Et tetri odori nocere.	287	G	
Epileptici defecatio intempestiua nocet.	287	Garum.	327
Equorum impetigines Epilepticos non iuuant.	290. 292	Gauia cerebrum.	290
Erasistrati libri Salutarium preceptorum.	353	Glycea Gracifella vocant ex aduerso.	394
Errhina.	256	Gonagra.	513
Exhalationes ex decocto haustu recepta in stomachica passione.		Gonorrhœa.	317
		Gonorrhœa quid, & in quo à Syriasi differt.	224
		H	
Excrementa à natura non aliena		Hamarthritus.	513
Asclepiadi sententia.	39	Hedera vis.	54
Experimenti tentatio.	520	Hedra.	460
Extensio siue distensio.	182	Heliosis.	284
Euenoris libri curationum.	439	Helleborum qua cautione dandum.	279
Evrosi qui sint.	10	Helleborum Catapecton.	472
Eunuchismus Epilepsia nihil confert.	290	Helleborismus.	283
Euphorbium potui datum ad duccendas aquas.	438	Hemicrania.	243
		Hemicrania qua ex parte venâ incidi postulet.	246
F		Heraclidu libri de internis passionibus.	211
Febri cauta siue Syncopalis.	130.	Herba calycaria.	462
Febricantib. quando cibis dandus ex Asclepiade.	38	Herba calycularu.	350. & 369
Febribus periodicis & typicis que conueniant ex Asclepiade.	38	Hirudinum in Synanche appositio.	167
Febrium signu ex Asclepiade.	37	Hippocrates male curat Iliacos.	216
Felliduca medicamenta.	417	Hippoc. liber diateticus.	125
Folle fabrili distendendus venter Iliacorum.	215. & 219	Hyanche quid.	160
Folliculus clysteru.	452	Hydrops vnde dicatur.	429
Frigus tussim mouet.	107	Hydrops qui curatu facilis qui difficilis.	434
Furor duplex Stoicis.	296	Hydropu cause.	429
Furor duplex Empedocli.	296	Hydropis differentie multe.	430
Furor duplex Platoni.	ibid.	Hydropis curatio.	435
Furor eroticos.	ibid.	Hydropem signa communia que sequantur.	432
Furor ex Libero patre.	ibid.	Hydrophobus insans.	197
Furor protrepticos.	ibi.		

# INDEX.

<i>Hydrophobus miles.</i>	197	<i>Incubo epilepsia nunciū.</i>	168
<i>Hydrophobos in aquam immitti rehabile.</i>	108	<i>Incubonū signa, symptomata.</i>	262. 263
<i>Hydrophobia seu Hygrophobia.</i>		<i>Incubo passio periculosa.</i>	ibid.
195		<i>Incubo plurimos Rome interfecit.</i>	ibidem
<i>Hydrophobia morbus acutus, &amp; ex structura.</i>	198	<i>Incubonū curatio.</i>	ibid.
<i>Hydrophobia ex causa occulta.</i>	196	<i>Inflationem &amp; saltū ventrū que sequantur.</i>	474
<i>Hydrophobia Satyriasis in saepe ef- ficat.</i>	108	<i>Influxionis siue Catarrhī curatio.</i>	349
<i>Hydrophobia phlebotomia con- uenit.</i>	206	<i>Iniectionis medicaminū vomitus quā- do perniciosus.</i>	456
<i>Hydrophobia signa.</i>	196	<i>Iniectionis partem quidam vo- muerunt.</i>	455
<i>Hydrophobia causa.</i>	195	<i>Intellectus quomodo fiat ex As- clepiade.</i>	39
<i>Hydrophobia causa, lesio à Gallo gallinaceo.</i>	ibid.	<i>Intercus.</i>	433
<i>Hydrophobia curatio non est ut bibant egri.</i>	208	<i>Intestinis ulceratis quomodo cly- steres injiciendi.</i>	455
<i>Hydrophobia interim celerius, interim tardius post morsum accidit.</i>	196	<i>Intestinatorum nomen &amp; ulcera- tionis siue in superioribus sit, intestini, siue inferioribus cu- ratio.</i>	455. & deinceps.
<i>Hypodyma.</i>	270	<i>Intestinatorum ulceratio perseverans quomodo tractanda.</i>	459
<i>HypoZygon.</i>	317	<i>Intestinatorum ulceribus limpidis factis nimium adstringentia non conferunt.</i>	ibid.
<i>Hydrophobia causa, sola aspira- tio ex cane rabido.</i>	195	<i>Intestinatorum suori si tumor iun- ctus sit.</i>	461
<i>Hydromelum.</i>	406	<i>Intestinatorum solutio si nimis ut- geat.</i>	ibid. & deinceps.
<b>I</b>		<i>Intestinatorum ulceribus si plu- rimus fuerit sensus.</i>	463
<i>Icterus unde dicatur.</i>	419	<i>Intestinatorum superiorum ulcerib. medicamenta anoterica aptio- ra, inferiorum, clysteres.</i>	467
<i>Icterus quae sequantur acci- dentia.</i>	ibid.	<i>Intestini.</i>	50
<i>Icteri curatio.</i>	420		Ischias
<i>Ictericū sel assusum quomodo de- tergendum.</i>	ibid.		
<i>Iecoru &amp; lienis scirrholi affectoru curatio.</i>	413		
<i>Iecorosis &amp; lienosis chimania ac- cidentia.</i>	412		
<i>Iecorosis propria accidentia quae sequantur.</i>	ibid.		

<i>Iselias à matricis vexatione quomodo dignoscatur.</i>	<u>427</u>	<i>Lapidu in vesica dignotio à vesica ulceratione, &amp; sanguine gelato miellum impediende.</i>	<u>526</u>
<i>Ischiadica &amp; Psœadica passiones unde dicta, &amp; quibus ex causis generantur.</i>	<u>495</u>	<i>Laryngotomia plane rejicienda in Synanche.</i>	<u>173</u>
<i>Ischiadicos quæ comitantur accidentia.</i>	<i>ibid.</i> & <i>deinceps.</i>	<i>Laureolum, Scalpreatum.</i>	<u>515</u>
<i>Ischiadicorum &amp; Psœadicorum curatio.</i>	<u>497.</u> & <i>deinceps.</i>	<i>Lesio ante deambulationem.</i>	<u>249</u>
<i>Ischiadici omnia vehementiora medicamenta, noxia.</i>	<u>499</u>	<i>Leipothymia.</i>	<u>274</u>
<i>Ischuria.</i>	<u>526</u>	<i>Leptomeres quid Asclepiadi.</i>	<u>39</u>
<i>Ileos quid sit.</i>	<u>210.</u> & <u>211</u>	<i>Leptomeria Asclepiadi.</i>	<u>418</u>
<i>Ilei iam præsentis signa.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Lethargus cur &amp; unde dicatur.</i>	<u>64</u>
<i>Ilei causæ antecedentes.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Lethargus gravior phrenitidis.</i>	<i>ibidem</i>
<i>Ilei curatio.</i>	<u>211</u>	<i>Lethargi in phrenitidem mutatio.</i>	<u>17.</u> & <u>64</u>
<i>Ileos morbus strictura.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Lethargicorum pulsus magnus fortitudinis signum non est.</i>	<u>65</u>
<i>Ileos à soli vexatione quomodo differat.</i>	<u>212</u>	<i>Lethargicu phlebotomia quando adhibenda.</i>	<u>71</u>
<i>Ileos à Colico affectu quomodo differat.</i>	<u>212</u>	<i>Lethargicorum non somnus, sed oppressio.</i>	<u>64.</u> & <u>66</u>
<i>Ileo phlebotomia quando conveniat.</i>	<u>213.</u> & <u>217</u>	<i>Lethargicu vinum noxium.</i>	<u>79</u>
<i>Incuho quid, eius causa.</i>	<u>262</u>	<i>Lethargicu pulsus &amp; respiratio deteriores quam phreniticis.</i>	<u>64</u>
<i>Inunctiones nutritibiles.</i>	<u>351</u>	<i>Lethargicu noxium immoderatum sternutamentorum vsus.</i>	<u>77</u>
<b>L</b>		<i>Lethargi ab alijs malis quæ sensum hebetudinem faciunt dignotio.</i>	<u>71</u>
<i>Lac qualitatem acquirit herbarum quib. rescitur animal.</i>	<u>464</u>	<i>Lethargi definitiones variae.</i>	<u>65.</u> & <u>66</u>
<i>Lac Epilepticu noxium.</i>	<u>290</u>	<i>Lethargicorum signa.</i>	<u>69.</u> & <u>67</u>
<i>Lac diacochlecon.</i>	<u>463</u>	<i>Lethargi differentia plures quorundam sententia.</i>	<u>71</u>
<i>Lac caprinum quale eligendum.</i>	<u>464</u>	<i>Leucophlegmatia.</i>	<u>412</u>
<i>Lac aperiergon.</i>	<u>465</u>	<i>Leucophlegmatia signa propria.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lac galactodes.</i>	<u>465.</u> & <u>467</u>	<i>Libri Sorani notæ &amp; curæ.</i>	<u>445</u>
<i>Lacti calx admixta.</i>	<u>466</u>		
<i>Lactis costæ vires, &amp; quomodo coquendum.</i>	<u>463.</u> & <u>464</u>		
<i>Lamanchia.</i>	<u>306</u>		

# I N D E X.

<i>Lienem qua deducant.</i>	<u>416</u>	<i>Mania olim, Mantice.</i>	<u>296</u>
<i>Lienosos propria accidentia qua sequantur.</i>	<u>412</u>	<i>Mania morbus tardiss. ex stri- flura.</i>	<u>299</u>
<i>Lingua, faucium &amp; palati in Synanche scarificatio.</i>	<u>167</u>	<i>Mania quam partem magis af- ficit.</i>	<u>ibid.</u>
<i>Locorum patientium specialis co- gnitio à Methodicis negligitur.</i>	<u>123. 137</u>	<i>Mania cum vaticinatione.</i>	<u>297</u>
<i>Locorum patientium varietas re- mediorum qualitatem nō mu- tat.</i>	<u>123</u>	<i>Mania in lethargum mutatio.</i>	<u>17</u>
<i>Ludus calculorum.</i>	<u>304</u>	<i>Mania in phrenitidem mutatio.</i>	<u>ibid.</u>
<i>Lumbricorum egestionis præscie significationes.</i>	<u>485</u>	<i>Mania variè mentem occupat, præsertim cum timore.</i>	<u>298</u>
<i>Lumbrici rotundi quibus reme- dijs detrahendi.</i>	<u>487</u>	<i>Mania phlebotomia conuenit.</i>	<u>302</u>
<i>Lumbrici tolluntur, causa ex qua generantur sublata.</i>	<u>488</u>	<i>Maniacos variarum specierum error fallit.</i>	<u>299</u>
<i>Lumbrici si pueri vexentur, qua sequuntur accidentia.</i>	<u>483</u>	<i>Manutigium.</i>	<u>287</u>
<i>Lumbrici per que loca excludun- tur.</i>	<u>484</u>	<i>Medicamenta omnia sunt omniū corporū partium communia, ex sententia Methodicorum.</i>	<u>416</u>
<i>Lūbrici laborantes quomodo dis- cernuntur ab epilepticis, phre- niticis, catalepticis, &amp;c. ibid.</i>	<u>488. &amp;</u>	<i>Medicaminis sumptio diuturna metuenda.</i>	<u>318</u>
<i>Lumbricos excludentia.</i>	<u>489</u>	<i>Medicorum inuidentia.</i>	<u>46</u>
<i>Lūbricos expellentes potiones. ibi.</i>	<u>210</u>	<i>Melancholia morbus qui sit, &amp; vnde dicatur.</i>	<u>310</u>
	<u>M</u>	<i>Melancholia antecedentes causa.</i>	<u>ibid.</u>
<i>Malagma Polyarchion.</i>	<u>118</u>	<i>Melancholia in quò differt à fu- rore.</i>	<u>311</u>
<i>Mania vnde &amp; quot nomi- nibus Græci dicatur.</i>	<u>296. &amp; 297</u>	<i>Melancholia Methodicū; qua proprie Hypochondriaca di- citur.</i>	<u>ibid.</u>
<i>Mania quid sit.</i>	<u>297</u>	<i>Melancholia curatio.</i>	<u>ibid.</u>
<i>Mania quibus à phrenitide dis- cernatur.</i>	<u>297</u>	<i>Melancholicū ventriculus prima- rio afficitur.</i>	<u>16</u>
<i>Manie causa.</i>	<u>297</u>	<i>Melancholicorū symptomata.</i>	<u>310</u>
<i>Mania curatio.</i>	<u>300</u>	<i>Melimelon.</i>	<u>406</u>
		<i>Memoria quomodo fiat ex Af- clepiade.</i>	<u>39</u>
		<i>Miracdyngist.</i>	<u>154</u>
		<i>Miliace aues.</i>	<u>251</u>
		<i>Minythica</i>	

<i>Minythica malagmata.</i>	<u>256</u>	<i>Omelysis.</i>	<u>118.146</u>
<i>Mora celsa.</i>	<u>490</u>	<i>Omnia fieri necessitate sententia</i>	
<i>Morbus quo magis à natura recessit, eo grauior.</i>	<u>14</u>	<i>Asclepiadu.</i>	<u>39</u>
<i>Morbus puerilis.</i>	<u>264</u>	<i>Onisci Epilepticu nihil profunt.</i>	
<i>Morbi multi genuini vna cum</i>		<u>290</u>	
<i>etate consenscunt.</i>	<u>494</u>	<i>Onirogonos.</i>	<u>262.266</u>
<i>Morbus sacer.</i>	<u>264</u>	<i>Oniropolepis &amp; Onirogonos.</i>	<u>533</u>
<i>Morbi chronici ab acutis quo differant.</i>	<u>241</u>	<i>Ophites lapis.</i>	<u>502</u>
<i>Morborum chronicorum curationes Medici gloriam parant, non autem acutorum.</i>	<u>241</u>	<i>Opus Cyrenzicus deuoratur.</i>	<u>194</u>
<i>Morboru causa ex Asclepiade.</i>	<u>39</u>	<i>Oris totius siccitatis remedium.</i>	
<i>Morborum chronicorum curationes pauci veterum tradiderunt.</i>	<u>241</u>	<u>23</u>	
<i>Mydriasis paralyssis tunice oculi.</i>	<u>314</u>	<i>Orthopnea ex aduerso appellata.</i>	<u>394</u>
<i>Muria.</i>	<u>245</u>	<i>Oxymeli doloribus incongruum.</i>	<u>235</u>
<b>N</b>		<b>P</b>	
<i>Natura quid Asclepiadi.</i>	<u>39</u>	<i>P Antapliobi.</i>	<u>199</u>
<i>Natura prodest &amp; nocet.</i>	<u>ibid.</u>	<i>Papauer profundum somnu facit.</i>	<u>6</u>
<i>Nauigatio maritima.</i>	<u>258</u>	<i>Paracentesis.</i>	<u>38. &amp; 306</u>
<i>Nicolam, Heraclicu liber de Composition. medicam.</i>	<u>58</u>	<i>Paracetesim in hydropo alij probant alij improbant.</i>	<u>439.</u>
<i>Ninnum liquor vino miscendus.</i>	<u>150</u>	<i>&amp; deinceps.</i>	
<b>O</b>		<i>Paracentesis in hydropo quando adhibenda.</i>	<u>443. &amp; quomodo</u>
<i>Oculi alba macula siue vnguis.</i>	<u>132</u>	<u>500</u>	
<i>Oculorum tunica paralyssis.</i>	<u>314</u>	<i>Paralipssis.</i>	<u>313</u>
<i>Odontogogum plumbeum apud Delphum.</i>	<u>344</u>	<i>Paralyssis menti.</i>	<u>315</u>
<i>Odoramenti resumptio fit.</i>	<u>151</u>	<i>Paralyssis labij superioris.</i>	<u>314</u>
<i>Odorata quodam modo nutriunt.</i>	<u>147</u>	<i>Paralyssis lingue.</i>	<u>ibid.</u>
		<i>Paralyssis faucium &amp; summitatis gutturu.</i>	<u>315</u>
		<i>Paralyssis instrumenti odoratus.</i>	<u>315</u>
		<i>Paralyssis stomachi.</i>	<u>315</u>
		<i>Paralyssis cordis.</i>	<u>317</u>
		<i>Paralyssis interiorum partium.</i>	<u>317</u>
		<i>Paraclysis matricis.</i>	<u>497</u>
		<b>N</b>	<u>9</u>

# I N D E X.

<i>Paralysis cæni.</i>	315	<i>Parmenidu libri de Natura.</i>	
<i>Paralysis coli, &amp; recti intestini.</i>	493	<i>Paropresis.</i>	255
316		<i>Partibus certis corporis pecuda-</i>	
<i>Paralysis peritonæi ex Erasistra-</i>		<i>res medicamentorum facul-</i>	
to.	ibi.	<i>tates tribulæ videntur melio-</i>	
<i>Paralysis ieiuni intestini, &amp; cæci.</i>		<i>dici.</i>	416
ibidem		<i>Passiones per inibiis constitutæ.</i>	
<i>Paralysis colis.</i>	317	16	
<i>Paralysis vesicæ.</i>	316	<i>Pediculi feræles.</i>	442
<i>Paralysis cruris duplex.</i>	317	<i>Pedicularum multitudo.</i>	415
<i>Paralyseos genus paradoxum.</i>		<i>Peripneumonia quid sit.</i>	120
ibid.		<i>Peripneumonia morbus est acu-</i>	
<i>Paralyseos curatio. 318. &amp; de-</i>		<i>tu.</i>	122
<i>inops.</i>		<i>Peripneumonia unde nomen suu</i>	
<i>Paralysis curatu difficilior.</i>	317	<i>psit.</i>	120
<i>Paralysis causæ.</i>	312	<i>Peripneumonia causæ. 120. &amp;</i>	
<i>Paralysis triplex.</i>	ibid.	121	
<i>Paralysis ex conductione &amp; ex-</i>		<i>Peripneumonia sine febre esse ne-</i>	
<i>tensione.</i>	ibid.	<i>quit.</i>	120
<i>Paralysis causæ antecedentes.</i>		<i>Peripneumonia qui magis obno-</i>	
313		<i>24.</i>	ibid.
<i>Paralysis iam facta symptomata.</i>		<i>Peripneumonia ex strictura fit.</i>	
ibidem		122	
<i>Paralyti affectuum partium mo-</i>		<i>Peripneumonia ex pleuritide an</i>	
<i>tu ex artu industria.</i>	329	<i>perniciosa.</i>	120
<i>Paralysis cruris à luxatione quo</i>		<i>Peste laborantibus quæ profint.</i>	
<i>discernitur.</i>	317	38	
<i>Paralysis seminales viarum a-</i>		<i>Phagedæna stomachi quid sit, &amp;</i>	
<i>lia ex solutione, aliæ ex condu-</i>		<i>quæ eam consequantur acci-</i>	
<i>ctione.</i>	ibid.	<i>dentia.</i>	410
<i>Paralysis palpebrarum.</i>	313	<i>Pharyngotomia.</i>	38
<i>Paralysis pylori.</i>	316	<i>Phlegmas.</i>	195
<i>Paralysis siagouis.</i>	314	<i>Phlogopota.</i>	297
<i>Paralytici quando phlebotom. ad.</i>		<i>Phlebotomia in ventris solutione</i>	
318		<i>noxia.</i>	105
<i>Paralytici recte detrahatur san-</i>		<i>Phlebotomia quibus conveniat,</i>	
<i>guu.</i>	42	<i>quibus minime ex Asclepiade.</i>	
<i>Paraplexia.</i>	378	38	
<i>Parapnæche.</i>	359		

*Phlebot*



Phlebotomia cardiaca minimè conuenit.	151	Phreniticis balneum quando ne- xiu.	35
quia.	149	Phreniticis quando adhibenda phlebotomia.	25
Phobodipsos.	195	Phreniticis phlebotomia quando noxia.	35
Phanigmos.	325	Phrenitici post phlebotomiā quo- modo tractandi.	26
Phragmos.	210	Phreniticis phlebotomia noxia ex Asclepiade.	40
Phrenitu unde dicta.	2	Phreniticis qui clysteres utiles.	26
Phrenitudi definitio.	2. & 7	Phreniticis qui debeant inuise- re.	23
Phrenitu fit sine consensu abatu partium.	2	Phrenitica passioni antecedentes causæ.	11
Phrenitis alia ex striclura, alia ex solutione.	19	Phrenitidis in lethargum muta- tio.	17. & 64
Phrenitidu curatio ab Asclepia de instituta refellitur.	41	Phrenitici non tondendi ex Af- clep.	40
Phreniticorū curatio ex Diocle.	35	Phreniticis quando somnus profis- cit.	23
Phreniticorum curatio ex Hera- clide Empirico.	57	Phrenitici in obscuro loco non de- stinendi ex Asclep.	40
Phrenitudi curatio ex Themiso- ni sententia, refellitur.	53	Phrenitici tempore resumptionis quomodo tractandi.	34
Phreniticorum cibus.	26	Phrenitici in declinatione quo- modo alendi.	32
Phreniticis gestatio & motus cō- ueniens.	29. 33	Phreniticis curandis quin locus qua stragula, qui aer conue- niant.	21. & 22
Phrenitici quomodo fallendi.	28	Phreniticis quo pacto fomentum cu- randum caput.	32
Phrenitici dormientes aliquando magno meliorum errore exci- tantur aliquando lethargo op- pressi, sine auxilio relinquun- tur.	18	Phrenitu à mania, melancholia & ceteris quomodo dignosca- tur.	15
Phreniticis caput primario affi- citur.	16	Phrenitides qua perniciosiores.	14
Phreniticis cibi etiam nonnihil à ratione alieni dandi, modo cō- cupiti.	29	Polyfarcia quid.	330
Phreniticis xinum prorsus deue- gandum.	29. 31. 33	Polyfarcia curatio duplex.	331
Phreniticis quando tondendum caput.	26		
Phreniticis clyster acrior noxius.	35		

Phrenitice passionis signa.	11	Pleuriticorum decubitus, & quò fotus in adhibendi.	104
Phrenitidis essentia, & eam se- quentia symptomata.	12	Pleuriticum quando vena inciden- da.	105. & 111
Phrenitici quando & quomodo ligandi.	23	Pleuriticum quibusdā in regionib. venam recte incidi, quibusdā minime.	116
Phrenitidis in maniam mutatio.	17	Pnigation.	262
Phthiriasis vnde originem & nomen sumpsit.	449	Podagra quid sit, & vnde dica- tur.	513
Phthisis paralysis oculi.	314	Podagricos quæ comitantur ac- cidentia.	514
Phthisis accidentia.	385 & 386	Pollen macton.	479
Phthisis seu phthoes causæ ante- cedentes.	385	Poma cuius succi.	53
Phthisis curatio.	387. & 388	Polyphagia in morbo acuto lo- non habet.	61
Phthisi vicinæ passionēs Airo- phia, Syntexis, empyema, &c. & quomodo à sese dignoscan- tur.	386. & 387.	Porcelliones siue onisci.	287
Phthisicorum sputa quomodo dis- cernantur.	386	Praxagoras in eileo ventre discif- so stercus educebat.	219
Phthiriasis quomodo curatur.	449 & deinceps.	Praxagora samulus ternos bili- bres panes singulis dieb. edens.	401
Phthiriasin qua sequantur. ibid.		Pressura siue profundus somnus.	6
Phthisin ventri fluor deteriorem inducat.	386	Priapismus.	317
Phrygia cantio.	308	Priapismus quid sit, & vnde di- ctus.	535
Pleuritis vnde nomen sumpsit.	96	Priapismi à Satyriasi dignotio.	536
Pleuritidis definitiones variae.	97	Priapismus in senē.	224
Pleuritis quæ purgatione egeat.	III	Principia corporis ex Asclepias de.	36
Pleuritis quo tempore, & quos po- tissimum inuadit.	98	Procolium.	464
Pleuritis dextri lateris an pericu- losior.	100	Procorosis quid Asclepiadi.	4
Pleuriticum vena lateris dolenti oppositi secanda.	105	Psædicos quæ comitantur acci- dentia.	497
Pleuriticorum sputa.	99	Psædici à nephriticis discernen- di.	497
Pleuriticorum sputa saniosa, à sa- nie quomodo discernantur.	100	Psychrolusia.	259
		Ptarmicum.	277
		Ptyssin	

<i>Ptyſis</i> quid ſit, & quæ eius ſymptomata.	347. & 348	<i>Sanguinis</i> fluentis ex ſtomacho.	ibid.
<i>Ptyſis</i> quibus à peripneumonia diſcernitur.	348	<i>Sanguinis</i> fluentis ex ventre.	361
<i>Pulmo</i> penetratus mortem ſemper non inferit.	365	<i>Sanguinis</i> fluentis ex hepate, liene, vena magna ſigna	361
<i>Pulmoni</i> viæ logothæretici.	101	<i>Sanguinis</i> fluentis ex gingivis, vna, tonſillis.	ibid.
<i>Pyra</i> duraciſima.	147.	<i>Sanguinis</i> fluentis ex capite in viſcera interna.	ibid.
<i>Pyra</i> Scandiana.	406	<i>Sanguinis</i> fluentis ex pulmone ſigna.	362
R		<i>Sanguinis</i> fluore laborantes qui faciliſ, qui difficiliſ curantur.	363
<i>Ranarum</i> viſcellum.	195	<i>Sanguinis</i> ex pulmone fluentis curatio difficiliſ.	365
<i>Raptus</i> Græci ſpaſmus.	185	<i>Sanguinis</i> fluor à ſanguinis ſputo diſfert.	357
<i>Renaliſ</i> paſſionis cauſa antecedentes.	512	<i>Sanguinis</i> fluoris duplex ſignificatio propria & abuſiva.	356
<i>Renaliſ</i> paſſionis à colica diſcrimen.	514	<i>Sanguinis</i> fluoris per eruptionem, vuluſationem, deſtrictionem dignotiones.	359
<i>Renalem</i> paſſionem ex tumore quæ comitantur accidentia.	523	<i>Sanguinis</i> differentia varia à variis poſita.	357
<i>Reſorptiva</i> curatio ſive metachronica.	330	<i>Sanguinis</i> ex putredine per veſicam fluentis ſigna.	329
<i>Reſina</i> cadialiſ.	353	<i>Sanguinis</i> fluentis ex arteria.	360
<i>Rheumatiſmi</i> curatio.	350	<i>Sanguinis</i> fluoris ex ſeminalibus viis, vel ex vrèthra dignotio.	335
<i>Rhacofiſ.</i>	30	<i>Sanguinis</i> fluentis ex ſuperſignificum ſigna.	360
<i>Rhigoletbron</i> & <i>Rhigolyton</i> .	277	<i>Sanguinis</i> fluoris cauſe antecedentes.	356
<i>Rhigos</i> Græcè quid.	236	<i>Sanguinis</i> fluoris curatio.	367. &
<i>Rhinenchyton</i> .	343	<i>Sanguinis</i> deinceps.	373
<i>Rogmos</i> .	90. & 386	<i>Sanguinem</i> ſiſtentia.	373
<i>Ruma</i> .	264	N	
S		S	
<i>Særa</i> pro magnis.	264		
<i>Sanguis</i> teſtudinis, homini, vituli marini an conferat Epilepſie.	290		
<i>Sanguinis</i> fluentis ex hypochoſto.	360		
<i>Sanguinis</i> fluentis ex diaphragmate.	ibid.		

# INDEX.

Sartrix in rabiem incidit, quod	somno quo differat.	6
chlamidem scissam rabiem mor-	Somnus veneris quid sit, & cur	
fibus sarcendam sumpsisset.	sic dicatur.	332
—195	Somnus veneris aliquando alie-	
Satyriasis quid, & unde dicta	rius passionis signum.	—333
sit.	Somni veneri à Gonorrhœa dis-	
—223	crimen.	—333
Satyriasis quomodo curanda. 224	Somni veneri curatio.	ibid.
Satyriasis quibus, & qua aetate	Soranus à quo hæc latiniZanda	
accidit.	suscepit Aurelianus. 66. 123	
Satyriasis causa antecedentes.	Sorani libri de adiutorijs.	—127
ibid.	Sorani lib. de febribus.	135
Satyriasin qua consequantur.	Spasmodus.	284
ibid.	Spasmus.	182
Satyriasi vexatis nocet veneris	Spasmus cynicus quid sit.	336
usus.	ibid.	
Satyriasi phlebotomia conveniens	Spasmi cynici signa.	ibid.
ibid.	Spasmi cynici curatio.	ibid.
Scamnia.	Spasmus cynicus quo differt à spa-	
—313	simo & paralyti musculorum	
Scilla decoctum ad. ducendas	buccas colligantium.	ibid.
aquas.	—439	
Scirrhus hepatis & lienis quo	Spasmi & tetani cause antece-	
modo curanda.	denies.	—182
—413	Spasmus stricture morbus est.	
Scotoma parva epilepsia.	ibid.	
—261	Sphæra repercusibilis.	—426
Scotoma unde dicatur, quibus ac-	Sphæra ludus.	271
cidas, quo tempore anni.	—261	
Scotomati causa, signa, sympto-	Spongia expressa ex decocto con-	
mata.	stringentium accommodanda	
—262	podici post usum clysteris.	
Scotomati curatio.	—453	
—262	Spongia resina cinis.	374
Scotoma quomodo differt ab epi-	Statio corporum seniorum.	—37
lepsia, & cephalæa.	—261	
—261	Stomachi risummatissimum qua se-	
Seminales via.	quantur.	—400
—224	Stomachi solutionem à Adar qua	
Serapionis libri Curationum. 293	sequuntur.	ibid.
Siagon.	—314	
—255	Stomachi solutio perpetuo cibum	
Strapismus.	exigens.	401
—255	Stomachi ventositatem qua se-	
Significatio in morbis unde su-	quantur.	—400
menda.	—39	
—12	Stomachi	
Smegmata.	—449	
—449	Stomachi	
Semine quomodo fiat sententia	—39	
Asilepiadi.	—39	
—39	Stomachi	
Semine pressura sine profundo	—39	
—39	Stomachi	

Stomachi

<i>Stomachica passio unde dicta.</i>	<i>Syncope seu Cardiacæ ventris</i>
<u>398</u>	<i>fluor perniciosus.</i> <u>152</u>
<i>Stomachica passio à Phagedæna</i>	<i>Syncope ut articuli acrob. medica</i>
<i>quo discernitur.</i> <u>152</u>	<i>mentis consuecantur, non requi-</i>
<i>Stomachicæ passionis causa an-</i>	<i>rit.</i> <u>152, 158</u>
<i>tecedentes.</i> <u>399</u>	
<i>Stomachicæ passionis curatio.</i> <u>401</u>	
<i>et deinceps.</i>	
<i>Stomachica passiois cum duri-</i>	
<i>tie curatio.</i> <u>403</u>	
<i>Stomachicæ passionis cū rheuma-</i>	
<i>tismo curatio.</i> <u>ibid.</u>	
<i>Stomachicam passionem quæ se-</i>	
<i>quuntur.</i> <u>392</u>	
<i>Stomachi duritiem quæ sequun-</i>	
<i>tur.</i> <u>400</u>	
<i>Stomachica synanche.</i> <u>ibid.</u>	
<i>Stranguria.</i> <u>52</u>	
<i>Structura, Solutio, et utrinque</i>	
<i>complexus.</i> <u>19, 20, 23</u>	
<i>Styphonta.</i> <u>459</u>	
<i>Stymmata.</i> <u>461</u>	
<i>Subactio homines euentu conce-</i>	
<i>ptionis generari ex Parmeni-</i>	
<i>de.</i> <u>493</u>	
<i>Sudores critici et diaphoretici.</i>	
<u>140</u>	
<i>Sudores diaphoretici in dysente-</i>	
<i>ria.</i> <u>457</u>	
<i>Sympasmata.</i> <u>421</u>	
<i>Synanche quid.</i> <u>160, 161</u>	
<i>Synanche unde nomē sumpsit.</i> <u>159</u>	
<i>Synanches signa.</i> <u>161, 162</u>	
<i>Synectica causa.</i> <u>38</u>	
<i>Synanches causa antecedentes.</i>	
<u>160</u>	
<i>Synanche phlebotomia adhiben-</i>	
<i>da.</i> <u>164</u>	
<i>Synanchicorum cibum.</i> <u>ibid.</u>	
<i>Synanches prognostica.</i> <u>162, 163</u>	
<u>163</u>	
	<i>T</i>
	<i>T Ensmus dysenteria iun-</i>
	<i>gendus.</i> <u>426</u>
	<i>Tenont, gra.</i> <u>513</u>
	<i>Tenoute.</i> <u>168, 167</u>
	<i>Tetanus, et eius species.</i> <u>182</u>
	<i>et 183</i>
	<i>Tetano phlebotomia conuenit.</i> <u>187</u>
	<i>Tetano conclusos dentes cuneis</i>
	<i>aperire non oportet.</i> <u>187</u>
	<i>Tetani causa antecedentes.</i> <u>184</u>
	<i>Tetanus stricture morbus est.</i> <u>183</u>
	<i>Thrombosis.</i> <u>458</u>
	<i>Timor repentinus memoriam eri-</i>
	<i>pit.</i> <u>299</u>
	<i>Tormentum quæ passio sit.</i> <u>210</u>
	<i>Toruiosa passio quæ sit.</i> <u>212</u>
	<i>Toryniton.</i> <u>246</u>
	<i>Trophemata.</i> <u>490</u>
	<i>Tumor ventris quid, et eius acci-</i>
	<i>dentia.</i> <u>473</u>
	<i>Tussicula aliquando morbum per-</i>
	<i>se, aliquando morbi appendix.</i>
	<u>355</u>
	<i>Tussicula curatio.</i> <u>ibid.</u>
	<i>Tympani eorum remedia specialia</i>
	<u>436</u>
	<i>Tympanites.</i> <u>432</u>
	<i>Typhus febri ex Ascleprade.</i> <u>37</u>
	<i>V</i>
	<i>Vapor ex cimeribus.</i> <u>222</u>
	<i>Venarum sectio in dolore</i>
	<i>cap.</i> <u>259</u>
	<i>Venarum sub lingua sectio in Sy-</i>
	<i>nanche uicini.</i> <u>169</u>
	<i>Veno</i>

# I N D E X.

<i>Venus parua epilepsia.</i>	290	<i>Vesica hamorrhagia ex eruptione</i>	
<i>Ventositatem vëtris quæ sequan-</i>		<i>vel osculatione, vel percussu,</i>	
<i>tur.</i>	474	<i>vel saltu curatu facilius, quam</i>	
<i>Ventriculatio.</i>	212	<i>ex putredine.</i>	529
<i>Ventriculosi seu torminosi.</i>	212	<i>Vinifacultas ex Asclepiade.</i>	52
<i>Ventriculosa passio unde dicta.</i>		<i>Vina diversi generis.</i>	149
450		<i>Vina Italica constringentia.</i>	469
<i>Ventriculosa passio, à Rheuma-</i>		<i>Vinum protropum.</i>	350
<i>tismo ventris quo diffcrat.</i>	451	<i>Vinum tortium.</i>	238
<i>Ventriculosa pass. curatio. 452. &amp;</i>		<i>Vinum tethalassomenon.</i>	156. 157
<i>deinceps.</i>		<i>Visa quæ sint Latinis &amp; Tullio.</i>	
<i>Ventriculosam passionem quæ de-</i>		199	
<i>monstrant. 450. &amp; deinceps.</i>		<i>Vnctiones &amp; fotus coctionis in-</i>	
<i>Vertebrum Cælio Ischion. 25. &amp;</i>		<i>uande gratia.</i>	61
28.		<i>Voci amputata causa, &amp; cura-</i>	
<i>Vesica tumoris ex lapide signa.</i>		<i>tio.</i>	346
525		<i>Vomitus provocatio in cephalæa.</i>	
<i>Vesica passionis plurima.</i>	525	252. & 254	
<i>Vesica hamorrhoides.</i>	529	<i>Vomicarum significatio quæ.</i>	545
<i>Vesica passionis ex tumore, &amp;</i>		<i>Vrinalium viarum eadem passio</i>	
<i>lapide curatio. 530. &amp; deinceps.</i>		<i>quæ &amp; renum.</i>	524
<i>Vesica hamorrhagia.</i>	527	<i>Vrinalia medicamenta.</i>	286. &
<i>Vesica vitia curatu difficilia. ibi.</i>		289	
<i>Vesica fluentis, id est solutionem</i>		<i>Vue fabriles. 352. 372. 407. &amp; 469</i>	
<i>patientis curatio.</i>	528	<i>Vua paleales.</i>	233

F I N I S.



## Errata sic corrigito.

Pag. 3. phrenith. l. phrenitim. ibid. si cōsensu. l. quia cōsensu vehemēs &c.  
 pag. 4. scriptorū edidi. l. scriptorū autoritate edidimus. ibid. in marg. potissi-  
 mus l. potissimum. ibid. designet. l. designat. in marg. παρὰ κτλ. l. παρὰ  
 κτλ. causas nominare. l. causas eum nominare. in marg. seu partitio-  
 nes verba \* nominibus seu partitiones verba nominibus ipsis &c. ibid. quæ  
 dictio λαι. l. quæ dictio λαι. & causam esse το πυρί, febrem verò το πυ-  
 ριτῶν. l. causam esse το πυρί, i. febricitandi, τὸ ὅ πυρί, το πυρί.  
 pag. 5. in marg. in aliis rebus &c. l. Si in aliis rebus id vsurpetur, quàm &c.  
 ibid. neq; \* sumpson. l. neq; sumptionibus. in marg. vt sol. 5. &c. vt fo. 3. de  
 febre dixit. 6. a somno contra naturam. l. a somno quia contra naturā est.  
 ibid. in furore febricit. l. in furore non febricitantium. 7. membranarū naris.  
 l. membranarum nariū. 8. quia non futura. l. quia si futura. 9. veniunt.  
 Siquidem &c. l. veniunt, siquidem imminentem passionem \* cohibeat medī-  
 cinalis &c. in marg. colatur. l. tollatur. in marg. Cum verò. l. Nos verò.  
 ibid. ceratione. l. ratione. 11. ne ea. l. ne u. ibid. eius causa. l. eius causis. i. ar-  
 dor. 13. in marg. Eripath. l. Leipthymia. 15. in marg. αὐγῶν l. μύγῶν.  
 ibid. ager credibilis esse non. l. ager nō credibilis esse potest. 16. in marg. λῆγῶν  
 l. λῆγῶ. 17. argumento pass. l. augmento passionis. 18. calore. l. colore. &  
 mox, Calore inquam. l. Colore inquam. ibid. subinflatas. l. subinflatus. ibid.  
 lethargi. l. lethargici. 24. ἄτρω. l. ἄτρω. in marg. item quia ne. l. item ne.  
 25. in marg. potus aquæ. l. potum aquæ. ibid. pertracta. l. pertractata. ibid.  
 adiutorium tendere. l. intendere. 26. in marg. potus aquæ. l. potui aquam.  
 ibid. alienationis. l. alienatio. 28. dehinc clunes etiam, simul. l. dehinc clunes  
 etiam. Nam simul hec omnia scarificare &c. ibid. phlebotomia, quæ. l. phle-  
 botomia par, quæ &c. ibid. in marg. λῆγῶν. l. λῆγῶν 29. fieri. l. fieri po-  
 tuerit. ibid. incidenda. l. inhibenda. 30. fecerunt. l. facerent. 31. in marg.  
 \* multum \* in carp. \* artuum, in carp. &c. 32. in marg. vt exacto. l. vt ex-  
 erto, &c. ibid. Hæc enim quæ. l. Hæc enim de collaris proferuntur, quod  
 Græci &c. 34. fuisse. l. esse. 36. fortuna. l. fortunam. ibid. sensa. l. prehensa  
 ibid. æternum mouentia. l. æternum se mouentia. ibid. sensas. l. prehensas.  
 42. adiutoriū. l. adiutoriorum. 47. in marg. vulgò echinon. vulgò errhinon.  
 48. & phrenitico. l. ex phrenitico. 50. in marg. inebriare. l. inebriari.  
 59. ὀφθαλμοί. l. ὀφθαλμοί. 64. consequentis passionis. l. consequenti passioni.  
 77 phreneticis. l. phreneticis sic ubiq; legito. ibid. conyza. l. conyza. 78. he-  
 betudine. l. habitudine. 86. sanitati. l. sanitati. 88. camali cibo. l. carnali  
 cibo. 99. λῶσπναια. l. λῶσπναια. 111. hebetudinem. l. habitudinem. 112.  
 ælionem. l. unclionem. 124. actum. l. actum. 144. in marg. pychtica. l.  
 pychtica. 165. in marg. εὐφροῖα. l. εὐφροῖα. 168. in marg. apperibile &  
 stom. &c.



stom. &c. aperibile. estomoticum. infra pag. 172. apertibile. 175. post hortum.  
l. post ortum. 176. in marg. 267. l. 167. 182. De conductione. l. De condu-  
ctione. 184. surum atq; vestig. l. surarum atq; vestig. 206. redncatur. l. re-  
ducantur. 209. in marg. indige. l. indiget. 217. cataplasmaticus. l. cataplas-  
maticus. 221. castorea. l. castoreo. 226. in marg. pendendi. l. pendendi  
ali. 229. Diarrhoea. l. diarrhoea. 233. apotomiam. l. apotamiam. 242. in  
marg. gloriosi medici. dele que sequuntur. \* scripserunt. dele que sequun-  
tur. ibid. Pauci autem. l. Patientes. &c. in marg. i. x. l. i. x. \* quo-  
tidianas Diurnas. \* Diurnas dixit. &c. 245. in marg. i. x. l. i. x. l. i. x.  
286. carnem ut p. p. l. carnem. ut pag. 290. 290. cen. l. non. 322.  
siquidem ex vulneribus. l. siquidem an ex vulneribus. 326. calidus. l. cali-  
da os. 345. in marg. ferreus. l. ferrei. ibid. squilla. l. scilla. 365. ut q. ex-  
clusis vel cadentibus &c. l. ut purgamentis exclusis vel excurrentibus. etiam  
febre oborta. adhibita curatio in &c. 366. chirurgamentis. l. chirurgamentis.  
403. solutio cogente. l. solutione cogente. 404. calonia. l. cydonia. 409. im-  
mittimus. l. immittimus. 410. in marg. i. x. l. i. x. l. i. x. 413. peri-  
toneon. l. peritoneon. sic in marg. i. x. l. i. x. l. i. x. 437. in marg. cadentium. l.  
candentium. 510. iniusta. l. iniusta.



